四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一七冊目次

赤水玄珠三十卷（一）（明）孫一奎撰 明萬曆刻清修本 〇〇一

赤水玄珠三十卷（一）

（明）孫一奎撰

明萬曆刻清修本

赤水元珠三十卷（浙江巡撫採進本）

明孫一奎撰。一奎字文垣，號東宿，又號生生子，休寧人。是編分門七十，每門又各條分縷析。如風門則有傷風、眞中風、類中風、瘖痱之別。寒門則有中寒、惡寒之殊。大旨專以明證爲主，故於寒熱虛實表裏氣血八者，諄諄致意。其辨古今病證名稱相混之處，尤爲明晰。惟第十卷怯損勞瘵門附方外還丹，專講以人補人採煉之法，殊非正道。蓋一奎以醫術遊公卿間，不免以是投其所好。遂爲全書之大瑕，是足惜耳。原本卷末附醫旨緒餘二卷，醫案五卷，今別自爲帙。焦氏經籍志載孫一奎赤水元珠十卷、醫旨緒餘二卷，而不及醫案，或所見非全本歟。

赤水元珠

西泠吳氏藏板

赤水玄珠序

羅浮道人題

盖謂三五之道非人不傳而非人之至者尤不得其傳是故太上聖人知陰陽之幾察寒暑之候辯愚民之冷煥宣卉物之温涼為之濟人者不勞而受沉痾者得效矣嗟乎世道賴此人也久矣吾心思若人亦久矣時休陽孫生探天地五行之奥採百家同異之龜觀易必尋易之源講書必求書之要凡所以濟人

歙邑黃鶚刊

利命者一以心學為本誠所稱上古之胎醫中之伯者生平不妄交與在家惟註方言有醫旨緒餘數百言率皆辨衆論以歸於中明先天太極之圖發前賢証佊之秘又於先世所未名之

疾未有之方為之補其闕而增其所未盡其有功於人夫豈負薪之勞壼飧之賜哉書成請題於余余曰文以載道文而無道焉以運之吾人所羞稱也今生之所纂者率皆闡幽發微會

之中而得其解昔黃帝求道多方索之不得而象罔得之於赤水若生所註信有本矣名之曰赤水玄珠不亦宜乎然則世之藝何捨鈞天大樂而審笙敔薄大羹之味而嚼艸根乎雖然語

云莫前弗開莫後弗傳而為生之迺胤迺孫者又當敬承大志永保於無疆之休可也其若生之意否孫生叩首曰善遂書之孫生休人名一奎字文垣東宿乃其號也

赤水玄珠序

太史氏曰世所籍口金匱玉表清露以濟司馬長卿渴枚氏能令吳太子霍然病已此甚無當也余嘗善病所識天下醫無慮數百獨海陽文垣孫君最名余所識天下名醫無慮數十獨孫君其古之名醫歟古之醫者能割皮解肌訣脈結筋搦髓腦揲荒爪幕湔浣腸胃

漱滌五藏練精易形此秦越人能生補太子淳于意能生郎中令循文垣孫君能生不佞且君之生我至再矣一在辛巳年一在今歲丁酉冬其察視審治甚神其效甚奇余是以德君深扁鵲曰良工取之拙者疑殆然又曰越人非能生死人也此自當生者越人能使之起耳君有其良復有其讓

語曰痛定思痛余每思之輒藹藹霣涕余是以德其甚深因有感于造物者以其生兮是大德也而必以兮顯其之奇亦忍矣造物不可問其神于醫必神于理其有以振兮益兮使曰首無所從藉其之奇乎則其之惠矣矣雖然衆生無病則維摩詰無病其安能俾衆生不病哉天下賴其惠者尚多君乃出一

編示曰赤水玄珠云傳所命也余故稍敘其之奇弁諸首簡傳之天下用廣其之惠于不窮不佞之言謭謭以當施藥艸云爾

賜進士出身通議大夫吏部右侍郎兼翰林院侍讀學士國史副總裁記注起居

經筵日講官前禮部侍
郎詹事府詹事掌院
事國子祭酒徐顕卿譔

赤水玄珠序

醫難言哉靈素出自軒岐其成
言班如可誦也成法森如可尋
也而其包涵陰陽五行之化節
序盈虛之變金石草木飛潛靈
蠢之性情深遠無盡與潔淨精

微同旨而不可竟是故業是者
性必夙授質必靈明誦其言而
不泥其言尋其法悟其所以法
無見而無所不見而卒歸於無
見又不以無見名無解而無所
不解而卒歸於無解又不以無

解名而後可以融靈素之秘奧
察腑臟之隱伏氣血之流滯空
竅關膈之通塞起歸人而生之
也不則且不能窺軒岐之藩籬
何論閫奧醫難言哉自周秦迄
今以是樹門戶者奚啻什伯千

萬和緩越人叔和仲景倉公伯
仁丹溪數公而外寥寥無聞猶
且不免淺學雌黃之口子華子
有言醫者理也理者意也藥者
瀹也瀹者養也悟其意會其理
察四然二反而加疏瀹始可以

言醫藥醫難言哉余嘗既其難
思見其人久矣而潘符卿往往
推休寧孫生文垣者善名理而
精岐黃及握符宰休寧時有陰
陽之患孫生診之果能洞標本
之緩急投劑輒効試與上下靈

秘而論議之隨叩輒應如建瓴
水使人解頤余固奇之矣已出
所著醫旨示余鑿鑿乎發前人
所未發補前書所未盡益大奇
之生曰此緒餘也有全集三十
卷未授剞劂曰得卒業其發凡

定例析類分門按病訂方詳哉乎其言之也此書行而後世之疾其有瘳乎書未有名會方士挾仙術遊里中生就問名仙稱純陽子命曰赤水玄珠生馳語余、曰嘻純陽子知生者心哉

玄珠何物也是未可以知識言語形象求也而得之必以象罔生所著積以歲季超焉悟解萬境俱冥殆所謂夙授靈明不以見解名者耶遂為引數言於首

知以

萬曆丙申長至日南京吏科給事中前休寧令豫章祝世祿書於梧竹居

孫生赤水玄珠序

郡人汪道昆伯玉譔

萬曆辛巳蔣秋官郎以恤刑行部来新安日新鍰書欲病作呂醫診視族醫無狀者誕而謁投病以益甚同蔣藉而仕進者爲吾郡汪伯立雅善孫生文垣視疾宣言今以醫名家者無如孫生良薦入診之診畢孫生皇皇若有失也又心懼難色危言以駴蔣因陽飾愉婉以寬其心對劑而進飲既蔣曰稍安矣人擧

欣欣章公無恙獨孫退語郡丞曰蔣公病甚亟藉令生蚕從事五日疾可已身可活也今雖司命能若之何哉茲愉婉而具七餌者非謂能回其勢而生之也爲無辜族醫地爾蔣果不出五日死郡之人翕然稱奇在昔春秋越人知桓侯于未病迨侯病遁逃而去齊孫生於蔣亦可謂預知微矣余固記憶其事而想其人之一覲也閱幾年生族子元素持生所著赤水玄珠懇余

叙諸首余謂醫學之難非彊識
方書之難也遡本始而不謬所
宗之難亦非徒知所宗之難也
以意會所宗者之心契其旨而
融其迹之難也亦非以古人之
心會於心之難也以古人之心

會之已而用之隨俗爲變運化
不膠之難也是故執方則泥用
變則神泥則功鮮而害速神則
中奇而効闕故受醫不慎所宗
是規磨之識也徒執其方是刻
舟之見也何也軒岐之訓猶之

六經漢之仲景與私淑尼父之
軻氏奚異辟彼惡池而源于河
配林而始於岱也世之業醫者
高之徑二守彥脩之譚謂心法
在是畢之拘局曲一定之方膠
用而嘗試之爲朝夕斋糈計偶

獲一効遂囂然自負以爲高而
靡知顛蹶隨之畢之畢也舍古
習而倍前賢即晉齊之杞不啻
也忘其本矣安能獲古人之心
若旦暮遇之哉廼若孫生著述
闡發素難之秘與獵弋諸先哲

之名言取裁于性靈之獨見列其方而不泥其方究其辭而融其意生平見病而决死生如預知蔣恤刑者根本敦茂非苟而已也余固多病獲生譔著讀之翛然其有瘳乎生又謂親歷者狹未若廣之以公同志其所濟者奢也廼自序以就正大方爲名非懸書以市譽有而不居顯而益晦生非但以技高其德邵亦可重矣余故敘之以滲元素文學俾生弁諸首簡

赤水玄珠序

蓋余識孫君于白下自崔封部所覩莊而危和言義不及利則以儀之致邸中与談性命剝復之奧氣化消息之機明危觀火細如鏤塵出入揃林序、皆香如浚三山泛溟海洸洋河漢窠冥有極蓋七日而孫君志其所之余亦不知孫君之爲何客也將別出所著醫旨緒餘相示且云書有赤水玄珠若干卷本証及著方上極靈素內景河洛籍易不參劉李諸名家橫豎鉤貫得其要領是書

也行將使世無夭札余慕之甚頃來
遊吳中始出示余因留數卷余所涉
旁郡國久之遷余又遠矣孰更數
方來愈檢君書中得方與症偶不數
劑霍然良已然後喜君之爲方用
至利生人又且急如此而益嘆君之用

心爲勤且遠也嗟乎醫者死生之門
也乃或目不知書耳授數方便欲寄
人生死于其中本無奇利齒喉名
盛興服昂意氣以誅主人挑內竪手
囁嚅乎語曰鈞奇以重精名高利
厚兩集焉人有請急赴徐徐不應以

覩成敗乃進而收其贏責居人後
利在人先其自爲甚巧于病家無
分毫倚賴受者奔走之如市彼安
乎矻矻勤苦爲君獨勤且遠不憚
煩若此使君與彼乎食喉名之
徒樵進于勢語落落不阿于僮僕無

款曲有勢務不自言不讀君書不知
君之爲異人也用醫如用將呼吸安危
間不容髮而以殉虛名與俗情爭醫
人負痛哉已乎於後是書之刻爲
不容已也一日予嘆謂君言珠之價也以豪
固覽君所持論則幾留如詛盟其

為知也夫炙象圖豈可以目得之乎君
曰不然今試以著為寒為熱為虛
為實書之所可載者也察脈辨危時
寒時熱時虛時實而形之存乎其人
焉雖善言者能言也不象圖其可以得
之乎余亦唉而序之

西吳沈演時敷甫譔

赤水玄珠序

自古無不朽之方而世醫每不
淺之病者如而無泥之以求無可
言而化也余所以高玄珠之千古化者
黃生子嘉生子律宝生之與之詞
羅山人惠生之子無不能言之與
之醫道以醫鳴若而銅羅山人
易秘書生以授生之子生之生之文兵黃留
於其醫者自受銅羅山人名是
東之世醫而近古焉生之子之術益
若三乃化而業由孫生生家而醫宗
生來學而於神慶留意而於圖

謂醫之討家者其書者之不折為
立而立言之陸生香枯以其書者
仁儒為生之人後世學者夭死其賞
乎何古之人無書不可傳者從津其
而精粗畢存要略節行之生之人及
古乃從古人精粗而因日書只可之傳

者是篇乎其是非不折之案之案底之
為繕寫而得醫者也粗畧哀集法在
錄古及抄本秘而之案任而之取擇
此龍其術書詳方龍其發之書方稱精
黨里乾之為無之千年而經東萬書
我人治病消垣而見人之不繼者

以古治病者也沒至未見人之病而
已調復生以以病按復按病而發之
方案具之書消垣雖之里之不百代
之不精偶然也古之言而我人此其生
死人也其之生者而死亦嘆乎之害而
致死之世不是之講人見而像其是在

也傳之而後而志其生者而以不死者
生之子孫奎形書人調出人贊益
我之人
時道士出身建田郭南京國子監博
士古新　時樹經謹識

□□三讀矣
經十篇□□□□□習之之意以書
之儀而復之之而言　而得之之要
集密窮異之萬狀而實靈之蘊
自然蓋無而有之而無有無而
未始有也者是神何道易之道

哉易藏於太極著炯於兩儀宣
洩流布於山川都會形勝瀲發
於人身五官百骸七竅而脩蠖
蟄伏無非是易者曰此易之真
教也若彼點畫剞劂耳徒借
為呻吟帖括耳誠枯毫敝楮安

所神大塊之神而傳易之神易
之神得孫子之先君子傳之而
孫子傳其先君子之神以傳易
之神也髫而授句讀遊易於茲
畫剞劂呻吟帖括間未慊甫壯
而視伯兄賈長短輕重出入低

昂易矣猶未慊道遊異教家秘
之以岐黃術始察知消息升沉
寒暑虛實而易之神之於胸臆
間多矣猶未慊悉發岐黃所謂
點畫剞劂者呻吟帖括之則又
謂是誠枯毫敝楮也猶未慊自

趨蠡而匡廬而沅湘而秦淮而吳越探賓搜奇且欲傳易之神於山川都會形肢摸其所蘊蓄發舒於太極兩儀者而通之五官百骸七竅則謂曰其先君子之晉易而憊弱也得若仲而委

易之蛻傳易之神矣孫生三十年於茲以其神之岐黃異巧變幻如雲霓狀而海內病欝癆者癆瘵者瘖瘂顛癇者百千雖治之詑待治於生不可數而生運化不滕人而可着菴矣獨生之

先君子無憂某生所著赤水玄珠真岐黃神今得廣而傳之予且見其先君子之神不朽而先君子之澤無窮昔顯考琳以遺毋食而廣孝君子嘉之曰錫類生實有為蓋不徒問切族醫爾

者予曩時苦濁三年莫為理遇孫生授丸而旦夕瘳也若有見孫生之所以為神者故敢神其神

吳興潘大復徵復甫著

孫生赤水玄珠序

余自弱冠從丹鉛業素善病會孫生文垣以其術游陽羨為余切脉熟視余曰所瘳非直疾也子往矣必顯聲執苑中無疑更未十年余果得第通籍長安中則生之言信也居未嘗不指屈竊歎伏爲自是生技日益進名日奢問方者屣屨遍戶閾冠蓋相望也則生又自詑曰吾所為是業者将脩先君志以濟物而利後嗣者也與其身親痲者及

而狹疇若以獨契者為撰述廣而及乎閱数寒暑帙成而屬余序之余惟天下之言衞生者祖軒岐軒岐家言意而不泥理而不方其變化之有概乎仲景氏務以支順闔横之辨陽入陰入之殊為之闡経絡而章和代旁引廣喻其要歸卒澤於軒岐自丹溪後而醫方家盖難言之矣譬如張羅者張之於無鳥之所則終日不獲一張於多鳥處則又駭鳥矣必張於有鳥無鳥之

際然後能多得鳥焉夫離法而師心自用者張之於無鳥之所也執詞而泥其方者張之於多鳥之處也惟不泥其法不離其法以合離得之斯張於有鳥無鳥之際而變運不膠今孫生之

言具在其概實離津筏而上之然亦不欲逾津而棄其筏所謂上見其原而下通其流者非邪或曰孫生之言誠效矣然闡之貫諸懷錐刃而天下爲勇西施衣褐而天下稱美故扁鵲見秦

武王而投其石謂與知之者謀之而與不知者敗之也孫生以名家子餙身脩行焦神竭能不爲重糈故第以異人所授精良而闡發岐黄之秘與余恐當孫生世而然孫土者以貫諸之錐

刃而西施之衣褐也請以質諸宋陽里子

賜進士出身承德郎禮部儀制清吏司主事陽羨友人吳正志撰

赤水玄珠序

繆氏仲淳有言學不徹三才不
可以醫不會六經語孟孫吳涅
槃道藏諸書不可以醫下士聞
而大咲予游齊雲訪孫山人文

垣質以仲淳語輒唯唯因前席
請益曰神農本草非而胗家之
祖與何以無方曰固也聖人彝
百物之性洞五臟之候令巧者
批竅中郤各自以其意為方以
待天下之變曰後世名家如東
垣仲景河間之流縷縷焉析而
疢之曰某方已某病贅乎曰此
又善會聖人之意而陰示天下
後世以無法之法也規矩生於

巧舍規矩而索巧則法之所不
載雖然丹溪出而支離門戶矣
弃也沿襲久而俗學興蹊徑雜
而指睹亂辟之盲吏折獄不得
其情而妄比率方術滋煩殺人

滌多矣善悟者得意於法外故能虛實〻虛〻實〻虛故知變知變則知常知常然後生死人予霍然起謝不敏山人出一編示予且曰不佞主臣苦心五十年弁里有降仙者自呼純陽子予舉是印之大書曰玄珠玄珠遂以名云是且然乎哉進予技矣

賜同進士出身徵仕郎中書舍人故鄣丁元薦譔

自序

孫仲子奎曰先文學以儒術起家迺七尺孱弱始受易為諸生攻制藝過苦又屢上棘圍罷歸不無怏怏體罷憊而弱益甚余甫垂髫日侍呫畢見之輒隱心焉間嘗自念

昔人有言事親者不可不知醫何得究竟秘奧俾葆和吾親無恙乎然猶之呻吟帖括未已也比稍長先文學令視伯兄賈之括蒼道遘異教家有儫儫也者指余曰孺子何為者乃恂恂若爾吾懷秘密久矣遇而後傳吾歷觀人間世無如孺子可授若能受而讀吾方可以衛生可以澤物所就匪直一手一足烈矣何必劬劬奔走齷齪籌計為哉余曰幸甚君之禁方豈能如陽慶公所傳五色奇咳之術余小

子事親有所藉手矣及受讀而解驗之果有槩於中而多奇中因趣裝歸海陽語先文學以故且告之欲舍業而事方術先文學沾沾喜曰醫何不可為也良醫濟施與良相同博比衆又何論良賈第異人

所授精良矣顧拘局而不通洽脫
非心融機變則其方泥而難用夫
飲水者必窮其源軒岐遺經非方
術家之崑崙乎而張仲景以下諸
家皆崑崙所達支委也彼習業者
專則精不專則雜稟心者一則恒

不一則問飛衛之貫虱也佝僂之
承蜩也專一故也小子弟勉之迺
裝軒岐遺書以及諸大家載籍下
帷誦讀口玩心惟無間寒暑可三
年所私心又謂索居而闚觀孰與
廣詢而遠覽方今 明盛多賢宇宙

寥濶四海九州之士持昭曠而[illegible]
成法者詎無其人余何卑卑以立
里自隘也於是自新都游彭蠡歷
廬浮沅湘探冥秦淮釣奇於越卒
之淹跡三吳馬所歷之地遇明達
而折伏其前與之譚支順闌橫之

秘叩下逐上争之旨辯陽入陰入
之殊闡經絡和代之異與夫鑱石
橋引案杭毒熨之法今三十年于
茲矣惟耳目漸廣故得於心者津
津漸融即未能為人治病決死生
多驗或庶幾診視鮮戾投劑靡乖

慰夙心而遂生平永親年而登大耋矣惟是三吴諸名公遂信余有知也忘分下交爭為延致余又懼時過苦難因乘餘暇采先哲之名言出已試之鄙見積以歳年纂輯成袠上之期無負先文學之訓次之希免徧閱之勞下之為子姓守故業者立法程焉非以此而希有聞也迺有客請余集而付剞劂夫以名家稱者林林而著作之盈充棟余何必置一株鄧林間哉客曰梗楠豫章櫟社之樹皆木也良與

賤之分有目者能辨之君有國工能而自秘其術何示人不廣也余曰不佞固非梗楠豫章之良散木之賤亦非甘心如客言當置之市肆以竢工師運斤焉是所顧也敢自矜敝帚而秘之乎若曰懸書國門以市譽非予所敢

古歙黄昺刻

採用群書目

河圖　洛書
周易　洪範
周禮註疏　爾雅
孝經
越絶　史記
前漢書　後漢書
宋史　朱子綱目
元史　古今逸史

野史
陰符經　孔子家語
墨子　管子
抱朴子　黃石公素書
呂氏春秋　劉向說苑
太玄經　白虎通
大易通　伊洛淵源
性理大全　三子口彔
陸宣公奏議　韓柳歐蘇文集

黃山谷刀筆　陸象山年譜
王文成文集　王龍溪語録
陳白沙文集　弇州山人四部稿
副墨
埤雅　山海經
草木子　博物志
酉陽雜俎　鶴林玉露
搜神記　說文字原
夷堅志　玉海

萬寶事山　南村輟耕録
古今事類合璧　野客叢書
菽園雜記　仁孝訓
傳習録　洗冤録
灼艾集　羅子要録
鼂飛　家塾事親
居家必用　多能鄙事
祝子小言　閱古隨筆
鳴猷録　大明會典

大明一統志
吾學編
名世類苑
心經
五燈會元
圓覺經
金剛經
法寶壇經
肇論中吳集解
道德經
南華經
黃庭經
清靜經
許真君書
葛洪神仙傳
列仙傳
悟真編

呂純陽集
神仙四書
金丹大全
脩真秘書
譚真人化書
中和集
脩真十書
參同契

採用歷代醫家書目

神農本草經
黃帝素問
靈樞經
雷公炮炙
圖經本草
伊尹湯液本草
秦越人難經
顱顖經
張仲景傷寒論
金匱要畧
金匱玉涵方
華佗內照
甲乙經
巢元方
玄珠密語
紺珠經

王叔和脉經
褚氏遺書
肘後方
通真子脉語
千金方
千金翼
外臺秘要
范汪東陽問
斗門方
梅師集驗方
孫兆口訣
孫氏集驗方
李兵部手集方
文潞公藥準
靈苑方
蘇沈良方
原病式
保命集

宣明方　濟生拔萃
活人書　龐氏傷寒總病論
十藥神書　趙嗣真傷寒書
儒門事親　成無己明理論
醫學啓源　醫學發明
傷寒直格　傷寒蘊要
醫說　錢氏小兒直訣
陳文中小兒方　東垣十書
醫壘元戎　衛生寶鑑
嚴用和濟生方　陳氏三因方
產寶百問　孫用和家傳方
婦人良方　脉訣舉要
傷寒補亡論　傷寒百證歌
胎產須知　名醫錄
素問鈔　診家樞要
食療本草　本草拾遺
證類本草　日華子諸家本草
珍珠囊　本草衍義

日用本草　衍義補遺
本草發揮　食物本草
脉訣刋悞　十四經發揮
難經本義　攖寧生心要
證治本草　丹溪心法
丹溪纂要　丹溪心要
金匱鈎玄　仁齋直指
簡易方　澹寮方
心法附餘　醫學正傳
醫學正宗　醫學集成
袖珍方　本草會編
讀素問鈔　汪石山醫案
痘治理辯　本草集要
本草蒙筌　醫經小學
玉機微義　醫學統旨
醫學指南　醫林集要
乾坤生意　韓氏醫通
張三丰仙傳方　活人心統

諸症辯疑　衛生方
銅人鍼灸圖　證治要訣
瑞竹堂經驗方　奇效良方
海上仙方　萬氏積善堂
廣嗣要語　徐氏家傳方
醫經大旨　怪症奇方
折肱錄　避水集驗方
青囊雜纂　傷寒祖方發揮
醫方捷徑　醫學權衡

醫學權輿　明醫雜著
發明証治　體仁彙編
攝生衆妙方　養生主論
醫方選要　幼幼新書
活幼心書　幼科類萃
小兒袖珍　全幼心鑑
活幼口議　嬰童百問
活幼全書　傷寒百問
陶氏傷寒六書　伊尹太法

博愛心鑑　痘疹心要
痘疹正宗　痘疹八十一論
痘疹全書　傷寒類症便覽
外科精要　外科心法
外科經驗方　外科發揮
癰疽神秘灸方　鍼灸節要
明醫指掌　外科集驗方
龍木論　醫學名人統宗
原机啓微　咽喉口齒方

古今醫統　程氏釋方
適宜方　醫學質疑
難經正義　宦底便方
醫學源流　萬病回春
醫學入門　古今醫鑑
素問發微　金鏡錄
醫便　抱拙子傷寒翼
正脉啓蒙　本草綱目
醫學綱目　保赤全書

閱校諸公姓氏

凌迪知稚哲

姚弘道伯道

孫一俊應章

臧繼薦原實

臧懋德敬伯

陳夢麟孟仁

臧懋中用甫

姚紹憲叔度

臧懋循晉叔

潘大復徵復

臧懋和正甫

潘龍翰濬游

潘玄授徵奇

沈演　叔敷

張睿卿稚通

吳愼樞闢初

吳愼機發初

周承積慶叔

孫燁　元素

孫文德從明

生生子赤水玄珠凡例

一是書專以明證為主蓋醫難於認證不難於用藥凡證不拘大小輕重俱有寒熱虛實表裏氣血八箇字苟能於此八個字認得真切豈必無古方可循即於十二經藥性中表裏寒熱溫涼間摘出治之自然權變合宜不失勝算故古謂審證猶審敵知己知彼百戰百勝矣

一所引諸書名及諸家姓氏者欲人知有所自且一證之中經書多有發之未盡者前賢或觸目感悟揭而補之俾後學得以宗傚後之人不究前人盡心用意處反謂某長于此而短於彼其善于補而不善於攻迺以補其缺略者反指以為偏駁豈知本之學哉且又不尋師訪友局守一家之說濫稱專門為能擴充愚故不揣管陋每於一證之間有經文可據者即以經文為首引無經文者采取各家之言為證是則宗之非則黜之間有悞後人惑來世者則援據格言與論以折其衷庶見前人補缺之意匪偏而後之取法者得以履其正也

一辨證原經文有單立篇目則原依其篇目有混稱未析者或古今名稱不同如古經以風寒濕三氣雜至而成痺立名丹溪迺改痺為

痛風又如腸澼泄利腸風臟毒混論而未析如此者甚多設不辨而正之何所適從茲以各證經文混論者列之於前以為之綱以今人嘗稱者析之於後而為之目目下各列治法庶古今照貫攻治不紊緩急檢閱免致疑滯

一婦人臟腑經絡七情六氣感病與男子無以異治法亦然所異惟胞門子戶月汛胎產陰

挺崩漏赤白帶內外吹翕推特標婦人門五
卷使知同異端緒大方經畧庶家技不得稱
擅場局夫不得呼專秘隨俗為變醫之能事
斯無愧於扁鵲也與
一治小兒法惟臍風嘬乳盤腸內弔驚疳痘疹
為差別餘皆與大方脉同但臟腑脆薄劑宜
較小龠三歲內者不形於診然虎口三關之
紋亦難盡憑當於聲色動靜哭咲大小便參

之四歲後便可以一指按於經渠列缺之上
診左右手脉孰大孰小孰浮孰沉以辨內外
二傷率多應驗不可謂全不關於診也至如
痘疹尤小兒緊要方術及外科并列門後以
統其治用寓無可無不可之意云
一採用經史　國典群書諸雜家言統計二百
六十五種非泛騁博洽資口吻也以為不廣
搜遠引不足發明天人合一之旨而聖賢立

功立命之意夫古之人有不為良相願為良
醫也者此何以故子輿氏曰老吾老以及人
之老幼吾幼以及人之幼然則惠溥當時澤
流後世是惟相與醫適克踐之矣
一醫家著輯汗牛充棟不能一一臚置但取其
書可宗法萬世無弊者一部中採數條一門
中採數法數方以為嚆矢要之緣辭契意神
而明之存乎其人而已况登彼岸者航筏尚
可棄乎

一醫寄生死之關非知性命者不足與有言也
儒之窮理盡性以至於命固當取以折衷而
老氏性命兼脩釋氏明心見性道理自可參
觀故兼採二氏為翼夫知三教之所以者乎
醫學思過半矣
一醫要先識人身內景臟腑形質手足經上下
宗氣營氣衛氣呼吸出納三焦絡始及各經

表裏陰陽金木水火土部位配合命名之義上下不得錯綜一經不得兩配而河洛周易靈素洪範黃庭性理諸家合一不背洞悉源委始能言標本而測病攏若內景不明牽書不究局局然守草根樹皮之末方左右枝梧逢原謂何如命門三焦包絡相火及手足經配合自難經已下紛紛不決者余不揣菲謭于醫旨緒餘中借為剖析似而靈素洪範太極百家照徹相貫皷以俟之具法眼者

一醫道肇自炎帝之本草而黃帝之內經伊尹之湯液而周禮登之天官冢宰誠重之也諸如上池金匱青囊或神或僊不可枚舉其顯在六卿廊廟者齊則褚澄唐則王珪李世勣陸宣公狄梁公劉禹錫李兵部宋則文潞公蘊子瞻朱紫陽我　明則劉誠意咸有著述此皆上古良相之芳躅逸人之高致逮今凰斯為下廁之技流烏知醫之所自耶噫道無汙隆顧人力行何如耳宣尼有言人能弘道非道弘人吾黨共勗之哉

海陽生生子孫一奎識

菰城友人沈之墨書

生生子赤水玄珠目録

孟河丁氏藏書

一卷

風門

明風篇　傷風　真中風　類中風　瘖痱

瘟疫門

明疫篇　頭面腫（俗呼鸕鷀瘟　一名蝦蟇瘟）

火熱門

明火篇　外內君相篇　病機篇

論五臟有邪身熱各異　論表裏熱

論雜病發熱惡寒與傷寒不同

惡寒非寒惡熱非熱論

二卷

暑門

明暑篇　注夏　解㑊

濕門

明濕篇

燥門

明燥篇

寒門

明寒篇　中寒

三卷

頭痛門

頭痛　頭風　眉稜眶痛　雷頭痛

風屑　頭重　大頭風

面門

面　頰車病

目門

目　外障　內障

鼻門

鼻　鼻淵　鼻衄　鼻瘜肉

耳門

耳　耳鳴　耳聾　耳腫痛

口門

口　唇　舌　齒

咽喉門

咽喉　喉痺　梅核氣

四卷

腹痛門
腹痛　水鳴　小腹痛

脇痛門
脇痛

心痛門
心痛　胸滿胸痛胸痺　蟲痛

嘔吐噦門
嘔吐噦　胃風　悪心　嘔苦水　嘔沫
嘔膿　嘔長虫　酒嘔　嘔清水

腰痛門
腰痛

五卷

水腫門
針灸法

脹満門
脹満　一名皷脹　一名単皷
一名氣虚中満

痞門
痞

六卷

吐酸門
吐酸　停飲

痰飲門
痰飲

怔忡驚悸門
怔忡　驚悸　心動　怒　善太息　恐

七卷

欬嗽門
欬嗽

喘門
喘　氣短　氣促　少氣　産後喘

哮門
哮　善悲　肺痿　肺癰

八卷

癭門

瘧　瘧母　產後瘧
泄痢門
泄痢　泄痢辯　泄瀉辨
九卷
氣門
血門
嘔吐血　咳血　鼻衄　齒衄　舌衄
肌衄　小便血　大便血
十卷
虛怯虛損癆瘵門　方外還丹
十一卷
鬱門
鬱
痿門
痿
脚氣門
脚氣
白濁門

白濁
夢遺門
夢遺
汗門
汗　頭汗　手足汗　無汗
消癉門
上消　中消　下消　口燥咽乾
十二卷
痺門
行痺　痛痺　臂痛　肩背痛　着痺
鶴膝風　攣　一身盡痛　產後一身盡痛
十三卷
傷飲傷食門
傷酒　傷食　不能食
積聚門
積聚　汪子良積聚論
十四卷
癲狂癇門

明癲 明狂 明癇
顫振門
顫振
瘈瘲門
瘈瘲
痓門
痓 勞風
不得卧多卧門
不得卧 多卧

煩躁門
煩躁
健忘門
健忘
十五卷
秘結門
秘結
大小便不通門
大小便不通

關格門
關格
癃閉門
癃閉遺溺不禁辯 小便不通 遺溺
小便不禁 溺赤
脫肛門
脫肛 截腸病
前陰諸疾
疝門
疝

十六卷
霍亂門
霍亂 轉筋
中悪門
中悪 客忤
欬逆門
欬逆
噫氣門
噫氣

下氣門
下氣 漏氣 走哺
嘈雜門
嘈雜
眩暈門
眩暈
瘖門
舌瘖 喉瘖 妊娠瘖
疸門
疸
厥 論吐法
十七卷
傷寒門
十八卷
傷寒門
十九卷
傷寒門
二十卷
婦人門
二十一卷
婦人門

二十二卷
婦人門
二十三卷
婦人門
二十四卷
婦人門
二十五卷
小兒門
二十六卷
小兒門
二十七卷
痘疹門
二十八卷
痘疹門
一十九卷
外科門
三十卷
外科門

赤水玄珠第一卷

明新安休陽生生子東宿孫一奎著輯

友人楚銅壁山人桂峰黃　廉

古歙抱拙子鍾山程弘賓

和宇方中聲校閱

門人婺邑汪甘節吉甫

潘士梧惟美

查道立仲脩

休寧程　銓惟衡

徐景奇士偉

余　煌明德

子　泰來中孺

朋來濟孺　校梓

赤水玄珠第一卷目錄

風門
明風篇　傷風　真中風　類中風　瘖痱
瘟疫門
明疫篇　頭面腫一俗名鸕鷀瘟蝦蟇瘟
火熱門
明火篇　外內君相篇　病機篇
論五臟有邪身熱各異　論表裏熱
論雜病發熱惡寒與傷寒不同
惡寒非寒惡熱非熱論

風門

明風篇

生生子曰風春之令氣也木之所司肝為之主素問六化篇云木之化風主於春春之為言蠢也陽氣蠢動故風所以皷舞萬物為天號令岐伯曰東方生風風生木其臟為肝其志為怒故怒傷肝風傷肝肝為足厥陰之經以六氣言之自十二月大寒節起至二月春分節止是初之氣厥陰風木用事人有感其令氣者為傷風其有

不即發於令氣而四時亦有傷風之症者時人謂之四時感冒感有淺深治有緩急令既不同治亦有異故首述經文以明風之躰有所據而人天咸一之理實寓焉後別治法以見風之変症無常非簡約可盡先賢有言曰風乃百病之長善行而數变非易言也信夫

傷風

仲景傷寒論謂有汗悪風脉浮數為傷風外有六經之形症太陽症頭項痛腰脊強以桂枝湯治之後若傳經當宪仲景節菴治法治之其餘不過感冒耳四時皆有之以後法按治

九味羗活湯　治四時傷寒傷風頭痛遍身盡痛腰脊強發熱晝夜不散不思飲食

羗活　防風　川芎　白芷　細辛　柴胡
黄芩　生地　甘草　蒼朮　姜三片棗一枚

水煎熱服　如悪心減黄芩　如有汗加白朮減蒼朮　如口渴加知母石膏　如一二帖不觧或天寒時月加麻黄　如鼻塞加紫

蘇葱白

夫此方予每用加柴胡乃總治傷風各經之活套也令人只知其治四時傷寒如神不知加柴胡總治各經之妙盖羗活治太陽肢節疼大無不通小無不入乃撥亂反正之主也防風治一身盡痛聽君將命令而行隨所引而至柴胡治少陽頭疼在兩頭角及寒熱脇痛耳聾白芷治陽明頭痛在額蒼朮雄壯能除足太陰經湿氣使邪不得傳脾生地黄治手少陰心熱在內黄

芩治手太陰肺熱在胸。細辛治足少陰腎經苦頭痛不已。川芎治足厥陰頭痛在腦。此方乃易老所製。凡見表証悉宜服之。不犯三陽禁忌。實解利之神藥也。然以一藥而槩治各經之証。苟用其方而不知其所以立方之意。則未免有執一之弊。故述各藥主治本旨。使學者詳各經之症孰重。以本經之藥為君。迭為賓主。則所治無不响應。

和解散 治傷風鼻塞咳嗽。胸脇吊痛。發熱口渴。

紫蘇 杏仁 陳皮 半夏 前胡 薄荷
葛根 甘草炙 桔梗 桑白皮
姜三片 葱白三根 棗子一枚 風邪重加防

桂枝湯 治太陽頭項痛。腰脊強。自汗。

桂枝 赤芍 甘草炙 姜三片 棗二枚 煎服取微汗

此冬月即病宜服。春分後忌之。 小便數及飲酒人皆不宜服。 飲酒人不喜甘。恐中滿而嘔也

參蘇飲 治傷風鼻塞發熱。惡心有痰。胸膈不利。

橘紅 枳殼 桔梗 粉草炙各一錢 木香一分

蘇葉 半夏 乾葛 前胡 人參 茯苓各八分
姜三片 棗一枚 咳嗽甚者去人參加木香
熱盛喉疼除半夏加天花粉酒芩

熱傷風 咳嗽喉疼面熱。此素有痰火鬱熱在內。熱極生風。或為風寒所束。不得發越。此熱為本。寒為標。治宜清熱散寒。經云。火鬱則發之。又曰。風寒外束者可發。

二陳湯加桔梗天花粉玄參薄荷酒芩前胡
嗽不轉加瓜蔞仁 夜嗽多加知母 喉疼減半夏 痰盛加貝母枳殼 肺熱氣壅輕則加桑白皮地骨皮。重則加石膏

肺氣虛發熱咳嗽。服前發散藥。其嗽愈甚。或被發散太過。當用收歛之劑補之。 日間嗽多吐白痰沫。或惡心者為氣虛。六君子湯加五味子薏苡仁款冬 夜嗽多口渴。痰不易出。發熱為血虛。四物湯加知母五味子馬兜鈴麥門冬瓜蔞仁

肺氣實。或素有痰。為風寒所閉。鼻塞咳嗽。氣壅不得倒頭而臥。

三拗湯
麻黄連根節 甘草生用 杏仁不去皮尖
姜三片棗二枚煎服取清痰乃止
火盛者　瀉白散加石膏枳殼天花粉前胡
効遲加玄明粉一錢調下立應

中風

内經云風之傷人也或為寒中或為熱中有中血脉有中腑有中臟
東垣云中血脉者口眼喎斜　中腑者肢節廢

加五色有表証拘急不仁　中臓者唇緩失音鼻塞耳聾眼瞀便閉性命危急此三者治各不同如中血脉外有六經之形症則從小續命湯加減及疎風湯治之如中腑内有便溺之阻隔宜三化湯局方中麻仁丸通利之外無六經之證内無便溺之阻宜大羌活愈風湯秦艽湯中臓痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜之
綱目云中風世俗之稱也其證卒然仆倒口眼喎斜半身不遂或舌強不言唇吻不收是也然名各有不同卒然仆倒者經稱為擊仆世又稱為卒中乃初中風時其狀又如此也其口眼喎斜半身不遂者經稱為偏枯世又稱為左癱右瘓及腰腿風乃中倒後之症邪之淺者狀如此也其舌強不言唇吻不收者經稱為痱病世又称為風懿風氣亦中倒後症邪之深者狀如此也東垣以中脉中腑邪淺而易治中臓為邪深而難治者得之矣凡病偏枯必先仆倒故内經連名稱為擊仆偏枯也後世迷失經意以偏枯為

痱病之旨一以中風名之遂指偏枯為枯細之枯而非左癱右瘓之症習俗之弊至於如此也殊不知仲景云骨傷則痿名曰枯蓋痿緩不收則筋骨氣肉無氣以生脉道不利手足不稟水穀之氣故曰枯非細之謂也積日累月漸成細者間有之非可便指枯為細也此枯字即枯槁之枯初中倒時隨即醒者宜治若不醒者宜掐人中俾醒看痰涎壅盛宜吐之口噤亦吐之若口開手撒遺尿者為陽暴絶速宜大料參芪補接之若眼

戴上者宜灸之

玄珠經云風病口開手撒眼合遺尿鼻聲如鼾者五臟氣絶也（盖口開者心絶手撒者脾絶眼合者肝絶遺尿者腎絶声如鼾者肺絶也若見一猶可用工若面赤時黑主陽上散腎水反尅心火兼遺尿口開氣喘斷不救也）

按已上皆真中風症也由人元氣素虛腠理踈豁衛弱失護一遇風邪莫之能禦經曰邪之所湊其氣必虛救醒後多用驟補法丹溪獨參膏加竹瀝姜汁之類與類中風症不同法也

附方

小續命湯

麻黃（去節） 人參 黃芩 芍藥 防巳 川芎

杏仁 甘草 桂（各一兩） 附子（五錢） 防風（一兩五錢）

每服五七錢加生姜五片水煎食前熱服

金櫃要畧有石羔當歸無附子

大凡中風。不審六經之加減。雖治之不能去其邪也。內經云。開則淅然寒。閉則熱而悶。知暴中風邪。宜先以加減續命湯隨症治之。

中風無汗悪寒。麻黃續命主之。依本方麻黃防風杏仁各加一倍宜針至陰（足小指外側爪甲角針入二分出血）崑崙（足外踝後跟骨上）擧蹻取之

中風有汗悪風。桂枝續命主之。依本方芍藥桂枝杏仁各加一倍宜針風府（項後入髮際一寸針七分禁灸）上二證皆太陽經中風也

中風有汗身熱不悪寒。白虎續命主之。依本方甘草加一倍外加石膏知母各二兩

中風有汗身熱不悪風。葛根續命主之。依本方桂枝黃芩各加一倍外加乾葛二兩宜針陷谷（足大指次指間本節後陷中針五分）去陽明之賊刺厲兌（在足大指次指去爪甲如韭葉）瀉陽明之實 上二證皆陽明經中風

中風無汗身涼。附子續命主之。依本方附子加一倍甘草加三兩外加乾姜二兩宜刺隱白（足大指內側爪甲角）去太陰之賊此太陰經中風也

中風有汗無熱。桂枝續命主之。依本方桂枝附子甘草各加一倍宜針太谿（足內踝后根骨上陷中動脈應手針過崑崙）此少陰經中風也

中風六證混淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或

麻木不仁宜羌活連翹續命主之小續命八兩
外加羌活四兩連翹用六兩
古之續命混淆無症之别今各分經治療又分經
鍼刺法厥陰之井大敦（足大指甲後韭葉叢毛間）一刺以通
其經少陽之經絶骨（外踝上三寸灸五壯）灸以引其熱是
鍼灸同象法治之大䏏
防風通聖散
防風　川芎　當歸　芍藥　大黄　芒硝
連翹　麻黄（去節）　薄荷　山梔　白术　荊芥（各五錢）

石膏　桔梗　黄芩（各一兩）　滑石　甘草（各二兩）
每服一兩加生姜水煎服
中風外無六經之形證内無便溺之阻隔知血弱
不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜
養血而筋自榮大秦艽湯主之
秦艽（三兩）　甘草　川芎　當歸　白芍　石膏（各二兩）
細辛（五錢）　羌活　防風　黄芩　白芷　白术
生地　熟地　白茯苓（各一兩）　川獨活（二兩）
右十六味剉每服一兩水煎温服無時如遇天

陰加生姜如心下痞每兩加枳實一錢同煎
中風外有六經之形症先以加减續命湯随症治
之内有便溺之阻隔復以三化湯主之
厚朴　大黄　枳實　羌活（各等分）
右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半
終日服之以微利為度無時法曰四肢不禁俗
曰癱瘓故經所謂太過則令四肢不禁又曰土
太過則敦阜：高也敦厚也既厚而又高則令
除去此真所謂膏粱之疾非肝腎經虚也何以

明之經所謂三陽三陰發病為偏枯痿易四肢
不禁王注曰三陰不足則發偏枯三陽有餘則
痿易易為變易當用而痿弱無力也其治則瀉
令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承氣湯
選而用之若脾虚則不用也經所謂土不及則
卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不用四肢皆
禀氣於胃而不能至經必因於脾乃得禀受也
今脾不能與胃行其津液四肢不得禀水穀氣
氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故

不用馬其治可補十全散加減四物去邪留正

愈風湯中風症內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之然治病之法不可失其通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和如初覺風動服此不致倒仆

羌活　甘草　防風　川芎　細辛　枳殼

人參　麻黃　甘菊　薄荷　當歸　知母

黃芪　柴胡　前胡　半夏　厚朴各二兩　生地四兩

熟地　防己　茯苓　黃芩　白芷　蔓荊子

枸杞　地骨皮各二兩　石膏　蒼朮各四兩　桂一兩

芍藥各三兩　獨活　杜仲各二兩

右㕮每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服如遇天陰加生姜空心一服臨卧再煎渣服俱要食遠空心一服吞下二丹丸為之重劑臨卧一服嚥下四白丹為之輕劑是動以安神靜以清肺假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩均作四服每服加生姜五片空心以粥投之得微汗則佳如一旬之通利用愈風三兩大黃一兩亦均作四服如前煎臨卧服得利則妙常服之藥不可少四時之輔如望春大寒後加半夏柴胡人參各二兩木通四兩此迎而奪少陽之氣也望夏之月加石膏黃芩知母各二兩此迎而奪陽明之氣也季夏之月加防己白朮茯苓各二兩勝脾土之濕也初秋大暑之後加厚朴二兩藿香二兩桂一兩木通二兩此迎而奪太陰之氣也霜降之後望冬加附子乙兩桂一兩當

歸二兩勝少陰之氣也得春減冬所加藥四時類此雖立法於四時之加減更宜臨病之際審病之虛實寒熱土地之宜邪氣之多少此藥具七情六慾四氣無使五臟偏勝不動於榮衛如風秘服之則永不燥結如久瀉服之則能自調初覺風氣便服此藥及新方中天麻丸各一料相為表裡治未病之聖藥也及已病者更宜常服無問男婦及小兒驚癇抽搐急慢驚風等病服之神效如解利四時傷風隨四時加減法又

療脾腎虛筋弱言語難精神昏憒及治內弱風溼內弱者乃風熱火亢躰重者乃風溼土餘內弱之為病或一臂肢躰偏枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜以多思故思忘之道皆情不足也是以心亂則百病生於心靜則萬病悉去故此藥能安心養神調陰陽無偏勝及不動榮衛

四白丹 能清肺氣養魄謂中風者多昏昧氣不清利也

白朮 茯苓 人參 砂仁 防風 川芎各五錢 白芷一兩 知母 細辛各二錢 羌活 獨活 薄荷各二錢半 白技一錢半 甘草 香附炒各五錢 甜竹葉三兩 射一字 龍腦五分 牛黃五分 藿香一錢半

右藥二十味計八兩六錢三字為細末煉蜜為丸每兩作十丸臨卧嚼一丸分五七次嚼之上清肺氣下強骨髓

二丹丸 治健忘養神定志和血內安心神外華腠理

丹參半兩 丹砂五錢為衣 遠志五錢 茯神一兩 人參五錢 菖蒲五錢 熟地一兩半 天門冬一兩半 麦冬一兩 甘草

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十丸至百

丸空心食前常服安神定志一藥清肺一藥安神故清中清者歸肺以助其真清中濁者堅強骨髓血中之清榮養於神血中之濁者華榮腠理如素有痰久病中風津液湧溢在胸中氣所不利用獨聖散吐之後用利氣瀉火之劑

瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此是風熱煩躁方在火門

天麻丸 行榮衛壯筋骨

天麻六兩酒浸三日 牛膝六兩酒浸三日 杜仲炒去絲 萆薢六兩另研 玄參六兩 當歸十兩 生地一斤 羌活十兩 附子一兩

右為末煉蜜丸桐子大常服五七十丸病大至百丸空心食前溫酒或白湯下平明服藥至日高飢則止藥大忌壅塞失於通利故服藥半月稍覺壅微以七宣丸輕踈之使藥再為用也牛膝萆薢治筋骨杜仲使筋骨相著天麻羌活和風之聖藥當歸地黃養血能和榮衛玄參主用附子佐之行經藥也

抱拙子曰按中風之證卒然倒仆口眼喎斜半身不

遂或舌强不語脣吻不收是也然名各不同有曰風癔以心悶閉不能言喉中噫〻作聲蓋肺氣入心則能言邪中心肺痰涎潮塞故使然也有曰風痱者以風涎散注於關節氣不能行故使四肢不遂也有曰舌強不語者以風入心脾二經心之別脉系於舌本脾之脉俠咽連舌本散舌下今風涎入其經絡故舌不轉而不能言也有曰四肢拘攣者以風冷邪氣入於肝臟使諸經攣急屈而不伸也有曰風柔者以風熱邪

氣入於肝藏使諸經弛張緩而不收也有曰風顫者以風入肝經上氣不守正位故使頭招面搖手足顫掉也有曰風癇者以風冷之氣客於中滯而不能發故使口禁不能言也與前涎塞心肺同候此以口噤為異耳要畧曰風之為病當半身不遂經絡空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣則急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於府即不識人邪入於藏即難言口吐涎已上所論皆

言風從外入也劉守真曰風病多因熱甚俗云風者言末而忘其本也所以中風有癱瘓者非謂肝風實甚而卒中之也亦非外中於風良由將息失宜而心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無知也張潔古曰人之氣以天地之疾風名之故中風者非外來風邪乃本氣自病也凡人年逾四旬氣衰者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛之人則間有之亦是形盛氣衰故如

此治法和藏府通經絡便是治風李東垣之說與潔古同朱彥脩曰西北氣寒為風所中者誠有之東南氣溫地濕有風病者非風也皆濕生痰痰生熱熱生風也已上所論皆言風從內出也夫自古論中風者悉主於外感而劉張諸子則主於內傷今詳此病蓋因先傷於內而後感於外相兼成病者也但有標本輕重不同耳假如百病皆有因有証因則為本證則為標古人論中風者言其証也諸子論中風者言其因也

豈可以中風一證岐而為二哉故古人所論外感風邪者未必不由本體虛弱榮衛失調之所致諸子所論火盛氣虛濕痰者未必絕無風邪外侵之所作若無風邪外侵則因火因氣因濕各為他證豈有暴仆暴瘖口眼喎斜手足不遂舌廢不用昏不識人之候乎治法外感重者宜先祛外邪而後補中氣內傷重者宜先補正氣而後攻外邪或以散風藥為君而補虛藥為佐使或以補虛藥為君而散風藥為佐使全在活法量標輕重而治之

凡中風證內邪已除外邪已盡當服愈風湯以行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減蓋能和營衛通經絡有補氣養血之功祛濕消痰之效疎而不耗補而不滯不燥不寒誠觀左右之輕重上下之緩急酌而用之無不克濟

按中風五臟亦顯外證目瞀者中於肝舌不能言者中於心唇緩便秘者中於脾鼻塞者中於肺耳聾者中於腎此五者病深為難治但風中腑者多兼中臟如左關脉浮弦面目青左脇偏痛筋脉拘急目瞤頭眩手足不收坐踞不得此中膽兼中肝也用犀角散之類如左寸脉浮洪面赤汗多惡風心神顛倒忪悸恍惚言語蹇澁舌强口乾此中小腸兼中心也用麻黃散之類如右關脉浮緩或浮大面唇黃汗多惡風口喎語澁身重嗜卧肌肉不仁腹脹不食此中胃兼中脾也用防風散之類如右寸脉浮澁而短面白鼻流清涕多喘胸中冒悶短氣自汗声嘶四肢痿弱此中大腸兼中肺也用五味子湯之類如兩尺脉浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俛

仰兩耳鳴骨節痛足痿善恐此中膀胱兼中腎也用獨活散之類此皆言真中風也而有氣血之分焉氣虛而中者由元氣虛而賊風襲之則右手足不仁用六君子湯加鈎藤姜汁竹瀝血虛而中者由陰血虛而賊風襲之則左手足不仁用四物湯加鈎藤竹瀝姜汁氣血俱虛而中者則左右手足皆不仁也用八珍湯加鈎藤竹

瀝姜汁其與中風相類者則有中寒中暑中濕中火中氣食厥勞傷房勞等證中於寒者謂冬月卒中寒氣昏昧口噤肢攣惡寒脈浮緊用麻黃桂枝理中湯之類中於暑者謂夏月卒冒炎暑昏冒痿厥吐瀉喘滿用十味香茹飲之類中於濕者丹溪所謂東南之人多因濕土生痰痰生熱熱生風也用清燥湯之類加竹瀝姜汁中於火者河間所謂非肝木之風内中六淫之邪外侵良由五志過極火盛水衰熱氣怫鬱昏冒

而卒仆也用六味丸四君子獨參湯之類内有恚怒傷肝火動炎上者用柴胡湯之類中於氣者由七情過極氣厥昏昧或牙閉緊急用蘇合香丸之類誤作風治者死食厥者過於飲食胃氣自傷不能運化故昏昧也用六君子加木香勞傷者過於勞役元氣虛耗不任風寒故昏冒也用補中益氣湯房勞者因腎虛精耗氣不歸原故昏冒也用六味丸此皆類中風者也

邪之所湊其氣必虛故風之傷人雖云臟腑俱受而肺肝二經居多蓋風邪之入先於皮毛之虛皮毛受邪則内客於肺肺主氣肺邪既盛則氣必上逆所以有痰涎壅塞昏暈倒仆之狀肝主筋屬木與風其氣相感以類相從故風邪乘虛肝經受之則筋緩不榮或筋縮不舒所以有手足拘攣或四肢癱瘓之狀治風之法初得病即當順氣及日久即當活血此萬古不易之理蓋風病未免有痰治痰先治氣氣順則痰清治風先活血血行風自滅順氣和血斯得病情若先

不順氣便用烏附又不養血徒用麻防未見有愈者也

内經治口眼喎斜多屬足陽明筋病蓋足陽明筋結頰上得寒則急得熱則弛左寒右熱則左頰筋急牽引右之弛者而喎向左也右寒左熱則右頰筋急牽引左之弛者而喎向右也故其治法以火灸且為之膏油熨其急者以白酒調和桂末塗其弛者後人用酒煮桂取汁以故布浸搨病上左喎斜搨右右喎斜搨左即内經用酒桂劑法也

人之一身經絡貫串謂之脉脉者血之隧道也血

隨氣行周流不停筋者周布四肢百節聯絡而束縛之此屬肝木得血以養之則和柔而不拘急脉皆起於手足指端故十二經皆以手足而名筋則無處無之皮毛者屬肺主外而易於感冒人身之血內行於脉絡而外充於皮毛滲透肌肉滋養筋骨故百體平和運動無礙若氣滯則血滯氣逆則血逆得熱則瘀濁得寒則凝泣衰耗則順行不周滲透不偏而外邪易侵矣津液者血之餘行乎脉外流通一身如天之清露

若血濁氣滯則凝聚而為痰〻乃津液之變徧身上下無處不到津液生於脾胃水穀所成濁則為痰故痰生於脾土也是以古人論中風偏枯麻木等證以血虛瘀血痰飲為言是論其致病之源至其得病則必有所感觸或因風或因寒或因濕或因酒或因七情或勞役房勞汗出因感風寒濕氣遂成此病此血病痰病為本而外邪為標其邪中於皮毛肌肉則不知痛癢麻木不仁如有物一重貼於其上或如虫遊行或

洒〻寒慄遇熱則或痒遇陰雨則沉重酸痛其邪入於血脉經絡則手足指掌肩背腰膝重硬不遂難於屈伸舉動或走注疼痛此上諸症皆外自皮毛以至筋骨之病凡脉所經所絡筋所會所結血氣津液所行之處皆邪氣鬱滯正氣不得流通而致然治者當以養血除風順氣化痰為主不必強度其病屬其經某臟而雜治之也

風病遺尿屬氣虛參芪補之小便不利者勿用利藥既得自汗則津液外亡小便自少若利之使

榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚當候熱退汗止小便自行兼此症乃陽明大忌利小便須當識此

婦人產後中風口噤手足瘈瘲如角弓狀或血暈四肢強直俱用荊芥略炒為末黑豆淋酒調下三錢極妙或加當歸入酒少許水煎灌下即省

秦艽升麻湯

秦艽　升麻　乾葛　芍藥　人參　甘艸

白芷　防風　桂枝　連鬚葱白水煎

川芎石膏湯 此乃防風通聖散加減法也

防風　川芎　當歸　芍藥　連翹　石膏
黄芩　桔梗　薄荷　人參　荊芥　大黄
甘菊　滑石　甘草　山梔　砂仁　寒水石
生姜　水煎服

八味順氣散
白朮　青皮　白芷　烏藥　人參　陳皮
甘草　白茯苓

烏藥順氣散
麻黄　陳皮　烏藥　乾姜　甘草　殭蚕
川芎　枳殼　白芷　桔梗　生姜　大棗
水煎服

〈一卷　卅三

六合湯
熟地　當歸　川芎　芍藥
秦艽一作防風　羌活　水煎服

三生飲
南星生一兩　川烏去皮臍生　附子去皮臍生各半兩　木香二錢半
生姜十片　右每服五錢水煎

省風湯
南星生三錢　防風生三錢　半夏湯泡生　甘草生

黄芩各一錢半　右加生姜三片水煎溫服

搐鼻通天散
藜蘆　川芎　白芷　細辛　防風　薄荷各一錢
猪牙皂角三个刮去皮子　右為末吹鼻中

開關散　一名破棺散　治中風口噤
南星末五分　氷片少許　右五月五日午時合以中
指點末揩齒左右其口自開

搐生飲
蒼朮　木香　南星　半夏　細辛　菖蒲
甘草生　生姜　痰盛加全蝎水煎服

〈一卷　卅四

稀涎散
白礬一兩半生　牙皂四个肥寔不蛀者去皮弦炙黄
右為末溫水調下一二錢吐出痰涎便省

觧語湯　一方有石菖蒲遠志
羌活　防風　天麻　肉桂　川芎　南星
陳皮　白芷　當歸　人參　甘草　酸棗仁
羚羊角　水煎入竹瀝半盞再一滾服

清心散

青黛 硼砂 薄荷各二錢 牛黄 氷片各三分
右為末先以蜜水洗舌後以姜汁擦舌将藥
末蜜水調稀搽舌本上

加味轉舌膏

連翹 遠志 薄荷 柿霜各乙兩 石菖蒲六錢
梔子炒 防風 桔梗 黄芩酒炒 玄明粉
甘草 酒大黄各五錢 犀角 川芎各三錢
右為末煉蜜丸彈子大硃砂五錢為衣食後
臨臥薄荷湯嚼下一丸

訶子清音湯

桔梗一兩半生半炒 訶子四十九个半生半炮 甘草二錢半生半炙
右為末每服七錢童便一大碗煎熱調服

大八風湯

當帰 杏仁 炙草 桂心 乾姜炮 五味
升麻六分 川烏炮 黄芩炒 芍藥炒 獨活 防風
川芎 麻黄 秦艽 石斛 人参 茯神
石膏 黄芪 紫苑三分 大豆去皮炒九分

虎脛骨酒

防風 萆薢 當歸 松節 亀板 虎骨酥炙
各二兩 晩蚕沙 五加皮 秦艽 羌活各二
白术二兩 枸杞子 蒼耳子各四兩 牛膝二兩 鱉甲一兩
乾茄根八兩上蒸飯 一方有石斛續断杜仲巴戟各二
右剉碎絹袋盛之以無灰酒三斗浸壜内春
秋七日夏五日冬十日密固煑滚封七日開
取時不可面向坛口恐藥氣冲目每日早午
晩間病人自取酒一小盃服之不許多飲又
不令藥力断絶病痊酒盡将渣晒乾再入乾

浮萍一斤半木香一兩防巳木瓜各二兩射
少許研為末酒糊丸桐子大酒下五十丸日
用三服忌食動風之物
又曰凡中風者俱有先兆之症凡人如覺大拇指
及次指麻木不仁或手足不用或肌肉蠕動者
三年内必有中風之症経曰肌肉蠕動命曰微
風宜先服八風散愈風湯天麻丸各一料為愈
夫大拇指次指皆手足太陰阳明経中風多著
此経也先服祛風滌熱之劑辛凉之藥治内外

之邪是以聖人治未病不治已病又云善治者治皮毛是治萌芽也故初成者獲愈固久者伐形是治未病之先也

丹溪云大率治風主血虚有痰治痰為先或挾火與濕蓋濕生痰痰生熱而熱生風也

半身不遂者大率多痰在左屬死血與無血宜四物湯加桃仁紅花竹瀝姜汁在右屬氣虛屬痰宜四君子湯二陳湯加竹瀝姜汁

氣虛卒倒參蓍湯補之挾痰則濃煎人參湯加竹

瀝姜汁血虚四物湯補之挾痰則四物皆用姜汁炒過加竹瀝姜汁能食者去竹瀝加荆瀝

竹瀝荆瀝乃開經絡行血氣故為必用之劑

肥人多濕少加烏頭附子行經

肥人中者以其氣盛於外而歉於內也肺為氣出入之道肥人氣必急急則痰涎上壅邪盛可知所以治之必先理氣為急中後氣未順痰未除調理之劑惟當用藿香正氣散和星香散煎服此方非特可治中風之症中氣中惡尤宜尋常嘔吐痰厥及胸膈飽悶者皆可用之

治風之法初得之必先順氣及日久則當活血此萬古不易之理有以四物吞活絡丹愈者正此意也設不先順氣化痰遽用烏附又不活血徒用防風天麻羌活輩吾未見其能治也

若飲食坐卧如常但失音不語只以小續命湯去附子加石膏菖蒲一錢

開關之劑

稀涎散　治中風不語牙關緊急單蛾双蛾

江子仁六粒每粒分作兩半 牙皂三錢切片 明礬一兩

化開礬將二味投入攪勻待礬枯為末每用三分吹入諸病皆愈痰涎壅盛者以五分灯心湯下喉中之痰逆上者即吐膈間者即下

凡中風口噤不開用白塩梅揩齒即能開乃可進藥

丹溪用藜芦為末加射香少許入鼻內吐之一吐不愈再吐之虛甚者不可吐

救急通關散　治中風中氣一應急病宜先以此開關

牙皂 細辛 二味為末吹入鼻内得嚏佳
蘓合香丸 擦牙上牙関即開 再以生姜自然
汁并三生飲俟其甦省然後次第進以順氣之
劑或排風續命之類
勝金丸 治中風忽然仆倒如醉形躰昏悶四肢
不收涎潮逆上膈氣不通命在須臾
生薄荷五錢 牙皂二兩捶碎水一升二味同浸取汁研成膏 瓜蒂末一兩 乙
藜芦末兩 二 硃砂半兩另研
右将硃砂末二分和二味末子和匀用膏子
為丸龍眼大硃砂為衣温酒化下一丸甚者
二丸以吐為度得吐即醒不醒者不治
桑枝法 桑枝一升炒香以水三大升煎取二升
一日服盡圖經云桑枝温平不凉不熱可以常
服療躰中風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣
眼暈肺氣咳嗽消食利小便久服身輕聰明耳
目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得
桑煎不服出抱朴子政和間何子常病兩臂痛
諸藥不効依此作數劑臂痛即愈

九治中風莫如續命之類然此可扶持初病若要
收全功火艾為良中風皆因脉道不利血氣閉
塞也灸則喚醒脉道而血氣得通故收全功
中風不語 用龜尿少許點於舌神効
取龜尿法置龜新荷葉上用猪棕鼻内刺之即出
一方 治半身不遂口眼喎斜頭目眩運痰火熾
盛筋骨時疼此乃原於血虚血熱挾痰挾火経
絡肌表之間先已有其病根後因感冒風寒或
過嗜醇酒膏梁而助痰火或惱怒而逆肝氣遂
有此半身不遂之証其在於經絡肌表筋骨之
間尚未入臟腑並以此方治之盖此方有補血
活血之功不致於滞有健脾燥湿消痰之能不
致於燥有清熱運動踈風開経絡通滕理内固
根本外散病邪王道劑也多服見功
白术一錢半 川芎一錢半 南星 半夏 芍藥
茯苓 天麻各一錢 川歸 生地 熟地 牛膝
酸棗仁 黄芩 橘紅各八分 羌活 防風 桂各六
紅花 炙甘草各四分 黄栢三分 水煎入竹瀝姜汁侵晨服

瘖痱

素問太陰所謂入中為瘖者陽氣已衰故為瘖也內奪而厥則為瘖痱此腎虛也少陰不至者厥也脉解篇王註云痱廢也腎氣內奪則舌瘖足廢

綱目云厥逆者溫補之河間地黃飲子是也

河間地黃飲子　治瘖痱不能言足廢不能用腎氣弱其氣厥不至舌下　熟地　肉蓯蓉酒浸焙　巴戟　石斛　附子炮　五味　菖蒲　遠志　官桂　麥冬　山茱萸　白茯苓各等分

水盞半姜五片棗一枚薄荷同煎至八分不拘時服

麝香散　卒中風瘖瘂倒地不省左右癱瘓口眼喎斜諸藥未服者服之

真射二錢真香油二兩　若遇此症將射香研細入油攪勻開口灌之其人自甦不獨治中風且全其言語不蹇手足不癱服此後方服順氣踈風之劑蓋射香通關節可以行至病所也

疫門

凡衆人病一般者此天行時疫治有三法宜補宜散宜降用大黃黃芩黃連人參桔梗蒼朮防風滑石香附人中黃為末神麴糊為丸每服五七十丸氣虛四君子血虛四物痰多二陳湯作使送下熱甚者加童便

生生子曰夫溫病有冬傷於寒不即發過時而為春溫者有冬不藏精者有感四時不正之氣者有君相二火加臨而沿門闔境相似者有用和

解法者有用補法者有用寒涼者有用瀆法者各推其所因而施治之毋執熱之一途而槩用寒涼法也

大抵治時疫當按邪在何經及參之時月故奏効甚捷發熱發斑以玄參升麻湯治之

頭痛先寒後熱以小柴胡湯渴加知母天花粉無汗加葛根　夏加石膏知母各叁錢

先熱而後寒口渴無汗葛根升麻湯加柴胡熱甚及夏月加石膏知母

但熱無寒口渴煩躁白虎湯加麦門冬
大渴大熱譫語腹滿脉洪大有力大柴胡湯或凉
膈散
發熱而大便瀉小便短柴苓湯
發熱口渴而小便不利五苓散
韓飛霞五瘟丹亦妙
張子和六神通解散　治時病從外而感者頭痛
躰疼見風怕寒遇暖則喜不問日數皆當大汗
麻黄一錢半　蒼术一錢　甘草　黄芩各一錢　石膏

滑石各二錢　姜葱煎熱服
如譫語神思不寧熱邪在裏而汗不能盡解又加
人参黄連二味即安　此方用藥輕微人多不
曉易而忽之不知其中自有神妙如解汗未通
更加紫蘓葉葛根白芷等助其威風得汗其病如補
治瘟病活套
人中黄療時行熱毒為君蒼术香附散鬱為臣
黄芩黄連降火人参補虛桔梗防風利氣行經
為佐熱鬱結則内外氣液不通成燥大黄苦寒
而能滌蕩燥熱滑石性滑味淡將以利竅解結
通氣液以潤燥二者一陰一陽用之為使
藿香正氣散　治外感發熱頭痛内因痰飲凝結
作熱四時疫癘或中脘痞滿嘔逆悪心癨亂及
傷寒頭疼增寒壯熱
茯苓　白芷　紫蘓　陳皮　桔梗　大腹皮
甘草　白术　厚朴　半夏各一兩半　藿香三兩　前胡
右每服五錢姜三片棗一枚水煎熱服欲出
汗以被覆之　如挾飲食加枳實山查腹疼

加砂仁蒼术減白术
敗毒散　治四時疫癘傷風有汗風濕身腫躰疼
悪風口乾日晡發熱　茯苓　甘草　人参
桔梗　川芎　柴胡　前胡　枳殼　羌活
獨活各等分　生姜三片薄荷五片水煎服
六神散　治大熱發强譫語方在狂門
漬法
五枝湯　治時疫用表藥太多而肺金枯燥以致
腠理經密不能得汗而熱不解

桑槐榆桃柳各四十九條煎湯浴之少頃膚潤而汗出熱因退矣

辟瘟丹　雄黃末一錢　射半分　用黑棗肉搗為丸棗核大硃砂為衣綿包塞入鼻中男左女右入病家則不染瘟氣

神仙百解散

茵陳　柴胡　前胡　人參　羗活　獨活
蒼朮米泔浸炒　甘草　乾葛　白芍　升麻　防風
藁本　藿香　半夏　白朮各一錢　立春已后不
加減立夏已後一料内加柴胡　赤茯苓　川
歸各五錢　立秋已後減柴胡一分不用川歸赤茯苓
只加　乾葛　肉桂去粗皮各一分　麻黄去節五錢　立冬已
後並無加減一方無川歸有黄芩五錢

右為細末每服三錢水一鍾半姜三片棗二枚煎一鍾熱服併進二服如要表散加葱白三寸淡豆豉三十粒同煎服以衣被蓋覆汗出而愈

頭面腫俗名鸕鶿瘟蝦蟆瘟車前草水煎服極效大便秘者加蜂蜜一匙

多是少陽陽明二經之火上壅熱極而生風也故腫每在兩頰車及耳前後當用清降二法防風通聖散加減治之感之輕者只清之亦自消散不必加硝黄恐藥過於病也

予嘗治多加痰藥於清散之中取効甚速今列於左

白姜蚕　天花粉　酒芩　酒連　大力子一錢
甘草　柴胡各一錢　貝母　玄參　桔梗
枳殼各八分　連翹　石膏各一錢　升麻一錢
葱白三根姜三片淡竹葉二十片食後緩緩
服之　大便秘結加酒煨大黄一錢

若被重劑瀉下太過損傷中氣脾弱泄瀉面與項腫不退此所謂上熱未除中寒復生者也以小柴胡湯加白朮山藥升麻白芷一補一消庶幾保全

大頭病與此亦相須而治

丹溪曰大頭天行病乃濕熱在高巔之上用羗活酒芩酒煨大黄隨病加減不可用降藥

東垣有法有方謂陽明邪熱太甚資實少陽相火而為之視其腫熱在何部隨經治之當緩勿令

重劑過其病𠫊陽明之邪首大腫少陽之邪出於耳前後先以酒炒黄芩黄連炙甘草煎頻頻少與呷之食後再煎大黄大力子臨時加芒硝等分亦時時呷之俟邪氣少殺只服前藥未已再如前次第服之取大便邪氣已即止陽明渴加石膏少陽渴加栝蔞根陽明行經升麻芍藥葛根甘草太陽行經羌活荊芥防風並與上藥相合服之　或云頭痛酒芩口渴乾葛身疼羌活桂枝防風芍藥

海藏神术湯　治内傷冷飲外感寒邪無汗者

蒼术製　防風略二　甘草炒一兩

右㕮咀加葱生姜同煎服如太陽症發熱惡寒脉浮而緊者加羌活二錢　如太陽證脉浮緊中带弦數者是兼少陽也加柴胡二錢　如太陽證脉浮緊中带洪者是兼陽明也加黄芩二錢婦人服者加當歸或加藁本湯各二錢　如治吹妳煎成調六一散三五錢神效

又神术湯六氣加減例

太陽寒水司天加羌活桂枝餘歲非時变寒亦加冬亦加　陽明燥金司天　加白芷升麻餘歲非時變凉湿亦加秋亦加　少陽相火司天加黄芩地黄餘歲非時变雨湿亦加夏亦加　太陰湿土司天　加白术藁本餘歲非時变熱湿亦加夏末秋初亦加　少陰君火司天　加細辛獨活餘歲非時变熱亦加春末夏初亦加　厥陰風木司天　加川芎防風餘歲非時变温和亦加春亦加

已上神术湯六氣加減法非止為司天之氣設也至于歲之主氣與月建日時同前應見者皆當随所見依例加减之按海藏此論與戴人云病不如是當年氣看與何年運氣同便向此中求妙法方知皆在至真中之歌相表裏實發前人之未發也盖海藏此論所謂其氣司天加其藥者治常氣之法也所謂随所應見加减者治变氣之法也戴人所謂看與何年同氣求治法者亦治变氣之法也能將二公之法擴充行之

則內經運氣之本義燦然矣夫內經論運氣有常氣有变氣常氣者有定紀如其年屬其氣司天當寒其年屬其氣司天當熱是也变氣者無定紀如其年屬其氣司天當寒反变熱當熱反寒是也王氏註文釋以經無定紀之变氣作有定紀之常氣使後學皆以年歲占運氣而其應者十無一二是以人莫之信而其道湮晦久矣二公生於數千百年之後復啓其端而續之功亦巨矣

火熱門 火之與熱微甚之間而已各標門戶近贅今歸之於一便學治也

明火篇 五運六化篇曰君火之化熱主春末夏初行暄淑之令而不行炎暑應君之德也

生生子曰諸書言火不一於雜症中言者往往至言火雜症而兼令氣者雖間有之而未暢也愚謂天有六氣火居其二地有五行火居其一人之五臟德合五行火之有二君相是已火之在易為離離者內陰外陽主乎動者也動則生故曰天不能遠火以生物人不能遠火以有生過動則变而反消爍於物也在禦之何如爾按內經氣交变大論篇云南方生熱熱生火其令熱其变消爍其災燔焫又運氣五行生死順逆篇曰火主於南應夏火之為言化也言能化生萬物也顧其為疾不獨侍於君相凡五志之火皆致眚也岐伯歷舉病机一十九條而屬火者五此先聖論火者大氏也後之言火者無論其他且以丹溪之特識乃分君火為人火相火為天火而後之人翕然頌之愚竊以為未然也夫火

有天人不可以君相而分屬天人何也六：之氣以君火為二之氣経以熱稱之以相火為三之氣経以暑稱之是君相皆可以火稱也惟人之攝養失宜則五臟之火隨觸而見觸之於心之経心之絡心之臟皆君火也固可以人火稱之若觸之於包絡觸之於三焦此相火也亦可以人火稱也而獨以天火稱之何哉又曰見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣雖其取譬無非欲狀相火之烈然但可以論五臟

厥陽之火而非君相令氣有定位有倫序者言也彼造化之所以生：無窮者以其有不易之定躰為之主然後四時行而萬物生蓋天人之理一致若外內君相之火亦必先有定位而後可以言變化惟善攝生者其五行五志之火有以默裨其生：之功故人莫得而見其端及其過極則熊烈之勢始見書謂寂然不動感而遂通是已愚故曰治火熱之症必先察夫令氣之流行而參治之可也雖非火令司天之年然一

歲中既有此君相二節之氣治病者安得舍令氣而不加察之乎諸書又妄以命門為相火而主方即以滋陰降火湯為專劑以故令之治虛怯者未数月而多至殞促固司命者陰柄其權或亦治火之源未徹而妄投藥劑有以致之乎吾祁汪子良醫學質疑有外內君相篇言之頗悉言外者有曰火邪自天氣血感之而為病也得非令氣之天火歟言內者有曰乃人之調養失宜正氣自傷而為病也得非所觸五志之人

火者歟外內之因不同補瀉之治自別以外君相言之則有令氣之序以內君相言之則少陰少陽厥陰自明五志之火自見也況內外証治甚詳瑩然可法似補前人所未臻雖其所約諸方未必能一一中其肯綮推其意極欲正其外內君相之名表其虛、實、之治為後人作梯堦工之與纖不遑計也而亦不以君相分天人也愚故録之於左以俟明哲採焉

外內君相篇

祈邑汪子良著

夫火者明曜熖灼者也其性升燥其氣欝蒸其色為赤其聲為鳴其味為苦其始為溫其変為寒其為害也十二經絡臟腑無所不至諸書以心為君火以黄連瀉之右腎命門為相火以黄栢制之以君相二火限於心腎非也隨其所寓而名之君火相火之說始於運氣諸篇而近世諸書継之曰實火虛火人火龍火腎肝陰火五志之火之類其意雖各有所指而天人外内之未瑩則亦猶有惑也夫外者火邪自天氣血感之而為病也内者人之調養失宜正氣自傷而

為病也外内之因不同補瀉之治自別以外君相言之經有六節之序始於風木終於寒水自春分至小滿為二氣君火其令熱自小滿至大暑為三氣相火其令暑夫風火暑濕寒燥之六氣迭相盛衰以應六〻之節而君相當其二焉君相云者乃熱暑微甚之分耳應則為平変則為病當其時則微非其時則甚如非時而有大熱則為瘟疫之病類如君火之化熱感之則手少陰心太陽小腸臟腑主之相火之化暑人感之則手厥陰膻中

少陽三焦臟腑主之夫君少陰也而心又主血血屬陰為病主靜相火少陽也而膻中又主氣氣屬陽為病主動故凡靜者皆君火之症也如痛痒瘡瘍癰疽瘤氣結核紅腫鼻塞衄嚏吐酸瞀欝血溢血泄笑悲譫妄悪寒戰慄身熱轉筋腹脹有声小便渾濁淋秘暴注下迫舊有霍乱吐下太陰之症今去之之類皆君火使之然也凡動者皆相火之症也如瞀瘛暴瘖冐昧躁擾狂越詈罵驚駭嘔涌溢食氣逆上衝諸禁鼓慄如喪神守喉痺

耳鳴耳聾暴注瞤瘛跗腫疼酸暴病暴死之類皆相火使之然也夫君相之火俱主於熱宜用寒凉正治但熱微甚之不同耳其在表者發之在裏者瀉之利之下之半表半裏者和之如柴胡黄芩瀉肝胆之火黄連瀉心火木通瀉小腸火芍藥瀉脾火石膏瀉胃火黄芩瀉肺火與大腸火知毋瀉腎火黄栢瀉膀胱火此外君相之症治者也内之君相者正氣自傷為病有似火邪所發而實非也如諸書所謂實火可瀉虛火

、可補之類夫實者正氣之有餘也虛者正氣之不足也盖人之氣生發於胃聚於膻中膻中者乃心前空虛之位名曰氣海又曰宗氣其氣之餘由肺運於一身通調水道下輸膀胱水精四布五経並行以為生〻不息之運用若夫起居動靜調養失宜過於勞倦房事醉飽耽食肥甘辛辣厚味之屬以致経絡臟腑因之受傷則夫膻中之氣隨其所寓鬱滯而為病氣之有餘則為實火氣之不足則為虛火故曰君火者猶人

火也可以水滅可以正治惟黄連之苦瀉之相火者猶龍火也不以水滅不以正治順其性而折之惟黄栢之辛制之又曰實火可瀉黄連解毒之屬虛火可補参朮生甘草之屬兼瀉兼緩故内之君火者實火也猶人火也宜用寒凉之味瀉之如肝臟素熱復加酒熱上行而為目赤腫痛者治用柴胡黄芩龍胆草之屬又有肝経素有湿熱又復感溼織以致肝経熱鬱而為下疳者治用龍胆瀉肝湯之屬或為便毒者治用

大消毒散之屬或為楊梅瘡者治用防風通聖散之屬又有膽癉因於謀慮不决故胆虛氣上溢而為口苦者治以胆募俞又如小兒因聞異聲内激胆熱而為驚搐者治用瀉青丸之屬又如過食膏梁之味熱積於心而為癰疽者治用黄連解毒湯之屬経曰膏梁之変足生大疔充足也足又醉以入房或臨房忍精以致小腸膀胱熱鬱不散而為淋濁者治用黄栢知母木通梔子之屬又如有因勞動熱起於脾而為痰涎帶血

者治用黄連芍藥之屬又如過食肥甘而為消中或為中滿等症治用三補丸之屬経曰肥者令人内熱甘者令人中滿又曰消中熱中皆富貴人也又如醉以入房酒熱鬱於脾胃而為熱厥者治宜解酒散熱間服滋陰之劑岐伯言熱厥者此人必醉飽以入房酒聚於脾胃不得散酒氣與谷氣相薄熱盛於中云〻腎氣日衰陽氣獨盛故手足為之熱也又有因於飽食熱積大腸而為痔漏下血者治用黄連枳殻之屬経

曰因於飽食筋脉横觧腸澼為痔又如食滞腸胃欝熱不散而為下痢赤白者治用大承氣湯之屬經曰通因通用者此也又如色慾不遂腎熱内熾而為遺精者治用珍珠丸加椿根皮之屬内之君火之大意盖如是内之相火者虚火也猶龍火也宜分氣血而用甘温之味補之有因久視傷血以致肝熱上騰而為目赤腫痛者治用四物湯加黄連黄芩柴胡之屬又有肝血内虚而為發熱者治用四物湯加黄栢知母之

屬又有胆腑虚熱而為不寐者治用酸棗仁竹葉之屬又有少陽胆經血枯不足以配陽氣則氣欝為熱而為瘰癧者治用四物湯生地柴胡黄芩連喬玄參夏枯草之屬或為耳鳴者治用清氣化痰丸之屬又有勞心過度以致神不守舍而為驚悸不寐等症治用八物湯加酸棗仁遠志間服硃砂安神丸之屬又有因於失志心神受傷而為癲風者治用四物湯間服硃砂安神丸之屬又有抑欝傷心而為癰疽不起者治

用人參黄芪白朮附子之屬又有内傷心之元陽而為惡寒者治用人參附子赤石脂之屬王太僕云益火之原以消陰翳之類是也又有小腸膀胱氣虚不能運化小便而為淋秘者治用參芪朮茯木通之屬經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣又有勞倦傷脾而為大熱氣喘虚煩者治用補中益氣湯之屬經曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣薰胷中故内熱又有勞倦傷脾

症現頭痛發熱惧食寒涼之藥過多而增譫語鄭声脉数不鼓者治用參芪白朮當歸附子乾姜之屬又有勞傷脾胃陽氣不能上榮而為頭痛耳鳴鼻塞口淡等症治用補中益氣湯加蔓荆子之屬經曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也又有飲食失節與夫素齋内傷脾胃而脉虚身熱咳嗽腹脹泄瀉等症補中益氣加減治之又有内傷胃腑胃氣大虚而為嘔吐者治用參芪白朮砂仁石菖蒲之屬或為消穀善飢者

治用參芪甘草之屬或爲吐血者治用參术附
子之屬或爲左齒痛者治用參芪术歸白芷升
麻之屬或爲腹脹者治用參芪白术砂仁木香
之屬經曰塞因塞用之類是已又有過慾腎虛
火炎於肺而爲喘嗽等症治用六味地黃丸加
黃栢知母貝母麥冬五味之屬又有肺氣內虛
不能運行而爲喘嗽憤鬱等症治用參芪术附
麥冬五味欵冬花之屬又有大腸氣虛不能傳
送而爲裡急後重或爲虛秘等症治用補中益

氣湯之屬又有過慾傷腎陰火內熾而爲耳鳴
者治用清上實下之劑或爲口鼻血溢者治用
四物湯加茆根大小薊阿膠之屬或爲骨蒸者
治用當歸生地黃胡黃連知母地骨皮之屬或
爲熱從臍下起者或爲熱從足上起者治用四
物加黃栢知母間服六味地黃丸之屬或爲午
後發熱者治用當歸地黃枸杞龜板之屬王太
僕云壯水之主以制陽光之類是已內之相火
之大意蓋如是此外猶有五志之火亦屬正氣

自傷但因五志所發之不同耳經曰人有五志
以生喜怒悲思恐若夫五志過度則火發於中
而爲病耳怒則氣上喜則氣緩悲則氣消思則
氣結恐則氣下之類夫五志過傷非藥可治乃
以所勝治之悲勝怒喜勝悲恐勝喜怒勝思思
勝恐之類是已夫悲可以勝怒以悽惻苦楚之
言感之喜可以勝悲以浪謔褻狎之言娛之恐
可以勝喜以迫遽死亡之言怖之怒可以勝思
以汙辱欺罔之言觸之思可以勝恐以慮彼亡

此之言奪之之類是也夫五志所傷未甚正氣
未虛或可以藥治者有之如青皮以瀉怒氣之
逆參芪以補悲氣之消香附以開思氣之結升
柴以舉恐氣之降惟夫喜則氣和志達雖病亦
微不治可也此五志之症治者也又有內外兩
傷之火正氣自傷復加火邪外傷而爲倦怠少
氣自汗身熱失於視聽脉虛等症治用清暑益
氣湯之屬經曰陽氣者煩勞則張精絕辟積於
夏使人煎厥目盲不可以視耳瞶不可以聽之

類是也又如元氣素虛遇夏外熱傷氣而為倦怠無力頭疼口淡等症俗謂之注夏治用參芪白朮麦冬五味黃芩之類又如足之太陽經氣不足感受暑氣而為惡寒發熱身重疼痛手足逆冷小便已洒然毛聳小有勞身即熱口開前板齒燥脉弦細芤遲仲景所謂中暍是也治用白虎加人參湯之類又有勞倦復感暑氣而為身熱神昏溺澁等症治用辰砂五苓散之類又如胃氣內虛因感暑氣而為頭疼身熱泄瀉脉

洪而實者治用柴苓散之類又如遠行勞倦逢大熱而渴渴則熱舍於腎而為足不任身骨痿者治用人參黃芪之類經曰骨痿者生於大熱也又如腎虛陰火上炎而為勞熱咳嗽等症復感夏暑傷之其氣益甚治用滋陰降火之劑經曰春夏劇秋冬瘥之類是也又如內有痰火外感暑氣皷激痰飲寒碍心竅而為卒倒手足不知動躡者俗謂之暑風是也二陳湯加黃連香薷主之又如冬月過於房勞精氣內竭至春則

無發生之氣而為瘟疫者治宜補中加以辛凉解表之劑經曰冬不藏精春必病瘟又如冬月傷寒寒邪未發至春復感熱氣而為大熱頭疼口渴心躁脉浮緊者防風通聖散主之經曰冬傷於寒春必病瘟此皆內外兩傷症治並行而不悖焉者也是知君相二火以外言之有春熱夏暑陽動陰靜之分也以內言之有實瀉虛補五志勝治藥治之分也以外內兩傷言之有表裹邪正補瀉兼施之分也是故外內君相醫之

廣用者也其為道甚大其為說甚雜其為病甚多其為變也甚速其為御也甚難非一方一法所可盡也能明乎此醫之為道思過半矣

病機篇

內經曰諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大皷之如皷癰疽瘍疹瘤氣結核霍亂瞀悶鬱腫鼻塞鼽衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄衊血汚皆少陰君火之熱乃心小腸之氣所為也又曰諸熱瞀瘈暴瘖

冒昧躁擾狂越罵詈驚駭胕腫酸痛氣逆衝上禁慄如喪神守嚏嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔飲溢食不下目迷不明暴注瞤瘈暴病暴死此皆少陽相火心包絡三焦之氣所為也

內經曰夫熱病者皆傷寒之類也陽勝則熱陰虛則內熱陽勝則外熱內外皆熱則喘而渴故欲飲冷也

陽勝則身熱腠理閉喘粗為之俛仰汗不出而熱齒乾以煩寃腹滿死能冬不能夏

有四肢熱逢風寒如炙於火者是人陰虛陽氣盛也人身非常熱也為之熱而煩滿者陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也

大熱病氣熱脈滿是謂重實尺寸脈俱虛是謂重虛粗大者陰不足陽有餘為熱中也

脈經曰弦數多熱數為熱極脈數為虛為熱寸口脈浮大而數者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭疼腹中熱寸口脈實熱在脾肺數為吐為熱在胃口關脈滑數胃中有客熱緩而滑為熱中尺脈實為身熱心痛數為臍下熱痛

又曰熱病脈小或細喘逆不得大小便腹大而脹汗出而厥逆泄注脈大小不調皆難治熱病已得汗而脈仍躁盛此陽脈之極也死熱病不得汗而脈躁盛者此陽脈之極也死脈浮而濇濇而身有熱者死熱病脈躁盛得汗而脈靜身涼者生

論熱在血氣之分

東垣曰晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也宜柴胡飲子晝則安靜夜則發熱煩躁是陽

氣下陷入陰中也宜四順飲子名曰熱入血室晝發熱煩躁夜亦發熱煩躁是重陽無陰也當急瀉其陽峻補其陰

論五臟有邪身熱各異

以手捫摸有三法輕手捫之則熱重手捫之則不熱是熱在皮毛血脈也重按之筋骨之分則熱蒸手極甚輕手則不熱是邪在筋骨之間也輕手捫之不熱重力按之亦不熱不輕不重按之而熱是在筋骨之上皮毛血脈之下乃熱在肌肉也

肺熱者輕手乃得微按全無日西熱甚乃皮毛之熱其証必見喘咳寒熱輕者瀉白散重者凉膈散地骨皮散

心熱者微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得微按至皮毛之下則熱少加力按之則全不熱是熱在血脉也其証心煩心痛掌中熱而噦以黄連瀉心湯導赤散硃砂安神丸

脾熱者輕手捫之不熱重按之筋骨又不熱不輕不重在輕手重手之間熱在肌肉遇夜尤甚其

証必怠惰嗜卧四肢不收無氣以動瀉黄散

肝熱者重按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱寅夘間尤甚其脉弦四肢滿悶便難轉筋多怒多驚四肢困熱筋病不能起於床瀉青丸柴胡飲子

腎熱者輕手重手俱不熱極重力按至骨分其熱蒸手如火其人骨蘊蘊如蟲蝕其骨困熱不任亦不能起於床滋腎丸主之

面熱者足陽明　口中熱如膠足少陰　口熱舌乾足少陰　耳鼽熱若寒手太陽　掌中熱手厥陰少陰太陰　足下熱而痛足少陰　足外熱足少陽　身熱膚痛手少陰　身前熱足陽明　洒淅寒熱手太陰　肩上熱肩似拔手太陽　中熱而喘足少陰　肩背熱及足小指外臁脛踝後皆熱足太陽　一身盡熱狂而妄聞妄見妄言足陽明　熱而筋縱緩不收陰痿足陽明

論表裏熱

病機機要云有表而熱者謂之表熱無表而熱者

謂之裡熱有暴熱而為熱者乃久不宣通而致也有服温藥而為熱者有悪寒戰慄熱者治法小熱之氣凉以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣以汗發之發之不盡則逆制之制不盡求其屬以衰之苦者治臟臟屬陰而居内辛者治腑腑屬陽而在外故内者下之外者發之又宜養血益陰其熱自愈

内経曰陰虛生内熱者因有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣薰胸

中故内熱陽盛則外熱者因上焦不通利則皮膚緻密腠理閉塞玄府不通衛氣不得泄故外熱

東垣曰發熱悪寒大渇不止煩躁肌熱不欲近衣其脉洪大按之無力者或無目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虚發躁當歸補血湯主之

又曰仲景論内外不足發熱自汗之症大禁發汗若飲食勞倦雜病發熱自汗表虚之症認作有餘便用麻黄發之汗大出則表益虚也

内經曰人數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相薄熱盛於中遍於身内熱而溺赤也飲食不節起居不時者陰受之入六腑則身熱不得卧上為喘呼

王好古曰一身盡熱先太陽也從外而之内者先無形也為外傷手足不和兩脇俱熱如火先少陽也從内而之外者先有形也為内傷

要畧曰發熱身疼而身如薫橘者湿也　一身盡痛發熱日晡轉劇者名風湿　汗出而身熱者風也　身熱脉絃数戰慄而不悪寒者癉瘧也

發熱悪寒脉浮数者温病也　身熱頭疼自汗多眠陽脉浮滑陰脉濡弱者風温也　中脘有痰令人增寒發熱自汗悪風寸口脉浮胸痞滿有類傷寒但頭不痛項不强為異耳　虚煩與傷寒相似身熱脉不浮緊不悪寒但熱而煩惟頭不痛　四肢熱者火乗脾土脾主四肢故熱也　手心熱者心與包絡火盛也　身體沉重走注疼痛乃湿熱相搏風熱鬱而不得伸也

東垣云四肢發熱者或口乾舌乾咽乾蓋心生火小腸主熱火熱來乘主位乃湿熱相合故煩躁悶亂也

王太僕曰熱來復去晝見夜伏夜發晝見時節而動是無火也

論雜病發熱悪寒與傷寒不同

許學士曰仲景云假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅悪寒也尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也此謂元受病而然也又云陽微則悪寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所病

而然也大抵陰不足陽往從之故陽內陷則發熱陽不足陰往乘之故陰上入陽中則惡寒陰陽不歸其分故寒熱交爭是以發熱而惡寒也原病式曰身熱惡寒熱在表也邪熱在表而淺邪畏其正故病熱而反惡寒也或言惡寒為寒在表或言身熱惡寒為熱在皮膚寒在骨髓者皆悞也仲景法曰無陽病寒不可發汗又言身熱惡寒麻黃湯汗之汗泄熱去身凉即安然則豈有寒者歟大法煩躁多渴欲寒惡熱為病熱也亦有亢則害承乃制之則病熱甚而反覺其冷者也雖覺其冷而病為熱實非冷也其病熱欝甚而反惡寒得寒轉甚而得煖少愈者謂煖則腠理踈通而陽氣得散怫熱稍退故少愈也其寒則腠理閉密陽氣怫欝而熱轉甚故病加尒上下中外周身皆然俗因之妄謂寒病誤以熱藥投之為害多矣

劉宗厚曰按此數論並言雜病陰陽相乘及火熱甚反兼水化為病亢則害承乃制之例但河間所引傷寒身熱寒熱與仲景及明理論義不相合詳趙嗣真明理論云往來寒熱者邪正分爭也邪氣之入也正氣不與之爭則但熱而無寒若邪正分爭於是寒熱作矣蓋以寒邪為陰熱邪為陽裡分為陰表分為陽邪之客於表也為寒邪與陽爭則為寒矣邪之入於裡也為熱邪與陰爭則為熱矣若邪在半表半裡之間外與陽爭而為寒內與陰爭而為熱表裡之不拘內外之無定由是寒熱且往且來日有至於三五

甚者則數發也若以陰陽相勝陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒此特論雜病陰陽二氣自相乘勝然也非可以語傷寒斯論為甚精切深合仲景之意蓋不惟釋疑於活人書而已

又按河間言惡寒為寒在表或身熱惡寒為熱在皮膚寒在骨髓皆悞也而活人書亦以此為表裡言之故趙氏曰詳分皮膚骨髓而不曰表裡者蓋以皮脉肉筋骨五者素問以為五臟之合主於外而充於身者也惟曰臟曰腑方可言裡

可見皮膚即骨髓之上外部浮淺之分骨髓則皮膚之下外部深沉之分與經絡屬表臟腑屬裡之例不同況仲景出此症於太陽篇首其為表症明矣是知虛弱素寒之人感邪發熱熱邪浮淺不勝沉寒故外怯而欲得近衣此所謂熱在皮膚寒在骨髓用辛溫至於壯盛素熱之人或酒客輩感邪之初寒未變熱陰邪閉於伏熱陰凝於外熱鬱於內故內煩而不欲近衣此所謂寒在皮膚熱在骨髓用辛涼必矣一發之餘

表解正和此仲景不言之妙若以皮膚為表骨髓為裡則麻黃湯証骨節疼痛其可名為有表復有裡之症耶然仲景傷寒一書人但知為方家之祖而未解作秦漢文字看故於大經大法之意反有疑似而後世賴其餘澤者往往類輯傷寒方論其間失其本義及穿鑿者亦有之矧以雜病為論但引其例乎茲趙氏釋疑可謂得其旨趣且黃帝針經有論皮寒熱肌寒熱骨寒熱等例如此則仲景所論分邪在皮膚骨髓之殊雖欲以盡証例之變蓋自有所本云

惡寒非寒惡熱非熱論

丹溪曰經云惡寒戰慄者皆屬於熱又云禁慄如喪神守皆屬於火惡寒者雖當暑月若遇風霜重綿在身自覺凜凜戰慄禁慄動搖之貌如喪神守惡寒之甚原病式曰病熱甚而反覺其寒此為病熱實非寒也或曰往往見有得熱藥而少愈者何也予曰病熱之人其氣炎上鬱為痰飲抑遏清道陰氣不升病熱尤甚積痰得熱亦

為暫退熱勢助邪其病益深或曰寒勢如此誰敢以寒涼與之非殺而何予曰古人遇戰慄之症有以大承氣湯下燥糞而愈者惡寒戰慄明是熱症但有虛實之分耳經曰陰虛則發熱夫陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜欲無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌表之間而惡熱也實非有熱當作陰虛治之而用補養之法可也

瀉白散　治肺熱

桑白皮 地骨皮各一兩 甘草五錢 為末水調服

清金丸 瀉肺火

黃芩炒 為末水丸沸湯下

黃連瀉心湯 治心熱

黃連炒 為末水調二三分量人大小與之

導赤散 治小腸實熱

生地 木通 甘草 各等分入竹葉煎服

調胃承氣湯 治脾熱胃熱

大黃 芒硝各一兩 甘草五錢 水煎服

瀉黃散

藿香七錢 山梔一兩 石膏五錢 甘草三兩 防風四兩

右為末用蜜酒拌畧炒服

柴胡飲子 治肝熱

柴胡 人參 黃芩 甘草 大黃 川歸

芍藥 各等分每服七錢姜三片水煎服

抑青丸 瀉肝

黃連 姜汁炒為末粥丸沸湯下

左金丸 治肝火

黃連六兩 吳茱萸湯煮少時為末粥丸陳皮白术湯下

瀉青丸

川歸 川芎 山梔 大黃 羌活 防風

龍胆草 為末蜜丸

本方去川芎羌活防風加黃連黃柏黃芩蘆薈

青黛各五錢 木香一錢 射香五分 名當歸龍薈丸

滋腎丸 治腎熱

黃柏三錢 知母三錢 桂一錢 為末蜜丸

凉膈散 治積熱煩渴面熱唇焦咽燥舌腫喉閉

目赤鼻衄項結硬口舌生瘡譫妄燥溢便溺閉結

連翹四兩 朴硝 大黃各二兩 薄荷 黃芩 梔子

甘草炙各一兩 為末每服三錢加竹葉五七片水煎

洗心散 治心肺積熱頭目昏疼肩背拘急肢節

煩痛唇焦咽腫痰壅唾粘滴溢便秘

白术一兩半 麻黃 川歸 荊芥 芍藥 甘草

大黃各六兩 每服二錢入生姜薄荷少許同煎服

三黃丸 通治三焦熱 去大黃加黃柏三糊丸

黃連 黃芩 大黃各等分

為末煉蜜丸桐子大每服三十丸
四順清涼飲子　治一切丹毒積熱壅滞咽痛
川歸　甘草炙　赤芍　大黃　每服七錢水煎服
黃連解毒湯　治大熱甚煩躁不得眠
黃連七錢半　黃栢　梔子各五錢　黃芩一兩
每服五錢水煎服　加防風連翹為大金花
丸治風熱　加柴胡治小兒潮熱　與四物
相合治婦人潮熱
當歸承氣湯　治熱發於上不利於下陽狂奔走

罵詈不避親踈
當歸　大黃各五錢　芒硝四錢半　甘草二錢半
右分二帖姜三片棗二枚水煎服
人參散　治身熱頭痛積熱在胸服此神妙
石膏　甘草各一兩　滑石四兩　寒水石三兩　人參五錢
為末每服一錢或二錢溫水調下早晚各一
服　兼服金花丸妙
四製黃栢丸
黃栢去粗皮淨四斤一斤米泔水浸　一斤以好酒浸一斤蜜糖水浸

右俱用磁器浸之三味俱要浸二指為度冬月
浸七日夏浸三日春秋五日濾出晒乾仍存餘
汁待後用再將黃栢一斤切作五寸長用真酥
油半斤以磁碗乘之先將銅銚將水熬滾再將
酥油連碗入水熔化將黃栢以微火炒熱用棕
刷蘸酥徐徐刷上且刷且炙各使透徹切忌焦
黑炙畢放於冷地上以磁碗覆之二日去火毒
并前共為細末以前存原汁和為丸如汁不敷
再加蜜酒兌勻和之丸如梧子大每空心及臨

臥酒吞下五七十丸徐以乾物壓之此藥滋腎
降火化痰之聖藥也　若吐血遺精服半月即
愈如相火周身疼痛減黃栢二斤加犀角一兩
為末入前丸中
天門冬膏
以生天門冬不拘多少去皮心搗絞汁盛磁器
內以鍋熬滾水入門冬連磁器于中煮至滴水
成珠以磁礶收貯每服二三匙沸湯點服如無
生者以乾者煮汁熬膏亦可　或以天門冬制

為末每服二三錢亦可

前胡散　治胃氣實熱唇口乾裂中心熱躁大便秘結非時煩渴睡中口内生涎

大黄五錢　桔梗　枳殼　前胡　杏仁各一錢　葛根二錢

右為末每服二錢入姜煎服

赤茯苓湯　治膀胱實熱腹脹小便不通口苦舌乾咽腫不利

猪苓　葵子　枳實　瞿麦　木通　黄芩

滑石　甘草　赤苓　車前子各等分

入姜水煎食前服

東垣瀉陰火升陽湯　治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛脉右關緩弱或弦或浮數

羌活　甘草炙　黄芪　蒼术各一兩　升麻八錢　柴胡一兩半　人參　黄芩各七錢　黄連五錢酒炒　石膏五錢秋深勿用

右每服一兩或五七錢水煎服

升麻散火湯　治男子婦人四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱發困熱如燎捫之烙手此多血虚而得之或胃虚過食冷物抑遏陽氣於脾土之中火欝則發之

升麻　葛根　羌活　獨活各五分　防風三分　柴胡八分　甘草炙三分　白芍五分　生甘草二分　水煎稍熱服

千金麦門冬湯　治諸疾後火热乗肺咳嗽有血胸脇脹滿上氣羸瘦五心煩熱渴而煩悶

麦冬　桑白皮　生地各一兩　半夏　紫苑

桔梗　淡竹葉　麻黄各七錢半　五味五錢　甘草五錢

每服七錢水煎服

拔萃方地骨皮散　治渾身壯熱脉長而滑陽毒火熾發渴

地骨皮　茯苓各五錢　柴胡　黄芩　生地

知母各一兩　石膏二兩　羌活　麻黄各七錢半若有汗者減此二味

右每服一兩入姜煎服

麦門冬散　治丈夫婦人蘊積邪熱心胸煩悶咽乾口燥睡卧不安或大小腸不利口舌生瘡

芒硝一兩　麦冬三錢　小草　黄連　升麻　犀角屑

甘草炙　黄芩　枳壳　大青各五錢

每服三錢水煎服

真珠散　治男女五臟積熱毒氣上攻心胸煩悶口乾舌燥精神恍惚悶亂坐卧不安

琥珀　真珠粉　天花粉　鉄粉　硃砂

甘草　牙硝　寒水石煅　大黄各等分

為極細末每一錢竹葉湯下

紫雪　治内外煩熱不解口中生瘡狂易叫走解諸熱毒藥毒邪熱驚癇百病

黄金百兩　寒水石　磁石　石膏　滑石各一斤研

已上用水一石煮至四斗去査入下項

炙甘草八兩　羚羊角屑　犀角屑　青木香

沉香各五兩　丁香一兩　升麻　玄參各一斤並剉細

已上再煮至一斗五升入下項

硝石四斤芒亦得每斤得七醋七錢五分　朴硝淨十斤

已上入前汁中微火煎柳枝不住手攪候有七斤投放木盆中半日欲凝入下項藥攪令匀入硃砂三兩

當門子一兩二錢五分　右藥成紫色霜雪每服一錢或一錢冷水調下大人小兒消息虛實加減食後服

千金黑奴丸　治火熱陽毒發班發狂煩躁大渴倍常

黄芩　釜底煤　芒硝　灶突墨　梁上塵

麻黄　小麦奴　大黄各一

右為末煉蜜為丸彈子大新汲水化服不定再服半丸飲水盡足當發寒寒已汗出乃差未汗再服半丸渴不甚者勿與之

大宮詹少溪吳駁閱校

赤水玄珠第二卷目録

暑門　注夏　解㑊
濕門
燥門
寒門　中寒　惡寒

赤水玄珠第二卷

新安生生子孫一奎著輯

暑門

明暑篇

五運六化篇曰相火之化暑主於夏夏之為言大也與午同意炎暑乃行有中有冒有傷有暑風乃三之氣也

内經曰因於暑汗煩則喘渴靜則多言體若燔炭汗出而散先夏至日發者為病溫後夏至日發

為病暑暑當與汗皆出勿止

脉虛身熱淂之傷暑

難經曰傷暑得之為正邪火自病也當惡臭其病身熱而煩心痛其脉浮大而散

潔古曰靜而得之為中暑動而淂之為中熱中暑者陰症中熱者陽症

東垣曰暑熱之時無病之人或避暑熱納涼於深堂大厦得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚火熱無汗為房

室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越多以大順散熱藥主之是也若行人農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發燥熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃為天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯涼劑主之

劉宗厚曰按此論中暑即仲景所謂中暍是也只作暑熱分之可見有陰陽二症受病不同如夏月受病有陰寒所遏使周身陽氣不得伸越以大順散主之者為中暑蓋當暑月名之猶冬

月發熱為傷寒也但中熱治例雖云用蒼朮白虎湯而又處清暑益氣之法況大順散一方是仲景太陽例藥然東垣施用諒不如此必有若益氣湯証例發揮暐、者惜乎無傳故使後人不能無疑也詳後所論別中暑証亦有於勞役動而得者中熱証亦有於避暑靜而得之者大抵因人元氣虛實不同故所受亦異為治豈得而無變法哉

陳無擇曰暑熱喜歸心心中之使人噎悶昏不知人入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則喘滿痿躄入腎則消渴凡中暍者死治之切不得用冷惟宜溫養得冷則死道途中無湯即以熱土熨臍中仍以熱溺沃之槩可見矣凡覺中暑急嚼生姜一大塊水送下如已迷悶嚼大蒜一大瓣水送下如不能嚼水研灌之立醒

治暑之法清心利小便甚好若自汗甚者不可利小便宜白虎湯清解之次分表裡治之如在表頭疼惡寒雙解散加香薷及二香散香薷飲之

類解之如在半表半裡泄瀉煩渴飲水吐逆者五苓散治之熱甚煩渴者益元散清之若表解裏熱甚宜半夏解毒湯下神芎丸酒蒸黃連丸等或人平素弱及老人冒暑脉微下利渴而喜溫或厥冷不省人事宜竹葉石膏湯加熟附半箇冷飲次以來復丹五苓散治之凡夏暑証不可服諸熱燥劑致斑毒發黃小水不通悶亂而死矣

盛夏發熱有傷寒冒暑二証若熱有進退則為冒

暑一句熱不止則為傷寒．

林氏曰中暑之証面垢悶倒昏不知人冷汗自出手足微冷或吐或瀉或喘或滿其脉浮虛名曰暑風慎不可用冷水及純大寒之劑即以蘇合香圓姜湯調灌或研蒜水灌之醒後用清暑之藥調理又有因暑氣入於心包絡而鼓激痰塞心竅卒倒不語者急宜吐出痰涎隨用導痰湯合黃連香薷飲加竹瀝姜汁

丹溪云暑乃夏月炎暑也盛熱之氣著人也有冒

有傷有中三者有輕重之分虛實之辨或腹痛水瀉者脾與大腸受之惡心者胃口有痰飲也此二者冒暑也可用黃連香薷飲清暑益氣湯益黃連退暑熱香薷消蓄水或身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此為熱傷在分肉也當以解毒白虎湯加柴胡氣虛者加人參或咳嗽發寒熱盜汗出不止脉數者熱在肺經用清肺湯柴胡天水散之類急治則可遲則不救火乘金此為中暑 凡治病須要明白辨別慎勿滚同施治春秋間亦或有之切莫執一隨病處方為妙

按傷暑與傷寒身皆發熱不可不辨明施治蓋寒傷形熱傷氣傷寒則外惡寒而脉浮緊經曰脉盛身寒浮之傷寒脉虛身熱得之傷暑傷暑則不惡寒而脉虛為異也故從小柴胡湯渴加知母石膏或人參白虎湯或清暑益氣湯

人參白虎湯 治暑熱發渴脉虛

人參一錢半 知母二錢 石膏五錢 甘草一錢 粳米一合 水煎服

竹葉石膏湯

石膏一兩 半夏二錢半 甘草 人參各二錢 麥門冬五錢 竹葉十片

每服一兩生姜三片水煎服

十味香薷飲 治伏暑身倦神昏頭重吐利

香薷一兩 人參 陳皮 白术 茯苓 黃耆 木瓜 厚朴 白扁豆 甘草各五錢

每服一兩水煎服

一方無參芪陳皮加紫蘇藿香檀香各等分名消暑十全飲　除暑渴霍亂吐瀉

益元散　治熱而煩悶小便赤澁

滑石六兩　甘草一兩

右為末每服二錢或三錢冷水調下燈心湯亦可　熱盛加辰砂　欲發汗用葱白湯調

五苓散

白朮　茯苓　猪苓各一兩半　澤瀉二兩　桂一兩

右為末每服二三錢熱湯調下

加辰砂名辰砂五苓散

縮脾飲　除暑渴止吐瀉

砂仁　草果　烏梅肉　甘草炙各四兩

扁豆　乾葛各二兩

每服六錢水煎冷服

大順散　治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水谷不分氣逆霍亂嘔吐

甘草　乾姜　杏仁去皮尖　桂

右先將甘草用白砂炒黃次入姜却下杏仁以不作声為度篩去砂入桂為末每服二三錢水煎溫服　如煩躁井花水調服以沸湯點服亦得

来復丹　治伏暑泄瀉身熱脉弱

硝石一兩同硫黃火上微炒用柳條攪結砂子不可火大　太陰玄精石研一兩

硫黃一兩　青皮　五灵脂去沙土　陳皮各二兩

右為末好醋糊為丸菉豆大空心米飲下二三十丸

大黃龍丸　中暑昏暈身熱惡寒頭痛或往来寒熱煩渴吐瀉

舶上硫黃　硝石各一兩　雄黃　滑石

白礬各五錢　寒食麵四兩

右為末滴水丸如梧子大每服五丸至七丸漸加至四十丸

劉宗厚曰此藥通利三焦分理陰陽溫胃開結治揮霍變亂神志昏憒元氣下陷者甚捷然病因實火溫熱者勿用

子和桂苓甘露飲　伏暑發渴脉虛
桂　人參　藿香各半兩　茯苓
白术　甘艸　葛根　澤瀉
石膏　寒水石各一兩　木香一錢
為末白湯調三錢
宣明桂苓甘露飲
茯苓　澤瀉各一兩　石膏　寒水石各二兩
滑石四兩　白术　桂　猪苓各半兩
為末溫湯調下二三錢

生脉散
人參　五味子　麦門冬各二錢
水煎服　一方加黃芪甘草
却暑散　治冒暑伏熱頭目眩暈嘔吐瀉痢煩渴背寒面垢
赤茯苓　甘草生各四兩　寒食麵　生姜各一斤
右為末每服二錢白湯下
冷香飲子　治傷暑喝霍乱腹痛煩躁脉沉微或伏
草果仁三兩　附子　陳皮各一兩　甘草五錢
每服一兩水煎入姜冷服
黃連解毒湯　方在火門
二氣丹　伏暑傷冷二氣交錯中脘痞悶或頭痛惡心並治
硝石　硫黃各等分
右為末銀器內文武火炒令鵝黃色再碾細用糯米煮糊為丸如桐子大每服四十丸新汲水下

香薷丸　大人小兒傷暑伏熱燥渴瞀悶頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並治
香薷一兩去根　木瓜　紫蘇葉　藿香洗
茯神去心各半兩　甘草炙　檀香　丁香各二錢半
右為末煉蜜和丸鷄頭子大每服一丸至二丸細嚼溫湯下或新汲水化下
春澤湯　伏暑發熱煩渴引飲小便不利兼治傷寒陰阳不分疑似之間最宜服此

澤瀉三錢　猪苓　茯苓　白术各二錢
桂心　柴胡各一錢　人参　麦門冬各一錢半
渴甚去桂加五味子黃連各二錢
香朴飲子　大人小兒伏暑吐瀉虚煩悶亂
人参　烏梅肉　茯苓　甘草炙
紫蘇　澤瀉　香薷　半夏麹
白扁豆　木瓜　厚朴姜制各一錢
姜三片棗一枚水煎服
清暑六和湯　心脾不調氣不升降霍乱轉筋嘔

吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胃脘痞滿頭目昏
痛肢體浮腫嗜臥倦怠小便赤澁并傷寒陰陽
不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食
砂仁　半夏泡　杏仁去皮尖　人参
藿香　扁豆　香薷　赤茯苓
厚朴姜制　木瓜各一錢　甘草炙五分
姜五片棗一枚水煎服
消暑十全散　伏暑胃氣不和心腹滿痛
香薷　扁豆　厚朴姜制　甘艸炙

紫蘇　白术　茯苓　藿香
木瓜　檀香各一錢
姜三片水煎服
黃龍丸　和劑方　治伏暑發熱嘔吐悪心
黃連淨三十二兩　好酒五升煮乾研為細末麹糊丸
梧子大每服五十丸白湯下
枇杷葉散　治暑毒攻心衄血嘔血或吐瀉作渴
香薷二錢　厚朴姜炒一錢　甘草炙一錢半　麦門冬
木瓜　茅根各一錢　枇杷葉　陳皮

丁香各半錢
每服三五錢姜水煎服
注夏
子和曰痿之作也皆五月六月七月之時午者少
陰君火之位未者湿土庚金伏火之地申者少
陽相火之分故痿發此三月之内為热也故病
痿之人其脉浮大
丹溪云注夏屬陰虚元氣不足補中益氣中去柴
升加炒黃栢挟痰者加南星

東垣曰刺志論云氣虛身熱得之傷暑熱傷氣故也痿論曰有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣内伐内伐則熱舍於腎腎者水藏也今水不能勝火則骨枯而髓虛足不任身發為骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也此湿熱成痿令人骨乏無力故治痿獨取於陽明時當長夏湿熱大勝蒸蒸而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩心下膨痞小便黄而數大便溏而頻或痢出黄如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗躰重或汗少者血先病而氣不病也其脉中得洪緩若湿氣相搏必加之以遲病雖互換少差其天暑温令則一也宜以清燥之劑治之内經曰陽氣者衛外而為固也熱則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黄芪甘温補之為君人参陳皮當歸甘草甘微温補中益氣為臣蒼术白术澤瀉滲利而除湿升麻葛根苦甘平善解肌熱又以風勝湿也湿勝則食不消而作痞滿

故炒麹甘辛青皮辛温消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黄栢苦寒借甘味瀉熱補水虛者滋其化源以人参五味子麦門冬酸甘微寒救天暑之傷於庚金為佐名曰清暑益氣湯

黄芪一錢汗少減五分　人参　澤瀉

白术　神麹　陳皮各五分　甘草炙

葛根　黄栢酒炒　麦冬　歸身各三分

升麻　蒼术一錢　五味子九粒　青皮三分半

作一服水二大盞煎至一盞去查食遠温服劑之多少臨時斟酌此病皆由飲食勞倦傷其脾胃乘天暑而病作也但藥中犯澤瀉猪苓茯苓灯心通草木通淡味滲利小便之類皆從時令之旺氣以泄脾胃之客邪而補金水之不及也此正方已是從權而立之若其時病湿熱脾旺之症或小便已數腎肝不受邪者誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先損其兩目也復立變症加減法於後　如心火乘脾乃血受火邪而不能升發陽氣伏於地中

地者人之脾也必用當歸和血少用黃栢以益真陰 如脾胃不足之證須少用升麻乃足陽明太陰引經之藥也使行陽道自脾胃中右遷少陽行春令生萬物之根蒂也更少加柴胡使諸經左轉生發陰陽之氣以滋春升之和氣也 如脾虛緣心火亢極而乘其土也其次肺氣受邪為熱所傷必須多用黃芪甘草次之人參又次之三者皆甘溫之陽藥也脾始虛肺氣先絶故用黃芪之甘溫以

益皮毛之氣而閉腠理不令自汗而損元氣也上喘氣短懶語須用人參以補之心火乘脾須用炙甘草以瀉火熱而補胃脾中元氣甘草最少恐滿也若脾胃之急痛并脾胃大虛腹中急縮腹皮急縮者却宜多用經曰急者緩之唉甚者去人參如口乾嗌乾者加乾葛 如脾胃既虛不能升浮為陰火傷其生發之氣榮血大虧榮氣伏於地中陰火熾盛日漸煎熬血氣虧少且心包與心主血血減

則心無所養致使心亂而煩病名曰寃寃者心惑而煩悶不安也是由清氣不升濁氣不降清濁相干亂於胸中使周身血氣逆行而亂經云從下上者引而去之故當加辛溫甘溫之劑生陽陽生而陰長也已有甘溫三味之論或曰甘溫何能生血又非血藥也曰仲景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血也更加當歸和血又宜少加黃栢以救腎水盖甘寒瀉熱火火減則心氣得平而安也如

煩亂猶不能止少加黃連以去之盖將補腎水使腎水旺而心火自降扶持地中陽氣也如氣浮心亂則以硃砂安神丸鎮固之煩一減勿再服以防瀉陽氣之反陷也如心下痞亦少加黃連氣乱於胸為清濁相干故以陳皮理之能助陽氣之升而散滯氣又助諸甘辛為用故長夏濕土客邪火旺可從權加蒼朮白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕氣大勝主食不消化故食減不知穀味加炒麯以

消之復加五味子麥門冬人參瀉火益肺氣助秋損也此三伏中長夏正旺之時藥也

脾胃虛弱隨時為病隨病制方　夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱甚損傷元氣怠惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中溜火而視物䀮䀮無所見小便頻數大便秘結胃脘當心而痛兩脇痛或急縮臍下周圍如繩束之

急甚則如刀刺腹難舒伸胸中閉塞時湿嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌强腰背胛皆痛頭痛時作食不下或食入即飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天氣之熱助本病也乃庚大腸辛肺金為熱所乘而作當先助元氣治庚辛之不足

黃芪人參湯主之

黃芪一錢如自汗過多加一錢　人參　白朮各五分
陳皮　甘草　當歸　黃栢以救腎水之源
麥冬各二分　神麯炒三分　五味子九粒　升麻六分
蒼朮五分無汗一錢　右俱作一服水二盞煎至一盞稍熱食遠或空心服之忌酒湿麵大料物之類及過食冷物○如心下痞悶加黃連二三分○如胃脘當心痛減大寒藥加草豆蔻仁五分○如脇下痛或縮急加柴胡二三分○如頭痛目中溜火加黃連二三分川芎三分○如頭目不清利上壅上熱加蔓荊子三分藁本二分細辛一分川芎三分生地黃一分○如氣短精神少或夢寐間困乏無力加五味子九粒○如大便澁滯隔

一二日不見者致食少食不下血少血中伏火而不得潤也加當歸身生地黃各五分桃仁三個研麻子仁五分研泥○如大便通行所加之藥勿再服○如大便又不快利勿用別藥少加大黃五分煨○如不利者非血結血秘而不通是熱則生風其病人必顯風症單血藥不可復加止常服人參黃芪湯藥只用羌活五錢防風五錢二味㕮咀以水四盞煎至一盞去查空心服之大便必大走也一服便止○如胸中氣滯加青皮橘紅

倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之○如氣滯太甚或補藥太過或心下有憂鬱之事更加木香二三分或砂仁二三分或白豆蔻仁二分與正藥同煎服○如腹痛不惡寒者加白芍藥五分黃芩二分減五味子

夫脾胃虛弱至六七月間河漲霖雨諸物皆潤人汗沾衣身重短氣甚則四肢痿軟行步不正脚欹眼黑欲倒者此腎水與膀胱俱竭之狀也當急救之滋肺氣以補水之上源又使庚大腸不受邪熱不令汗大泄也汗泄甚則亡津液亡津液則七神無所依經云津液相成神乃自生津者庚大腸所主三伏之義為庚金受囚也若亡津液汗大泄濕令亢盛則清肅之氣亡燥金受囚風木無可以制故風濕相搏骨節煩疼一身盡痛亢則害承乃制是也孫思邈曰五月常服五味子是瀉丙火補庚金大腸益五臟之元氣壬膀胱之寒已絕於巳癸腎水已絕於午今更逢濕旺助熱為邪西方北方之寒清絕矣聖人立法夏月宜補者補天元之真

氣非補熱火也令人夏食寒是也為熱傷元氣以人參麥門冬五味子生脉脉者元氣也人參之甘補元氣瀉熱火也麥門冬之苦寒補水之源而清肅燥金也五味子之酸以瀉火補庚大腸與肺金也當此之時無病之人亦或有二症況虛損脾胃有宿疾之人遇此天暑將理失所違時伐化必困乏無力懶語氣短氣弱氣促似喘非喘骨乏無力其形如夢寐朦、如烟霧中不知身所有也必大汗泄若風犯汗眼皮膚必搐項筋皮枯毛焦身體皆重肢節時有煩疼或一身盡疼或渴或不渴或小便黃澀此風濕相搏也頭痛或頭重上熱壅盛口鼻氣短氣促身心煩亂有不樂生之意情思慘悽此陰勝陽之極也病甚則傳腎肝為痿厥厥者四肢如在火中者為熱厥四肢寒冷者為寒厥寒厥則腹中有寒熱厥腹中有熱為脾主四肢故也若肌肉濡潰痺而不仁傳為肉痿證、中皆有肺疾用藥之人當以此調之氣上衝胸皆厥證也痿者四肢痿軟而無力也其心煩冤不止心神撩亂者是也

厥者氣逆也甚則大逆故曰厥逆其厥痿多相須也於前已立黄芪人參五味子麦門冬湯中每加白茯苓二分澤瀉四分猪苓白朮各一分如小便快利不黄澁者只加澤瀉二分與二朮上下分消其湿如行步不正脚膝痿弱兩足欹側已中痿邪者加酒洗黄栢知母三分五分或令兩足湧出力氣如汗大泄者津脱也急止之加五味子五粒炒黄栢五分炒知母三分不令妨其食當以意斟酌若妨食則止候食進再服取三里氣街以三稜針出血

若汗不止不減者於三里穴下三寸上廉穴出血禁酒湿麺　夫痿者湿熱乗於腎肝也當急去之不然則下焦元氣竭盡而成軟癱必腰下不能動心煩寃而不止也若身重或氣不短小便如常及湿熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子澤瀉猪苓茯苓黄栢知母蒼朮白朮之藥只依本病中證候加減常服藥亦須用酒黄栢二分或三分六七月之間湿令大行子能令母實而熱旺濕熱相合而刑庚大腸故用寒凉以救之燥金受湿熱之邪絶寒水生化之源源絶則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動矣步行不正兩足欹側以清燥湯主之

黄芪一錢半　黄連　蒼朮　白朮各一錢
陳皮　澤瀉各五分　五味子九粒　人參
白茯苓　升麻各三分　當歸一錢二分　柴胡
麦冬　生地　神麯炒　猪苓
黄栢酒製　甘草炙各二分

每服半兩水二盞煎至一盞稍熱空心服

丹溪治宋某劳傷發熱當作注夏治之

黄栢炒　升麻各三分　黄芪　人參
木通　白芍各五分　白朮一錢半　陳皮
甘草炙各二分

婦人患注夏手足痠軟而熱

白朮　黄栢炒　白芍　陳皮
當歸各一錢　蒼朮　甘草生各五分

解㑊音亦

生生子曰平人氣象論篇云尺脉緩濇謂之解㑊

王注曰尺者陰部也腹腎主之緩為熱中濇為無血故解㑊也解㑊之證懈倦困弱寒不甚寒熱不甚熱惡見人〻見人心惕〻然或熱多而汗出肢體百骸散解痿弱而不䏻任持少氣而不欲言左右倚不可以名其狀故謂之解㑊注夏之証殆相似亦虛類也其治大生脉湯足以主之加木瓜苡仁倚音䏻困弱也

大生脉湯　治注夏䏈倦嗜臥百凡懶動動則喘乏方出痿門

又方

甘枸杞子　北五味子

研碎貯罐內滚水泡封口少刻取服之可泡三次每服六錢久服為妙

濕門

明湿篇

生生子曰六氣之中湿為四之氣土之所司脾為之主五運六化篇曰土之化曰湿曰雨主於長夏長夏謂六月也土生於火長在夏中既長而旺土潤溽暑湿化行也盖燥則土生乾則土死泉出地中湿化信矣經曰地氣上為雲天氣下為雨雨出地氣雲出天氣則土雨之化見也經曰湿勝則濡洩人每夏月洩瀉多以胃苓湯益元散五苓散取効者實治湿令之勝也

生生子曰內經云諸湿腫滿皆屬脾土湿勝則濡瀉地之湿氣感則害人皮肉筋脉又曰因於湿首如裹盖首者諸陽之會至高至清若湿氣薰蒸而沉重似有物以蒙之也失而不治則鬱為熱〻傷血不能養筋故大筋緛短而為拘攣湿傷筋不能束骨故小筋弛長而為萎弱矣湿之為邪有自內得者有自外淂者陰雨湿地皆外所因飲食湯飲醺酪皆內所因有湿寒者有湿

熱者丹溪曰六氣之中濕熱爲病十居八九濕在上宜微汗之不欲大汗濕在下宜利小便此淡滲治濕也濕雖有内外二因然治法大抵要實脾土爲主緣脾惡濕苟脾土不燥則失其健運之常病易乘之内濕多則泄瀉生痰流於經絡肢節則腫痛外濕多則跗腫而肌肉濡潰原病式曰諸痙強直積飲痞膈中滿霍亂吐下躰重跗腫肉如泥按之不起皆屬於濕是以蒼白二术爲必用之藥加入二陳湯用之如濕在肌

表及上焦加羌活防風之類取風能勝濕之意如下焦腰足跗腫及泄瀉輕者加入五苓散重者加羌活防風升麻以升提之此無上妙法也

賈真孫曰濕爲土氣火熱能生濕土故夏熱則萬物濕潤秋凉則萬物乾燥濕病本不自生因熱而怫鬱不能宣行水道故停滯而生濕也况脾土脆弱之人易爲感冒豈必待不流而後爲濕哉人只知風寒之威嚴不知暑濕之炎烈感人於冥冥之中也病式云諸痙強直積飲等症皆屬於濕或胕腫躰寒而有水氣裏必小便赤少不通或渴是蓄熱入裏極深非病寒也大抵治法宜實脾清熱利小便爲上故治濕不利小便非其治也宜桂苓甘露木香葶藶木通治之守真師曰葶藶木香散下神芎丸此藥下水濕消腫脹利小便理脾胃無出乎此也腹脹脚腫甚若舟車丸下之濕熱内鬱發黄茵陳湯下之或佐以防己黄芪一身盡腫痛或無汗是濕流關節邪氣在表宜五苓散加官桂蒼术微汗之不

可大汗若自出汗多熱燥津液内竭小水不利切勿利之重損津液也宜防風白术甘草湯主之其濕症有二濕熱症多濕寒症少當以脉症明辨之如脉滑數小便赤澁引飲爲濕熱症若小便自利清白大便瀉利身疼自汗爲濕寒症治之宜五苓散加生附子蒼术木瓜主之出玉機微義

金匱防己黄芪湯　治風濕脉浮身重汗出惡風或疼

防己　黄芪各一兩　甘草炙五錢　白术七錢半

右每服一兩入姜棗煎　喘者加麻黄胃氣不和加芍藥氣上衝加桂枝下有寒加細辛

按濕勝身重陽微中風則汗出悪風故用黄芪炙甘艸實表防已白朮勝濕也

桂枝附子湯　治風濕相搏身體痛煩不能轉側不嘔不渇脉浮虚而濇者此湯主之

桂枝八錢生姜六錢附子三錢炙甘草四錢

右作二次入棗煎服小便自利者去桂加白朮湯主之服後其人如冒狀乃藥加使然也勿怪

甘草附子湯　治風濕相搏骨節痛煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利悪風不欲去衣或身微腫痛者

甘草炙　白朮各四　附子三錢　桂八錢

水煎服　金匱方减桂枝加生姜大棗名白朮附子湯

麻黄加朮湯　治濕勝身煩痛

麻黄六錢桂枝四錢甘草炙二錢杏仁二十五枚白朮八錢水煎取微汗　金匱减桂朮加薏苡仁名麻黄薏苡杏仁甘草湯　治濕勝身疼日晡所劇者

元戎加味五苓散　治濕勝身疼小便不利躰重發渇本方加羗活此乃太陽滲利之劑治風濕寒濕之藥也

局方五積散　治外感風寒冒寒濕身躰重痛

海藏云麻黄桂芍甘草即麻黄桂枝各半湯也蒼朮甘草陳皮厚朴即平胃散也枳壳桔梗陳

皮茯苓半夏即桔梗半夏等湯也又川芎當歸治血兼乾姜厚朴散氣此数藥相合為解表溫中泄濕之剤去痰消痞調經之方雖為内寒外感表裏之分之所製實非仲景表裡麻黄桂枝姜附之的方也至於積冷嘔泄時疫項背拘急加葱白豆豉厥逆加吴茱萸寒熱欬逆加棗婦人難産加醋始知用之非一途也惟知活法者其擇之　此方一兩加生姜五片水煎入射香再煎二沸治中濕而致癱瘓與中風相似二服立效

局方滲湿湯　治寒湿所傷身重腰冷如坐水中小便或澁大便溏瀉皆坐卧湿地或陰雨所襲之也

蒼朮　白朮　甘草各一兩

乾姜　茯苓各二兩　陳皮　丁香各二錢半

每服四錢入棗煎服

茵陳五苓散　湿熱勝發熱黃疸

茵陳蒿一兩　五苓散五錢　水煎服

大橘皮湯　治湿熱內甚心腹脹滿小便不利大便滑泄

橘紅一兩半　木香一錢　滑石六兩　檳榔三錢

茯苓一兩　猪苓　澤瀉　白朮

桂枝各五錢　甘草二錢

每服七錢入姜水煎服

葶藶木香散　治湿熱內外餘熱水腫腹脹小便赤澁大便瀉

葶藶　茯苓　猪苓　白朮各一兩

木香五分　澤瀉　木通　甘草

桂枝各五錢　滑石三兩

右為細末每服三五錢白湯調下

劉河間曰若小便不得通利而反轉泄者乃湿熱痞悶極深而攻之不開是能反為注泄此正氣已衰而多難救慎不可與攻也然當滋其化源

東垣清燥湯　表裡有湿熱痿厥癱瘓不能行走或足踝膝上皆腫痛口乾渴痢　方在注夏

吐劑

瓜蒂散　治中寒湿頭痛面黃鼻塞煩而脉大

瓜蒂一味為末以少許吹入鼻中黃水自出

按湿盛致痰液畱膈上肩背重痛麻痺者宜此吐之

攻下之劑

宣明三花神祐丸　治一切水湿腫病大腹實脹喘滿

舟車丸

大黃二兩　甘遂　大戟　芫花

青皮　陳皮各一兩　牽牛　木香各半兩

為末滴水丸如梧子大每服六七十丸白湯下

濬川散

大黄(煨) 郁李仁(各二兩) 甘遂(一兩) 芒硝(半兩)

牽牛(頭末四兩)

右為末姜湯調下空心臨卧隨症加减服

導水丸 濕熱内欝胸膈痞滿衄衂口舌生瘡咽喉不利牙疳齒蝕口臭或遍身生濕瘡乾疥睡語咬牙驚惕怔忡大小便滯澁風熱酒毒縕熱等症

大黄 黄芩(各二兩) 牽牛(頭末) 滑石(各四兩)

為末水丸如梧子大每服五十丸白湯下臨時隨症加减

除濕丹 諸濕相搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急津液凝澁便溺不利

檳郎 甘遂 威灵仙 赤芍

澤瀉 葶藶(各二兩) 乳香 没藥(各一兩)

牽牛(五錢) 大戟(炒三兩) 陳皮(四兩)

右為末糊丸梧子大每服五七十丸温水下

劉宗厚曰按此出太陽例藥諸濕欝滞於表裡重痛沉著非此不能除但中病即止虚弱者當慎

東垣海金沙散 脾濕太過遍身腫滿喘不得卧及腹脹如皷

牽牛(微炒一兩半) 甘遂(五錢) 白术(一兩) 海金沙(三錢)

右為末每服二錢煎逆流水調下得利止後服

聖灵丹 脾肺有濕喘滿腫盛小便赤澁

苦葶藶(炒四兩) 漢防已 木香 茯苓(寒食麵包煨)

木通 人参(各二錢半)

右為末棗肉為丸梧子大每服三十丸桑白皮湯下

續隨子丸 肺經有濕通身虚腫滿悶不快或逆或喘

人参 防已 赤茯苓(煨如上) 檳郎

木香(各五錢) 葶藶(炒四兩) 續隨子(一兩) 海金沙(半兩)

為末棗肉丸梧子大每三十丸棗皮湯下

導滯通經湯 治脾濕有餘氣不宣通面目手足腫脹悶而痛即五苓散減猪苓桂加陳皮木香

對金飲子 治脾胃受濕瞋脹米穀不化飲食不進身體沉重肢節酸疼皮膚微腫

平胃散 桑白皮一炒各為末每服二三錢入姜煎服

除濕湯

半夏曲炒 厚朴 蒼朮各二錢 藿香葉 橘紅 白朮 白茯苓各一錢 炙甘草七分 姜三片水煎服

白朮酒 治中濕口噤不知人

白朮一兩 酒二鍾煎至一鍾不拘時服不飲酒以水煎

撫芎湯 濕流關節臂痛手重或自汗頭眩痰逆惡心

撫芎 白朮 橘紅各一 炙甘草五錢

每服五錢姜七片水煎服

黄芪湯 風濕相搏脉沉而絃客在皮膚四肢少力関節疼痛

黄芪五兩 橘紅二兩 甘草兩 白茯苓一兩半 防風四兩

右每服六錢姜三片棗一枚水煎服

羗活勝濕湯

羗活 獨活各一錢 藁本 防風 甘草炙 川芎各五分 蔓荊子三分

水煎空心温服

如身重腰沉沉然加酒洗防巳五分輕者附子五分重者川烏五分

清熱滲濕湯

黄連 茯苓 澤瀉各一錢 黄栢二錢盐水炒 蒼朮 白朮各一錢半 甘草五分 水煎服

如單用滲濕去連栢加陳皮乾姜

東垣參朮湯 潔古云起卧不能謂之濕身重是也此方主之治脾胃虛弱元氣不能榮養心肺四肢沉重食後昏悶

黄芪二錢 人參 陳皮 青皮各五分

升麻　柴胡各三分　甘草炙四分　酒黄柏三分
神曲七分　蒼朮一錢　當歸二分
水煎食前帶熱服

燥門

明燥篇

生生子曰諸書視燥為風熱為血少是固然矣予謂諸書僅言病機耳而令氣則未之及也夫燥是六氣中五之氣也運氣六化篇已明言之其論曰在地成形在天為氣行有五而氣有六以分君火相火之化六氣化者謂寒濕暑燥風火也乃天之元氣然後三陰三陽上奉之謂之標六氣皆有一化舉大槩也而難經亦曰辛商也

丙之柔則金之化明矣觀運氣以卯酉為陽明燥金司天者又豈無所本哉夫金者西方之氣在人主肺運氣所以不言肺而言陽明者緣肺為華蓋雖陰臓居膈上處陽之部位必待陽而後發故屬陽明也金之化清與燥主於秋為五之氣主秋分后六十日有奇自斗建酉正至亥之中天度至此清氣乃行萬物皆燥也一年之間有此必然之勢亦有此必然之理也何以然金屬庚辛辛為丙婦帶火之氣故燥予故曰素

問言燥者指令氣也諸書云燥者指病機也燥之胎自丙中來故古人有云莫治風莫治燥治得火時風燥孔出深得夫燥之旨者同志者詳之

內經病機云諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥

燥本風熱論

原病式云經曰風熱火同陽也寒燥濕同陰也又燥濕小異也然燥雖屬秋陰而異於寒濕故反同其風熱也故火熱盛金衰而風生則風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝於水濕而為燥也凡人風病多因熱甚而風燥者為其兼化以熱為其主也然陽實陰虛而風熱太甚以勝水濕因而成燥肝主於筋而風氣自甚又因熱加之液還聚於胸膈則筋太燥也燥金[illegible]也[illegible]病燥熱太甚而脾胃乾涸成消渴者[illegible]勁切緊濇故為病筋脉勁强緊急而[illegible]甚怫鬱在表而裏氣不舒善伸數欠[illegible]急或時惡寒或筋惕而搐脉浮數而絃

也風熱燥并鬱甚於裡故煩滿而或悶結也及風癎之發作者由熱甚而風燥為兼化涎溢胸膈而瘈瘲昏冒僵仆也凡此諸症皆由熱甚而生風燥各有異者由風熱燥各微甚不等故也所謂中風或筋緩者因其風熱勝濕而為燥乃燥之甚也然筋緩不收而痿痹及諸膹鬱病痿皆屬金肺乃燥之化也如秋深燥甚草木痿落而不收病之象也是以手得血而能握足得血而能步夫燥之為病者血液衰少也而又氣血不能通暢故病然也

論結燥病本不同

東垣曰金匱真言論云北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎又云腎主大便大便難取足少陰夫腎主五液津液潤則大便如常若飢飽勞逸損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液衰少故大便結燥然結燥之病不一有熱燥有風燥有陽結有陰結又有年老氣虛津液不足而結者治法云腎惡

燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦瀉之陽結者散之陰結者熱之仲景云大便硬小便利不可攻下以脾約丸潤之食傷太陰腹滿食不化腹响然不能大便者以苦藥瀉之大抵津液耗少而燥者以辛潤之有物而結者當下之若不究其源一槩用巴豆牽牛之類下之損其津液燥結愈甚有復下復結極則以至引導於下而不能通者遂成不救之症可不慎哉

劉宗厚曰按此只是論結燥言裏証也河間所論則兼表裡而言

醫經統旨曰燥是陽明之化雖因於風熱所成然究其原皆本於血虛津液不足所至者為多何也蓋陰血虛則不能榮運乎百脉津液衰則無以滋養乎三焦由是邪熱怫鬱而燥变多端或燥於外數則皮膚皴結或燥於內數則精血枯涸燥於上咽鼻焦乾燥於下便溺閉結治之者外以滋益之內以培養之在上清解之在下通潤之務使水液自生而燥熱不容於不退矣

張子和治一婦人大便燥結小便淋澁半生不娠惟常服踈導之藥則大便通利暫廢藥則結滯忽得孕至四五月間醫者禁踈導之劑大便依常為難臨圊則努力為之胎墜者三又孕已經三四月弦望前後溲溺結澁其分胎隕乃訪戴人戴人診其兩手脉俱滑大雖滑大以其且孕不敢陡攻遂以食療之用花硷煮菠薐葵菜以車前子苗作茹雜猪羊血作羹食之半載居然

生子其婦燥病方愈

戴人曰予見孕婦利膿血下迫極努損胎但同前法治之愈者莫知其數也為医拘常禁不能变通非醫也非學也識医者鮮是難説也

又治一男子年六十餘病腰尻脊胯皆痛數載不愈晝靜夜躁大痛往来屢求自盡天年且夕則痛作必令人以手槌擊至四五更雞鳴則漸減向曙則痛止左右及病者皆作鬼神陰譴白虎齧朝禱暮祝覡巫僧道禁師至則其痛似減入

芟鬼神戰鬪山川神廟無不祭者淹延歲月肉瘦皮枯飲食減少暴怒日增惟候一死有書生曰既云鬼神虎蠱陰譴之禍如此禱祈何無一應聞陳郡有張戴人精於醫可以問其鬼神白虎與病乎彼若術窮可以委命其家從之戴人診其兩手脉皆沉滯堅勁力如張綆謂之曰病雖瘦難於食然腰尻脊胯皆痛者必大便堅燥其左右曰有五七日或八九日見燥糞一兩塊如彈丸結硬不可言曾令人剜取之僅下一兩

二卷　四十

塊渾身燥痒皮膚皺揭枯澁如麩片戴人既得病之虛實隨用大承氣湯以姜棗煎之加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑蓋病者聞燠則悅聞寒則懼說補則從說瀉則逆此弊非一日也而況一齊人傳之衆楚人咻之乎及煎成使稍熱嚥之從少至多累至三日天且晚臟腑下泄四五行約半盆以灯視之皆燥糞燥痺及瘀血雜臟穢不可近須臾痛減九分昏睡鼻息調如常人睡至明日將夕始覺飢而索粥温凉與之又

困睡一二日其痛盡去次令飲食調養日服導飲丸甘露飲滑利便溺之藥四十餘日乃復嗚呼世傳三十六虎書三十六黃經及小兒三十六吊誰為之耶始作俑者其無後乎古人以醫為重故医之道行今之人以醫為輕故医之道廢學者自局於術藝病者亦不擇精粗一槩待之常見官医迎送長吏馬前折腰真可羞也由是博古通今者少而師傳遂絶灵樞經謂刺與汗雖久猶可拔而雪結與閉雖久猶可解而決

二卷　四一

去腰脊胯痛者足太陽膀胱經也胯痛足少陽膽經之所過也難經曰諸痛為實内經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火注曰心寂則痛微心躁則痛甚人見巫覡僧道禁師至則病稍去者心寂也然去其後來者終不去其本也古之稱痛隨利減不利則痛何由去病者既痊乃壽八十歲故

凡燥症皆三陽病也

内經燥治法燥淫於内治以苦温佐以甘辛以辛潤之以苦下之

治風之劑

機要大秦艽湯　治血弱陰虛不能養筋、燥而手足不能運動指爪乾枯屬風熱甚者

秦艽　石膏各二兩　甘草　川芎

當歸　芍藥　羌活　獨活

防風　黄芩　白芷　生地黄

熟地　白朮　茯苓各一兩　細辛五錢

春夏加知母一兩

右剉每服一兩水煎服天陰雨加生姜七片

麻仁丸

郁李仁　麻仁各六兩　檳郎五錢　大黄二兩五錢一半炒

山藥　防風　枳殼炒各七錢半　羌活

木香各五錢半

右為末煉蜜為丸如梧子大每服二三十丸温湯下

東垣潤腸丸　治脾胃中伏火大便秘澁或乾燥閉塞不通全不思食乃風結秘血結秘皆令閉塞也以潤燥和血疎風自然通矣

麻子仁一兩　羌活　歸尾　大黄煨

皂角仁　秦艽各五錢　桃仁去皮尖一兩

右除二仁另研餘為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸食前白湯下

又有潤燥丸一方於本方加郁李仁防風

東垣導滯通幽湯　治大便難幽門不通上冲吸門不開噎塞不便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸　升麻　桃仁另研各一錢　紅花三分

生地黄　熟地各五分　甘草炙三分

右水煎調檳榔末五分

加大黄名當歸潤燥湯

脾約丸

麻仁一兩二錢半　枳實　芍藥各二兩　大黄蒸四兩

杏仁去皮尖炒一兩二錢

為末煉蜜丸如梧子大每二三十丸温水下

潤躰丸

郁李仁　大黄　桂心　黑丑

當帰　黄栢各五錢　軽粉少許

右為末水丸梧子大每服三四十丸温水下

滋燥養榮湯　治皮膚皴揭筋燥爪枯

當歸二錢酒洗　生地黄　熟地黄　白芍

秦艽　黄芩各一錢五分　防風一錢　甘草五分

水煎服

大補地黄丸　治精血枯涸燥熱

黄栢四両塩酒炒　知母二両塩酒炒　枸杞子三両　熟地四両

山薬三両　山茱萸　白芍各二両　生地黄二両半

當歸三両　玄参　肉蓯蓉酒浸各一両半

右為末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空

心淡塩湯送下

清涼飲子　治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黄芩　黄連各二錢　薄荷　玄参

川歸　芍薬各一錢半　甘草一錢

水二鍾煎八分不拘時服大便秘結加大黄

東垣清燥湯　治湿熱成痿以燥金受湿熱之邪

是絶寒水生化之源ゝ絶則腎衰痿厥之病大

作腰巳下痿軟癱瘓不能動方在注夏

半硫丸　治冷秘風秘結老人秘

透明硫黄研　半夏洗七次

各等分為末生姜糊為丸梧子大每服二十

丸姜湯下或用葱白一條姜三片煎入阿膠

二片溶化食前空心送下

寒門

明寒篇

生生子曰寒冬之令氣也六之終氣也水之所司腎為之主運氣六化篇曰冬之為言終也素問天元紀大論篇鬼臾區曰道生智玄生神神在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為濕在地為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水又五行大論篇曰北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎在體為骨在氣為堅在臟為腎其

性為凛其德為寒其用為閉其色為黑其化為肅故造化非嚴凛殺厲以固閉之則無以藏蓄微陽為春生之本故曰冬令嚴寒萬類潛藏君子固密啓玄子曰冬三月此謂閉藏水冰地拆無擾乎陽夜卧晏起必待日光示人隨時調攝也設令防閑少疎彼躰虛者觸冒之傷太陽寒水之經而為外感之証即時而病頭項痛腰脊強脉浮而緊名曰傷寒其症浩大傳变多端愚故採諸家傷寒另為一卷以統治之茲特以病機屬於内因者條列於斯所以別内外以見先賢用心有定宗又使後習調劑有定向也故首著中寒而以雜症屬寒者亦隷焉

中寒　雜症附

丹溪曰中寒非傷寒可比傷寒乃外感寒邪必大發熱循經而入以漸而深熱雖甚不死中寒乃倉卒感受其病即發而暴此胃氣之大虛也若不急治去生甚遠速當溫補

生生子曰寒乃天地戾凝殺厲之氣惟躰虛乃易

感之其症面青口噤四肢強直孿急疼痛甚則昏迷不省人事脉多遲緊急宜以姜附湯溫之或理中湯加附子治之雜症亦有寒者非若中寒之猛而急也又或炎天避暑者乘風取凉或口食生冷皆有寒症

劉守真病機曰諸病上下所出水液澄徹清冷下痢清白吐痢腥穢食已不飢堅痞腹滿急痛癥瘕癩疝屈伸不便厥逆禁固皆屬於寒

内經曰陰氣有餘為多汗身寒又曰陰盛則身寒

汗出身常清數慄而寒寒則戰
受寒甚者手足厥冷腹中絞痛脣青氣冷可急於
臍下三寸丹田穴上灸之或三五十壯或百壯
俟手足溫煖為度或用熨法亦可

姜附湯　治中寒口禁四肢強直失音不語忽然
暈倒口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復煩躁
兼陰症傷寒大便利而發熱者

乾姜五錢　熟附子三錢

水二鍾煎八分作二次服

或慮此方太燥即以附子理中湯相繼服姜附
本治傷寒經下后又復發汗內外俱虛身無大
熱晝則煩躁夜則安靜不渴六脉沉伏並宜服
此不知脉者更宜審之兼治中脘虛寒久積痰
水心腹冷痛霍乱轉筋四肢厥逆

理中湯　治五臟中寒口噤失音四肢強直兼治
胃脘停痰冷氣刺痛

人參　乾姜炮　甘草　白朮各二錢

水二鍾煎至一鍾不拘時服

加附子名附子理中湯

沉附湯　治虛寒無陽胃弱乾嘔

附子炮　乾姜炮各半兩　沉香　白朮各二錢半
甘草

右分二服每服加生姜五片水二鍾煎八分
食遠服

生料五積散　治感冒寒邪頭痛身疼項強拘急
惡寒吐逆腹痛又治傷寒發熱頭痛惡風無問
內傷生冷外感風寒及寒濕客於經絡腰脚痠

痛及婦人經血不調或難產並治之

白芷七分　半夏　厚朴　川芎
甘草　枳殼炒　茯苓　當歸
桔梗　乾姜炮　芍藥　肉桂各八分
麻黃　陳皮各一錢　蒼朮二錢

作一帖生姜三片葱白三莖水二鍾煎一鍾
不拘時服

正氣散　治傷寒陰症增寒惡風正氣逐冷
方見霍亂門

理氣治中湯　治寒氣攻心嘔逆心腹絞痛或泄瀉四肢厥冷或疝氣攻築小腹疼痛並宜服之

青皮　陳皮　人參　白术炒

炮姜　甘艸各一錢　木香七分

生姜三片水煎服

肉桂散　治傷寒服冷藥過多心腹満脹四肢厥冷昏沉不省人事变為陰毒悪症

肉桂　白术　木香　厚朴

良姜各三錢　白芍　人參　陳皮

前胡　當歸　附子炮各一兩　吴茱萸五錢

每服五錢姜三片紅棗三枚水煎不拘時服

温中湯　脉沉遲乃胃中寒也及胸膈満悶身躰拘急手足逆冷急宜温之

丁皮　厚朴各一兩　乾姜炮　白术

陳皮　丁香各一錢

右俱末每服二錢葱白湯調下

术附理中丸　治中寒急心腹痛

人參　附子炮　炮姜　白术

炙甘草　木香　丁香

各等分為末煉蜜為丸如梧子大每服六七十丸白湯食前送下

沉香桂附丸　治中寒心腹冷痛霍亂轉筋等症

沉香　附子炮　炮姜　良姜炒

官桂　茴香炒　川烏炮去皮臍　吴茱萸湯浸洗炒

各等分為末醋煮麪糊為丸梧子大每服五七十丸米飲下空心食前二次忌生冷

熨法　治三陰中寒一切虚冷厥逆嘔噦陰盛陽

虚及陰毒傷寒四肢厥冷臍腹痛咽喉疼嘔吐下利身背强自汗脉沉細唇青面黒諸虚冷証皆治

肥葱剉細　麥麸皮炒各三　食塩二兩

用水一大盞同和拌匀濕遍分作二次入鍋同炒極熱用重絹縫作二包先將一包熱熨臍上冷則易之葱包既冷再加塩水拌濕炒焦依前熨之再炒再熨至煤爛不用別另取新葱麦麸皮入塩日夜不住手相續至身躰

温熱陽氣復回脉起為度

人參養胃湯　治外感寒邪内傷生冷

蒼朮　厚朴　半夏麹各二錢　人參

茯苓　草果　藿香各一錢　陳皮一錢二分

甘草炙五分

姜三片烏梅半個水煎服

薑桂散　温中散寒

乾姜　良姜各一錢半　桂心　木香

半夏麹　炙甘草各一錢

姜五片紅棗三枚水煎服

東垣謂陰氣上溢於陽分則晝寒陰血自旺於陰分則夜寒氣分寒桂枝加附子湯　桂枝加芍藥人參湯　血分寒巴戟丸神珠丸

桂枝加附子湯　治太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢微急難以屈伸

桂枝　芍藥各一兩半　甘草炙一兩　附子炮半個

每服五錢姜四片棗一枚水一鍾半煎七分

桂枝加芍藥生姜人參湯　治發汗後身痛脉沉遲

桂枝　人參各一兩半　芍藥二兩　甘草炙一兩

煎法如上

巴戟丸　治肝腎俱虚收領精氣補真戢陽進美飲食

白朮　五味　巴戟

覆盆子　茴香　熟地　人參

蓯蓉　兎絲子　牡蠣　益智仁

骨碎補　白龍骨各等分

為末煉蜜丸梧子大每服三十丸食前米飲下日三服

神珠丸　治下焦元氣虚弱小腹冷痛皮膚燥澁小水自利是附寒而逆　又名離珠丹

杜仲炒三兩　訶子炮五枚　萆薢二兩　龍骨一兩

破故帋二兩　胡桃去皮百枚　硃砂另研一兩半　砂仁半兩

為末酒糊為丸梧子大硃砂為衣每服三十丸空心酒下脉絃數及絃細者皆不可服詳見衛生寶鑑

王海藏治三焦寒用藥大例

上焦寒　陳皮　厚朴　藿香　皆可治之

中焦寒大小便不通白朮乾姜丁香皆可治之
下焦寒　肉桂　附子　沉香
上焦寒
鉄刷湯　治積寒痰飲嘔吐不止胸膈不快飲食
不下　半夏四錢　草蔻仁　丁香
乾姜　訶子皮三錢各　生姜一兩
大吐不止加附子三錢生姜半兩分二服水煎
桂附丸　治寒邪冷氣入乘経絡令人卒心痛或
引背膂

川烏　黑附炮各三兩　炮姜　赤石脂
川椒去目微炒　桂心各二兩
右為末蜜丸梧子大每服三十丸不止加至
五十丸温水呑
胡椒理中丸　治肺胃虛寒咳嗽喘嘔痰水
胡椒　甘草　款花　蓽撥
良姜　細辛　陳皮　乾姜各四兩
白朮五兩
為末蜜丸梧子大每三十丸至五十丸温水

或酒任下
中焦寒
附子理中丸　治脾胃冷弱心腹疞痛嘔吐瀉利
霍乱轉筋體冷微汗滿悶腹鳴飲食不進
即前理中湯加附子為末用煉蜜丸梧子大每
服三十丸温水下
二氣丹　助陽退陰治裡寒心腹刺痛泄利嘔吐
自汗厥冷小便不禁霍乱轉筋久下冷利
硫黄　桂心各一分　炮姜二錢　黑附子炮半兩

硃砂二錢
為末麵糊丸梧子大每服三十丸空心煎艾
湯入塩送下
大建中湯　治内虛少氣厥冷大小腹絃急不能
食起則微汗陰縮口唇乾燥精滑自出或手足
乍寒乍熱而煩冤痠痛不能久立常多夢遺
黄芪　當歸　桂心　芍藥各二錢
人參　甘草各一錢　半夏　黑附子炮各二錢半
每服五錢姜三片棗二枚水煎服

下焦寒

張仲景八味丸 補腎之不足

還少丹 大補心腎脾胃治一切虛損肢體倦怠

小便混濁 山藥 牛膝

遠志 巴戟 山茱萸 杜仲

茯苓 楮實子 五味子 蓯蓉

石菖蒲 茴香各一兩 枸杞 熟地各二兩

為末棗膏搗為丸梧子大空心食前溫酒鹽

湯任下三五十丸日三○有熱加山梔一兩

○心氣不寧加麦冬一兩○精神少再加五 〈八二卷 五六〉

味子一兩○陽弱加續斷一兩

天真丹 治下焦陽虛

沉香 茴香 萆薢酒浸炒 巴戟酒浸去心

破故紙炒 葫芦巴炒 杜仲鹽水炒 黑牽牛鹽水炒各一兩

琥珀 桂心各五錢

右為末浸酒打糊為丸梧子大空心酒下五

十丸

通治三焦甚寒之氣

大已寒丸 治臟腑虛冷心腹疞痛泄瀉腸鳴自

利自汗米穀不化手足厥冷

華撥 桂心各六兩半 炮姜 良姜各十兩

右為末麵糊丸梧子大每服二十丸食前米

飲下

四逆湯 傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發

小便或澁或利或多汗厥冷脉微欲絕

炙甘草二兩 炮姜一兩半 附子半兩

每服三四錢水一鍾半煎七分溫服 〈八二卷 五七〉

海藏治下焦寒四逆湯例乾姜味苦止而不行

附子味辛行而不守泄小便不通二藥皆陽氣

化鈇作小便若姜附朮三味內加茯苓以分利

之為佳附生用而不炮則無火力熱則行而不

止蓋用水多煎少則味厚而直入下焦

治五臟寒方

肝寒雙和散 心寒定志丸菖蒲丸

脾寒益黃丸 肺寒小青龍湯

腎寒八味丸

東垣変和散　補血益氣治虛労少力

黄芪　熟地　當歸　川芎各一錢

官桂　甘草各七分　白芍一錢半

姜六片大棗六枚分二服水煎服無時

東垣曰此方予每治傷寒瘧疾中暑大病之後虛労氣乏者以此調治極驗不熱不冷溫而有補乃建中四物二方化而為一也

益黄散

陳皮一兩　青皮　訶子肉　炙甘草各半兩

丁香二錢

右為末每服二三錢水煎服海藏云此劑瀉脾以燥湿

姜附湯　加麻黄白朮人参甘草等分名附子麻黄湯治中寒湿昏暈緩弱腰脊强急口眼喎斜語声渾濁胸腹䐜脹氣上喘急不能轉動更宜灸而用之

代灸膏　治老人衰弱元氣虛冷臟腑虛滑腰脚冷痛沉重減食手足逆冷不能忍者用此代灸其効不能盡述

大附子一枚炮　吳茱萸　桂皮　木香各半兩

蛇床子半兩　馬藺草各一兩

為細末每用藥半匙生姜汁半盞白麪半匙同煎成膏攤於帋上臨臥貼臍以油帋覆其上綿衣繫之自夜至明乃去每夜如此其腰腹如灸能除寒積若腰痛貼腰眼

霹靂散　乃正治溫散之劑

附子一枚炮熟取出用冷灰窨之良久取出研末入真臘茶一大錢同和分二服每服水一盞

煎六分臨熟入蜜半匙放溫服之

寒中

東垣曰夫脾胃之症始則熱中終傳寒中經云陰盛生内寒厥氣上逆寒積於胸中是腎水反来侮土此謂所勝者妄行或作中満腹脹或作涎涕或足下痛不能任身履地骨乏無力喜睡兩丸多冷時作陰陰而痛或妄見鬼状夜夢亡人腰脊背胛俱痛而不渴不瀉此湿氣去而寒獨存血絡凝泣故其脉盛大以濇名曰寒中以白

术附子湯治之

白术附子湯　治寒中諸症

白术　附子炮　陳皮　蒼术炒

厚朴制　半夏　茯苓　澤瀉各一兩

猪苓半兩　桂心四錢

每服五錢生姜三片水煎服　量虛實加減

背寒

仲景云心下有留飲其人背惡寒冷如氷治法茯苓丸之類是也即千金化痰丸

身前寒

經云胃足陽明之脉氣虛則身以前皆寒慄治法宜鍼補三里穴是也

掌中寒者腹中寒魚上白肉有青血脉者是胃中有寒也理中湯之類

惡寒

丹溪曰久病惡寒當用解欝○濕痰積中抑遏陽氣不得外泄身必惡寒○惡寒非寒明是熱症

進士周年近四十得惡寒症服附子數百帖而病甚脉絃而緩遂以江茶入生姜汁香油些少調飲之吐痰一升許減大半又與通聖散去麻黄大黄芒硝加當歸地黄百帖而安

一女子惡寒用苦参赤小豆各一錢為末虀水調飲之吐痰甚多繼用後藥調理

川芎　南星　蒼术　黄芩

酒打麵糊丸服

上焦不通則陽氣抑遏而皮膚分肉無以溫之故寒慄東垣升陽益胃湯用升發之劑開發上

焦以伸陽明之氣出於表而溫之也丹溪吐出濕痰亦開發上焦使陽氣隨吐伸發出外而溫之也故寒慄皆愈二者乃治陽虛表寒之要

王海藏治一婦先病惡寒手足冷全不發熱脉八至兩脇微痛治者便作少陽治之陽在內伏於骨髓陰在外致使發寒治當不從內外從乎中治也宜以小柴胡調之倍加姜棗

丹溪治一婦年近六十六月內常覺惡寒戰慄喜烈火御綿汗時如雨形肥肌厚已服附子十餘

帖渾身痒甚兩手脉沉濇重取稍大知其熱甚而血虚也以四物去川芎倍地黄加白朮黄芪炒黄栢生甘草人參每服一兩重始煎一帖飲之腹大泄目無視口無言知其病勢深而藥無反佐之過也仍以前藥熱炒與之蓋借火力為向導一帖利止四帖精神回十貼病全安

又蔣氏婦年三十餘形瘦面黑六月喜熱悪寒兩手脉沉而濇重取則数以三黄丸下之以姜湯每服三十丸二十帖微汗而安又云三補丸亦可

大宮詹少溪吴馭閲校

赤水玄珠第三巻目録

頭痛門 附頭風 眉稜眶痛 雷頭風 大頭病 風屑 頭重

面門 頰車病

目門

鼻門

耳門

口門 唇

舌門

齒門

咽喉門 喉痺 梅核氣

赤水玄珠第三卷

新安生生子孫一奎著輯

頭痛

生生子曰頭為諸陽之首至清至高之處也苟外無風寒霧露之觸內無痰火濕熱之薰必無痛也既有內外之因當循內外之治

凡頭痛當分三陰三陽　諸血虛頭痛當歸川芎主之　諸氣虛頭痛人參黃芪主之兼見何症以佐使之藥濟之此立方之大法也　血氣俱

虛於調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛其効如神　濕厥頭痛清空膏主之　諸厥逆頭痛羌活附子湯主之　濕熱在頭者以苦吐之　世有真頭痛旦發夕死夕發旦死原其受病乃氣血虛極以致風寒暑濕之氣得以犯之名曰厥頭痛痛引腦巔陷於泥丸宮中非藥所能愈蓋其根本先絕也　丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者火也有可吐者亦有可下者　東垣曰經云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽經之脉起於目內眥上額交巔直入絡腦還出別下項病衝痛又足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客于經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也　如氣上不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也　有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓以

腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛　有心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也

凡頭痛皆以風藥治之者摠其大體言之也高巔之上惟風可到或味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦有三陰三陽之異　太陽經頭痛惡風寒脉浮緊川芎獨活之類主之　少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡黃芩主之　陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷主之　太陰經頭痛必有

痰體重或腹痛爲痰癖脉沉緩者蒼术半夏南星主之 少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥其脉沉細麻黄附子細辛湯主之 厥陰經頭疼項痛或吐痰沫冷厥其脉浮緩呉茱萸湯主之

丹溪云勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽作痛宜補中益氣湯多加川歸川芎甚者加知母蔓荆子 又云自魚尾上攻而痛屬血虚川芎川歸酒黄栢諸經氣滯亦能作痛

〈八三表〉 三

王節齋曰久頭痛病畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛温解散之藥暫時得効誤認爲寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常踈故風寒易入外寒束其内熱閉逆而爲痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣唯當瀉火凉血爲主而佐以辛温散表之劑以從其標則病可愈而根可除也

郭茂恂之婦産七日不食始言頭痛頭痛已又心痛作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無瞬息間每頭痛甚欲取大石壓之良久漸定心痛作則以十指抓壁血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是十日不已衆醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服之服即下瞑目寢如平昔至平旦下一行約三升許如蝗虫子三疾減半已刻又行如前則頓愈矣

頭重

東垣紅荳散治頭重極佳 方見雷頭風門

〈八三表〉 四

秘方茶調散 風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不可忍

片芩二兩酒拌炒二次不可令焦 小川芎一兩 細芽茶三錢 白芷五錢 薄荷三錢 荆芥穗四錢 頭巓及腦痛加細辛藁本蔓荆子各三錢

右爲細末每服二三錢用茶清調下

頭風

丹溪云屬痰者多有熱有風有血虛 在左屬風薄荷荆芥血虛川芎當歸 在右屬痰蒼术半

夏熱則酒芩為主

冲和膏 偏正頭風腫痛并眼痛者塗上立止如神 紫荊皮五兩炒 獨活三兩去節炒 赤芍二兩炒 白芷一兩 菖蒲一兩 右為末葱頭煎濃湯調塗藥到痛止

又方 酒芩一兩 蒼术 羌活 防風各五錢 細辛二錢 蒼耳三錢 右為末每服三錢生姜一大片同擂均茶湯[illegible]起服之

又方 酒芩五錢 蒼术二錢半 羌活 蒼耳 川芎 甘草生 酒黃連各一錢半 半夏麯三錢半炒

八三卷 五

右為末服法同前

頭癢風屑髮黃 用大黃酒浸炒為末茶調服

川芎散 偏頭痛頭風神効

甘菊 石膏 川芎各二錢 為末每服一錢茶清調下一方有白姜蚕六錢生用

經驗方 頭風頭痛

藿香 防風各二兩 辰砂 薄荷各一兩 天麻 白术 白附子 白芷各一兩五錢

右為末糊丸梧子大每服三十丸白湯下

菊花茶調散 諸風頭目昏重偏正頭風鼻塞

菊花 川芎 荊芥穗 羌活 甘草 白芷各二兩 細辛一兩 防風一兩洗淨 蟬蛻 姜蚕 薄荷各五錢 右為末每服二錢食後用茶清調下

有一婦人患偏頭痛一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或作臭氣一陣服遍治頭痛藥如芎蝎皆不効人無識此病者或曰腦癰偶有善醫云但服局方芎犀丸不十数服忽作嚏涕突出一鋌稠膿其疾自愈方見鼻淵

八三卷 六

秘方 貼頭風熱痛 大黃 朴硝各等分

右為末井底泥和捏作餅貼兩太陽穴神効否則防壞目

祛風清上丸 風熱上攻眉稜骨痛

酒芩二錢 白芷一錢半 防風一錢 柴胡一錢 荊芥八分 川芎一錢二分 羌活一錢 甘草五分 水二鍾煎八分食後服

芎辛導痰湯 痰厥頭痛

川芎 細辛 南星各一錢 半夏二錢 陳皮 茯苓 片芩酒炒各一錢二分 枳實一錢 甘草五分 如挾風熱甚

者加石羔三錢菊花一錢水二鍾姜三片煎至
八分食後服

清空膏　偏正頭痛年深及瘵風濕熱痛上壅損
目及腦痛年深不止

羌活　防風各一兩　柴胡七錢　川芎五錢　甘草一兩半炙
黄連一兩炒　黄芩三兩一半炒一半酒製　右為細末每服
二錢熱盞内入茶少許湯調如膏抹在口内少
用白湯送下臨卧服如苦頭痛每服中加細辛
二錢如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛加羌活

防風川芎甘草又加半夏一兩半如偏正頭痛
服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍
如發熱悪熱而渴正陽明頭痛只與白虎湯加
白芷

小清空膏　諸般頭痛惟血虚頭痛不治用片芩
細切酒拌晒乾為末茶清調下酒亦可

補氣湯　服前藥之後服此藥
黄耆八兩　甘草炙　當歸身各二錢　柴胡　升麻各二分
細辛少許　麻黄炒　苦丁香各五分　水煎服

安神湯　頭旋眼黒頭痛
羌活一兩　防風二錢半　柴胡五錢　酒黄栢一兩　酒知母
酒生地　升麻各五錢　黄耆二兩　甘草半生半熟四錢
右㕮咀每服半兩水二大盞煎至一盞半加
蔓荊子五分川芎三分再煎至一盞臨卧時
去渣熱服
右東垣冊溪治虚熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒
栢加風劑也

川芎散　頭風偏正頭風昏眩

川芎　細辛　羌活　槐花　甘草炙　香附
石羔炙各五錢　荊芥　薄荷　菊花　防風　茵陳
各一兩　右為細末每服二錢食後茶清調下日三服

石羔散　頭痛不可忍
麻黄去根節　石羔各一兩　何首烏五分　葛根七錢半
右為細末每服三錢生姜三片水煎稍熱服

又方亦名石羔散　頭痛
川芎　石羔　白芷各等分
右為細末每服四錢熱茶清調下

荆芥散　治頭風王太醫方　荆芥　石羔煆各等分
右為細末每服二錢姜三片葱白三寸連鬚
便水一盞煎七分食後服
玉真丸　寒湿為多腎氣不足氣逆上行頭疼不
可忍謂之腎厥其脉舉之則弦按之則堅
硫黄一兩　石膏　半夏湯洗　硝石研各二兩
俱為細末研匀生姜糊為丸梧子大陰乾每
服二十丸姜湯或米飲下更炙關元百壯良
方中黄丸子亦佳虚寒甚者去石羔用鍾乳
粉一兩　〔八〕二条　九
玉壺丸　風湿頭痛亦作痰患
半夏　南星　天麻　為末白麪丸服二錢
姜蚕散　偏正頭痛併夾腦風連兩太陽頭痛
白姜蚕為末用葱茶調服
乳香盞落散　男子婦人偏正頭痛不可忍大有
神効此風盛痺散而痛宜酸以收之
御米殼去蒂四兩　陳皮　甘草炙　桔梗去芦　柴胡各一兩
右為細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長

四指同煎七分温服此方名乳香盞落散亦内併無乳香想必傳寫錯誤也
治時氣頭痛不止　用朴硝二兩為末生油調塗
於頂上
治頭内如蟲蛀響名天白蟻用茶子細末吹鼻中
如聖散　眼目偏痛頭風
麻黄燒灰半兩　盆硝二錢半　射香　腦子各少許
右為細末搐之神効
治頭風餅子　五倍子　全蝎　土狗各七个
右為末醋糊作如錢大餅子發時再用醋潤
透貼太陽穴上炙熱貼之驗甚仍用帕子縛　〔八〕二条　十
之啜濃茶睡覺則愈
一奇散　産後頭痛　用當歸川芎為細末每服
二錢水一盞煎七分温服
治産後身熱頭痛肚痛
陳皮　白朮　白芍各二錢　黄芩二錢半　川芎一錢
乾姜　牡丹皮　甘草各一錢五分　荆芥五分
分四帖煎服
芎附散　産後敗血作梗頭痛諸藥不効

大附子一枚釅醋一碗用火四畔炙透蘸醋令盡去皮臍加川芎一兩並為細末每服一錢茶清調下

東垣曰濕熱在頭而頭痛者必以苦吐之若用上項搐鼻藥而涎少者必兼吐法治之

邪在胃而頭痛者必下之其症必兼膈痞或動作則痛甚或右手脉滑盛者是也

新沐中風為首風頭面多汗惡風當先風一日則病甚至其風日則少愈大川芎丸主之

風氣循風府而上則為腦風項背怯寒腦戶極冷神聖散主之

大川芎丸　首風旋暈弦急外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身體拘倦

川芎一兩　天麻四兩　為末煉蜜丸每兩作十丸每服一丸細嚼茶酒下食後服

神聖散　腦風邪氣留飲不散項背怯寒頭痛不可忍者

麻黃去節　細辛去苗　乾葛生一半炒一半　藿香葉各等分

右為末每服二錢煎荊芥薄荷酒調下茶亦得併治血風症

大全黑龍丹　產後寒凝血滯或胞衣不下或污血奔心危急惡疾垂死者但灌藥入口便活妙

通神聖　當歸　五靈脂　川芎　良姜　熟地各三兩　右研末入罐鹽泥固濟抵口炭十觔煆令通赤冷定取開看成黑糟色細研入後藥

百草霜五錢　硫黃　乳香各一兩　花蕊石　琥珀各三錢

右五味為末并前和匀丸如芡實大每服一丸

雷頭風俗名非古也

張子和曰雷頭風者結核塊於頭上而作痛者是也可用茶調散吐之次用神芎丸下之然後服烏荊丸及愈風餅子之類消風散熱是其治也如涼膈散之類

又云雷頭風是頭上有赤腫結核或如酸棗狀可用排針出血則愈矣

生生子曰所謂雷頭風者必是痰結核塊或先暗有於頭上然後隨遇而發或勞役或酒色或食

煿炙動風發毒之物感而發之或紅或腫而痛作矣急則治其標針而血出風散火滅痛因減去或有之也若先無結塊痰核卒然發寒熱而腫痛者乃風毒也不可不察

茶調散又名二仙散　瓜蒂　茶葉

為末每服二錢薤汁調服乃取吐藥也

神芎散　實者下之是也能去膈上滞痰

大黄　黄芩各二兩　牽牛　活石各四兩

為細末滴水為丸如小豆大温水下十五丸每服加十丸以利為度日三服

愈風餅子

川烏　川芎　甘菊　白芷　薄荷　防風　細辛　天麻　羌活　荊芥　甘草各等分

為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細嚼茶酒送下不拘時候

保命集云夫治雷頭風諸藥不効者為與症不相對也蓋雷頭風者震卦主之震仰盂故予製藥內加荷葉者象震之形其色又青乃述類象形

當煎局方中升麻湯主之治頭面疙瘩增寒拘急發熱狀如傷寒　升麻　蒼术　薄荷

為細末每服五錢水一鍾煎七分温服食後

或燒全荷葉一個研細調藥服之

生生子曰按二公方論俱以結核疙瘩而用風藥論治且指震為雷為譬固美矣恐猶未盡善也夫此病未有不因於痰火者蓋痰生熱熱生風故也核塊疙瘩皆有形可徵痰火上升壅於氣道兼於風化則自然有聲輕則或如蟬之鳴重則或如雷之響故以聲如雷而為名也或以其發如雷之迅速也設如前論盡作風熱治之恐認標而忘其本也予故附痰火一方于後以俟明哲評之

白姜蚕五錢　粉草二錢　半夏牙皂姜汁煮一兩　連翹五錢　片芩酒炒七錢　陳皮去白鹽煮　桔梗各五錢　大黄酒蒸九次二兩　薄荷葉三錢　白芷二錢　天麻酒浸五錢　青礞石二錢

俱為細末水浸餁餅為丸如綠荳大食後臨卧茶香二錢以痰利為度然後用清痰降火煎藥調理

紅莔散　頭重如山此濕氣在頭也
麻黃根炒　苦丁香各五分　紅豆十粒　羌活燒　連翹各二
錢　右五味為細末鼻內搐之
頭風屑肝經風盛也大便實瀉青丸主之虛則消
風散主之
消風散　諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩
痛肌肉瞤動目眩旋運耳簫蟬鳴眼澁好嚏鼻
塞多嚏皮膚頑麻燥痒癮疹又治婦人血風頭
皮腫痒眉骨疼旋欵倒痰逆惡心

八三卷　十五

川芎　羌活　人參　茯苓　白姜蚕　藿香
荊芥　甘草　蟬殼去土各二兩　厚朴姜製　陳皮去白各五錢
防風　右為細末每服二錢茶清調下如久病
偏頭風每日三服便覺輕減如脫着沐浴暴感
風寒頭痛身重寒熱倦疼用荊芥茶清調下半
盞不拘服之小兒虛風目澁昏倦及急慢驚風
用乳香荊芥湯治風屑極燥痒無時此乃氣虛
風邪侵於皮表用藜蘆不拘多少為末先于無
風處洗頭候將乾時用末摻之須用入髮至皮

乃緊縛之一日夜次日即不燥痒如尚有些少
可再用一次立効
頭上白屑極多山莔根油浸塗或以乳汁調
又方　白芷　零零香各等分　為末如前法用之
候三五日篦去數二三次終始不生
大頭病頭痛腫大如斗是也大率多是天行時疫病
泰和年東垣以監納濟源稅時長夏多疫癘初覺
增寒體重次傳面目腫盛目不能開上喘咽喉
不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問

八三卷　十六

如染之多不救張縣丞亦得此症至五六日醫
以承氣湯加板藍根下之稍緩翼日其病如故
下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存
心於醫可以請治遂命診視具說其由曰夫身
半已上天之氣也身半已下地之氣也此雖邪
熱客於心肺之間上攻頭而為腫盛以承氣下
之瀉胃中之實熱是誅罰無過殊不知適其病
所為故遂處方用黃連黃芩味苦寒瀉心肺間
熱以為君橘紅玄參苦寒生甘草甘寒瀉火補

氣以為臣連喬鼠粘子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬屁勃白姜蚕味苦平散腫消毒定喘以為佐新升麻柴胡苦平行少陽陽明二經不得伸桔梗味辛溫為舟楫不令下行共為細末用湯調時時服之拌蜜為丸噙化之服盡良愈因歎曰往者不可追來者猶可及凡他所有是病者皆書方以貼之全治甚衆

普濟消毒飲

黃芩 黃連各五錢 人參三錢 橘紅 玄參各二錢

連喬 鼠粘子 板藍根 馬屁勃各一錢 甘草生

柴胡 桔梗各二錢 白姜蚕炒 升麻各一錢

為細末服如前法或加防風薄荷當歸身川芎每服五錢水煎食後時時熱服如大便硬加酒煨大黃一錢以利之腫熱甚者宜砭刺之

生生子曰觀消毒飲以普濟二字為命名之旨書告四方使人人得躋壽域者君子之存心也乃今時之醫偶獲一未穩之方就括囊緘口自秘終身為徼利之計視此普濟消毒飲寧不自愧於心乎

大頭病者雖在身半以上熱伏于經以感天地四時非節瘟疫之氣所着以成至于潰裂膿出而又染他人所以謂之疫癘也大抵足陽明甚則逆傳視其腫勢在何部分隨其經而取之濕熱為腫火盛為痛此邪發於首多在兩耳前後所先見出者為主為根治之宜早藥不宜速恐過其病所謂上熱未除中寒已作有傷人命矣此疾是自內而之外者是為血病況頭部分受邪見於無形之處至高之分當先緩而後急先緩者謂邪氣在上着無形之部分既着無形所傳無定若用重劑大瀉之則其邪不去反過其病矣雖用緩藥若又急服之或食前或頓服或失緩體則藥不能除病矣當徐徐漬無形之邪或藥性氣味形體擬象服餌皆須不離緩體及寒藥或酒炒浸之類是也後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速去反損陰也此却為客邪當急去之

是治客以急且治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下各為本家病也若急治之不惟不能解其紛而反致其亂矣此所以治主當緩也治客當急者謂陽分受陽邪陰分受陰邪主也陰分受陽邪陽分受陰邪客也凡所謂客者當急去之此治客以急也假令少陽陽明之為病少陽者諸邪出於耳前後也陽明者首面大腫也先以黃芩黃連甘草通炒過剉煎少少不住服呷之或服畢再用大黃或酒浸或煨又以鼠粘子新瓦上炒香㕮咀煎去渣內芒硝各等分亦細細呷之當食後用徐得微利又邪氣已只服前藥如不已再服後藥依前次第用之取大便利邪已則止如陽明渴者加石羔少陽渴者加瓜蔞根陽明行經加升麻葛根芍藥之類太陽行經加羌活防風荊芥之類選而加之並與上藥均合不可獨用散也

八二卷　十九

黑白散　大頭病如神

烏黑蛇酒浸　白花蛇去頭尾酒浸　雄黃二兩　大黃煨五錢

為細末每服一二錢白湯調下

治疫毒頭重者甘桔湯加鼠粘子大黃芒硝

大頭天行病　羌活　酒芩　酒蒸大黃

大頭風用井底泥調大黃芒硝塗之

又方治大頭疫如神　貫衆三錢　葛根二錢　甘草一錢半　白姜蠶炒一錢　水煎服極佳加黑荳三錢尤妙

面門

靈樞經曰面熱者足陽明病十二經脉三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣上出鼻而為臭其濁出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上薰於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也

八三卷　二十

青紅黃白黑五色以應五臟是以外候驗內症也

東垣曰飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時而火上獨燎其面

丹溪曰面熱因胃熱有鬱火面寒因胃虛

咳逆停息不得臥面熱如醉此為胃熱上冲薰其

面以茯苓桂枝甘草五味湯加大黄利之
羅氏治楊郎中之内五十一歲身體肥盛己酉春患頭目昏悶面赤熱多服清上藥不効請治診其脉洪大而有力內經云面熱者足陽明病脉經云陽明經氣盛有餘則身已前皆熱況其人素膏粱積熱於胃陽明經多血多氣本實則風熱上行諸陽皆會於頭目故面熱之病生矣先以調胃承氣湯七錢加黄連三錢犀角一錢疎下三兩行微其本熱次以升麻加黄連湯去經絡中風熱上行如此則標本之邪俱退矣

升麻加黄連湯

升麻　葛根各一錢　白芷七分　甘草炙　白芍各五分　酒黄連四分　生犀角末　川芎　荊芥穗　薄荷各三分

用水半盞先浸川芎荊芥穗薄荷外都作一服水二盞煎一盞入先浸三味同煎至七分食後温服數服愈　忌酒麪五辛物

面寒　尼長老六十歲躰瘦弱十月間病頭面惡寒不敢當風行諸治不効脉短細而微且年高向素食日惟茶菓而已陽明之經本虚脉經云氣不足則身已前皆寒慄又加看誦損氣由此胃氣虚經絡之氣亦虚不能上榮頭面故惡風寒先以附子理中丸温其中氣次以升麻湯加附子主之

升麻　葛根　白芷　黄芪　附子炮各七分　甘草炙　人參　草荳蔻各五分　益智仁三分

水一鍾半連鬚葱頭二莖煎至一鍾温服數服良愈

升麻湯辨　或曰升麻加黄連湯治面熱升麻加附子湯治面寒有何依據答曰出自仲景雲岐子註傷寒論中辨葛根湯云尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脉夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得眠此陽明經受病也始於鼻交頞中從頭至足行身之前為表之表陽明經標熱本實從標脉浮而長從本脉沉而實陽明為病蒸蒸而熱不惡寒身熱為標病陽明本實者胃中燥鼻乾目痛為本病陽明為肌肉之本禁不可發汗在本者不禁下發之則変黄症太

陽主表營衛是也營衛之下肌肉屬陽明二陽并病葛根湯主之衛者桂枝營者麻黃營衛之中桂枝麻黃各半湯主之營衛之下肌肉之分者葛根湯主之又名解肌湯故陽明為肌肉之本非專於發汗止汗之治桂枝麻黃兩方互併為一方加葛根者便作葛根湯故營衛肌肉之次也桂枝芍藥生姜甘草大棗止汗有麻黃桂枝甘草發汗葛根味薄獨加一味者非發汗止汗也從葛根以解肌故名葛根湯錢仲陽制升麻湯治傷寒瘟疫風熱壯熱頭痛肢體痛瘡疹已發未發用葛根為君升麻為佐甘草芍藥安其中氣朱奉議作活人書將升麻列作陽明經解藥予診揚氏婦陽明經標本俱實先攻其裏後瀉經絡中風熱故用升麻湯加黃連以寒治熱也凡長老陽明經標本俱虛先實其裏次行經絡故用升麻湯加附子以熱治寒也仲景乃群方之祖信哉

面上有熱毒惡瘡治以栢連散

胡粉　黃栢炙　黃連各等分

右為末面脂調敷猪脂亦好

面上肺風瘡　以無灰酒濃磨鹿角尖敷之

指爪爬破面皮

生姜自然汁調輕粉敷破處更無痕

玉容散　面上黑䵟雀班

甘松　三柰　茅香各五錢　白芷　白姜蚕　白芨　白蘞　白附子　天花粉各一兩　防風　藁本　零陵香各三錢　肥皂二個　菉豆粉一兩

為極細末每洗面用之

秘方　面上雀班

櫻桃枝　紫背浮萍　白梅肉　猪牙皂角

等分焙乾為末每洗面時用之七八日後其班皆沒神効　一方加鷹屎少許尤妙服藥在後

防風通聖散　風熱上攻面熱

胃風湯　虛風症能食麻木牙關急搐目瞤動胃中有風熱攻面故面獨腫

白芷一錢二分　升麻一錢五分　葛根　蒼术各八分　甘草三分

柴胡　藁本　羌活　黄柏各五分　草荳蔻五分
蔓荊子二分　麻黄八分　白姜蚕三分　川歸一錢五分
水二鍾煎八分食遠服
丹溪治一婦人面頰兩腮熱腫膈壅之病也
乾葛　桔梗一錢半　升麻一錢　蘇葉一錢半　薄荷一錢
甘草七分炙　姜一片水煎食後服

一人登厠被臭氣薰觸隱忍良久明日滿面皆黑色月餘不散相士斷云不出月外必死至期無恙拉孫召先生治教以沉檀香各一兩剉碎安爐中燒薰帳内以被蓋定令病者瞑目端坐候香盡方可出帳明日引鑑照之面上黑色漸散矣

頰車病

平江陳氏因驚駭後常用手指甲掐住兩頰遂兩頰破損心懊憹不安脉數而實諸藥不愈用活幼口義牛黄清心凉膈丸數服如失

凡伸欠頰車蹉但開不能合以酒飲之令大醉睡中吹皂角末搐其鼻嚏透即自止

東垣云咽痛頷腫脉洪大面赤者羌活勝湿湯加黄芩桔梗甘草各五分如耳鳴目黄頰頷腫頭肩臑肘臂外後亷痛面赤脉洪大者以羌活防風甘草藁本通其經血加黄連黄芩消其腫以人參黄耆益其元氣而瀉其火邪

丹溪治兩腮腫用細辛草烏等分為末入蚌粉以猪脂調敷口含白梅置腮邊良久腫退出涎患立消矣消時腫必先向下

濟世方　治痄腮
車前草　梔子仁　竹葉
杵碎熱敷患處

腮腫　用赤小豆醋調敷之

千金方　卒中風頭面腫杵杏仁如膏敷之

又方　痄腮如神
鷄子清調赤荳末及喉下諸般腫痛用蝸牛飛麵研勻貼腫處

口門

生生子曰治目有專門以其點藥精妙及動針手

法慣熟外此不過一理耳經曰目得血而能視是血不可以不養也又曰目者神之主是神不可以不安也又曰目者腎之竅是腎不可以不秘也又曰東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝肝和則目能辨五色也又曰心合脉諸脉皆貫於目

東垣曰夫五臟六腑之脉皆禀受於脾土而上貫於目脾者諸陰之首也目者血氣之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣可見五臟之精華皆輸於目而見於外足以驗夫臟腑之根於內者標本之虛實矣

經云瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽故陰陽合傳於精明此則眼具陰陽也又曰五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精為約束裹擷筋骨氣血之精而與脈并為系上屬於腦後出於項中此眼具五臟六腑也後世以內外背屬心上下兩瞼屬脾白眼屬肺黑眼屬肝瞳人屬腎謂之五輪盖本諸此也又有八廓之說無義無據今不得刪入焉

陽主散陽虛則眼楞急而為倒睫拳毛陰主斂陰虛則瞳子散大而為目昏眼花

保命集云在腑為表當除風散熱在臟為裏當養血安神如暴失明昏澁翳膜眵淚斑入眼皆表也風熱也宜表散以去之如昏弱不欲視物內瞳見黑花瞳散皆裏也血少神劳腎虛也宜養血補水安神以調之除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸主之婦人地黃丸主之或有體肥氣盛風熱上行目昏澁者槐子散主之此由胃中濁氣上行也重則為痰厥亦能損目若常使胃中氣清自無此病也又有因目疾服凉藥多氣因損者久之眼漸昏弱乍明乍暗不能視物此則失血驗也地黃丸消氣定志丸相須而養之視物不明見黑花者腎氣弱也駐景丸主之或有暴失明者謂眼居諸陽交之會也

而陰反閉之此風邪内滿當有不測之患也
目閉不開者足太陽之脉為目上綱足陽明之脉為目下綱平則約束熱則筋緩故目不能為之開也

治風熱之劑

本事方 睛痛難忍者

川歸 防風 細辛 薄荷各等分 每服二錢麥門冬湯調下食後日午及夜各一服

菊花散 肝腎風毒氣上衝眼疼

甘菊花 芎藭 大力子炒各一兩 甘草一兩五錢

為細末每服二錢

槐子散 體肥氣盛風熱上行目昏澁

槐子 黄芩 木賊 蒼术各等分

為細末食後茶調下

川芎散 風熱目眩熱腫胷中不利

川芎 槐子各一兩 為末氣滞下利姜湯調目疾茶清調熱上攻水煎服

潔古方治赤暴發腫散熱飲子

防風 羗活 黄芩 黄連各一兩 每服五錢水二盞煎温服如大便秘加大黄一兩如痛甚加川歸地黄煩躁不得卧加梔子一兩

洗肝散 風毒上攻赤目腫痛難開瘾澁眵淚

薄荷葉 川歸 防風 羗活 甘草炙

梔子 大黄 川芎各等分

為末每服二錢熱水調服

養血和血踈風之劑

龍胆湯 目暴赤雲翳疼痛不可忍者

四物湯各五錢 羗活 防風各三錢 龍胆草

防己各二錢

益氣聰明湯 飲食不節勞傷形體脾胃不足内障耳鳴或多年視物昏暗令目廣大久服無内障耳鳴耳聾之患又令精神倍常飲食加倍身體輕健耳目聰明

黄耆五錢 甘草炙六錢 人參五錢 葛根 升麻三錢 白芍

黄栢酒洗四次炒各一兩 蔓荊子半錢 每服五錢水煎卧時熱服五更再煎服之得睡更炒如煩亂

或有熱春月漸加黃栢夏月倍之如脾胃弱去之熱減少用但有熱或麻木或上壅頭目三兩服後其熱皆除又治老人腰以下沉重疼痛此藥久服治人上身反有精神兩足輕浮不知高下空心服之少加黃栢輕浮自減小兒減服多則壅滿治倒睫去黃栢芍藥忌烟火酸物

地黃丸　眼小昏澁因發而久不能瘥

防風　羌活　當歸　地黃　人參　茯苓

黃芩　黃連各等分　每服五七錢水煎溫服

東垣助陽和血補氣湯　眼赤熱壅白睛紅脉淚不疼痛惟隱澁難開此服寒藥太過而真氣不能通九竅也故眼昏不明

防風七分　黃蓍一錢　甘草炙　蔓荊子五分　歸身五分　白芷二分　柴胡　升麻各七分　水鍾半煎一鍾臨卧時服避風及忌食冷物

補氣血之劑

丹溪方　治勞力後兩眼上星右眼獨昏此熱傷血也　白朮　當歸　生地　木通　黃連酒炙

黃芩酒炒　黃栢各二兩炒　甘草炙四錢

分三帖水煎服大熱加白芍藥

倒睫拳毛其毛入眼中央是也

防風飲子

黃連炒　甘草炙　人參各一錢　歸身一錢五分　葛根

防風五分　細辛葉　蔓荊子各三分

水煎臨卧溫服

連喬飲子　目中溜火惡日與火隱澁小角偏緊久視昏花迎風有淚

蔓荊子　甘草　連喬　人參　紅葵花

生地　當歸身各三錢　酒芩　防風　羌活

黃芪各五分　升麻一錢　柴胡二分　水煎稍熱服前方治倒睫拳毛此方治眼楞緊急縮小者即倒睫拳毛之漸也蓋陽虛則眼楞緊急陰虛則瞳子散大故東垣治眼楞緊用參蓍補氣爲君佐以辛味疎散之而忌芍藥五味之酸收也　治瞳子散大用地黃補血爲君佐以酸味收斂之而忌茺蔚子青葙子之辛散一開一闔大有徑

瘥矣。

外障。

經云目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走内者少陽病凡赤脉翳初從上而下者屬太陽以其主表其病必連眉稜骨痛或腦項痛或半邊頭腫治法宜温之散之如簡要夏枯草散東垣選奇湯之類

簡要夏枯草散　目珠痛至夜則痛甚或用苦寒眼藥點上反疼甚者神効蓋目珠者連目本目系屬厥陰經夜疼甚及苦寒點之反甚者夜與寒皆陰故也丹溪謂夏枯草禀純陽之氣故治厥陰目疼如神又治眉稜骨痛目翳從上下者累効治翳必與退雲丸相兼服尤妙

夏枯草　香附子各二兩　甘草四錢　右為細末毎服一錢五分茶清調下纔下咽即痛減

東垣選奇湯　眉稜骨痛目翳從上下者尤妙

防風　羌活各三分　甘草三錢夏月生用　酒芩一錢冬月不用如能食及熱痛加之　分作三服水煎食後稍熱服當徐徐服之

羊肝丸　目翳從下上者從内眥出外者神効又補肝氣虚弱　羯羊肝一具新瓦盆中焙了肝若大只用一半

甘菊　羌活　栢子仁　細辛　官桂　白朮

黄連一兩半　五味子五錢

煉蜜為丸桐子大空心温湯下三十丸

東垣神仙退雲丸　一切翳暈内外眼昏無睛者累効又治翳從外眥入内此為少陽主於半表裏也宜和解之此方神妙

川芎　川歸各一兩半　犀角酒洗　枳實　川楝子

蟬蛻　甘菊各六錢　薄荷葉不見火　瓜蔞仁生者各六錢

蛇蛻　蜜蒙花　荊芥穗各二錢　此三味與甘草同焙乾去甘草不用　地骨皮　白芍藥炒去刺

羌活　生地各一兩酒洗焙乾　木賊一兩半去節童便浸一夜焙乾

為細末煉蜜丸每一兩分作十丸末湯調服日進二三丸食後服婦人當歸湯有氣者木香湯下在人消息之

內障。

內障者在睛裏昏暗與無患之人相似惟瞳人裏

有隱〻青白者無隱〻青白者亦有之人卒然目無精光若此陽氣大虛也丹溪治一人目忽不見物他無所苦起坐飲食如故此氣虛也急煎人參膏與之服二日目方見他醫與青礞石藥予曰今夜死矣巳而果然　又一人生平好飲熱酒忽目瞑脉濇此因熱酒所傷胃氣汚濁之血死在其中而然也遂以蘇木作湯調人參膏與之服二日鼻内及手掌皆紫黒余曰此病退矣滯血巳行乃與四物加蘇木桃仁紅花陳皮煎調人參末服數日而愈　又一男子五十五歲九月間早起忽開目無光視物不見急就睡片時却能見人竟不能辨其何人何物飲食減半神息極倦脉之緩大四至之上重按則散而無力余作受湿治詢之果因卧湿地上半箇月遂得此症用白术為君黄芪茯苓陳皮為臣附子為佐十餘帖而愈　右三方治目不明皆為陽虛氣脱而用補氣之藥追回者也經云上焦開發宣五谷味薫膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣又曰五氣入鼻藏於心肺上使五色脩明聲音能彰今氣既脱宜乎目之不明也

東垣人參補胃湯　勞役飲食不節内障神効

黄蓍　人參各一兩　甘草炙八錢　蔓荊子二錢　白芍三錢

黄栢二錢酒洋四次炒四次　每服五錢水一大盞煎七分稍熱服三五服兩眼廣大視物如常惟覺兩脚踏地不知高下火體升發故也病减住服七日再服此藥宜春間服之

補陰血之劑

復明散　治内障

黄芪一錢半　川芎五分　柴胡　連翹　甘草

生地各一錢　歸身二錢　蒼术五分　陳皮五分　黄栢

水二鍾煎至一鍾食後稍熱服忌湿麵及大辛熱之物

熟地黄丸　血弱氣虛不能養心致火旺於陰分瞳子散大風熱上攻頭目遍頭腫悶視物昏花法當養血凉血收歛散火而風熱自除矣

地黄一兩　歸身五錢　柴胡八錢　天門冬　地骨皮

五味子　黃連各二錢　生地八錢酒洗　黃芩五錢　枳殼炒

人參　甘草二錢炙各　煉蜜丸如菉荳大每服百

丸茶湯下食後服日服二次大忌辛辣物而

助火又忌寒涼物以損胃氣則藥不上行也

瞳子散大亦有因食辛熱及煿炙助火之物積於

胸中火旺則精散則視物亦大矣

益陰腎氣丸　此壯水之主以鎮陽光也

山茱萸一兩　茯苓二錢半　五味子五錢　熟地二兩　山藥五錢

澤瀉二錢半　牡丹皮五錢　生地一兩酒洗　歸身五錢

為末蜜丸桐子大硃砂為衣每服五七十丸

淡鹽湯送下

寶鑑甘菊丸　男子腎虛眼目昏暗或見黑花常

服明目暖水臟活血駐顏壯筋骨

甘菊花　熟地各二兩　枸杞四兩　山藥五錢

煉蜜丸如梧桐子大每服三四十丸空心食

後服

百點膏　眼翳遮瞳人視物不明如覺雲氣障蔽

川歸六分　黃連二錢半　水一碗煎至半碗再入後藥　甘草稍大分

防風八分　蕤仁三分去皮尖　右除蕤仁另研外同熬

滴入水中不散去渣入好蜜少許再煎少時

為度極要病人心靜點之至目微痛為度一

日五六次臨卧點之尤妙名百點膏訣頻點

之使藥力相續也

寶鑑還睛散　努肉攀睛翳膜昏澁

川芎　龍胆草　草决明　石决明　枳實

野菊花　野麻子　白茯苓　炙甘草　蒺藜

川椒炒去核　仙靈脾　荊芥　木賊　茵陳已上各一兩

為末每服二錢食後茶清調下一日三服忌

魚肉及熱麪蕎麥等物一方有楮實子無仙

靈脾枳實二味

滋陰地黃丸　瞳子散大黃睛視物無的或卒然

見非常之處　熟地一兩　生地一兩半　柴胡八錢　天門

冬　甘草　枳殼各三錢　人參　地骨皮各二錢

五味子　黃連各三錢　黃芩　歸身各五錢

蜜丸菉荳大每服百丸溫茶清送下日進二

次此補左腎之藥也

駐景丸　肝腎氣虛面目昏暗視物不明
車前子　五味子　枸杞子各二兩　熟地　當歸各五兩　楮實子　川椒各一兩炒　兎絲子酒浸製半觔
為末蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒下

菊睛丸　肝腎不足眼目昏暗常見黑花多泪補右腎不足　枸杞子三兩　蓯蓉酒浸炒　巴戟各一兩　甘菊　蜜丸如桐子大每服五十丸食後酒鹽湯任下

煮肝散　治雀目
青蛤粉　夜明砂　穀精草各等分
右細末每五七錢入猪肝內煮熟細嚼茶清送下

鼻門

東垣曰金匱真言論云西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺夫十二經脉三百六十五絡其氣血皆上升於面而走空竅其宗氣出於鼻而為臭難經云肺氣通於鼻肺和則臭知香臭矣

夫謂陽氣宗氣者皆胃中生發之氣也其名雖異其理則一若因飢飽勞役損傷脾胃生發之氣弱則營運之氣不能上升邪塞孔竅故鼻不利而不聞香臭也宜養胃實營氣陽氣宗氣上升鼻管則通矣又一説難經云心主五臭肺主諸氣臭者肺竅也反聞香臭者何也盖以竅言之肺也以用言之心也因衛氣失守寒邪客於頭面鼻亦受之不能為用是不聞香臭矣經云五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為之不利也潔古曰視聽明而清凉香臭辨而溫煖治法宜先散寒邪後補胃氣使心肺之氣得以交通則臭利而香聞矣

麗澤通氣散　臭不聞香臭
羌活　獨活　防風　升麻　葛根各二錢　麻黄一錢不去節冬月加之　蒼朮三錢　川椒一錢　白芷　黄耆各四錢　炙甘草二錢　右每服一兩水二鍾生姜三片棗二枚葱白三寸煎至一鍾稍熱服行坐之間宜避風寒

溫肺湯 鼻不聞香臭

升麻 黄耆各二錢 葛根 羌活 甘草 防風各一錢 麻黄不去節四錢 丁香一分 右作二服水二大鍾葱白三根煎至一鍾稍熱服

治鼻不聞香臭多年不愈者皆効

生葱分作三段早用葱白午用中段晚用葱末段塞入鼻中令氣透方効出本事方

陳無擇通草散 鼻塞不通不聞香臭并鼻塞肉

通草 細辛 附子各等分

為末蜜和綿裹少許納入鼻內

丹溪曰鼻為肺之竅因心肺上病而不利有寒有熱寒傷皮毛熱壅清道氣為之不利寒則表之熱則芩連又曰面皮紫黑面為陽中之陽鼻居面中一身之血運至面鼻皆為至清至精之血多酒之人酒氣薰蒸熱血得冷則凝污而不行故色紫黑治宜化滯血生新血四物湯加酒芩紅花酒拌又加茯苓陳皮甘草生姜煎調五靈脂末服氣弱加黄耆酒浸酒皶鼻治法亦然

陳無擇曰鼻頭白者亡血也赤者熱血也

粉黄散 肺熱赤皶俗曰酒皶鼻

硫黄 入蘿蔔內糠火煨一宿取出加輕粉烏頭尖各少許為末以酥油調不時敷

鼻瘜肉

濟世方云瘜肉因胃中有食積熱痰流注宜治其本消痰積是也 蝴蝶礬二錢 細辛一錢 白芷五分 右為末以舊綿裹藥納鼻中頻頻換又方蝴蝶礬三分 虢丹一分 細辛一錢照此法塞鼻

三因方單用枯礬末面脂用綿裹少許納鼻中數換瘜肉與藥消落細辛白芷甘草加消痰積之藥服之為効

辛荑膏 鼻生塞肉窒塞不通有時疼痛

辛荑葉二兩 細辛 木通 木香 白芷 杏仁湯泡去皮尖各五錢 右用羊髓猪脂二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黄色於冷水入龍腦射香各一錢為丸綿裹入鼻中數日脫落良愈

此方有理

羅太無輕黃散 瘜肉

輕粉 杏仁一錢去皮尖 雄黃五錢 射香少許

右四味各為細末先用杏仁研如泥後入雄黃射香同研極細磁器收勿走氣不拘遠近夜卧用筋頭點粳米大在鼻中瘜肉上隔一日夜一次半月見効

又方 瓜蒂 細辛各等分

右為細末以綿包如豈許塞鼻中須臾即通有人患瘜肉垂出鼻外用此藥則化為黄水點滴至盡三四日愈聖惠方單用陳瓜蒂以羊脂和傅上日三次効

濟世方 又患鼻瘡膿極臭者用百草霜研末冷水調服三錢

鼻衄鼻淵

或問生生子曰汪石山醫案載臭流濁涕症條云後見數人亦皆不治今人尚有治之而愈者吾竊疑焉或生或死其故何也意者猶治之未工耶抑猶有可生者而石山之忽耶願吾子悉以曉我子曰石山先生之學出於儒而述吾醫宗之大成者豈有此治而未工耶原其意或謂病之深者言也若特由今之可治而愈者石山又豈少略之耶或曰何如而深之不治也予曰易云大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生夫謂坤元者人之胃氣是也經曰營者水谷之精氣衛者水谷之悍氣皆籍胃氣以為養人之所以運動升降不息不死者賴此營於中衛於外而胃氣以為之樞也胃氣者穀氣也故經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上輸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行五臟陰陽揆度以為常也又曰五味入口藏於腸胃以養五氣氣和而生津液相成神乃自生即是而知人之不死者賴胃氣上升變化氣血以養五臟之神然後精明察色聽聲辨味剖臭而九竅有所用矣一出一入一升一降一呼一吸略不少間今鼻流濁涕者必腎陰虛而不能納氣歸元故火無所畏上迫肺金由是津液之氣

不得降下并於空竅轉濁為涕而為逆流矣由此腎肝愈虛則有升而無降有陽而無陰也經曰出入廢則神機化滅升降息則氣力孤危是時也仍不能杜謀慮絕作巧塞視聽以無源之腎肝而日勞此三者又將何藉而以濟其運用耶陰虛則病陰絕則死良以此夫或曰誠如是又何治之而猶有愈者予曰此必治之早者也戒怒以養陽絕慾以養陰斷煿炙遠酒麵以防作熱然後假之以良醫保肺為君開鬱順氣為

臣補陰養血為佐俾火息金清降令乃行氣暢鬱分清竅無壅陽開陰闔相依相附臟腑各司乃職升降不匱是自慎以培其根藥餌以却其病間有可愈者苟或驕恣不慎與夫委醫於陰絕源涸之後雖倉扁亦不能使其生又何石山之致疑焉

腦漏散 鼻流清濁涕積年不愈

川芎 荊芥 防風 乾姜 白芷 甘松各一兩 羗活 甘草各半兩

為末每服二錢食後茶清下

葱附丸 肺寒腦冷鼻流清涕

川附子去皮生用一枚 細辛半兩 葱汁打糊為丸如梧桐子大每服十四丸姜蘇湯下

川烏散 治腦漏

防風 細辛 白附子 茯苓 川烏 菖蒲 乾姜 白芷 川芎 甘草節各等分

為末每服三錢嚼生葱白湯調下

芎犀丸 偏正頭疼及一邊不聞香臭常流清涕

或作臭氣一陣及噴嚔稠膿 川芎 硃砂研內一兩為衣 石膏研 薄荷各四兩 人參 茯苓 甘草炙 細心各二兩 犀角生用鎊 梔子各一兩 阿膠蛤粉炒一兩半 麥冬去心三兩 為末煉蜜丸如彈子大用硃砂為衣每服一丸或二丸食後茶清任下

腦漏有老人腎經虛寒使然者用八味丸及煖腎之劑而愈 黑附子炮去皮 川芎 細辛 吳茱萸 乾姜各五錢 桂心一兩 皂角骨五錢

右將豬脂六兩煎油先一宿以醋浸前藥取

入猪脂内同煎以附子黄色為度用綿蘸藥塞鼻中瘥

耳門 耳聾 耳鳴

經曰耳者腎之竅也腎主藏精者也故精脫者則耳聾以腎藏精而氣通于耳耳者宗脉之所聚也　保命集云以竅言之水也以聲言之金也以經言之手足少陽俱會其中也有從内不能聽者主也有從外不能入者經也腎和則能聞五音矣羅謙甫以精脫耳聾之候為顴頰色黑也　耳聾少氣嗌乾者肺虛也東垣曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也腸胃不足故氣弱不充傷寒及大病之後多有此症以補中益氣湯治之耳聾多恐者肝虛也經云肝虛則目䀮䀮無所見耳無所聞善恐治法用四物湯加防風羗活柴胡菖蒲茯神等分煎湯服二十餘帖然後却以杜壬姜蝎散開之本草云肝虛則生姜補之是也

丹溪曰大病後耳聾須用補陰降火有陰虛火動而聾者宜四物湯加黄栢之類

生生子曰大病後則氣血俱虛然必胗兩手之脉孰勝而為之治斯無弊矣若脉大而無力或右手細小沉弱者皆陽氣大虛也正宜甘温之劑倣陽生陰長之義少加血藥佐之可也若純視為陰虛而用滋陰降火之劑則陽氣愈弱而犯東垣伐生生之戒非惟耳聾不瘥而反增悪心胷滿泄瀉之患矣若獨以陰虛火動而用滋陰降火者此正治法也予又何敢言

氣逆耳聾有三肝與手太陽少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾不聦頰腫又云太陽所謂浮為聾者皆在氣也

羅謙甫云手太陽氣厥而耳聾者其候聾而耳内氣滿也手少陽氣厥而耳聾者其候耳内渾渾焞焞此皆氣逆而聾也治法宜四物湯吞龍會丸降火及復元通氣散調氣散是也

丹溪治法痰火風熱者滚痰丸通聖散之類　聾病必用四物龍會養陰亦有濕熱痰者梹榔神

芎丸耳中鬨鬨然亦是陰虛　凡臟氣逆而為厥聾必有眩昏之症風聾必有頭痛之症勞役傷其氣血淫慾耗其精元昏昏憒憒是謂勞聾必有虛損之症其聲嘈嘈眼見黑花此虛聾也

劉宗厚曰凡耳鳴症或如蟬噪之聲或如鍾鼓之響或是閉塞此是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣治宜清痰降火又有因大怒而得宜順氣聽耳湯有因於風而得其鳴如輪車閧然或氣掉眩宜祛風芎芷散熱則加酒芩連喬有腎虛鳴者其鳴不甚宜滋腎丸虎潛丸大補陰丸八物湯加黄柏知母肝火動者當歸龍會丸飲酒人宜木香檳榔丸

素問金匱真言論南方赤色入通于心開竅于耳藏精于心此又耳為心之竅也

素問脉解篇曰陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也

益氣聰耳湯　飢飽勞役脾胃不足得耳聾之患

柴胡　升麻　蔓荊子　葛根各一錢半　人參

黄耆　甘草各二錢　黄柏　芍藥

水二鍾煎八分食遠服

清神散　頭目不清耳常重聽

甘菊花　白殭蚕各三錢　羌活　荊芥穗　木通

川芎各四兩　木香　防風各三錢　石菖蒲四錢　甘草二錢

為末每服三錢茶清調下

通氣散　氣閉耳聾

木通　木香　枳殼　菖蒲各五錢　川芎　柴胡

陳皮各二錢　白芷　羌活　殭蚕炒　全蝎　蝉蛻各二錢　甘草半錢　川山甲炮三錢　為末每服三錢酒調下

荊芥散　風熱上壅耳閉或耳鳴及出膿

防風　荊芥　升麻　甘菊　木通　黄芩炒

羌活　甘草　蔓荊子　水煎服

寶鑑姜蝎散　耳聾因腎虛所致十年內一服愈

乾蝎四十九个去毒洗焙去風熱　生姜切片如蝎大四十九片開痰

二味銀石器內炒至乾為末向晚勿食夜卧至二更時以酒調服徐徐服盡盡量飲至五更時耳中鬨百攢笙响便自此有聞

一法五更濃煎葱白湯一盛服先三日服黑錫丹

効又蝎先用糯米半升同炒又用姜四十九片放蝎上同炒去米姜不用只用米當是蝎字

寳鑑犀角湯　風毒壅熱胷心痰滯兩耳虚聾頭重目眩神効　犀角屑　甘菊花　前胡　枳殼炒　菖蒲　羗活　澤瀉　木通　生地各五錢　麥冬二兩　甘草一錢炙

右為末每服三錢水煎食後温服

茯神散　上焦風熱耳或聾或鳴四肢滿急昏悶不利　茯神一兩　羗活　柴胡　蔓荊子　薏苡仁　防風　菖蒲　五味　黄蓍各五錢　麥冬一兩　甘草炙　薄荷各三錢　為末每服三錢入生姜三片煎至五分食後温服

地黄湯　因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心中拂意則轉覺重虚鳴疼痛

生地一兩半　枳殼　羗活　桑白皮一兩　甘草　防風　黄芩　木通各五錢　磁石搗碎水淘二三十次去盡赤汁為度二兩　為粗末每服四錢用水煎去渣日三服不拘時候

寳鑑蠟彈丸　耳虚聾

白茯苓二兩　山藥三兩炒　杏仁一兩半炒去皮尖

三味研末和勻用黄蠟十兩熔化為丸如彈子大鹽湯嚼下有人止以黄蠟細嚼點好建茶送下亦効山藥茯苓杏仁皆屬于太陽山藥大補陰氣惟杏仁利氣乃補中有通也少氣嗌乾者門冬五味入參湯嚼下

多飲酒人耳鳴木香檳榔丸加枳殼柴胡大黄甘草南星桔梗青皮荊芥不愈四物湯

耳鳴必用當歸龍會丸氣實者神芎丸加檳榔一兩下之

耳忽腫痛涼膈散加酒炒大黄半兩酒浸黄芩防風荊芥羗活外以桑螵蛸一個炙存性射香二分枯凡胭脂俱為末摻之

耳腫痛

丹溪治耳腫痛黄水出而臭

桔梗　麻黄　羗活　大黄三錢酒炒　木通　甘草　茯苓一錢半　分三帖熱服

寶鑑解熱飲子　氣虛熱壅耳內聾閉徹痛膿血
赤芍　白芍各五錢　川歸　甘草炙　大黃蒸　木別
子　每服四五錢水一盞煎七分食後卧時服
詳此方乃清涼飲子加木別子也

濟世方　聤耳膿不止
陳皮燈上燒灰為末射香少許二味和勻每用
少許先用綿拭耳中膿淨却上藥

又方　杏仁泥治耳中病及有水出杏仁炒令黑
為末葱涎搜和如棗核大綿包塞耳

復元通氣散　諸氣溢耳聾腹癰便癰瘡疽無頭
止痛消腫　青皮　陳皮去白四兩　甘草三寸半炙　連喬
一兩　為末熱酒調下

治耳作痛不可忍者用磨刀銕漿滴入耳中即愈
屢用屢驗

生生子曰治耳聾之症多不獲捷効者其故有三皆人自不攝養也不禁慾不戒性不戒酒及煿炙厚味以故服藥罔効也慾傷精精脫則耳聾怒則氣逆氣逆則厥厥氣相搏故為氣聾酒性大熱助火消陰煿炙厚味皆助火生痰者痰火上壅清竅閉塞鬱而為熱熱久則潰而為膿亦有燥火旺不作膿而成乾膜盯聹之類哉皆由于人之自索乎故書于方末俾病者知有所警焉

口門

生生子曰經云脾開竅於口藏精於脾脾和則口能知五味矣此脾之所主於口也又曰胃足陽明之脉挾口下交承漿又云手陽明大腸之脉挾口交人中此二陽所挾於口也又曰有病口苦名曰膽癉蓋肝主謀慮胆主決斷為清淨之府是以事事皆取決於胆也胆或不決為之恚怒則氣上逆胆汁上溢故口苦或熱甚而使然也

東垣曰內經云膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜好飲酒人多有此疾易老用五苓散導赤散相合服之神効

劉河間曰肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口乾

肺熱則口辛腎熱則口鹹胃熱則口淡或曰口臭者亦胃熱為之

生生子曰口者五臟六腑所貫通也為脾之竅臟腑之氣皆由此出入若戶門也難經謂唇為飛門齒為戶門會厭為吸門義本諸此故臟腑有偏勝之疾則口有偏勝之症也肝熱口酸者用小柴胡湯加黃連吳茱萸青皮甚者當歸龍會丸心熱口苦或口舌生瘡者黃連瀉心湯涼膈散脾熱口乾者三黃丸瀉黃丸肺熱口辛者甘

桔湯瀉白散加前胡山梔腎熱口鹹者滋腎丸大補陰丸滋陰降火湯胃熱口淡者清胃散加石膏有謀慮不決肝移熱於胆而口苦者用益胆湯加柴胡龍胆草或龍胆瀉肝湯有脾胃氣弱木乘土位而口酸者用伐肝補脾湯有膀胱移熱於小腸而口糜潰爛者用柴胡地骨散實者大黃朴硝以利之或導赤五苓加黃連薰服大抵口舌生瘡初起不可便用凉藥敷掺恐寒凝不消久而難愈必須先用辛輕升散之劑而後清凉或視其所因而分治之或有中氣不足致虛陽口瘡者又當從理中湯加附子治之此又不可不知也

升麻散　上膈熱壅口舌生瘡先用此升發

升麻一兩半　赤芍藥　人參　桔梗　葛根　薄荷　防風各一錢　甘草五分　姜一片水煎食後服

三黃丸　三焦實熱

黃芩春四兩夏秋六兩冬三兩　黃連春四兩夏五兩秋三兩冬三兩　大黃春三兩夏一兩秋二兩冬五兩　為末煉蜜丸梧桐子大

每服百丸食遠白湯送下

加味龍胆瀉肝湯　胆痺口苦

柴胡一錢　黃芩七分　生甘草　人參　黃連　天門冬　胆草　山梔各五分　五味子七粒　麥冬　知母各五分　水煎服忌辛熱物大効

移熱湯　治口糜　即五苓散合導赤散

胡黃連散　口糜

胡黃連五分　藿香一錢　細辛二錢　黃連三錢

為末每用五分乾掺口內漱而吐之

加味甘露飲　男婦小兒胃經客熱口臭牙宣赤眼口瘡一切疼痛及上焦消渴喉腥等症丹溪云此心肺胃藥也　熟地　生地　天冬　麥冬　枇杷葉（去毛）　黄芩（各一兩）　茵陳　枳殼　石斛　甘草（各一兩）　犀角（二錢）　為粗末每服三五錢水煎食後臨卧溫服　此方得自一品之家其間加犀角一味尤為有理百發百中

香薷湯　口臭

香薷一把煎濃湯稍稍含之

丹溪云香薷能治口臭

寶鑑瀉白散　治肺熱喉腥一人膏梁而飲因勞心過度肺氣有傷以致氣出腥臭涕唾稠粘咽嗌不利口苦乾燥以加減瀉白散治之良愈

桑白皮（三錢）　地骨皮　甘草（炙各一錢半）　知母（七分）　黄芩（五分）　五味子（三十粒）　麥冬（五分）　桔梗（二錢）

作一服水二大鍾煎一鍾食後服日進二次

張子和云一人年二十餘歲病口中氣出臭如登厠雖親戚莫肯對語戴人曰肺金本主腥金為火所乘火主臭應便如是久則成腐腐者腎也此亢極則反兼水化病在上宜湧之以茶調散湧去其七夜以舟車丸濬川丸五七行比旦而臭斷

黄連升麻湯　口舌生瘡

升麻（一錢半）　黄連（一錢）

為細末綿裹入口內含津液嚥下

行義栢皮散

川栢（蜜炙為末一分）　青黛（一分）　研勻入生龍腦一字研勻

治心脾熱舌頰生瘡摻上有涎即吐之

治口瘡　砂仁（火煅存性）　為末摻上即愈

又方　蛛蜘（火煅存性）　為末入輕粉傅之

又方　取桑樹汁先以髮拭口即以汁傅之

東垣化毒法凡口瘡無論新舊遇夜卧將自己兩腎丸以手攞緊左右交手揉三五十度但遇夜睡覺行之如此三五度良愈因酒而生者一夜愈久病諸口瘡三二夜愈如鼻流清涕悪寒者攞二腎丸向上揉之數夜可愈

益胆湯
黄芩、甘草炙　人參各一錢　官桂　苦參泔炒
茯苓各五分　遠志八分　水煎食遠服
伐肝補脾湯
黄連一錢二分　芍藥　柴胡各一錢　青皮八分　白术一錢半
人參八分　白茯苓一錢　甘草炙五分　水煎食前服
柴胡地骨散
柴胡　地骨皮各五分　水煎食遠溫服
赴筵散
細辛　黄栢炒各等分　為末摻患處吐涎乃愈
瀉白散　滋腎丸　滋陰降火湯俱見火門
大補陰丸見虛損　清胃散方見牙門
治口瘡黄栢炙同細辛各二錢研極細傅之噙少
時當即滿口有涎吐之少刻又傅又噙如是五
七次立愈
綠袍散　大人小兒口瘡多不効者
黄栢四兩　甘草炙一兩　青黛一兩
右先取二味為末入青黛同研勻乾貼

五倍子治口瘡以末搽之便可飲食
治口瘡以胆礬一塊用百沸湯泡開含漱一夕可
瘥八分
治口瘡以好墨研螻蛄極細傅之立効　胡氏方
螻蛄走小腸膀胱其効甚捷因力峻氣猛陰虛
氣上致瘡者戒用惟體實有熱在上焦者用之
内府治口臭方
連喬為末糊丸食蒜韮之後茶呑二三錢口中
濁氣化為清氣妙絶
治少陽口瘡半夏散聲絶不出者是寒遏截陽氣
不伸半夏製一兩桂烏頭各一字同煎一盞分
作二服
治太陰口瘡甘礬散以甘草二寸白礬栗子大含
化咽津
治赤口瘡乳香散以乳香沒藥各一錢白礬半錢
銅綠少許研為末摻之
治白口瘡沒藥散以乳香沒藥雄黄各一錢輕粉
半錢巴荳霜少許為末摻之

紅芍藥散 心痛口瘡 紫桔紅蒼 三錢四兩
五服安康 右件紫菀桔梗紅芍藥蒼木各等
分為細末羊肝四兩批開摻藥末三錢用麻
扎定火内燒令熟空心食之大効白湯送下

小兒口瘡遍白者及風疳瘡蝕透者以白姜蚕洗
浄炒令黃色為末用蜜和傅之立効

多効散 治唇緊瘡及疹
訶子肉 五倍子各等分 為細末乾貼上効

唇上生瘡用白梅瓣貼之神効如開裂出血者即
止

唇緊燥裂生瘡以青皮燒灰猪脂調塗

唇

六腑之華在唇經云脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廪之本営之居也其華在唇四白肝脉督脉衝脉任脉皆絡唇者也一有受邪則唇亦為之病風則動寒則緊燥則乾裂氣欝則生瘡血少則瀋而無血色治法内理脾胃外敷以藥無不愈矣又傷寒狐惑上唇生瘡虫食其臟下唇有瘡虫食其肛皆當以類而推大抵與口病相類而治也

唇瘡以甑上滴下汁傅之屡効

舌門

生生子曰經云舌乃心之苗蓋以心為根蒂也心為一身之君主則又為一身之根蒂而舌又為一身之苗也故傷寒一科每每倚舌為實鑑以驗表裏臟腑虛實生死敖氏之金鏡錄是也經曰心脉系舌本脾脉絡舌旁繫舌下故舌病多二經之所致也心熱則生瘡脾熱則強硬滑胎舌尖腫脹疊厚為重舌舌腫硬而不柔和挺然脹滿或出口者為木舌乃二經之火上壅急以針砭刺出毒血以殺其摽然後以瀉心脾之藥治其本可也然不獨心脾之經肝脉亦絡舌本故傷寒邪熱傳至厥陰經則舌巻囊縮除此之外大槩口舌之病皆相近治法亦不甚外當與口部相叅施治則盡其用矣

順氣豁痰湯 舌痺或麻此因痰氣滞于心胞絡

半夏（用白凡生姜皂角煮過一錢半） 茯苓 橘紅 八姜（去白）
貝母 黃連 桔梗 枳殼（各一錢） 香附（童便浸七分）
甘草（四分） 姜三片水煎服

玄參升麻湯 心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫或連頰項兩邊腫痛 玄參 升麻 生犀角（鎊為末） 赤芍藥 桔梗 貫衆 黃芩（各一錢） 甘草（七分）
水煎服大便秘結加大黃二錢

舌無故自痒者不可作風熱治由心血不足用理中湯合四物湯治之

昔有人舌上生瘡久蝕成穴累服涼藥不效此亦下元虛寒以致虛火不降後養正丹遂得愈

舌上血出不止名曰舌衄詳在血門

血虛舌麻者四物湯加黃連

舌出口數寸以氷片為末敷愈

舌脹滿口不能發聲者蒲黃敷愈

舌腫脹口不能開合以草麻子綿紙取去油就將此紙作撚燈上點著吹滅將烟薰之良久則消

已上三條皆出醫說

齒門

生生子曰齒者骨之餘腎之標寄于齦養于氣血上齦屬足陽明胃下齦屬手陽明大腸是知齒者骨也本乎乾元以資始也齦者肉也本乎坤元以資生也譬之木生于土藉土以為養也若動搖脫落乃腎之本虛以致標亦虛至于生蟲浮腫牙宣出血臭穢腐爛者腸胃濕熱壅盛也虛者補之濕熱者瀉之清之外以末藥擦之如風寒外束者解散之除腎氣虛衰精元不固

齒無所養浮豁不堅隱隱而痛外其餘腫爛出血生蟲等症皆腸胃之疾甚而齗爛齒落者猶土崩而木倒也其治在齗齗堅則齒自固矣

大補陰丸 滋陰降火湯 六味地黃丸
皆治陰虛火動牙痛不堅牢而脫落者（方見虛損門）

清胃散 胃熱及食辛熱之物致使上下牙痛牽引頭腦面熱齒惡熱者 當歸 生地 黃連（各八分） 升麻（三錢） 牡丹皮（一錢五分）
水二鍾煎八分食後服（頭腦痛加川芎八分甚者加石羔白芷）

定痛羌活湯 風熱攻注牙根腫痛
羌活 防風 川芎 生地(各一錢) 升麻(一錢二分)
細辛 荊芥 獨活 薄荷(各六分) 石膏(二錢) 甘草
(五分) 水煎食後服惡熱飲者加龍胆草(酒洗一錢半)惡
風作痛加白豆蔻黃連(各五分) 濕熱甚者加黃
連(一錢) 山梔(一錢)
安腎丸 腎虛牙齒豁落隱痛久服固精補陽
青鹽(炒) 補骨脂(鹽水炒) 山藥 石斛 白茯苓
兎絲子(酒炒) 巴戟(去心) 杜仲(姜汁炒各一兩) 肉蓯蓉(酒浸) 白蒺
藜(各二兩炒) 右煉蜜丸梧桐子大每服七八十丸
〈八之叁〉 六十五
空心淡鹽湯下
經驗石膏湯 胃有實熱牙痛或上牙腫痛
升麻 知母(各一錢) 石膏(一錢半) 大黃(酒蒸二錢) 山枝
薄荷 茯苓 連翹(各八分) 朴硝(六分) 甘草(五分)
水煎食遠服頻頻口嚥即愈
百効湯 腸胃蘊熱風熱牙齦腫痛頰車皆腫
升麻 葛根 白芷 酒芩 桔梗(各一錢) 防風
薄荷(各五分) 石膏(三錢) 甘草(六分) 天花粉(八分) 細辛(四分)

姜三片水煎食後頻頻少服之 頭疼及項
頸痛者加羌活(一錢) 發寒熱者加柴胡(一錢) 屢効
擦牙定痛散 一切牙痛風熱腫痛
薄荷葉 天花粉 樟腦(各等分)
右為細末擦患處効
止痛方 牙疼并齦腫痛
將軍(一兩) 川椒 胡椒 樟腦(各三錢)
右為末不時擦之吐去苦水為美
氣虛牙痛者脾胃不足或服寒涼藥過多抑遏陽
氣於脾土之中身反發熱者當以補中益氣湯
〈八之叁〉 六十六
或調中益氣湯火鬱湯消息治之
牙痛方 猪蹄甲入鹽塡滿火煅焦為末擦上(立愈)
又方 乾茄蒂為末搽上効

咽喉門

經云一陽一陰結謂之喉痺一陰乃手厥陰心包
絡之脉一陽乃手少陽三焦之脉二脉並絡于
喉氣熱內結故為喉痺喉主天氣咽主地氣地
氣通于嗌嗌即咽之低處也咽喉者水穀之道

路也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者聲音之户也懸雍者音聲之関也 張子和云咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉以納氣故喉氣通于天咽以納食故咽氣通于地會厭管乎其上以開闔掩其喉則其食下不掩之其喉錯必舌抵上齶則會厭能閉其喉矣四者交相為用闕一則飲食廢而死矣

生生子曰經云喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而天氣閉塞也云咽痛者云嗌痛者謂咽喉

不能納唾與食而地氣閉也云喉痺咽嗌痛者謂咽喉諸病天地之氣並閉塞也盖病喉痺者必兼咽嗌痛病咽嗌痛不能兼喉痺也今喉咽俱病方並入喉痺門中

寶鑑荊芥湯 咽喉腫痛語聲不出嚥之痛甚

荊芥五錢 桔梗二兩 甘草一兩 每服四五錢水煎食後温服 按此即甘桔湯也海藏云治咽痛以甘桔湯加大力子竹茹妙

本事方 治中風急喉痺欲死者

白姜蚕為極細末生姜自然汁調下喉愈

寶鑑馬鞭散 喉痺咽腫連頰吐氣數者

馬鞭草 本草云味辛涼破血主癥瘕血痢通月經

搗自然汁嚥一合許即愈

孫召先生方 治急喉閉

猪牙皂角 白礬 黄連各等分 新瓦上焙乾為末每用五分吹入喉中吐出膿血立愈

急喉痺其聲如鼾有如痰在喉中響者此為肺絶之候速宜人参膏救之用竹瀝姜汁調下獨参

湯亦可若服之早者十全七八次則十全三四遲則十不救一也

丹溪曰喉痛并瘡多屬虛火遊行無制用人参黄栢蜜炙荊芥氣虚人参竹瀝血虚四物竹瀝

咽喉燥痛四物湯加桔梗荊芥黄栢知母立止

喉舌之疾皆屬火熱雖有數種之名輕重之異乃火之微甚故也微而輕者可以緩治甚而重者惟用針砭刺血最為上策

治喉痺用青艾汁灌下愈

喉痛必用荊芥陰火炎上必用玄參

又方 茜草根一兩一服 此所謂治血中之火也

咽中瘡腫草麻子(一粒去皮淨) 朴硝(一錢)同研新汲水作一服連進二三服効

本事利膈湯 虛損上壅脾肺有熱咽喉生瘡

雞蘇葉 荊芥 防風 桔梗 人參 甘草 大力子(各一兩炒) 為細末每一錢沸湯點服

如咽痛口瘡甚者加姜蚕(一兩)

東垣桔梗湯 咽腫微覺痛聲破(季冬用之)

麻黃(五分連節) 桔梗 甘草(各一錢) 黃芩 白姜蚕(各三錢) 馬兜勃(一兩) 桂枝(少許) 當歸身

水二鍾煎一鍾食後稍熱徐徐呷之

三因發聲散 咽痛煩悶咽物即痛不宜寒涼藥過泄之此煩悶乃虛熱也

瓜蔞(一枚) 白姜蚕(五分微炒) 桔梗(七錢半) 甘草(二錢炒)

右用細末少許乾摻咽喉中若腫痛左右有紅或止一邊紅紫長大水米難下用此一錢朴硝一錢和勻摻喉中咽津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用前散一錢七白礬(五分細研)乾摻

三因蜜附子法 感寒咽閉不能咽

大附子(一枚生去皮臍切作大片蜜塗炙令黃) 口含嚥津甘味盡更以附子片塗蜜炙用以効為度(已上皆散寒之劑也)

丹溪治咽痛諸藥不効者此非咽痛乃是鼻中生一條紅線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂掛到咽門而止口中飲食不入雖用深取土牛膝根獨條肥大者搗碎入好醋三五滴同研細滴入鼻中二三點即系斷珠破吐出瘀血立安

愚按治喉痰藥皆大同小異不過疎風清熱散毒破血激痰而已明手此則凡單蛾雙蛾之症皆可類推也

丹溪噙化丸治痰結核在咽必用醎能軟堅之味

瓜蔞仁 青黛 杏仁 海蛤粉 桔梗 連翹 風化散

右為末姜蜜丸噙化

梅核氣

生生子曰梅核氣者喉中介介如梗狀又曰痰結

塊在喉間吐之不出嚥之不下者是也丹溪噙
化丸正治此等症也
仲景半夏厚朴湯　治婦人咽中如有炙臠
半夏一升 厚朴三兩 茯苓 生姜各四兩 蘇葉二兩
右以水七升煮取四升分温四服日三夜一
三子調氣丸　治梅核氣
蘇子 白芥子 蘿卜子 半夏麴 滑石各研
一兩 前胡六錢 桂心三錢 黄芩 黄連各五錢 生訶子三錢
桔梗七錢 甘草四錢 橘紅明礬硼砂玄明粉各二錢煮乾二兩
右為末生姜汁少許竹瀝一碗打糊為丸菉
豆大食後白湯下一錢日三服
清咽益元丸
益元散一兩 牛黄五分 百藥煎三錢
右以甘草桔梗煎濃汁為丸芡實大陰乾噙
化一丸妙
大七氣湯　治梅核氣極佳　方現氣門
終

赤水玄珠第四卷目録

腹痛門　腹痛　水鳴　小腹痛
脇痛門　脇痛
心痛門　心痛　胸滿　胸痛　胸痺　蟲痛
嘔吐噦門　嘔吐噦　胃風　悪心　嘔苦水
嘔沫　嘔膿　嘔長虫　酒嘔　嘔清水
腰痛門　腰痛

赤水玄珠第四卷

新安生生子孫一奎著輯

腹痛門（附水鳴小腹痛）

生生子曰腹痛極要體認真切庶按劑有功有寒熱（脉沉而遲者寒脉浮而數者熱）有虛實（脉散大而無力者虛脉弦而有力者實）有痰涎（脉滑者痰沉弦者飲）有積聚（脉沉弦而伏者積或伏或弦者聚）有虫痛（脉多沉滑或乍大乍小）有死血（脉沉而澁或結或促）

寒痛者綿綿而痛無增減也以姜桂附子之屬溫之

熱痛者時痛而或時吐也得熱物而痛止者蓋辛熱能冲開鬱結氣道踈通暫得少愈而陰血日虧燥火愈熾不久復發遷延歲月此為積熱輕者以山梔黃連白芍香附之類重者調胃承氣湯下之

虛痛者以手重按至痛處而止者是也宜參朮白芍加溫煖藥

實痛者手不可近按之愈痛或消或下詳症施治

飲食所傷作痛者宜溫脾行氣以消導之蓋飲食得寒則滯得熱則化若痛漸下及日久不愈者宜推蕩之詳見內傷飲食門

痰痛者必小便不利痰隔中焦氣閉下焦上下不相流通故痛治當導痰開鬱　又伏飲作痛者或吐或下視形氣何如當與痰飲門相參治

虫痛者面上有白斑點唇若塗硃痛後便能食時作時止詳見虫門

食積死血痛者痛有常處而不移動者是也（宜按門尋）治

腹中水鳴

丹溪曰腹中水鳴乃火擊動其水也蓋水欲下火欲上相觸而然用二陳湯加芩連梔子亦有臟寒而水聲汩汩者宜分三陰部分而治中脘太陰當臍少陰小腹厥陰各從其宜溫之　又有腸胃空虛而鳴者宜參朮之類補之

腹中水鳴而痛亦有因于火因于鬱者

生生子曰觀丹溪治腹痛無定方蓋欲使人悉病自擇且方者隅也隅于一則不能圓活而貫通

是以後人有守死方之誚
凡臍下痛而人中黑者多死
○感暑而痛或泄痢併作其脉必虚宜十味香薷飲或六和湯
感溼而痛大便溏泄小便不利其脉必濡宜胃苓湯
食積痛常欲大便去後而痛減者是也宜溫宜消久者遇仙丹神芎丸等攻而下之（當與傷食門相參治）
氣滯而痛其脉必沉宜木香順氣散

死血痛〻有常處宜桃仁承氣湯
痛而欲得熱手按及熱物熨者是寒宜香砂理中湯或五積散
痛而熱手熱物熨不止者是熱宜黃連解毒之類實則以硝黃下之
絞腸沙痛極是急速先與塩湯探吐或委中并十指出血藿香正氣散正氣天香散
酒積痛　酒傷則發宜泄其積痛自止也
多年敗田螺殼煅存性加三倍于木香檳榔丸中更加山茵陳等分衆藥中其効甚速

槩痛湯　治火痛
黃連（薑汁炒）　山梔仁（炒各二錢）　橘紅　茯苓（各一錢半）
草蔻仁（七分）　半夏（一錢）　甘草（四分）　姜三片食前服

星半安中湯　痰積作痛
南星　半夏（各一錢半）　滑石　香附　枳殼　青皮
木香　山梔仁　蒼术（炒）　砂仁　茯苓　橘紅
（各一錢）　甘草（四分）　生姜四片煎服
氣攻痛者去南星滑石加厚朴玄胡索（各一錢）

痰甚者加白螺殼燒灰一錢臨服調下

木香順氣散　氣滯腹痛
木香　香附　檳榔　青皮　陳皮　厚朴
蒼术　枳壳（炒）　砂仁（各一錢）　甘草（五分）　姜三片煎服

香砂理中湯　即理中湯加藿香砂仁

小腹痛
傷寒家蓄血在下焦宜抵當桃仁承氣之類若因氣鬱而痛以青皮主之寒者以桂枝吴茱萸溫之若因疝奔豚癥聚者又當循各門施治

苦練丸　治奔豚小腹痛寒也

苦練　茴香　大附子　三味酒煮焙乾末之

每兩入玄胡末半兩全蝎炒丁香各十八箇

為末酒糊丸梧子大每食前溫酒下五十丸

酒煮當歸丸　治小腹下痛及疝

當歸一兩　茴香半兩　附子七錢　良姜七錢　四味酒煮乾

再焙加後藥　鹽炒　丁香各半兩　全蝎二錢

柴胡　升麻　木香各一錢　苦練五分　甘草炙五分　玄

胡索四錢　為末酒煮糊丸梧子大每二十丸空心白湯下

小腸癰作痛者其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀

腹常痛或遶臍生瘡急宜下之或以雲母膏太

乙膏為丸服之自愈

脇痛門

有風寒脉浮弦而數者是也　有食積脉沉弦而伏者是也　有痰飲脉或弦或滑或結或促

有死血脉濇　有虛脉弦而細數或大而無力　有氣鬱脉沉而細

有火脉洪滑而數　當分條類析明別左右施治

經曰左右者陰陽之道路氣之所終始也又曰肝

木氣實則脇痛肝氣實則怒夫謂實者指邪氣

而言經曰邪氣盛則實是也

脇痛屬肝木及胆火木氣實者以柴胡川芎青皮

蒼朮踈之肝火盛者以當歸龍會丸瀉之死血

積者以桃仁紅花香附川芎破之痰飲流注者

以南星半夏蒼朮川芎豁之鬱宜開鬱寒宜散

寒怏大法也

兩脇走痛是痰實者可用控涎丹方見痰飲門

左脇痛為肝經受邪宜枳芎散或柴胡踈肝散

右脇痛為肝經移病于肺宜推氣散

食積痛　凡痛有一條扛起者是也當于積塊門檢治

氣弱人脇痛脉細緊或弦多從勞役怒氣得者八

物湯加木香青皮

肥白人氣虚發寒熱而脇下痛用參芪補氣柴胡
黄芩退熱木香青皮調氣
瘦人發寒熱脇痛多怒者必有瘀血宜桃仁紅花
柴胡青皮大黄滑石
去滯氣必用青皮乃肝胆二經之藥若二經血不
足者先當補血少加青皮可也
脇痛發寒熱似覺有積塊必從飲食大飽勞力所
致必用龍會丸
痰飲停伏脇痛宜導痰湯

脇下痛而大便秘結者木香檳榔丸或龍會丸
亦有虚寒而作痛者一人脇痛連膈服氣藥不効
後用辛熱補劑下黒鉛丹而愈
觧痛外以琥珀膏貼之或以白芥子水研敷之或
吴茱萸醋研敷之韮菜炒熨亦佳
當歸龍會丸 肝木實火兩脇痛之要藥
當歸 龍胆草酒洗各 山梔 黄連 黄芩各一兩半
蘆會 大黄酒浸各五錢 木香一錢半 黄栢一兩 青皮一兩
柴胡五錢 射香少許 右末神麪糊丸梧子大毎姜湯下三五十丸

枳芎散 左脇痛
枳實麸炒 川芎各五錢 甘草炙一錢半
為末毎二三錢姜棗湯或酒調下
推氣散 右脇痛
片姜黄 枳殻麸炒 桂心各五錢 甘草炙三錢
為末毎服二錢姜湯調下
鷄鳴散 跌蹼損傷瘀血停積脇内日久作痛
復元活血湯 從高墜下悪血流于脇下疼痛不
可忍 二方見跌蹼門

柴胡瀉肝湯 鬱怒傷肝左脇痛
柴胡一錢二分 甘草五分 青皮 芍藥各一錢 黄連炒
山梔炒 龍膽草各八分 川歸一錢二分 水煎服
死血作痛瘦人多怒者常患此
桃仁九個 紅花 川芎 柴胡 青皮各八分 芍藥
香附各一錢 乙歸尾一錢半 水煎服
治脇下氣痛神方
小茴香炒一兩 枳殻麸炒五錢 為末毎二錢塩湯調下

心痛門

真心痛者手足青至節旦發夕死夕發旦死寒邪傷其君主也今之治例皆非真心痛也以其在心之部位而名或心之脉絡或手心主之脉絡或胃脘或胸膈或食傷或寒傷或氣逆或痰飲或死血或虫或鬱火皆致痛也

鍼經曰足太陰之脉其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫心下急痛　胃病者腹䐜脹胃脘當心而痛上

支兩脇咽鬲不通　脉經曰憂愁思慮則傷心傷心則苦驚喜忘善怒心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛徹背其脉弦此心臟傷所致也　諸虫痛者如心腹痛懊憹發作腫聚往來上下行痛有休作心腹中熱善渴涎出面色乍青乍白乍赤嘔吐清水者蚘也

病機機要曰有大實而心中痛者因氣而食卒然發痛大便或秘久而心胸高起按之至痛不能飲食急以煮黄丸利之利後以藁本湯去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身冷汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以朮附湯温之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知久病無寒暴病非熱也

陳無擇云若諸經心痛心與背相引心痛徹背背痛徹心若諸府心痛難以俛仰小腹上沖卒不知人嘔吐泄瀉此皆外感内淫則其氣閉塞鬱于中焦氣衝爭發為疼痛又曰九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰虫曰疰曰去来痛

者除風熱冷屬外所因餘皆不内外更婦人惡血入心脾經發作疼痛尤甚于諸痛更有卒中客忤鬼擊尸疰使人心痛亦屬不内外因在人以意推充施治

丹溪云凡心膈之痛須分新久若明知身受寒氣口食寒物而病于初得之時當用温散或温利之藥若其病得之稍久則成鬱矣鬱則蒸熱久必生火原病式中備言之矣若欲行温散温利寧無助火添病耶由是古方多以山梔為君

加熱藥為嚮導則邪易伏病易退然向安之後
若縱恣口味病必復作凡治此病必要先問平
日起居何如假如心痛有因平日喜食熱物以
致死血畱于胃口作痛者用桃仁承氣湯下之

治寒之劑

金匱赤石脂丸 心痛徹背背痛徹心此寒厥心痛
烏頭炮三錢 附子炮五錢 蜀椒 乾姜 赤石脂各一兩
右末蜜丸梧子大食後白湯下一丸日三服

朮附湯 寒厥暴痛脉微氣弱

甘草炙一兩 白朮四兩 附子炮一兩半 每三錢姜棗煎

立應散 寒痛氣痛腹痛皆効
良姜 香附各炒分 為末白湯調下二錢

二姜丸 養脾温胃去冷消痰治心脾痛寬胸下
氣進飲食一切冷物所傷並皆治之
乾姜炮 良姜 等分為末麪糊丸梧子大每服
十五丸至二十丸食後陳皮湯下 妊娠婦人
不宜服此皆温中之藥也

○散寒之劑

麻黃桂枝湯 外因心痛惡寒發熱内攻五臟拘
急不得轉側 麻黃 桂心 芍藥 細辛
乾姜 甘草炙各七錢半 半夏 香附各五錢 每服五
錢姜五片水煎食前服大便秘入大黃虚實加減

一人心痛諸藥不効服此而愈
檳榔 桂心 葛根 甘草炙減半 細辛 半夏
桔梗 枳殼 川芎 防風 等分水煎服

草豆蔻丸 客寒犯胃
草豆蔻煨一錢半 吳茱萸炮 益智仁 姜蚕炒 當歸

身 青皮各六分 神曲 姜黃各四分 甘草三分 桃仁七個
半夏泡一錢 澤瀉一錢小便利減 麥芽炒一錢半 炙甘草六分
柴胡四分詳脇痛多少與之 人參 黃芪 陳皮
右除桃仁另研如泥外為極細末同研勻湯
浸蒸餅為丸梧子大每三十丸熱湯下食遠服

治心痛
荔枝核燒存性為末醋湯下二錢

内傷飲食之劑

煮黃丸 治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣痃癖刺痛

雄黄(一兩研) 巴豆(五錢去皮心研如泥)入白麪二兩同研勻滴水丸梧子大滚水煮十二丸濾入冷水内令沉冷每用時用浸藥冷水下一丸一日十二時盡十二丸以利為度不必盡劑

藁本湯 治大實心痛大便已利宜以此徹其痛也

藁本(半兩) 蒼术(一兩) 水煎温服

飲食在膈上未入胃者宜吐之經曰在上者因而越之如瓜蒂散之類

氣痛之劑

正氣天香散(但是氣則發) 七氣湯 蘓子降氣湯(見氣門)

治痰飲痛劑

丹溪方 痰飲停積胃脘作痛

螺螄殼(牆上年久者煅) 滑石(炒) 蒼术 山梔 香附 南星(各二兩) 枳殼 青皮 木香 半夏 砂仁(各五錢)

右末生姜汁浸蒸餅為丸菉豆大每三四十丸姜湯下春加川芎夏加黄連冬加吴茱萸(半兩)

又方 治痰心痛

半夏油炒為末每服二錢姜湯下 痛甚者大

陷胸湯或為丸亦可

治死血痛劑

丹溪方 治死血胃脘痛者

玄胡索(一兩半) 桂 滑石 紅花 紅麯(各五錢) 桃仁(三十個)

右末湯浸蒸餅糊為丸

桃仁承氣湯 方見傷寒門

斗門方 血氣攻心痛不可忍

蓼根剉酒浸服之瘥

治火鬱之劑

丹溪方 治火痛

黄連 山梔(炒各二錢) 陳皮 茯苓(各錢半) 乾姜 半夏(一錢) 草豆蔻(七分) 甘草(四分) 姜三片水煎食前服

又方 治火痛

山梔仁(姜汁炒一兩) 水煎磨木香(三分) 或加川芎(二錢)

雜方 牡蠣(煅) 為末每二錢酒調下

失笑散 有人心痛百藥不効用此而愈

五靈脂 蒲黄 等分為極細末以醋調二錢熬成膏入水一盞食前温服有瘀血作痛加

玄胡滚藥螺螄殼陳年日久者治心痛洗淨為末熱酒調下一錢半

乾漆丸 九種心痛腹脇積聚滯氣

乾漆二兩搗碎炒去烟細研醋煮麵糊丸梧子大每服十五丸至十七丸熱酒下醋湯亦好不拘時日進二服

蚕沙散 男婦心氣痛不可忍

晚蚕砂不拘多少為末用滚水泡過濾淨取清水服之立止

熨法 治心腹俱痛以包川椒薄注腹上火熨令椒汗出良

梅硫丸 酸熱以收散寒凡服辛劑甚者改服酸劑立愈

氷梅去核一箇生硫黃 為末相和搗勻以可丸為度作一丸白湯下立愈病不再作

濟世方 治心痛

稀薟草搗汁醋汁相和服立效昔有人服此吐虫二條終身不發

緑礬止痛方 緑礬七八分好酒化下再不發

衍義方 治心痛

銅青一味淡醋湯些小服之

治虫之劑可與虫部參治

化虫丸 雀虱 檳榔 胡粉炒 苦練根去浮皮各五十兩 白礬枯十二兩 為末麵糊丸桐子大小兒疾病多有諸虫或因臟腑虛弱而動或咽食甘肥而動〻即腹中疼痛往来上下攻心痛則笑不休合眼仰身撲手心神悶乱嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面青黃色飲食雖進不生肌肉或寒或熱沉〻黙〻不明知病處一歲五丸溫水下入香油一二點打勻下之米飲亦得其虫自下

生生子曰已上論寒熱痰氣虫痛火食等痛治法皆已備矣但病久正氣虛損及禀賦素弱之人或被峻利攻伐太過以致羸弱而痛不愈者皆虛痛也當從補養氣血此根本之治不可全恃攻克以致虛〻之禍以予嘗治于病壞之後補藥收功者多

黃芪建中湯隨症加減 治虛弱及被克伐藥傷者

局方蘓合丸 治疰忤鬼氣卒心痛甚妙

山梔并刼藥止之不効者 玄明粉一服立止

胸滿胸痛胸痺

肝虛則胸痛引背脇實則胸痛不能轉側喜太息

仲景曰肝中寒者兩臂不擧舌本燥喜太息胸中痛不得轉側食則吐而出汗也肝著其人常欲蹈其胸上先未苦時但欲飲熱旋覆花湯主之

素問曰陽明所謂胸痛短氣者水氣在藏府也水者陰氣也陰氣在內故胸痛少氣也

仲景治胸痺之病喘息咳唾胸背短氣寸口脉沉而遲關上小緊數者宜以瓜蔞薤白白酒湯主之

大瓜蔞一個搗碎 薤白半斤 白酒七升

三味同煮取二升分溫再服

一婦人患胷中痞急不得喘息按之則痛脉數且澁此胸痺也因與小陷胸湯二劑而愈

支飲胸滿者枳朴大黃湯主之

厚朴一兩 大黃六兩 枳實一兩

水五升煮取二升分溫再服

斗門方 治胷腹壅滯去痰開胃

半夏泡淨焙乾為末生姜自然汁和為餅子用

濕紙包于慢火中煨令香熟水一盞用餅子一塊如彈子大入鹽半錢煎取一盞溫服大能去胸膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功効大矣

一人年二十三歲膈有一點相引痛吸氣皮覺急此有汚血也 滑石一兩 桃仁五錢 黃連五錢 枳殼一兩炒 甘草二錢炙 為末每服一錢半以蘿蔔自然汁煎熱飲之一日五六服

一人因服溫補藥又妄自學吐納以致氣亂血熱嗽血消瘦膈間有一點氣梗痛似有一條系垂映在腰與小腹皆痛大率偏在左邊此肝部有悪血也 滑石 枳殼一兩炒 黃丹三錢炒 黃連 柴胡五錢 紅花一錢 桃仁二兩 甘草二錢生 為細末每服錢半以蘿蔔汁煎沸服之有寒邪干于胸中者宜發散之如紫蘇前胡杏仁防風桂枝葛根之類

茯苓杏仁甘草湯 治胸痺胷中氣塞短氣

茯苓二兩 杏仁五十箇 甘草一兩

水一斗煮五升温服一升一日三服
橘枳姜湯　治同上
陳皮一斤　枳實二兩　生姜半斤　水五升煮二升分温再服
千金方　治胸痺氣滿塞心膈不利
枳實二兩　麸炒為末清米飲下二錢
仲景薏苡附子湯　治胸痺緩急
苡仁十五兩　大附子十個炮　為末每服方寸匕日三
旋覆花湯　治胸中嘈雜汪洋常覺冷涎泛上兀
兀欲吐飽悶

旋覆花　橘紅　半夏　茯苓　甘草
厚朴　芎藭　細辛　姜三片水煎服

虫痛

虫本湿熱所生臟腑虛則侵蝕
瘵寸白虫錫灰蕪荑檳榔極佳宜和中一人每覺
心中多嘈雜意欲作飲又疑虫漫依此方翌日
下長虫二條一長二尺五寸頭匾濶尾尖鋭每
寸作二節斑如錦紋一條皆寸斷矣
千金方云勞則生熱熱則生虫心虫曰蛔脾虫曰
寸白腎虫如刀截絲縷肝虫如爛杏肺虫如蚕
皆能殺人惟肺虫為急居肺葉内蝕人肺系故
成瘵疾咯血聲嘶藥所不到治之為難道藏中
載諸虫頭皆向下行惟自初一至初五日以前
頭上行故服藥多取月出以前盖為此也

取寸白虫方

錫灰一兩　木鱉子　蘆會二十文　黄丹十文　輕粉十文
為末猪膏油丸桐子大先一日食素晚莫喫
飯次早五更温水調下分二服

又方　畫粉　密佗僧　各等分為末每二錢用
麻油調服空心下頃刻成涎取下

虫蠱之生由飲食不節傷飢過飽喜喫腥膾多食
生冷酷嗜麴蘗愛食肥甘臟腑虛弱湿熱内滛
則生虫積也
三虫者謂長虫赤虫蟯虫也乃有九種而蟯人多
病之寸白虫從食牛肉飲白酒所成相連一尺
則殺人服藥下之盡出乃佳蟯虫多小兒患之
大人亦有令人口吐清汁心痛煩躁卧位乍止

其餘各種總不利于人胃中若有者宜化虫丸逮除之

腹內熱腸胃虛虫行求食上唇有瘡曰惑虫食其臟下唇有瘡曰狐虫食其肛得此疾者十無一生也

寸白虫上半月虫頭向上易治下半月向下難治先以肉汁或糖蜜引虫頭向上然後用藥

集効丸

木香 鶴虱炒 檳榔 訶子麪包煨去核 蕪荑炒 附子炮去臍 乾姜各七錢半 大黃一兩 烏梅十四個去核

右末煉蜜丸麻子大每三四十丸陳皮湯下或淡醋湯下

秘方萬應丸 大人小兒腹內有虫及積氣塊痛小兒疳病

三稜 莪朮各炒 醋陳皮炒 橘紅 史君子肉 麥蘖麪炒 神麪炒 雷丸 乾漆炒烟盡各五錢 檳榔一兩 蕪荑二錢半 鶴虱略炒 胡黃連炒 甘草炙各三錢 木香 良姜陳壁土炒 砂仁各二錢 右末醋米糊為丸菉豆大每三五十丸空心淡姜湯下

靈礬散 治小兒虫咬心痛欲絕

八 四卷 廿一

五靈脂末二錢 白礬五錢枯

每服二錢水煎服不拘時虫出即愈

安虫散 凡虫不可盡去宜安之

檳榔 胡粉炒黝 川練子去核皮 鶴虱炒二 酪 枯礬二錢半

右末每服一錢米飲調下

川練丸 上中二焦虛或胃寒虫動作痛

乾漆二錢炒烟盡 雄黃五分 巴豆霜一錢

右末麵糊丸黍米大看大小與服取東向石榴根煎湯下痛者苦練根湯或蕪荑湯下

八 四卷 廿二

蕪荑散 治諸虫作痛臨發時服

白蕪荑去扇 乾漆炒烟盡各等分為末每一錢米飲下

化虫丸 治小兒疳虫五心煩熱

蕪荑 黃連 神麪炒 麥蘖炒各等分

右末麵糊丸黍米大空心米飲下

制虫制勞悅肌膚去勞熱

檳榔一兩半 龍膽草一兩 乾漆五錢 為末煉蜜丸梧桐子大每十丸至十五丸滚水下

木香三稜散 腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑丑(半生半熟) 大腹子(炙) 檳榔 雷丸 錫灰(醋炒)
三稜(煨) 蓬朮(煨) 木香 大黃(各一兩)
為極細末每三錢空心蜜水調下或砂糖水下須先將燒肉一片口中嚼之休嚥下吐出口中肉汁後服藥

丹溪治蛔虫吐清水氣口刺痛取生艾汁隔夜勿食次早五更以肥香脯方寸已先喫令虫聞香隨即飲汁一升必下蛔虫凡胸喉中覺有虫上下偏喜聞葱豉油食之香者兩三日不食開口而卧將豉煎葱油令香放口邊虫當自出引而去之但隨喜所物用之亦可

古有一人忽患一疾凡惡心則吐虫數條後乃頻作累治不効每用殺虫藥則吐虫愈多招孫尚先生診之曰六脉皆細非虫也今雖吐虫乃臟寒而虫不安失居上膈因而吐出復用殺虫藥虫為藥所苦不能自安所以虫吐愈多也硫黃附子各一兩為末粳米糊丸每服三十丸飲下之五服後再不吐虫而痛亦止

仲景曰凡腹中痛其脉當沉弦今反洪大故有蛔虫熱則生虫故脉洪大

嘔吐噦門

生生子曰機要云有聲有物謂之嘔無聲有物謂之吐空嘔濁惡而聲長謂之噦要知噦屬陽而吐屬陰也無形者肺有形者胃以胃熏氣血言也又云上焦吐者為氣中焦吐者為食積下焦吐者為寒内經云食不得入是有火也食入復出是無火也有飽後逢怒或傷力跌撲以致瘀血積于胃脘者有膈虛及風痰作吐者有胃虛而蛔行求食者有中氣虛弱者有風寒外襲者

有鬱火作痛而吐者有傷酒而嘔吐者有脚氣發而吐者惟細心體認治之無不愈矣

東垣云大便閉者通利之陰虛邪氣逆上窒塞嘔噦不足之病此地道不通也正當用生地黄當歸桃仁紅花之類和血潤燥兼用甘草以補其氣微加大黄芒硝以通其閉大便利邪氣去則氣降嘔噦自不見矣復有胃中虛熱穀氣大虛發而為嘔噦者但得五穀之陰以和之則嘔噦自止五穀皆屬陰或食或飲白湯或喜涼水皆能止嘔噦不必用藥也治嘔吐生姜半夏橘皮必用之聖藥但只治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀氣而已勿作表實以辛藥瀉之

東垣嘔吐噦分為三陽經云嘔吐噦者皆屬于胃胃者總司也以其氣血多少為異耳且如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也

仲景云嘔多雖有陽明症慎不可下

孫真人云嘔家多服生姜乃嘔吐之聖藥也氣逆

者必散之故以生姜為主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以陳皮去白主之噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以姜製半夏為主故朱奉議治嘔吐噦以生姜半夏陳皮之類究其三者之源皆因其脾虛弱或因寒氣飲食所傷而致也宜丁香藿香半夏茯苓陳皮之類若但只内傷宜察其虛實使内消之痰飲者下之當分何經對症用藥不可亂也

嘔吐膈氣總論

潔古云吐有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是故上焦吐者皆從于氣氣者天之陽也其脉浮而洪食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸而發痛其治當降氣和中中焦吐者皆從于積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脉浮而弦其症或先痛而後吐或先吐而後痛治法當以小毒藥去其積檳榔木香和其氣下焦吐者皆從于地道也其脉大而遲其症朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法宜毒藥通其閉溫其寒氣大便漸通以中焦藥和之不令大便閉結而自安也

右潔古論三焦吐蓋本黃帝所謂氣為上膈食飲入而還出為下膈食晬時乃反出之其上焦食已暴出者今世謂之嘔吐也中下二焦朝食暮吐暮食朝吐者今世謂之膈氣反胃也今分

嘔吐膈食為二門

仲景云諸嘔吐穀不得下小半夏湯主之

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之胃反嘔吐者大半夏湯主之服前小半夏湯諸湯不愈者此胃虛當以甘益之立愈

治氣之劑

仲景陳皮湯　乾嘔手足厥者治宜辛散

橘紅四兩　生姜八兩　水七升煎三升溫服一升下咽即愈

木香散

木香　檳榔　等分為細末以後桔梗湯調下

潔古桔梗湯　上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮洪宜先降氣和中

桔梗　白朮各一兩半　半夏麴二兩　橘紅　枳實炒

茯苓　厚朴各一兩　每服一兩水煎調木香散二錢隔夜空腹服之三服後氣漸下吐漸去然後去木香散加芍藥黃芪一兩半同煎服之

病愈則止如大腑燥結食不盡下以大承氣
湯去朴硝微下之少利為度再服前藥補之
如大便復結又依前微下之

檳榔橘紅散 治嘔吐

白檳榔一枚 橘紅二錢半 水煎服

治寒之劑

加減二陳湯 痰火為患嘔噦頭眩心悸中脘不
快發寒熱或食生冷脾胃不和並治

丁香一兩 半夏 陳皮各五兩 茯苓二兩 甘草一兩半

每服四五錢姜三片烏梅一枚水煎熱服

治痰痞加草豆蔻一兩半

藿香安胃散 脾胃虛弱不飲食嘔吐不時

藿香一錢半 丁香 人參各二錢 橘紅五錢

每服二錢姜三片水煎服

東垣丁香吳茱萸湯 治嘔吐噦胃寒所致

丁香 甘草 茯苓 柴胡 半夏 乾姜各五分 吳茱萸 草豆仁 蒼朮 黃芩 人參各錢 升麻七分 當歸一錢半

每服五錢姜三片水煎食前熱服忌生冷

藿香平胃散 治嘔吐不止

藿香 厚朴各一兩 半夏 甘草炙各二兩 蒼朮三兩 陳皮去白二兩 每服五錢姜三片棗三枚水煎溫服

羅太無紅豆丸 諸嘔吐逆膈氣反胃亦治寒濕

丁香 胡椒 砂仁 紅豆各二十粒

右末姜汁糊為丸皂角子大每一丸以大棗
一枚去核填藥麵裹燒麵熟去麵細嚼白湯
下食前進三服効

丁香附子散 膈氣吐食及下焦寒而奔豚上冲

黑附子炮去皮臍 丁香各五錢 檳榔一大 硫黃去砂 胡椒各二錢 右先將四味為末次入硫黃再研勻每服
二錢用蝙蝠一箇去翅足腸肚填藥在內用
濕紙五七重裹定置慢火內燒熟取出細嚼
用溫酒送下一日三服米飲送下亦可

仲景吳茱萸湯 治嘔而胷滿者

吳茱萸湯泡一兩半 人參三分 生姜一兩半 大棗三枚 水煎

治火之劑

蘆根湯　熱而嘔吐不止及治惡阻
蘆根取土中新白者半斤水二碗煎一碗熱服
竹茹湯　治胃熱而嘔
乾葛　半夏姜汁煮各三錢　甘草二錢
每服五錢姜三片竹茹錢半棗一枚水煎温服
昔有人病傷寒得汗後数日忽嘔吐藥食俱不得
下醫皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐後以
此竹茹湯與之即愈
枇杷散　治嘔吐利膈氣止嘔啘又治卒嘔吐不
食單煮枇杷葉汁飲之此物味若平下氣
枇杷葉去毛　人參　半夏各一錢　茯苓五錢　茅根二兩
姜七片水煎磨檳榔末五分和匀服之
丹溪治膈上有熱胃中有痰二陳湯加炒梔子黄
連生姜主之嘔而發熱者小柴胡湯主之温膽
湯治嘔吐不下飲食極妙
仲景青鎮丸　治寒熱往来脉弦嘔吐頭痛即小
柴胡湯加青黛以姜汁打糊為丸白湯下
劉河間治暴吐上焦氣熱所冲經曰諸嘔吐酸暴

〈四卷　二

注下迫皆属于火脉浮而洪者荊黄湯主之
荊芥一兩　人參五錢　甘草二錢半　大黃二錢
右水煎調檳榔散二錢空心服
檳榔散　檳榔二錢　木香一錢半　輕粉少許
右為細末同前煎藥下如欲作丸子用蒸餅
糊為丸小豆大每二十丸食後服
治痰血之劑
香靈丸又名丁丸　六　治嘔吐如神及産後嘔不止者
丁香　辰砂六錢　五灵脂一兩　右香脂先研末後
入砂再研匀用狗膽汁或猪膽汁為丸鷄頭
子大每服六七丸生姜陳皮湯磨下
治痰血獨以五灵脂狗膽汁為丸鷄頭子大每服
一丸生姜湯磨下及生姜酒送下極熱服
草靈丹　五灵脂姜汁煮透　甘草燒酒煮透
焙乾為末每服五分置掌中用舌舐下此方
治膈氣反胃嘔吐梅核氣及胃脘疼痛効
治虚之劑
丹溪云久病嘔者胃虚不納穀也

〈四卷　三

生姜　人参　黄芪　白术　香附之類治之
李浲治反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困倦無力
垂死者以人参三兩作一服水煮帶熱頓服愈
理中湯　治脾胃虚寒嘔吐不食
調中湯　治脾胃虚弱嘔吐
治中湯　治霍乱吐瀉 即理中湯加橘紅青皮各一兩是也
六君子加砂仁治脾胃虚弱悪心欲吐及吐食或不思食
治積氣之剤
遇仙丹　木香拡榔丸　枳實導滞丸　七聖丸
皆可選用
治風痰之剤
金花丸　吐食而脉弦肝乗脾也由脾胃之虚宜
治風安胃　半夏湯泡一兩　檳榔二銭　雄黄一銭半
右末姜汁浸蒸餅糊為丸桐子大小児另丸
姜湯下従少至多漸次服之以吐止為度風
痰羈絆於脾故飲食不下也
治水飲之剤
小半夏湯　治嘔吐穀不得下者

半夏一斤　生姜半斤　水七升煮取一升半分温再服
小半夏加茯苓湯　治卒嘔吐心下痞膈閉有水
眩悸者即前方加茯苓四兩
大半夏湯　治胃反嘔吐服前小半夏湯諸薬不
愈者此胃虚宜以甘益之服此立愈
半夏二斤　人参三兩　白蜜一斤　右水一斗三升和蜜揚
之二百四十遍煮薬取三升従服一升餘分再服
猪苓湯　治嘔吐而病在膈上後思水解急與之
思水者此湯主之　猪苓　茯苓　白术各等分
為末飲調方寸匕日三
胃風
胃風之症治嘔愈嘔者是也用川烏一兩洗浄去
皮臍不去尖以漿水一碗煮乾毎枚切作二片
復用漿水一碗煮盡更切作四片毎細嚼一片
以少温水下少頃嘔遂止此皆好食甘甜之物
膏粱之味積久成熱因而生風非一朝一夕之故也
雑方碧霞丸　治吐逆立効
黄丹四兩篩過用好米醋半斤用薬入銚内煎

乾却用炭火三斤就銚內煆透紅冷取出研細末用粟米飯擣為丸梧子大煎醋湯下七丸効

木瓜湯　主嘔噦風氣又吐而轉筋者煮木瓜汁飲之甚良此酸收之剎欲吐不吐者是也

惡心

丹溪云惡心有熱有痰皆用生姜隨症用藥

仲景生姜半夏湯　治胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無柰者

半夏半斤　生姜一斤取汁　右二味以水三升煮半夏

取二升內生姜汁同煮二升半少冷分四服日三夜一如病止住後藥　此溫痰症也

東垣茯苓半夏湯　胃風虛弱身重有痰惡心欲吐是邪氣羈絆于脾胃之間當先實其脾胃

炒麪三錢　大麥芽炒黃五錢　陳皮　天麻各二錢　白朮

茯苓　半夏各一兩　、每五錢姜五片煎熱服

柴胡半夏湯　治舊有風症不敢見風眼澁眼黑胸中有痰惡心兀兀欲吐但遇風覺皮肉緊手足難舉動重如石若在暖室少出微汗其症隨減再遇風病復如是　方見痰門

嘔苦水

丹溪治一婦人清早嘔苦水脉濇而微起轉如常此胃弱而上脘有濕

黃芩七錢　滑石　蒼朮炒　陳皮　山查　半夏各兩

桔梗五錢　飛礬二兩　姜水煎服

二陳湯加山梔子一倍黃連減半香附撫芎白豆仁煎服或臨服時磨檳榔末少許治鬱火惡心

嘔沫　反胃症沫大吐者多死予目擊十數人矣

仲景治乾嘔吐逆吐涎沫半夏乾姜散主之

半夏　乾姜各等分　二味為末取方寸匕漿水一升煎七合頓服之

嘔膿　予一族嫂中年患此半載亥救嘔膿血後竟無事此亦肺癰症也膿盡即愈

仲景云嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

嘔長虫　、、

丹溪治吐虫用黑錫灰檳榔末米飲調下

仲景治蚘厥當吐蚘今病靜而復時煩此為臟寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者聞

食臭出其人當自吐蚘

蚘厥者 烏梅丸主之又主痢 方在厥證門

傷酒嘔吐

東垣葛花解酲湯 方見傷飲門

益元散姜汁為丸治酒熱嘔惡殊驗

乾姜丸 治酒癖成飲吐酸水

乾姜 葛根 枳殼 橘紅 前胡各五錢 半夏 麴 白朮各一兩 吴茱萸 甘草各二錢半

右末煉蜜丸桐子大每三十丸米飲下

嘔吐清水

許學士神朮丸 治嘔吐清水如神

蒼朮一斤去皮切片為末用白芝麻半兩水二盞研濾取汁大棗十五枚煮爛去皮核以芝麻汁研勻成稀膏搜和入臼搗熟丸如桐子大每空心溫湯下五十丸加至百丸忌桃李雀鴿初服時膈上微燥且以茅朮製覺燥甚再進山梔子散一服久之不覺燥也

山梔散 山梔一味乾之為末沸湯點服

仲景茯苓散 治心胸中有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣滿不能食消痰氣能飲食

人參 白朮 茯苓各三兩 枳實二兩 陳皮五錢 生姜三兩 右水煎溫服如人行八九里許又進之一日三服

丹溪治兩手脉弦飲後嘔清水

神麴 蒼朮 香附各五錢 益元散一兩 半夏七錢半

右末姜汁浸蒸餅為丸

丹溪治一人年四十因灸艾火太多病腸內下血糞肚痛今痛自止善嘔清水食不下宜清胃口之熱

黄芩 甘草 茯苓各五分 陳皮 地黄各一錢 白朮 連翹各一錢半 姜三片水煎服

仲景治渴欲飲水水入則吐名曰水逆五苓散主之

千金方治痰飲吐水無時節者其原因冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消于飲食飲食入胃則皆变成冷水反吐不停皆用赤石脂散主之

赤石脂一斤研細末每服方寸匕酒飲調下時稍加至三匕服盡一斤終身不吐痰水又不下痢補五臟令人肥健有人痰飲服藥不愈

用此方愈經云諸病水液澄澈清冷皆屬于寒是也

白荳蔻散　治胃口寒作吐及作痛者

白荳仁三錢為末酒送下効

噎膈

内經陰陽別論篇曰三陽結謂之膈結謂熱結也三陽者小腸膀胱也小腸熱結則血脉燥膀胱熱結則津液涸故膈塞而不便焉其始也或由飲食不節痰飲停滯或因七情過用脾胃内虚而作或者不察悉指為寒例用香熱之藥治之反動七情之火脾胃之陰反有所耗是以病日益深今治此疾或見咽嗌閉塞胸膈痞悶似屬氣滯然有服耗氣藥過多中氣不運而致者當補氣而自運有大便燥結如羊屎者似屬血熱然有服通利藥過多致血耗竭而愈結者補血潤血而自行有因火逆冲上食不得入其脉洪大有力而數者有痰飲阻滯而脉結濇者當清痰泄熱其火自降又有脾胃陽火衰弱其脉沉細而微者當以辛香之藥溫其氣仍以益陰養胃為之輔可也大槩又有寒熱之辨若食已即吐者火也食久始吐者寒也王註曰食不得入是有火也食入復出是無火也按內經王註曰少陽一陽也陽明二陽也太陽三陽也一陽膽與三焦二陽大腸與胃三陽小腸膀胱張子和乃曰三陽者大小腸膀胱也并大腸而言不知後何所據耶

傷寒論云食入反吐穀不得前者胃水乾也王水曰病嘔而吐食久反出是無水也此與内經病能篇註異

氣厥論云膈中陽氣與寒相薄故膈食而陽氣不通此論亦云陽與寒相薄未嘗專主于寒也

丹溪曰大率屬血虛氣虛有痰血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無力有痰者脉必沉或伏而大又有氣滯結者寸關沉而濇又有擊跌内積瘀血忽然嘔吐食不能納者其脉必芤

張鷄峰曰噎當是神思間病惟内觀自養庶或可安又曰噎生于血乾血陰也陰主靜内外兩靜則臟腑之火不起而金水二臟有養陰血自生腸胃津液傳化合宜何噎之有

古方用人參以補脾御米以解毒竹瀝以清痰乾姜以養血粟米以實胃蜜以潤燥姜以去噦有氣結者用開導之劑有陰火上炎者作陰虛治有積血者當消息去之

糞如羊屎者不治五十以上者不治口中多出白沫者不治

治法大槩用童便韭汁姜汁竹瀝牛羊乳氣虛入四君子湯血虛入四物湯切不可驟用辛燥之藥宜薄滋味宜用乾蒸餅等物少用湯粥

六節藏象云人迎四倍以上為格陽盖陽上之極故格拒而食不得入

金匱云病人脉數數為熱當消穀引飲而反吐者以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在于上醫反下之今脉反弦故名曰虛

趺陽脉浮而濇浮則為虛濇為傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而濇其病難治

氣虛胃反右手脉無力者

四君子湯加蘆根　以伏龍肝浸長流水澄清煎之臨服入童便韭汁牛羊乳入黑驢尿和服以防其生虫

參苓白术散　錢氏白术散皆治中氣虛弱胃反

血虛胃反左手脉無力者以四物湯加童便或再加桃仁紅花　有酒積加甘蔗汁

二陳湯合平胃散　治有痰而胃反者

人參利膈丸　治胸中不利痰嗽喘滿而膈

木香　檳榔各七錢半　人參　川歸　藿香

甘草　枳實各一兩　大黃酒浸　厚朴各二兩

右末滴水丸梧子大温水送下

千葉白木槿花陰乾為末陳皮湯調下三五口不轉再服

奇方

未出毛啄木鳥　蝙蝠　小鮎鴨魚　三味入新瓦內鹽泥固濟煆存性為末外用狗寶為末和勻每服五七分漸至一錢姜湯下

又方 陳蜆殼燒灰米飲下
老牛涎如棗核大水中飲之終身不復噎
又方 芦根 茅根各二兩 水四鍾煮二鍾頓服之良
姜附散 膈氣不通胸膈悶結塊大如拳堅如石
嘔吐惡心飲食不下
香附子一斤 生姜三斤 搗取汁浸香附一宿晒乾再
浸再晒以姜汁盡為度為末每二錢米飲下
病機紫沉丸 治中焦吐食由食積與寒氣相格
故吐而痛 半夏麹 代赭石 砂仁各二錢
杏仁 沉香 木香 白朮各一錢 烏梅仁
丁香 檳榔各二錢 陳皮五錢 巴豆霜另研 肉果各五分
右末醋糊丸黍米大每五十丸柿霜湯下愈
東垣厚朴丸 主反胃吐逆飲食噎塞氣上冲腹
中諸疾藥味即與萬病紫菀丸同
厚朴 蜀椒去目微炒 川烏炮去皮 各一兩半 紫菀 吳茱
萸 柴胡 菖蒲 桔梗 茯苓 官桂
皂角去皮弦炙 乾姜炮 人參各二兩 黃連二兩半 巴豆霜
五錢 右蜜為丸桐子大每服三丸漸加至五七丸

以利為度姜湯下食後而卧此丸治効與局
方溫白丸同及治處暑已後秋冬下痢大効
加減法 春夏加黃連二兩 秋冬再加厚朴二兩
如治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲
茯苓各一兩半 如治風痛不愈者依春秋
加藥外更加人參菖蒲茯苓各一兩半 如
心之積加菖蒲茯苓為輔 如肝之積加柴
胡蜀椒 如肺積加黃連人參 如脾積加
茱萸乾姜 秋冬久瀉不止加黃連茯苓
脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲不下用粟
米半升為粉水丸梧子大煮令熟點少塩空
心和汁吞下
本事云驢尿極治反胃外臺載昔幼年經患此疾
每食餅及羹粥須臾吐出貞觀中許奉御兄弟
及柴蒋等時稱名醫奉勅令治醫竭其術竟不
能療漸至羸憊死在旦夕忽有士云驢尿極驗
旦服二合後食惟吐一半晡時又服二合人定
時食粥吐則便定後奏知大內中五六人患反

胃間服一時俱瘥此藥稍有毒服時不可過多盛取熱服二合病深者日服之良驗（本草云驢尿治癥癖反胃又云性冷味甘服之不生虫）

濟世方　驢尿調平胃散亦効

新瓦散　治反胃用多年瓦一片燒紅入驢尿内淬二十一次研末倉米飯焦為末二分飯末一分瓦末蠟精和飯丸以驢尿和平胃散服之

丹溪番胃方

黄連（姜汁炒三錢）山查肉（一錢）保和末（六錢）右粥丸桐

〈四卷　四五

子大以人參湯入竹瀝再煎沸熱下六十丸

本事大黄湯　治冷涎番胃其症欲發時先流冷涎次則吐食此乃勞証治不早死在旦夕用大黄一两生姜自然汁半茶盞炙大黄令燥又淬入姜汁内如此淬汁盡切焙為末每服二錢陳米一撮葱白二莖水一大盞煎七分先食葱白次服藥不十日即除根

羅太無云　玄明粉（硝提入九次入瓦罐煅成汁不尚再加頂火煅）其煅過净硝一斤入甘草末一两和匀名曰玄明粉每用一二錢桃花湯或葱白湯調下治膈上氣壅滯五臓秘結邪熱　忌魚及麪

丹溪治番胃積飲通用益元散生姜自然汁澄清白脚丸小丸子時時服　治番胃用吴茱萸貝母瓜蔞根牛膝草

本事治積聚停飲痰水生虫久成反胃及变為胃癰其說在靈樞及巣氏病源芫花丸

芫花（醋炙一两）牛膝　狼牙根　桔梗（炒）藜蘆（炒）檳榔（各五錢）巴豆（大粒炒黑）右末醋糊丸如赤豆大

〈四卷　四六

每服二三丸加至五七丸食前姜湯下

此方常服化痰消堅殺虫予患飲癖三十年暮年常是多雜痰飲来潮遲即吐有時飲半杯酒即止蓋合此症也因讀巣氏病源論酒癖云飲酒多而食穀少積久漸瘦其病常欲思酒不得酒則吐多睡不復能食是胃中有虫使然名為酒癖此方治之要之須痛禁酒則易治不禁無益也

羅太無桂香散　治膈氣反胃諸藥難瘥朝食暮

吐甚者食已輒出其効神速此重劑也

水銀　黑錫各三錢　硫黄五錢　右三味銚內用桫木搥袭研微火上細研為灰取出後用丁香末二錢桂末二錢生姜末三錢都一處研令匀每服三錢米飲調下一服効甚者再服神効

又云男婦小兒遠近畨胃吐食或有污血停蓄胸膈者方用五靈脂一味為末以黄狗膽汁為丸龍眼大每服一丸好酒半盞温服不止再服即効

丹溪治東陽王仲延咽膈間常覺有物悶悶每食

物必屈曲自膈而下且梗澁作微痛食亦减他無所苦予脉之右甚澁而闗甚沉左却和予曰污血在胃脘之口氣因而鬱為痰此必食物所致明以告我彼不自覺予又曰汝去冬好食何物為多曰我每日早必单飲點剗酒兩三杯逼寒氣為製一方用生韭汁半盞令細呷之一日三服盡韭二斤而安

濟世方　治噎食

鷄腹內穀袋不拘多少不可失已內物一粒用泥固濟火煅存性用姜汁炒香附末半兩配穀袋一箇為末神麹糊為丸姜湯送下

治氣噎不下飲

枇杷葉去毛　青皮　陳皮去白

右等分每服三錢生姜五片水煎服

金匱玉函　五噎心膈氣滯煩悶吐逆不食

蘆根五兩剉水三大盞煑二盞温服

永徽中有僧惟則病噎不能食為諸弟子曰吾死後便可開吾胷喉視有何物自經而卒弟子果

開喉胸中得一物形似魚而有兩頭遍體皆肉鱗弟子置碗中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中盛藍作澱適有一僧以澱置碗中此虫遂遶碗而走須臾化為水此乃虫瘕非噎比也此後人多以藍治噎候矣

秘方潤腸膏　治膈噎大便燥結飲食良久復出及朝食暮吐暮食朝吐其功甚捷

新取威靈仙四兩搗汁　生姜四兩取汁　真麻油二兩　白沙蜜四兩熬去沫　右四味同入銀石器內慢火熬成膏

時々以此挑食之良驗

雄黃二豆丸　治番胃噎食神驗

大烏梅二十枚水洗淨取肉　硇砂　雄黃各二錢　乳香一錢

真百草霜　黑豆　菉豆各四十九粒

右五味為細末烏梅肉搗丸彈子大每服一

丸噙化待一炷香時藥力方行烙白麪餅一

枚清熱湯泡開吃之無碍為妙設仍有微碍

一二日後再噙一丸三五丸除根

紫蘓子飲　欬逆上氣噎膈因怒氣呌喊未定便

挾氣進飲食或飲食甫畢便用性恚怒以致食

與氣相逆氣不得下或咳欬不透心氣逆悉心

蘓子炒　訶子煨去核　蘿蔔子微炒　杏仁去皮尖麸炒

人參　木香各一錢半　青皮　甘草炙各三錢

右分二服生姜三片水煎服

太倉丸　脾胃虛弱不思飲食番胃不食亦宜服之

砂仁　白豆仁各二兩　陳倉米一升用朝東向陽壁土炒去土不用

右末生姜自然汁丸桐子大每服百丸淡生

姜湯下

體仁彙編曰硫汞結成砂子吐逆立瘥方用嚴氏

青金丹治一切吐逆

水銀八錢　生硫黃一錢　為末入銚內慢火化開以

柳木棍攪炒或有烟焰以醋沃之結成砂子

再研為末用粽尖杵和丸菉豆大每服三十

丸生姜陳皮煎湯送下

青金丹治反胃久藥不效及小兒吐不止者硫黃豆

錢為末入水銀二錢半同研無星為度每服二

錢先取生姜汁酒一盞煎熱調藥空心服調時

逐漸著酒緩調令勻服訖以被蓋出汗安

又曰人參治番胃之良　用人參二兩柏破每服

一兩水一鍾半煎四分熱服兼以人參汁煮粥

吃愈有人患番胃諸方不瘥只服人參而愈若

卒嘔吐逆凡粥飲入口即吐困弱為丸服良

劉宗厚曰按古治番胃諸方悉是香燥大熱之

藥皆不足為法今姑採一二方以備用耳至于

丹溪所言補血益陰潤燥和胃調中等藥雖無

其方自宜隨証設施觀其立論則思過半矣

治噎禁方

皂角黃三分每春夏雨后樹上生如菌樣　蘆根浮水上者三錢　橘紅七分　烏藥一錢　桔梗二錢　枳實八分　水二鍾煎一鍾先服一酒杯漸漸加之渣再煎

生生子曰噎膈之病氣鬱居多然亦有陰血不足者少壯之人日以酒色是耽胃中之火沸騰則上焦肺金先受邪矣金主降令者也火淩于肺津液成濁況又下竭腎水將何攝伏其火以下行耶經曰大便者腎之所主陰血既虧則大便燥結結則下焦閉而氣反上沖經曰幽門不通上沖吸門又曰肺出氣腎納氣虛則失司乃職是有陽而無陰有升而無降也故守真子和丹溪皆以火熱而言戒用剛燥其意深矣然用藥必假滋陰潤燥為主陰血生則大便潤潤則下焦開開則氣降腎司職而病尋愈矣噫用藥之法固為詳悉然人不能鉄石其心斷酒色則雖日飲瓊漿亦莫能以致其生也予特附于篇末俾病者自加珍重孰非愈病之藥石耶

腰痛門

腰痛有腎虛有濕熱有痰有氣滯有跌撲瘀血

脉大而無力為虛弦為陰虛濇為死血沉滑為痰沉細為氣濡弱為濕緊數為風

東垣曰大抵寒濕多而風熱少然有房室勞傷腎虛腰痛者是陽氣虛弱不能運動故也經曰腰者腎之腑轉搖不能腎將敗矣宜腎氣丸茴香丸之類以補陽之不足也膏梁之人久服湯藥醉以入房損其真氣則腎氣熱而腰脊痛不能舉久則髓減骨枯發為骨痿宜六味地黃丸滋腎丸鳳髓丹之類以補陰之不足也

丹溪曰久痛必用官桂以開之方止腹脇痛亦然

煨腎丸　肝腎脾損穀不化治宜益精緩中消穀腰不起者神効

川萆薢　杜仲薑汁炒　牛膝　破故紙　芦芭

兔絲子　肉蓯蓉　沙苑蒺藜各一兩　桂心兩半

右酒煮猪腰子為丸桐子大每服五七十丸空心塩酒送下

金剛丸　腎損骨痿不能起床
川萆薢　杜仲炒　照前法丸服
麋茸丸　腎虛腰痛不能轉側
麋茸一两鹿茸亦可用　兎絲子一两　舶上硫黄五錢
右末以羊腎二對酒煮爛去膜研如泥和丸
梧子大陰乾如羊腎不敷入酒糊佐之每服
三五十丸温酒或盐湯下
鹿角散　新角刮去黑皮取白者炒黄為末酒服
一錢日進三服禁生魚餘不禁陳者不用角中

心黄亦不用此方治腰痛神効東垣曰鹿角能去悪血
羊腎散　羊腎為末酒服一錢日進三服本草云
羊腎補腎氣益精髓
腎氣丸　茴香丸　青娥丸　已上皆補陽之不
足也
八味丸　治虛勞小腹拘急小便不利此則陰陽
兼補也
六味地黄丸　虎潜丸　滋腎丸　大補丸
已上皆補陰之不足也

治陰虛脉大者
杜仲　亀板　黄栢　知母　枸杞子　五味
子　等分為末以猪脊髓為丸每服五七十丸
空心盐酒送下
補腎丸　治腎虛腰痛効
烏藥葉本草云烏藥嫩葉補中益氣　側栢葉
右酒蒸晒乾為末粥丸梧子大照前服
腰腿湿痛方
亀板酒炙五錢　黄栢酒炙四錢　青皮三錢　甘草生一錢半

右末研姜一大片次入藥末一錢研細以蒼
耳汁煎令沸服
治陰虛性急腰痛者
亀板　黄栢　知母　側栢
右為末地黄膏為丸
治湿熱腰腿疼痛
亀板酒炙二两　黄栢酒炒　蒼术　蒼耳子多两　一　側栢半两
威灵仙酒浸一两　右以牛膝膏為丸以黑豆汁煮
四物湯加陳皮生甘草生姜一片煎呑下

又方 治腰腿疼痛
龜板（一两半） 黄栢 白芍藥（各一两酒炒） 陳皮 知母
葳灵仙 蒼朮 蒼耳子（各半两） 為末蜜丸服
治湿熱腰痛大便瀉
龜板（一两酒炙） 楮皮（炒） 蒼朮 滑石（各半两） 芍藥（酒浸）
香附（各四钱） 為末粥丸如内傷白朮山查湯下
東垣蒼朮湯 治湿熱腰腿疼痛
蒼朮（三钱去湿止痛） 柴胡（二钱行经络） 防風 黄栢（各一钱）
水煎空心服

陳無擇牛膝酒 治傷風毒攻刺腰痛不可忍
牛膝 川芎 羌活 地骨皮 甘草 薏苡
仁（各一两） 海桐皮（二两） 生地黄（十两） 俱以絹袋盛入
好酒二斗浸二七日夏三五日每服一杯一
日三四服常令酒氣不絶為佳一法（入杜仲一两）
治痰痛以二陳湯加天南星川栢蒼朮葳靈仙（之類）
丹溪治老人因跌撲腰痛
蘇木（一钱） 歸身頭 陳皮（各一钱） 人参 黄芪
木香 木通（各五分） 桃仁（九枚）

煎湯送下自然銅末子五分
脉濇者有瘀血也用熟大黄湯治墜墮閃肭腰痛
不能屈伸 大黄（如指大） 生姜（各半两切片）
二味炒令焦黄以水一鍾浸一宿五更去渣
服天明取下如鷄肝者即惡血也
治食積腰腿痛
龜板（酒炙） 側栢葉（酒炒） 香附（五钱） 白芥子 凌霄花（一钱半）
右酒糊丸以四物湯加陳皮甘草山查蒼朮
青皮煎湯下

痰積食積指下有力或沉滑有力皆宜下之
治腰痛用葳靈仙此治痛之要藥為細末每服二
錢以猪腰子一枚批開掺藥在内湿紙煨熟五
更細嚼熱酒下
千金方用葳灵仙一錢温酒送下逐日以微利為
度病人稍虚者禁用
治腰痛不可忍
牽牛不以多少研取頭末去渣取大蒜每一瓣
切開入巴豆一粒在内外用湿紙包定火煨令

蒜熟去巴豆將蒜細研和牽牛末為丸梧子大
每服五丸醋湯或茶空心送下量虛實服

藥棋子　治腰痛氣滯者

黑牽牛不拘多少以新瓦火燒赤便以牽牛倒在瓦上自然一半生一半熟不得攪動取頭末一兩入硫黃一分同研勻分三服每用白麵一匙水和捏如棋子樣五更初用水一盞煮熟送下痛住即止未住明日五更再服

許學士曰予嘗有此疾每發只一服痛立止

〈八四卷〉　三七

按此二方皆濕熱痰氣壅滯不能流通故痛猛而用藥峻也此樣方法亦不可無但看病虛實用之

獨活寄生湯　治腎虛弱卧冷濕地腰腿拘急筋骨攣痛或當風取涼過度風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼痛

獨活　杜仲　牛膝　細辛　秦艽　茯苓
桂心　防風　川芎　人參　甘草　桑寄生各一兩半　當歸　熟地各二兩　一方加續斷三兩

每服三錢姜五片水煎食前服

王海藏防風湯　治傷寒後腰痛或皮肉痺及腿膝疼痛行步艱難不能俛仰

防風　川芎　附子炮　當歸　芍藥　羌活
續斷各一兩　麻黃去節　桂枝去皮　杜仲炒各七錢　牛膝　五加皮　丹參各五錢　每五錢姜二錢煎食前服

此二方皆治寒濕之劑也

東垣川芎肉桂湯　卧寒濕之地腰痛不能轉側兩脇搐急作痛月餘不愈腰痛論中所說皆為足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二症屬少陽膽經外絡病皆宜去血絡之凝乃愈

〈八四卷〉　三八

羌活一錢半　柴胡　肉桂　蒼木　歸梢　甘草炙
川芎各一錢　獨活　麴炒各五分　防風　防已各三分
桃仁五個去皮尖另研　水酒煎食遠熱服

陳無擇曰小續命湯加炒桃仁治風腰痛最妙

五積散加桃仁治寒濕腰痛

東垣羌活勝濕湯　治脊痛項強腰似折項似拔此足太陽經不行也

羌活　獨活　槀本　防風各一錢　蔓荊子三分

川芎二分　甘草炙五分　水二鍾煎溫服

若身重沉〻然及經中有濕熱也此方加黄栢一錢太附子五分蒼术二錢

予嘗治一人腰下濕中宮有痰腰痛而小便白濁身重如山乃以二陳湯合五苓散以蒼术換白术加羌活服之効有熱再加黄栢木通

陳無擇桃仁酒　腎虚風劳所傷毒腫掣痛牽引小腹連腰痛桃仁麸皮炒去皮尖研細每服一

錢熱酒調下出汗即愈

東垣地龍湯　腰脊痛或打撲傷損從高墜下悪血在太陽經中令人腰膝痛或脛腨臂膞中痛不可忍鼻壅塞不通

中桂四分　桃仁六箇　羌活二錢　獨活　甘草　黄栢各一兩

麻黄五分　地龍四分焙乾者　蘇木六分　歸尾一錢

每服五錢水煎食遠熱服

橘核酒　治打撲腰痛瘀血積蓄痛不可忍

用橘核炒去皮研細每服二錢酒調下或用猪腰子一枚去筋膜破開入藥同葱白茴香鹽以濕紙包煨熟嚼下溫酒送之已上二方皆該入前打撲瘀血条下

摩腰丹　治老人腰痛及婦人白帶

附子尖　烏頭尖　天南星各一錢半　硃砂　樟腦

丁香各一錢半　乾姜一錢　射香三分　雄黄一錢半　為末煉蜜丸如圓眼大臨用以生姜汁化開如厚糊様火上烘热抹掌上擦腰中候藥盡貼腰上即烘綿衣縛之俟腰熱如火隔二日用一丸

皂角膏　治諸腰痛脚痛

用皂角一斤去皮弦搗碎好酒二大碗熬去一半濾去渣再用前汁入磁瓶内熬為膏子隨痛處貼之

如神湯　治男婦腰痛

玄胡索　當歸　桂心　杜仲各半分

為末酒調下三錢甚者不過數服

橘核散　治腰痛諸般滞氣

橘核　乳香各五錢　破故紙二兩　山查　玄胡索

菴蕳　沒藥　五加皮　紅麯各一兩

為末酒調下
丹溪治癃疾初安因冲風又發腰痛兼又白濁已與人參白术檳榔半夏等補藥又教以煆牡蠣一錢木通五分炒栢三分入前藥同煎服
痢後腰痛兩脚無力
陳皮　半夏　白芍一錢　茯苓　蒼术　當歸
黄芩酒炒五分　白术二錢　甘草炙乙錢
姜三片煎食前服
四卷終

赤水玄珠第五卷目録

水腫門
水脹通論　論水氣証治大法
脉經叙諸水形証　羅太無治許晝齊藥案
仲景治水大法
脹満門一名鼓脹
鼓脹說　虫蠱
痞氣門

新安生生子孫一奎集

水脹通論

靈樞經曰水穀入于口輸于腸胃其液別為五天寒衣薄則為溺與氣天熱衣厚則為汗悲哀氣并則為泣中焦胃緩則為唾邪氣內逆則氣為之閉塞而不行不行則為水脹余知其然也不知其何由生願聞其道岐伯曰五穀之津液和合而為膏者內滲入於骨空補益腦髓而下流於陰股陰陽不和則使液溢而下流于陰髓液皆減而下下過度則虛（下過度謂房勞過度也）故腰背痛而脛痠陰陽氣道不通四海塞閉三焦不瀉津液不化水穀并行腸胃之中別于迴腸留于下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則為水脹

黃帝問于岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯荅曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脉動時欬陰股間寒足頸腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客于皮膚之間鼟鼟然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅然而不起腹色不變此其候也鼓脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內著惡氣乃起瘜肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候

也石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒氣客于子門子門閉塞不得通惡血當瀉不瀉衃以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生于女子可導而下帝曰膚脹鼓脹可刺耶岐伯曰先刺其脹之血絡後調其經刺去其血絡也

石水臍以下腫其脉沉

本事方云臍腹四肢悉腫者為水但腹脹四肢不甚腫為蠱（蠱即鼓脹也）

綱目云水脹皆本于房勞過度

水腫出素問水熱穴論

黄帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病岐伯曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢于皮膚故為胕腫胕腫者聚水而生病也帝曰諸水皆生于腎乎岐伯曰腎者牝臟也地氣上者屬于腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚腎汗出

〈五卷　三〉

腎汗出逢于風內不得入于臟腑外不得越于皮膚客于玄府行於皮裏傳為胕腫本之于腎名曰風水所謂玄府汗孔也帝曰水俞五十七處者是何主也岐伯曰腎俞五十七穴積陰之所聚也水所從出入也尻上五行行五者此腎俞故水病下為胕腫大腹上為喘呼不得卧者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得卧分為相輸俱受者水氣之所留也肺腎之標本其上下分為相輸相應之病而俱受者緣此二臟乃水氣之所留故也伏菟上各二行行五者此腎之街也三陰之所交結于脚也踝上各一行行六者此腎脉之下行也名曰太衝凡五十七穴者皆臟之陰絡水之所容也

尻上五行行五

脊中一　懸樞一　命門一　腰俞一

長强一　大腸俞一　小腸俞　膀胱俞二

中膂内俞　白環俞二　胃倉二　肓門二

志室二　胞肓二　秩邊二

伏菟上各二行行五

〈五卷　四〉

中注二　四滿二　氣穴二　大赫二　横骨二

外陵二　大巨二　水道二　歸來二　氣衝二

踝上各一行行六

太衝二　復溜二　陰穀二　照海二

交信二　築賓二

甲乙經云身腫關門主之　水腫脹皮腫三里主之　風水膝腫巨虛上廉主之風水面胕腫顏黑解溪主之　風水面胕腫衝陽主之水中留飲胸脇支滿刺陷谷出血立已面胕腫上星主之先取譩譆後取天牖風池

水腫人中盡滿唇反者死水溝主之　水腫大臍平灸臍中無理不治

內經曰三陰結謂之水王註云謂脾肺之脉俱寒結也　又曰下焦溢而為水王註曰下焦為分注之所氣窒不瀉則溢而為水

黃帝問曰有病腎風者面胕龎然壅害于言可刺否岐伯曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至帝曰其至何如岐伯曰至必少氣時熱時熱從胸背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃

目下腫難以行月事不來煩而不能食不能正偃正偃則咳病名曰風水論在刺法中帝曰願聞其說岐伯曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必湊之故水氣時熱而汗出也小便黃者少腹中有熱也不能正偃者胃中不和也正偃則欬甚上迫肺也諸有水氣者微腫先見于目下也曰何以言之岐伯曰水者陰也目者亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫也真氣上逆故口苦舌乾卧不得正偃正偃則咳出清水也諸水病者不得卧卧則驚驚則咳甚也腹中鳴者病本于胃也薄脾則煩不能食食不下者胃脘膈也身重難以行者胃脉在足也月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也

針經曰肢脛者人之管以趨翔也莖垂者身中之機陰精之候津液之道也故飲食不節喜怒不時津液內溢乃下流于睾血道不通日大不休俛仰不便趨不能止此榮然有水上不下也

劉宗厚曰按內經諸水氣皆諸臟本病也針經所引則又主飲食及七情等因皆致之可見病机之微矣但有濕腫氣腫初亦頗相似然以手按之成凹不即起者濕也濕與水有微甚之意況有氣腫及諸水形証不同要在臨症詳審也

水腫有陽水陰水之分若脉來沉伏面色青白不煩渴小便澁而清大便溏泄為陰水治宜實脾脉來沉數面色赤黃或煩渴小便赤而難大便秘治宜疎氣蕩滌

論水氣証治大法

内經曰不從毫毛病生于内者陰氣内盛陽氣竭絶不得入于腹中故言五臟陽以竭也津液者水也充郭皮中陰蓄于内水氣脹滿上攻于肺肺氣孤危䰟者肺神腎為水害子不救母故云其䰟獨居也夫陰精損削于内陽氣耗減于外則三焦閉溢水道不通水滿皮膚身体否腫故云形不可與衣相保也凡此之類皆四肢脉数急而内鼓動于肺中也肺動者謂氣急而欬也

如是者皆水氣格拒于腹膜之内浮腫施張于身形之外欲窮標本其可得乎平治權衡謂察脉浮沉也脉浮為在表脉沉為在裡在裏者泄之在表者汗之故云開鬼門潔淨府也去宛陳莝謂去積久之水物猶如草莝之不可留也身

劉宗厚曰按經論水氣証治至為机審故云開鬼門潔淨府然鬼門者猶幽玄之謂有毛竅而不見其開闔邪氣感入邪與正相搏毛竅閉塞而寒熱作為病客于表故宜發汗遣邪氣以開鬼門也此亦發汗之別稱泄諸病在表之通例也淨府者謂膀胱内無入孔而外有出竅為清淨津液之府憑腎氣蔵氣化水穀之精而滲入膀中氣約成溺出也夫腎主下焦司閭闢開竅二陰肺脾之氣通調水道下輸膀胱氣化水行而自清淨否則便澁或濁或淋為水氣溢于腠理為膚腫諸病若宛莝陳莝壅滞于身中當泄去是物而潔淨宜此二法在表者汗之在裏者泄之權衡予治也雖然經云水病本之于肺腎二

經而古今方論並不以治水獨瀉腎氣為説者何蓋腎陰奉行降令為生化之源而常不足至陰精損削于内生氣不能運化至為胕腫其氣索矣况肺弱而母氣孤危若乎故東垣曰若治以甘淡滲泄陽藥獨陽無陰其欲化得乎此探擷巳上治例之妙也如積飲留飲傷脾若土之于雨中則為埿矣或因七情所致手足太陰俱病身浮腫似水氣用燥脾導氣之劑即愈一則若埿土之得和風暖日水濕去而陽化自然萬

物生長一則肺氣開泄滲道通利水氣不濡于脾矣此正諸濕腫滿皆屬脾土諸氣膹鬱皆屬于肺而與陰陽為病水氣机之不同故亦不待開鬼門潔淨府而已也

原病式謂水腫為濕熱實甚故治以辛苦寒藥蓋以辛散結而苦燥濕以寒除熱而隨其利濕去結散熱退氣和而愈而謂脾虛不能制水之說

丹溪以水腫由脾虛不能制水故水漬妄行當以參朮補脾使脾健則自能轉運而水自行但宜

補中行濕利小便為上

劉宗厚曰按劉河間以水腫為濕熱謂在表有熱宜汗謂在裡有熱宜下治法宜開鬼門潔淨府蓋言有餘之證然也丹溪以脾虛不能制水治當補中行濕利小便蓋言不足之證然也若夫滋腎制火之說愚切以為未當蓋補腎之藥乃陰滯柔潤適以滋濕耳豈理也哉今治此證但脾虛受濕為不足所致者宜燥脾土兼利小便若非氣鬱飲食濕熱所致者禁不得妄下證雖可下又當權其輕重不可過用芫花大戟甘遂猛峻之劑暫時快利水氣復來而無以治之也少壯充實脉洪大有力者當瀉其水年老虛人得此惟當補中行濕為先設或元氣下陷者即又當升提之

古方十種證候以短氣不得臥為心水兩脇疼痛為肝水大便鴨溏為肺水四肢苦重為脾水腰痛足冷為腎水口苦咽乾為膽水乍虛乍實為大腸水腹急肢瘦為膀胱水小便秘澀為胃水

小腹急滿為小腸水以此十水為正水外有風水皮水石水黃汗風水又有風腫氣腫血腫風腫者皮粗麻木不仁走注疼痛氣腫者皮厚四肢瘦削腹脇脹膨至若煩躁漱水迷忘驚狂嘔逆煩悶皮間有紅縷赤痕者此血腫也婦人經脉壅閉敗血停腐尤多見此妊娠亦有氣遏水道而虛腫者此但順氣安脾飲食無阻既產而腫自消若產後發虛則虛退而告殂矣

大抵浮腫之脉帶數即是虛寒潛止其間久必沉

伏沉伏則陽虛陰實為水必矣　面龐然浮腫疼痛其色炲黑多汗惡風者屬腎風治見

諸唇黑則傷脾缺盆平則傷心臍出則傷肝足心平則傷腎背平則傷肺凡此五傷必不可治

大凡水腫先起于腹而後散于四肢者生先起于四肢而後入腹者死至若鼓脹而肚上青筋脹滿而大便滑泄久瘧而轉作虛浮又兼見前五傷則死矣與夫男從腳上腫而上女從上腫而下或肉硬或掌心平而無紋皆不治

論生死脈法

水病脈洪大者可治微細者不可治水病脹閉其脈浮大數者生沉細虛小者死水病腹大如鼓脈虛者死實者生

脈經敘諸水形症　原出金匱要略

病有風水有皮水有正水有石水有黃汗

寸口脈沉滑者中有水氣面目腫大有熱或身體反重而酸或惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出而無大熱者皆為風水風水其脈自浮外症骨節疼痛惡風

皮水其脈亦浮外証胕腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗皮水之為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者防己茯苓湯主之

○正水其脈沉遲外証自喘

石水其脈自沉外証腹滿不喘

黃汗其脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿

心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其人陰腫

肝水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時時津液微生小便續通

肺水者其身腫小便難時時鴨溏

脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面瘦

裹水者一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水也

仲景曰諸水身半以下腫者當利小便身半巳上當發汗經云身半以上天氣主之身半以下地氣主之天氣主之者其在皮也故汗而發之問肌肉之外皮膚之裏首至足一身皆腫者當作何治答曰亦宜汗之也與身半以上同法身半以上汗之者尺寸之天地也故汗之肌肉之外皮膚之裏一身盡腫者從天而汗之此表裡之浮沉凡治之法當如是也肺心肝腎中州巳上俱宜汗中州以下皆宜汗如小便利而渴不宜汗不宜下以其重亡津液故也

王海藏曰觀高低内外輕重表裡隨經補瀉要當謹察肺胃腎三經病即瘥也

夫水氣者胃土不能制腎水逆而上行傳入于肝故令人腫治者惟知泄水而不知益胃故多下之强令水出不依天度流轉故胃愈虚食不滋味則發而不能治也莫若行其所無事則為上計不可不知 凡補胃不可使之壅滯如本草叙赤小荳治水腫通氣補脾胃之類是也

羅太無治許魯齋藥案云魯齋年五十八向日駁體浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食减少脉得弦細而緩年少時多服牽牛大黄藥面日四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出自中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣營養臟府經絡皮毛故氣行而濇為浮腫大便溏多而腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五臟皆以胃氣為本五臟有胃氣則和平而安若胃氣虚弱不能運動滋養五臟則五臟脉不和平本臟之氣盛者其脉獨見輕則病過甚則病死故經曰真臟之脉弦無胃氣則死今幸未至於甚尚可調補人知服牽牛大黄為一時之快不知其為終身之害也遂以平胃散加白术茯苓草荳蔻仁數服而腹脹溏泄腸鳴時痛皆愈飲食進止有四肢浮腫以導滯通經湯主之良愈

導滯通經湯 治脾濕而氣不宣通面目手腿浮

陳皮 白术 桑白皮 木香各五錢 茯苓一兩

右每服六七錢水煎食前服霖雨時加澤瀉一兩

丹溪治水腫多以二陳加白朮人参蒼朮為主佐以黄芩麥冬炒梔子制肝木若腹脹少佐以厚朴 氣不運加木香木通 氣若陷下加升麻柴胡提之隨病加減必須補中行濕二陳治濕加升提之藥能使大便潤而小便長 産後必須以大補血氣為主少佐蒼朮茯苓使水自降用大劑白朮補脾若壅滿用半夏陳皮香附監之 有熱當清肺金麥門冬黄芩之屬 一方用山梔去皮取仁炒搥碎米湯送下一抄若胃熱病在上者帶皮用 治熱水腫山梔子五錢木香一錢半白朮二錢半取急流水煎服 水脹用大戟香薷濃煎汁成膏丸去暑利小水

大戟為末棗肉丸十丸泄小水劫實者

綱目述丹溪治水腫得効之法十五條其法大率以甘艸佐白朮参陳等劑補中氣為君木通滑石郁李仁海金沙行水為臣厚朴大腹皮蘿梗通滯氣為佐使如氣不升浮惡寒脉沉者探吐以提之頭面光腫加麻黄微汗之挾積氣者佐以保和温中抑青等丸磨之挾熱者佐以黄芩之類清之挾瘡癰者佐以連翹犀角散之而隨証加減也

仲景曰寸口脉沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏趺陽脉伏水穀不化脾氣衰則鶩溏胃氣衰則身腫少陰脉細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名曰血分

仲景治水大法

風水脉浮身重汗出惡風者防已黄芪湯主之

防已一两 黄芪一两二錢五分 白朮七錢五分 甘草五錢

右每服五錢生姜四片棗一枚水煎温服良久再服 腹痛加白芍藥

因濕為腫者前湯調下五苓散 又前湯治風濕脉浮為在表其人或頭汗出外無表証惟腰以下常重而腫難以屈伸腰以上俱和者並効

風水悪風一身悉腫脉浮不渴自汗出而無實熱者越婢湯主之 治裹水加白朮四两

麻黄去節六两 石膏半斤 生姜三两 大棗十二枚 甘草

兩二右五味以水六升先煮麻黄抹去上沫入諸
藥煮取三升分溫三服　惡風者加大附子
一枚炮　古今錄驗治風水加朮四兩
皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者
防已加茯苓湯主之
防已　黄芪　桂枝各三兩　茯苓六兩　甘草二兩炙
右五味水六升煮取三升分溫三服
裏水為病越婢加朮湯主之又甘草麻黄湯亦主
之　甘艸二兩炙　麻黄四兩去節　水五升先煮麻黄

去滓沫內甘草煮取三升溫服一升被覆出
汗汗不出再服慎風寒
水之為病其脉沉小屬少陰浮者為風無水虛脹
者為氣水發其汗即已脉沉者宜附子麻黄湯
浮者宜杏子湯
附子麻黄湯
附子一枚炮去皮切作八片　麻黄去節　甘草炙各二兩
水七升先煮麻黄再沸去上沫內諸藥煮取
二升半溫服八合日三服

陰陽結邪多陰少陽名曰石水小腹腫石水者謂
冬月水氷如石之時故曰石水也大墓于盛冬
陽氣微故石水而死也腎肝並沉為石水並浮為風水
黄汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗
沾衣色正黄如蘗汁脉自沉問曰從何得之以
汗出入水中浴汗從孔中入得之黄汗者黄芪
芍藥桂枝苦酒湯主之
黄芪五兩　芍藥三兩　桂枝三兩去皮　苦酒一升
水七升煮三升溫服一升當心煩也至六七

日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也
黄汗之為病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已
汗出又身常暮卧盜汗出者此勞氣也若汗出
已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止者必
生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身瞤瞤
即胸中痛又從腰已上必汗出下無汗腰下
弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩
躁小便不利此為黄汗桂枝加黄芪湯主之
桂枝去皮　芍藥各三兩　甘艸二兩炙　黄芪

右入棗十二枚擘以水八升煮取三升溫服
一升須臾飲熱稀粥一升以助藥力被覆取
汗不汗更服之
師曰寸口脉遲而澁遲則為寒澁則為虛不足趺
陽脉微而遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手
足厥冷則營衛不利營衛不利則腹滿脇鳴相
逐氣轉膀胱營衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣
不通則骨痛陽前通則惡寒陰前通則痺不仁
陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則
失氣虛則遺溺名曰氣分氣分心下堅大如盤
如旋杯水飲所作桂枝去芍藥加麻黃附子細
辛湯主之
桂枝去皮 浮生姜 麻黃去節 細辛略二 甘草炙
大棗十二枚擘 附子一枚炮去皮破八片
右水七升先煮麻黃去沫內諸藥煮取二升
分溫三服當汗出如虫行皮中愈
心下堅大如盤如旋杯水飲所作枳朮湯主之
枳實 白朮略三 右二味水五升煮取三升分

溫三服腹中耎即當散也
面目浮腫喘嗽痰涎葶藶大棗瀉肺湯主之
甜葶藶 苦葶藶等分 大棗
腰已下有水氣牡蠣澤瀉散
兩脇下有水氣腹中雷鳴生姜瀉心湯
十棗湯
大戟 芫花 甘遂略等分 大棗十枚
三花神祐丸
十棗湯加 牽牛 大黃 輕粉 水丸服
除濕丹
神祐丸加 乳香 沒藥
玄青丹
神祐丸加 黃連 黃栢 青黛
已上四方不可輕用必看其有實候乃用之
明理趂痛丸 治水氣浮腫又治脚氣上攻風毒
走注疼痛神効
白芥子桂為 肥甘遂去皮 生大黃各一兩末
右用白麵一兩半滴水丸作餅子慱令黃不

可過焦為末醋糊丸梧桐子大冷酒下二十
丸不拘時量虛實加減
紫菀散
木香　人參　白朮　紫菀　川芎各二兩
右粗末生姜烏梅煎服次日又一服
調胃白朮澤瀉散
治痰病化為水氣傳為水鼓不能食
白朮　澤瀉　芍藥　陳皮　茯苓　生姜
木香　檳榔各等分　一法加白朮本藥各半治
臍腹上腫如神心下痞者加枳實下盛者加檳榔
六　五卷　廿二
胡洽方　治支飲澼飲于十棗湯中加大黃甘草
五兩同煎服之故以相反之劑欲其上下俱去
也　郁李仁破澼氣能下四肢水　大抵去水
藥多泄熱當求脉之虛實下之
消腫散　治水氣喘呼不得臥煩熱燥渴大小便
不利　大黃蒸　山梔炒　甘草炙　乾葛　陳皮
麻黃　川芎　馬牙硝各等分　為末蜜湯調下二錢
又方　千金子二百五十粒姜三片滾水煎空心

服以利為度
集成尊重丸　治蠱証水腫氣腫喘急小水赤澁
大便秘結一切中滿單腹鼓脹
人參　沉香　丁香　木香　檳榔　車前子
葶藶子各四錢　胡椒　蝎梢　滑石　海金沙
赤茯苓　白豆蔻各一錢半　蘿蔔子六錢　郁李仁一兩二錢
右為末姜汁糊丸梧桐子大每服三丸姜湯
下一日服三次
簡易方　治蠱脹身乾黑瘦多渴煩悶
馬鞭草細剉曬乾勿見火以酒煮味出去滓溫
六　五卷　廿三
服立効不善酒者水煎亦可六月半時採
元戎神方
烏雞子一枚去頂取清黃汁調膩粉一大錢令
勻內殼中以蒸餅劑裹之蒸熟去殼取熟黃二
葶藶等分炒為末與上并黃蒸餅等為丸荳大
每服三五十丸車前子湯下小便澁不通瞿麥
湯下
又攻擊泄下之劑去菀陳莝之法也

許學士十腫水病并根源証狀方法

一青水先從左右脇腫起根在肝　大戟

二赤水先從舌根起根在心　葶藶子

三黄水從腰腹起根在脾　甘遂炒

四白水從脚腫起根在肺　桑白皮

五黑水從外腎腫起根在腎　連翹

六玄水從面腫起根在外腎　芫花醋炒

七風水從四肢腫起根在骨　澤瀉

八石水從腎腫起根在膀胱　藁本

九高水從小腹腫起根小腸　巴豆去皮油

十氣水或盛或衰起根在腹　赤小豆

右十般腫病各有根源種〻不同看十腫病根除一味倍多餘九味等分逐味依法脩治焙為細末煉蜜丸如梧子大用赤茯苓湯吞下三丸不拘時候每日三服忌鹽一百二十日緣鹽能化水也又忌魚鰕麵食一切毒物及生冷房室甚効用此方獲瘥後更服後来補藥

補藥方　肉桂去粗皮　乾姜　肉豆蔻　赤茯苓去皮

莪术醋煮　川芎　桔梗各等分　依法製服一方無茯苓莪术有青皮白术檳榔　俱等分為末每服三錢百沸湯點服空心食前日午晚各一服前項二方治水腫病甚効予試用之百發百中獲濟無數

治腫滿小便不利茯苓散

郁李仁四錢　檳榔二錢　白术一錢　赤茯苓一錢　甘遂切片炒一錢

陳皮半錢　右為末每服一錢姜棗湯調下

已上三方許學士試効者治水腫無逾此矣

雄黄神金散

雄黄　葶藶糯米一兩炒熟　澤瀉　椒目炒半　大戟

巴戟　茯苓　芫花醋浸一日炒　甘遂　桑皮各一兩

右為末空心用井花水調服每一錢加至五錢以利為度忌鹽醋生冷油膩之物

從脚腫加葶藶　肚腫加椒目　從陰腫加澤瀉　面腫加茯苓　從心腫根在肋加雄黄　從肢腫根在皮加甘遂　從口腫根在

小腸加巴戟　從腰腫根在腎加大戟　從
膝腫根在肝加芫花

三白散　治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫大二便不利

白丑二兩　桑白皮　白朮　陳皮　木通各等分

為末每服二錢空心姜湯調下小兒減半

秘方　治皷脹如神氣皷則放屁水皷則下水而愈

大戟　白商陸　甘遂各三錢　陳皮二錢　大腹皮

梹榔　白朮　海帶　海藻各二兩　為末每

用三錢和白麵三兩水拌做一塊分作三小

塊每塊捍碗口大薄餅一箇共作三箇無油

鍋內烙熟空心服一餅酒送下茶過口坐卧

忌風生冷油膩塩一箇月不能斷葷者不可

治也此藥試過每用一餅僅行水四五度並不度人

一方　用乾鷄屎一升炒黃好酒三碗淬下煮作

一碗絹濾去渣飲之少頃腹中氣大轉腸鳴從

大便利下脚膝及臍上下先皺起漸漸消至腹

如一次消不盡再服一劑以田螺二枚滚酒內

渫熟食之即止後以温粥調養而安

此方治一切水氣濕發腫効

三因消腫丸　治水腫喘滿小便不利

滑石　木通　白朮　黑丑炒　茯苓　半夏

陳皮各一錢　木香　瞿麥　丁香各五分

為末酒糊丸梧子大每五十丸灯心麦門湯下

葶藶丸　治涌水証如溢囊裹裡漿或遍身腫滿

按腹不堅疾行則濯濯有声或喘欬不定

葶藶炒　澤瀉　椒目　桑白皮　木猪苓

杏仁各五錢　為末煉蜜丸梧子大每二三十丸葱

白湯下不拘時服以利為度

局方神助散　治十種水氣面目四肢浮腫以手

按之隨手而起欬嗽喘急不得安卧小便赤澁

大便不利

黑丑末　澤瀉各一兩　椒目半兩　猪苓二兩　葶藶

三兩　右為末葱白三莖水煎入酒調服三錢

薏苡根散　治水腫

薏苡根君　木香　檳榔　黑丑

右為末酒調服妙

聖惠氣寶丸又名順氣丸 治腰脇俱病如抱一甕肌膚
堅硬按之如鼓脚腫不能屈伸自頭至臆中痰
脊露骨胷膈痞悶四肢無力
木香 茴香炒 羌活 木瓜 川芎 當歸
陳皮炒 檳榔 地骨皮各一兩 大黄一兩半 黑丑二兩
皁角四兩 右為末熬皁角膏為丸梧子大每六
十丸温酒下 一方無木瓜生姜灯心湯下
治一切氣血凝滯風毒熾盛脚氣走注作腫
或大便閉脚氣入腹喘悶寒熱往来状如傷
八 五卷 廿七
寒並宜服之
簡易方 治水蠱不問年月深者
大戟 當歸 陳皮各一兩
水二升煮七分頓服利二三斗即愈
元戎方 治十種水氣垂死
鯉魚一頭重一斤者和葱白冬瓜羹食之
又治鼓氣方
滑石 輕粉各一錢 槐花一錢半
右不犯鉄氣為細末生地黄自然汁生姜自

然汁停滴在藥中為丸梧桐子大一日服三
丸次日服四丸五日以来早辰只一服用生
地黄汁温送下小便中水盡為度得瘥後日
服嘉禾散十日永不再發
治陰水腫之劑
五皮散 治風濕客于脾經氣血凝滯以致面目
俱浮四肢腫滿心腹膨脹上氣喘促
五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮
茯苓皮 水煎熱服 一方加牽牛
八 五卷 廿八
澹寮方無地骨皮五加皮 加陳皮桑白皮
白术木香散 治腫滿喘欬欲變成水病者不能
食不能卧小便秘
白术 猪苓 甘草 澤瀉 赤茯苓各五錢
木香 檳榔各三錢 橘紅二兩 官桂二錢 滑石三兩
右每服一兩半生姜三片水煎温服 一方加木通
接萃聖灵丹 治脾肺有濕喘滿風盛小便赤澁
苦葶藶四兩炒 防己二錢 赤茯苓麴炒 木香
檳榔 木通 人参各一錢五分

為末以棗肉丸梧子大每服五十丸桑白皮湯下

續隨子丸　治通身虛腫喘悶不快

人參　防巳　赤茯苓麩炒　續隨子　木香

檳榔　海金沙各五錢另炒　苦葶藶四兩

右為末棗肉丸梧子大每五十丸桑皮湯下

退腫揭氣散　治積水驚水或飲水過多停積于脾故四肢而身熱用藥惟內消其腫自退

赤豆　陳皮　蘿蔔子　甘艸炙各二錢　木香半錢

每服一兩生姜三片棗一枚水煎食前服

復元丹　治水腫皮膚盈溢心腹堅脹喘急不得正偃正偃則咳嗽腿腹冷口苦舌乾小便不利夢中虛驚不得安卧

附子炮　木香煨　茴香炒　川椒炒去汗　獨活　厚朴

白朮炒　吳茱萸炒　桂心各一兩　澤瀉一兩半　肉果煨

檳榔各五錢　為末糊丸梧子大每服五十丸紫蘇湯下一日三服先便旋利如傾次乃腫消喘止此藥能助真火以養真土運樞机禁慾絕鹽半年乃不再作

當歸散　治同前

川歸　赤芍藥　牡丹皮　白朮　赤茯苓

陳皮　檳榔　木香　桂心　木通各等分

脚膝頭面腫大小便不快每服二錢水一鍾紫蘇葉二片木瓜一片同煎八分溫服日三服稍覺愈只早晚服二次但覺氣下小便長是効　臟虛去檳榔　臍凸加大腹皮猪苓各一兩　忌鷄魚肉酸醎之物及海味

大半夏湯　治土不能制水水漬于腸胃溢于皮

膚漉漉有声怔忡喘息名曰水脹

橘紅　半夏　茯苓　甘草　桔梗　檳榔

等分每服五錢姜三片水煎服

赤茯苓丸　治同上

木香五錢　苦葶藶四兩炒　防巳二兩　赤茯苓二兩

為末棗肉丸梧子大每服三十丸桑皮湯下

人參葶藶丸　治一切水腫及喘滿不可當者

人參一兩　苦葶藶四兩炒

為末棗肉丸梧子大每三十丸桑白皮湯下

神秘湯　治水氣上乘于肺肺得水而浮水腫不
卧卧則喘
白茯苓　木香各五錢　桑白皮　紫蘇葉　陳皮
人參各七錢　姜七片水三鍾煎鍾半食後分五服
無礙丸　治脾病横流四肢腫滿
木香半兩　蓬朮炮　三稜炮　檳榔　郁李仁炮去皮各一兩
大腹皮二兩　為末麥芽麵糊為丸梧子大每服
三十丸生姜湯呑下
香蘇散　治水氣虚腫小便赤澁
陳皮去白一兩　防巳　木通　紫蘇葉各五錢

六五卷　廿一

右為末每服二錢姜三片水煎食前服
小葶藶丸　治腫滿腹大四肢枯瘦小便澁濁
甜葶藶炒　蔣菜根等分為末　煉蜜丸彈子大每服一
丸陳皮湯嚼下只三丸小便清数病愈
牡蠣澤瀉散　治脾胃氣虚不能約制腎水水溢
下焦腰以下腫
牡蠣炒　澤瀉　蜀漆洗去腥　葶藶炒　瓜蔞根
白商陸根　海藻洗等分為末白湯調服方寸

匕小便利止後服
踈鑿飲子　治水氣遍身浮腫喘呼氣急煩渴大
小便不利服熱藥不得者
澤瀉　赤小豆　白商陸　大腹皮　茯苓皮
羌活　椒目　木通　秦艽　檳榔等分
薑五片水煎服
大橘皮湯　治湿熱内攻腹脹水腫小便不利大
便滑泄
陳皮半兩　木香二錢半　滑石六兩　檳榔三錢　茯苓一兩

六五卷　廿二

猪苓　白朮　澤瀉　肉桂各五錢　甘草二錢
生姜五片水煎服
實脾散
厚朴　白朮　木瓜　附子炮　木香　茯苓
大腹子　草果仁　乾姜炮各一兩　甘草炙五錢
姜五片棗一枚水煎服
加味枳朮湯　治氣為痰飲所隔心下堅脹名曰
氣分○枳殼　白朮　陳皮　檳榔　桔梗
木香　桂　紫蘇梗葉　五灵脂炒各二分　半夏

茯苓　甘草各一分半　姜三片水煎服

調榮散　治瘀血化為水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分

細辛　莪朮　桂　赤芍　川歸

川芎　玄胡索　白芷　大腹皮　桑白皮

檳榔　瞿麥穗　陳皮　赤茯苓　葶藶炒

大黃煨各一分　甘草炙一分半　每服五錢姜棗煎食前服

大荳湯　治風水通身腫百節痛惡風自汗眼合不得短氣欲絶其脉浮

大荳　杏仁去皮尖炒　麻黃　防風　防巳　猪苓

大五卷　廿三

澤瀉各四兩　黃芪　烏頭炮各二兩　半夏　茯苓

白朮各五兩　甘遂炒一　甘草炙各一兩　每服五錢姜七片

水二鍾酒半鍾煎一鍾服以大小便利為度

如不利加生大戟五兩　葶藶炒香二兩　無不利矣

內甘遂甘草本相反故用之以成功屢試屢

効非泛常所可測也

澤漆湯　治石水四肢瘦腹腫不喘其脉沉

澤漆洗去腥五兩　桑白皮六兩　射干米泔水浸　黃芩

茯苓　白朮各四兩　澤瀉　防巳各二兩

每服五錢水三鍾先用黑豆一合煎至二鍾

入藥同煎七分空心食前服一日三次

附子菉荳湯　治寒客皮膚殼殼然而堅腹大身

腫按之陷而不起色不変病名膚脹一劑未知再作

大附子大者一枚生去皮臍　菉豆二兩　生姜一兩切

水二鍾煎一鍾分三服空心午晚各一服

葶藶防巳丸　治面目浮腫肺氣喘咳不安小便赤澁

防巳一兩　木通　葶藶　杏仁去皮尖麩炒　貝母煨各

一兩　右為末棗肉丸梧子大每服五十丸食遠服

大五卷　廿四

桑白皮煎湯送下

酒腫丸　治酒腫及脾虛發腫

蘿蔔十枚　皂角五枚　二味用水煮乾去皂角將

蘿蔔搗爛蒸餅糊為丸芡實大蘿蔔煎湯如

意送下

犀角湯　治結陽症四肢腫滿熱菀不散或毒攻注

犀角　玄參　連翹　柴胡各五分　升麻　木通

各一錢　沉香　射干　甘草炙各七分　芒硝三錢

麥門冬三錢　分二服水煎

消腫湯 治水腫喘滿大小便不利
白朮 山梔(各五錢) 赤茯苓 蘿蔔子(各三錢) 葶藶
椒目 蘇子(各一錢) 沉香(三分) 木香(五分) 水煎服
又方 継前服(已上二方神效)
葶藶(二錢) 椒目(一錢) 猪苓(一錢半) 澤瀉(八分)
葱白三根 水煎呑牽牛末為丸 則大小便俱通

二奇方
白朮(五錢) 滑石(三錢) 水煎服 七服全愈

白茯苓湯 治水腫 開鬼門潔淨府(机要方)
文 五卷 廿五
白茯苓 澤瀉(各二) 郁李仁(五錢) 水煎臨服
入生姜自然汁服 或作粥飯 或和麵作粿
食之五七日後 侯脹下 乃與白朮散

又方 大田螺 大蒜 生車前草 和研為膏 作大餅
敷于臍上 少頃水從小便出 數日愈

病機白朮散 服前白茯苓湯利後 以此補之
白朮 澤瀉(各五錢) 為末 以茯苓三錢煎湯調下
或丸服亦可 每三十丸 從少至多 後以黃芪
建中湯之類調補

脹滿門 一名鼓脹

內經曰 諸濕腫滿 皆屬于脾(盖言脾虚不能運化 此脹滿之所由生也)
又曰 濁氣在上 則生䐜脹(此清濁相干而為脹也 其中亦有寒熱之分)
靈樞曰 脹者皆因厥氣在下 寒氣逆上 榮氣留止
真邪相攻 兩氣相搏 合而為脹 又曰 內虛不足
中寒濕 令人中滿 又曰 胃中寒 則脹滿
針經云 脹取三陽 三陽者 足太陽膀胱寒水為脹
也(此皆以脹為寒也)
內經曰 諸腹脹大 皆屬于熱
六 五卷 廿六
丹溪曰 七情內傷 六淫外侵 飲食不節 房勞致虛
脾土受傷 轉輸失職 胃雖受谷 不能運化 故陽
自升 陰自降 而成天地不交之否 清濁相混 隧
道壅塞 濕鬱為熱 熱又生濕 濕熱相生 遂成脹
滿 經曰 鼓脹是也 以其外雖堅滿 中空無物 有
似于鼓 又名蠱 者若蟲侵食 有蠱之義 是以脹
滿為熱也
陽熱為邪 則身體有熱 脹滿而咽乾 陰寒為邪 則
吐不下食 脹滿而自利

又有穀脹水脹氣脹血脹不可不別

失飢傷飽痞悶停酸旦食暮不能食者是為穀脹

脾土受溼不能制水水漬于腸胃而溢于肌膚漉漉有声怔忡喘息是為水脹

七情欝結氣道壅隔上不得降下不得升身腫大而四肢瘦削是為氣脹

煩躁漱水迷忘驚狂痛悶嘔惡虛汗厥逆小便多大便黑婦人尤多見之是為血脹

又有五臟六腑之脹 出靈樞脹論篇全文在醫旨緒餘

靈樞曰心脹煩心短氣卧不安　肺脹虛滿而喘咳　肝脹脇下滿而痛引小腹　脾脹善噦四肢煩悗體重不能勝衣卧不安　腎脹腹滿引背央央然腰髀痛　胃脹腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨于食大便難　大腸脹腸鳴而痛濯濯冬日重感于寒則飧泄不化　小腸脹小腹䐜脹引腰而痛　膀胱脹少腹滿而氣癃　三焦脹氣滿于皮膚中輕輕然而不堅　膽脹者脇下痛脹口中苦善太息

大槩有虛實之辨實者腹中常脹外堅內痛按之不陷法當踈利　虛者時脹時減虛氣留滯按之則濡法當以溫藥和之

又有五積久而成脹滿者有外感寒邪傳入于裏寒变為熱作胃實而脹滿者有痎瘧久而成脹滿者治療之法在體認詳明按而治之可也

久病羸乏變為脹滿喘息不得及腫脹而肌肉崩潰足脛流水脣黑缺盆平臍突背平足心滿此数者皆為五臟損敗不治之症也

陳無擇曰脹滿皆臟氣不平勝乘相因為病如怒傷肝肝尅脾脾氣不正必脹于胃名曰勝尅怒乘肺肺氣不傳必脹于大腸名曰乘尅

丹溪戒云醫家不察虛實急于作効病者苦于脹急喜行利藥以求通快不知寬得一日半日其腫愈甚病邪深矣真氣傷矣

脉訣擧要曰脹滿脉弦脾制于肝洪數熱脹遲弱陰寒浮為虛滿緊則中實浮則可治虛則危急

丹溪云宜大補中氣行溼此乃脾虛之甚必須近

音樂斷厚味大劑人參白朮佐以陳皮茯苓蒼朮之類　有脉實堅人壯盛者或可攻之便可收補用參朮為主　凡補氣必帶厚朴寬滿以其味辛能散其結也須用姜汁製之　肥胖人初脹未久以胃苓湯服　如面白人腹脹是氣虛宜參朮厚朴陳皮　如瘦人腹脹是熱宜黃連厚朴香附白芍　如因有故蓄血而腹脹者宜抵當丸下死血　如因有食積而腹脹有熱者用木香檳榔丸有寒者用木香厚朴丁香砂

仁神麯香附　如因外寒東內熱而腹脹者用藿香麻黃升麻乾葛桂枝　因大怒而腹脹者宜青皮陳皮香附木香梔子仁蘆會　實者按之堅須下之次消之次補之　虛者溫之升之補之　朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛終日急氣血俱虛　腹脹不寬滿者食肉多用黃連一兩阿魏半兩醋浸餌餅為丸同溫中丸白朮湯下　食肉多三補丸料內加香附半夏麯蒸餅糊丸服

鼓脹說

生生子曰脹滿之疾穀食不消小便不利腹皮脹急而光內空〻然如鼓是矣俗知謂之鼓脹不察其致之者有由也內經曰脹取三陽三陽者足太陽寒水膀胱經也見樞經曰下焦溢而為水靈蘭秘典曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣歷考三書可見小便之不利由下焦原氣虛寒以致濕氣壅遏于膚裡膜外之間不得發越勢必腫滿是腫滿之疾起于下元虛寒也若非

溫補下元則小便何能獨利且夫人之胃如釜甑然釜底火旺則熱氣薰蒸甑炊易熟若徒有水而無火則無氣上升物何由熟即此可以例觀矣故治脹滿者先宜溫補下元使火氣盛而濕氣蒸發胃中溫煖穀食易化則滿可寬矣夫清氣既升則濁氣自降濁氣降則為小便也小便利脹有不消乎語謂地氣上為雲天氣下為雨惟此氣流行斯為雲為雨也今之醫者一遇此疾則曰內經有言諸濕腫滿皆屬脾土土虛

則濕停濕停則滲透肌膚遍身腫滿不可不通
利也輒用利小便及補中之劑如五苓散胃苓
湯加木通車前子大腹皮滑石之類法未為爽
謬不然顧脹之愈多而小便愈少腫脹愈急何
故哉不溫補下元而徒以通利之藥施之也果
若此豈惟不効則下元益虛真氣益弱危期且
至安望其有瘳乎余嘗究心靈素參會易理悟
然有得于中且施之病者隨試輒効故筆之于
册以公我之同志(補壯原湯于後)

治氣脹之劑

平肝飲子 專治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃
心腹脹滿頭運嘔逆脉来浮弦
防風 桂心 枳殼 赤芍 桔梗(炒各一兩) 人參
甘草(炙) 檳榔 當歸(酒洗) 川芎 陳皮(各五錢)
每服五六錢姜五片水煎服

紫蘇飲子 治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘
促煩悶腸鳴氣走漉漉有声大小便不利脉虛
緊而澁 方在瘡門

調中順氣丸 治怒氣傷肝三焦痞滯水飲停積
脇下虛滿或時刺痛
木香 白豆仁 青皮 橘紅 三稜(炮各一兩)
半夏(泡) 大腹子(各二兩) 砂仁 檳榔 沉香(各五錢)
糊丸梧子大每服三五十丸陳皮湯下

木香順氣湯 治濁氣在上則生䐜脹及七情所傷
陳皮 厚朴(各四分) 川歸(五分) 草豆蔻(麵裹煨去皮) 木香
蒼朮(米泔洗各三分) 青皮 益智仁 白茯苓 澤瀉
半夏(泡) 乾生姜 吴茱萸 升麻 柴胡(各二分)

加姜水煎服

自指橘皮湯 治七情所傷中脘不快腹脇脹滿
香附米 半夏 橘紅(各二兩) 甘草(七錢半)
每服一兩姜五片棗二枚水煎服

四製枳殼丸 治腹脹鼓疾
陳枳殼(去穰四兩分四製一兩用蒼朮一兩同炒一兩用乾漆一兩同炒一兩用茴香一兩同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒)以炒枳殼黃色為度
去同炒藥只用枳殼為末却將蒼朮等四味
煎湯去渣打麪糊為丸梧子大(每服五十丸米飲湯下)

烏藥順氣散　脹滿痞塞七情憂思所致此方如神
天台烏藥　香附　沉香　砂仁　橘紅
半夏　為末每服二錢灯心湯調
寬中八寶散　治全前方
木香　歸尾　蘿蔔子　真蘓子　檳榔
砂仁各一錢半　沉香　牙皂各一錢
共為末每服一錢或二錢黃酒調下
小水不利并水腫加苦葶藶子末一錢五分
鏤蛄後段炙末一錢入前方內

治寒脹之劑
大正氣湯　治脾胃虛寒外為風寒濕氣擾動心
腹脹滿　藿香　厚朴　陳皮　半夏　白术
各二錢半　檳榔　桂枝　枳殼　乾姜炮各一錢三分　甘草
炙五分　分作二帖姜三片水煎服
大半夏湯　治肝氣太盛尅勝于脾〻鬱不行結
聚涎沫胃中脹滿其脉弦遲
半夏　桂心各五兩　附子炮　人參　甘草炙　厚朴
川歸　茯苓　枳實各二兩　川椒炒去汗閉口去目者八百粒

每服四五錢姜棗煎服
沉香降氣湯　治中脘脹滿時吐脇疼每噫則賁
氣快不噫則悶漸覺面浮磨檳榔入紫蘓同煎
下神保丸五七粒
香附一兩　沉香五分　砂仁二錢　拎草三錢
右為末每服一錢入塩少許沸湯服
神保丸　治諸寒積脹滿急痛大便不利
木香　胡椒一錢　全蝎七個　巴豆十粒去皮心研
右為末飣餅丸麻子大硃砂為衣每服五丸

腰脇疼痛茴香酒下餘陳皮湯下
順氣木香散　治氣不升降嘔逆惡心胸脇痞悶
脇肋脹滿及酒食所傷噎食吞酸心脾疼大便
不調及婦人血氣刺痛一切冷氣服此寬中利
氣和胃進食
丁皮　砂仁　良姜　桂心　乾姜炮　甘草炙
橘紅　厚朴　蒼术　桔梗　茴香炒各三兩
每服五七錢加姜棗水煎服
蓽澄茄丸　治痞滿脹痛穀脹氣脹通用

蓽澄茄 白豆蔻 砂仁 青皮 蘿蔔子

木香各二分 肉豆蔻 茴香炒 丁香 桂各一分半

陳皮三分 右為末麵糊丸梧子大每服三十丸陳皮湯下

導氣丸 治諸痞塞腹脹如鼓大便秘結等症又腎氣小腸氣疼功効尤捷

青皮水蛭等分同炒去水蛭 莪朮虻虫等分同炒去虻虫 檳榔斑猫同炒去斑猫 胡椒茴香同炒去茴香 三稜乾漆炒去乾漆 吴茱萸黑丑同炒去黑丑 赤芍藥川椒同炒去川椒 石菖蒲桃仁同炒去桃仁 乾姜 磠砂同炒去磠砂 大附子青鹽同炒去青鹽 右十味為末酒糊為丸梧子大每服五十丸加至七十丸紫蘇湯下

沉香飲 治腹脹氣喘坐卧不安

沉香 木香 枳殻各五錢 萝蔔子炒一兩

每服五錢姜三片水煎服

木香化滞湯 破滞氣心腹滿悶

甘草炙 白檀香 藿香 陳皮 桔梗 大腹皮 茯苓 白荳仁各二分 砂仁 人參 青皮

檳榔 木香 姜黄 白朮各四分 水煎服

縮砂飲 治氣脹氣蠱等病如神

蘿蔔子研汁 砂仁不拘多少以蘿蔔子汁浸透炒乾又浸又炒不厭次多愈多愈炒為細末每服一錢米飲下

四炒丸 治年高人患鼓脹獨只腹脹肢體如柴舉動乏力

木香 檳榔各五錢一兩

二味剉如芡實大四製一分用萝蔔子一兩同炒深黃色去萝蔔子不用一分用乾漆一兩炒烟尽去漆一分用茴香一兩炒深黃色去茴香一分用茈朮一兩炒黃色去朮 右只留木香檳榔為末以四味同炒藥煎湯打糊為丸菉豆大每服七八十丸米飲下

中滿分消湯 治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥冷食入反出下虚中滿腹中寒心痞下寒沉厥奔豚

益智仁 半夏 木香 茯苓 升麻各七錢五分

川烏 人參 青皮 當歸 生姜 柴胡

乾姜 黄連 蓽澄茄各五錢 黄芪 吴茱萸

草豆蔻 厚朴各五錢 右每服一兩水煎溫服大忌房劳湿麵生冷 一方有麻黄澤瀉各二錢五分黄柏五分

錢氏塌氣丸

胡椒一兩 蝎梢半兩 為細末麵糊丸如粟米大

每服五七丸至一二十丸陳米飲下
木香塌氣丸　治單腹脹
丁香　胡椒各二錢　蝎尾半兩　枳實一兩　白牽牛一兩
郁李仁四錢　木香　檳榔各半兩　為末飯丸菉
豆大每服十丸至十五丸陳皮生姜湯任下
木香散　治單腹脹
木香　青皮　白朮　姜黃　草豆蔻各半兩
阿魏　蓽澄茄各一兩
右末醋糊丸菉豆大每服二十丸生姜湯下

又方　治鼓氣
大癩蝦蟆一隻新瓦二片相合鉄線纏定盛在
內外用鹽坭固濟慢火煆存性為末溫酒調服下三五錢
治熱脹之劑
中滿分消丸　治中滿鼓脹氣脹大熱脹水脹
人參　白朮　姜黃　黃芩　黃連　半夏泡
枳實麩炒五錢各　甘草炙　猪苓各乙錢　茯苓　砂仁
乾生姜各二錢　厚朴姜製一兩　知母炒四錢　澤瀉　橘紅
各二錢　右研茯苓澤瀉生姜各為末餘共為末和

勻鉦餅為丸梧子大每服百丸白湯吞下
沉香交泰丸　治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而
不伸為䐜脹　沉香　白朮　橘紅各三　茯苓
澤瀉　枳實去穰麩炒　吳茱萸湯洗　當歸酒浸　青皮去白
木香各一錢　大黃酒浸一兩　厚朴姜製五錢　湯浸鉦餅為
丸梧子大每服七八十丸白湯下微利即止
廣茂潰堅湯　治中滿腹脹內有積塊堅硬如石
令人坐臥不安大小便澁滯上氣喘促遍身虛腫
厚朴　黃芩　益智　草豆蔻　當歸各五錢　吳

茱萸　紅花酒洗　升麻　廣茂各二錢　甘草　柴胡
澤瀉　神曲炒　陳皮　青皮各三錢　黃連六錢　半夏
七錢　每服七錢姜三片水煎服　渴者加葛根四錢
鷄屎醴飲　治鼓脹旦食暮不能食痞滿壅塞
椎鷄屎臘月取乾一兩晒　川芎一兩　二味各為極細末
和勻麵糊丸梧子大每服五十丸溫酒下
又方　加大黃一兩每服二錢姜湯下
推氣丸　治三焦痞塞氣不能降胸脇脹滿大便
秘小便赤　陳皮　檳榔　枳實　黃芩

大黃 黑丑生 等分 為末蜜丸梧子大每服五七十丸臨睡白湯下

大異香散 治穀脹失飢傷飽痞悶停酸早食暮不能食

陳皮 青皮 京三稜 莪朮 益智仁 香附子 藿香 半夏曲 桔梗各五錢 枳殼五錢 甘草炙三分

每服五六錢薑棗煎服

木香分氣丸 善治脾胃不和心腹脹滿兩脇膨脝胸膈注滿痰嗽喘急刺心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之亦治穀脹

木香 檳榔 青皮 莪朮煨 當歸 姜黃 白朮 枳殼麩炒 橘紅 肉果 乾生姜 玄胡索 京三稜煨 赤茯苓 秋冬加丁香炒

各等分為末麵糊丸小豆大每服三五十丸生姜湯下 忌生冷茄子馬齒莧

補下元之劑

壯原湯 治下焦虛寒中滿腫脹小水不利上氣喘急陰囊兩腿皆腫或面有浮氣

人參 白朮各二錢 茯苓 破故紙各一錢 桂心 大附子 乾姜 砂仁各五分 陳皮七分

水煎食遠服 有痰加半夏一錢 喉中痰声加桑白皮一錢 咳嗽亦加 脚趺面腫加薏苡仁二錢 中氣不轉運不知饑加厚朴木香 氣欝不舒加沉香烏藥臨服磨入 氣虛甚者人參加作五錢大附子加作一錢半 汗多者再加桂枝五分白芍藥酒炒過八分 若夏月喘乏無力或汗多者加麥門冬一錢五味子十一粒 夜夢不安者加遠志一錢 兩脇氣硬加白芥子八分若面浮腫脇下氣硬加白芥子紫蘇子五分 若身重不能轉動加蒼朮一錢澤瀉七分 濕盛加桑白皮赤小豆

治血脹

人參芎歸湯 治小便多大便黑痛悶喘急 名曰血脹

當歸 半夏三分 川芎一兩 莪朮煨 甘草炙 木香 砂仁 烏藥各五錢 人參 桂 五灵脂炒 各一分

每服三五錢紫蘇葉四片 姜五片 棗一枚 水煎服

一方 治血鼓腹脹如盆

三稜煨 莪朮 乾漆炒烟盡 牛膝去蘆酒洗 虻蟲去翅足糯米炒

琥珀 肉桂 硇砂 水蛭石灰炒赤 大黃各半分

為末用生地黃自然汁和米醋調勻為丸梧子大每服十丸空心溫酒下童便下亦可

雞屎醴散 治旦食暮不能食血脹痞滿

大黃 桃仁去皮尖 乾雞屎醴各半分

為末每服一錢生姜三片煎調食後臨睡服

治積塊不消發為脹滿之劑

治五蠱脹丸 忌鹽四十日

官桂 歸尾 檳榔 橘紅 枳殼炒 莪朮炒

三稜炒 大黃酒煮 青皮 黑丑君 白商陸君

芫花君 大戟 甘遂去心包麵煮 赤小豆 椒目

木香 砂仁 乾漆炒烟盡君 枳實炒 醋糊為丸

梧子大初服三日每服九十丸過三日服八九十九又過三日服七十九每用葱七根煎湯送下空心服以行四五次為度行後以溫粥補之不行而吐者亦妙次用補法

補方 青皮 桔梗 莪朮 三稜 枳實

枳殼 木香 砂仁 茯苓 檳榔 陳皮

芍藥 細辛 歸尾 人參 香附各半分 每服四五錢水煎服須要過四五十日後方許食鹽將醬

食鹽用藥法

鯽魚去腸將五苓散末入魚腹中焙乾為末白湯調服方許食鹽 已上三方乃一宗方極峻利非積固體厚者未敢謾試姑錄此以備參考

溫白丸 治心腹積聚心下堅結大如杯碗傍攻兩脇心痛食不消化

桔梗 柴胡 菖蒲 紫菀 黃連 乾姜

桂皮 茯苓 川椒 吳茱萸 巴豆去皮心膜去油

人參炒 厚朴各五錢 川烏炮二兩五錢 皂莢去皮子炙五錢

右為末入巴霜和勻煉蜜為丸梧子大每服卅丸紫蘇湯下取下積滯如魚腦爛綿而安

小檳榔丸 治脾虛腹脹不進飲食快氣寬中

萝蔔子炒 檳榔煨 黑丑炒 木香各五錢

為末麪糊丸梧子大每服三四十丸姜湯下

治蠱脹將愈內有痞塊用此消之

青皮 枳殼 三稜 莪朮 蒼朮 厚朴 桂皮 香附各二兩 砂仁 草果 針砂 白芷各五錢 烏藥 乾漆 乾姜各一兩 歸尾一兩半 檳榔一兩 木香二錢半 阿魏二錢 一方有綠礬一斤 陳皮一兩

為末棗肉丸梧子大每空心好酒吞下五十丸漸加至二錢

治脾虛之劑

強中湯 治喫生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成腹脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛

乾姜炮 白朮各二兩 青皮去白 人參 丁香各三兩 草果仁 附子炮去皮臍 厚朴姜製五錢 甘草炙五錢

每服四五錢姜棗煎服 嘔者加半夏

如食麵脹滿加蘿蔔子各五錢

溫胃湯 治憂思鬱結脾肺氣凝大腸與胃氣不平脹滿冲咳食不得下脉虛而緊濇 附子炮 歸尾 厚朴 生人參 陳皮 白芍 甘草各炙一兩 乾姜兩二錢半 川椒二錢半炒 每服五六錢水煎服

草荳蔻湯 治腹中虛脹

澤瀉一分 木香三分 神曲四分 半夏 枳實 益智 草豆蔻 黃芪春夏不用 甘草各五分 青皮 陳皮各六分 茯苓 當歸各七分

生姜三片水煎服 冬月加黃芪五七分

通氣生姜丸 治三焦虛脹

人參 茯苓 神曲炒 麥芽炒各一兩半 官桂 歸尾 陳皮炒六兩 半夏洗一兩 生姜去皮切六兩 厚朴六兩

右為末以生姜汁煮麵糊為丸梧子大每服三十丸空心食前米飲下

治脹而喘嗽之劑

定喘葶藶丸 治皷脹喘嗽

葶藶 木香 貝母等分

為末飪餅糊丸梧子大硃砂為衣煎桑白皮湯下或即以四味為末仍以桑白皮湯下妙

附雜方

敷藥 治腹硬如石或陰囊腫大先用熟水嚼甘草後以藥敷肚上 大戟 芫花 甘遂 海藻各等分 為末醋調塗或用白麵調藥敷肚上

熨法　治腹脹如鼓漲如木皮樣
杜烏藥 䔧荊芥　蒼朮　茵草　山茵陳　二
蚕沙　松毛　橘葉　椒目　烏頭　赤豆
樹葉　葛　各等分作二次炒熱以布袋盛
熨之冷又炒熨三四十度或復用煎水薫洗
或服神保丸微溏泄其氣
獨聖散　治脾胃不足過食生冷心腹痛脹
塩五合以水一升煎化頓服自然吐即定
食麵多腹中飽脹以熱酒和生姜汁飲一二盃即消

桂香丸　治大人小兒過食雜菓腹脹氣急
肉桂一兩不見火 射香一分另研　為末飯丸菉豆大小
兒七丸大人十五丸白湯下二三服神效
西来方　治腹中積塊作脹作痛大小便不利
硼砂二錢 苦葶藶子　海金沙各三錢 乳香一錢半
没藥　牙皂各一錢 檳榔　陳皮　三稜各二錢 莪
朮二錢半 木香一錢　共為末每服五分滚水調下
虫蠱
生生子曰按鼓症内經靈樞水脹篇只有水與膚

脹鼓脹腸覃石瘕石水六者又脹論篇載五臟
六腑皆有脹狀甚著後代諸書論脹鮮有發明
予在吴下時有同志友吴生諱震號九宜者博
雅君子也每與予討論多善予一日偶談及鼓
脹乃詰予曰鼓有虫否乎予卒不敢應俛思久
之對曰或有之當以疑辭對者盖以目未見而
書無考也按許學士本事方云臍腹四肢悉腫
者為水但只腹脹而四肢不甚腫者為蠱註謂
蠱即鼓脹也由是恭之古人曾以蠱鼓同名矣

且蠱以三虫為首豈無旨哉愚謂鼓脹即今云
氣虛中滿是也以其外堅中空腹皮綳急有似
于鼓故以鼓脹名也彼蠱症者中實有物積聚
已久溼熱生虫理或有之吴生曰子質何其敏
也予堂嫂病鼓三載腹大如箕時或脹痛四肢
瘦削三吴名劉歷嘗不瘳吴俗死者多用火葬
燒至腹忽响聲如炮人皆駭然乃見虫從腹中
炮出高二三丈許燒所之天為昏俄而墜地細
視之皆蛔也不下千萬數大者長尺餘虫腹中

復生小虫多者十五六條或十數條或五六條虫在人腹中蓄息若此曷不令人脹哉匪ゝ藥劑豈易瘳哉顧蠱以多虫為首于義始見許之以蠱名皷者旨可徵矣惜乎諸書未有言及予既為後人立言幸繹數方以備後之治皷疾者知有此蠱字義也予聞之恍然如夢始覺然猶未親見其異也歳萬曆癸巳赴督漕理刑吳比部之召而至淮陰有王鄉宦者其子年十六新娶後腹脹大按之有塊形如稍瓜四肢瘦削發

熱晝夜不退已年半矣族醫惟以退熱消脹之劑投之其脹愈大其熱愈熾甚且喉中兩耳俱瘡余診視之脉滑數望其唇則紅其腹則疼又多嗜肥甘余思諸凡腹疼者唇色淡不嗜飲食今若此得非虫乎投以阿魏積塊丸服之果下虫數十大者二一紅一黑長尺餘虫身紅線自首貫尾虫腹中有虫大者數條小者亦三四條虫下則熱漸减脹漸消三下而愈此余所親治者益信前聞之不虛也世之奇症書所未載者大率類此胡可以未聞未見者而輕議之也余因紀其聞見叅其方于皷症之末

治虫蠱之劑

八毒赤丸　治男婦染着神鬼謂之鬼疰病服之甚効治虫積蠱脹如神　雄黃另研　礬石　硃砂另研　牡丹皮　附子炮　藜芦　巴豆各一兩　蜈蚣一条

右為末煉蜜丸如小荳大每服五七丸至十丸冷水送下無時昔有副使許可道至椎州請醫看脉乍大乍小乍短乍長氣血不均邪

氣傷正本官說去路至邯鄲驛中夜夢一婦人着青衣不見面用手于脇下打了一拳遂一點痛往来不止寒熱不食乃鬼驚也可服八毒赤丸本官言讀名醫錄中看李子豫八毒赤丸為殺鬼杖子遂與藥三粒臨卧服明旦下清水二斗立効製藥時宜志誠齋戒

紫金丹　治虫蠱并虫積

大黃　檳榔各三兩半　蒼朮　貫仲　牙皂　香附各二兩　三稜　雷丸　黑丑各二兩　史君子一兩半　白

苦練根皮各二錢半 右為末每服三錢五更時沙糖湯調服至天明下虫積不問黃腫鼓脹心痛一服即効 小兒減半看大小輕重

又方 治仝

黑丑 五灵脂好酒煮 檳榔各五錢 大黃一兩 阿魏二錢 桃仁去皮尖研如泥不拘分兩但可丸為率

右為末以桃仁膏為丸梧子大每服二錢白湯送下

積塊丸

治癥瘕積聚癖塊一應難消難化腹中飽脹或虫積疼痛皆能取効若神不傷元氣

京三稜 莪朮各用醋煨 自然銅 蛇含石各燒紅醋淬七次二錢 雄黃 蜈蚣全用焙燥各一錢二分 辰砂八分 木香一錢半 鉄華粉用橘末醋炒一錢 蘆薈 天竺黃 阿魏 全蝎洗全用焙乾各四錢 沉香八分 氷片五分

右為極細末用雄猪胆汁煉為丸黑狗胆汁尤妙丸如梧桐子大或服七八分重者一錢五更酒送下塊消即止不必盡劑

痞氣門

內經曰太陰所至為積飲痞隔痞者心下痞滿而不能食也。

仲景云滿而不痛為痞。滿而痛為結胸。

劉河間曰痞與否同不通泰也謂精神營衛血氣津液出入流行之紋理閉密而為痞也

東垣曰將無積血不痞夫痞者心下滿而不痛是也太陰者溼土也主壅塞乃土來心下為痞滿也。傷寒下太早亦為痞乃因寒傷其營營者血也心主血邪入于本故為心下痞悶仲景立瀉心湯數方皆用黃連以瀉心下之土邪其効如响應桴故活人書云審知是痞先用桔梗枳殼湯非以此專治痞也。盖因先從錯下。必成痞症。是邪氣將陷而欲過胸中。故先用截散其邪氣使不致于痞。先之一字。早用之義也。若已成痞而用之。則失之晚矣。不惟不能消痞。而反損胸中之正氣。則當以仲景痞藥治之。經云察其邪氣所在而調治之正謂此也非止傷寒如此至

于酒積雜病下之太過亦作痞蓋下多亡陰亡陰者謂脾胃水穀之陰亡也故胸中之氣因虛下陷于心之分野故至心下痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則其痞益甚甚而復下之氣愈下降必變為中滿鼓脹皆非其治也又有虛實之殊如實痞大便閉者厚朴枳實湯主之虛痞大便利者白芍陳皮湯主之如飲食所傷痞悶者當消導之去其胸中窒塞上逆兀兀欲吐者則吐之所謂在上者因而越之是也

王海藏曰治痞獨益中州脾土以血藥兼之其法無以加矣

傷寒痞者從血中來雜病痞者亦從血中來雖俱為血症大抵傷寒之症從外至內從有形至無形故無形氣症以苦泄之有形血症以辛甘散之中滿者勿食甘不滿者復當食也中滿者腹脹也如自覺滿而外無腹脹之形即非中滿乃不滿也不滿者病也當以甘治之可也

綱目云無形氣症以苦泄之者枳實黃連之類是也有形血症以辛甘散之者仲景人參湯之類是也

劉宗厚曰痞之為病由陰伏陽蓄氣血不運而成處心下位中央䐜滿痞塞皆土之病也與脹滿有輕重之分痞則內覺痞悶而外無脹急之形脹滿則外有形也前人所論皆指悞下而致之亦有不因悞下而然者如中氣虛弱不能運化精微則為痞飲食痰積不能施化則為痞濕熱太盛土來心下則為痞既痞與濕同治惟上下分消其氣如果有內實之症庶可畧與䟽導世

人痞塞喜行利藥以求速効暫時通快痞若再作益以滋甚是不察夫下多亡陰之意也

統旨曰痞有虛實之殊而又有濕有熱有痰有鬱有風寒不消有脾胃虛弱有飲食過傷者當求所因而分治之如實痞大便閉以黃連枳實厚朴苦以泄之虛痞大便利以芍藥陳皮酸以收之濕者四肢困重小便短少宜蒼朮茯苓半夏滑石澤瀉以滲之鬱者則流滯不通食難消化宜撫芎香附蒼朮枳實以開之熱則煩渴溺赤

用黄連黄芩葛根升麻以發之。便結者即而利之。痰則胸中窒塞用半夏瓜蔞枳實黄連以豁之。欲吐者因而越之。飲食後因冒風不消而痞。宜吳茱萸砂仁草豆蔻藿香溫以化之。脾胃弱而轉運不調為痞。宜四君子湯等甘以補之。飲食過傷則腹飽噯氣而致痞塞者。又當以青皮枳實厚朴山查麯蘗以消導之。至于痰挾血成窠囊而痞者。用桃仁紅花香附大黄之類。若脈右関多弦弦而遲者。必心下堅。此肝木尅脾土。

欝結涎閉于臟腑氣不舒則痞。木香順氣湯。如下多則亡陰而痞者。四物加參苓白朮升麻柴胡。少佐以陳皮枳殼監制。或大病後元氣未復而痞。補中益氣湯加陳皮。凡此痞滿不可執全在活法詳脉證虛實而治之也

劉河間曰三陰三陽之標本治各不同。有用寒藥而為熱痞。大黄黄連之類也。有用寒熱藥者。陰與陽不和而痞。大黄黄連加附子之類也。有用辛熱藥多而寒藥少者。陰盛陽虛而痞。半夏生薑甘草瀉心三方之類。瀉心湯者。非瀉心火之熱。乃瀉心下之痞也。通而論之。其藥陽多而陰少。蓋病發于陰而得之。有大黄黄連瀉心湯獨為陰心下痞而脉疾一証。桂枝後用。從太陽浮弱所变餘皆陰陽雜用

直格云傷寒裹之陰分已受熱邪。是病發于陰也。或熱微而下証未全。誤下之早。則裹熱除去表熱乘虛入裡而作痞也。故仲景攻痞。多用大黄黄連黄芩寒藥。尔後或加附子乾姜之類者。是

以辛熱佐其寒藥。欲令開發痞之怫熱結滯也。非攻寒耳

劉宗厚曰河間論瀉心湯分陰陽寒熱多少而用藥可謂詳切矣。而此論則專主於熱。二者似乎不同。要之各有所當。蓋直格是言其受病之本河間是論其用藥之標。若以為痞有陰寒之症耶。則仲景瀉心五方何皆用黄芩黄連之藥。若以為痞無陰陽之異耶。何瀉心湯又有兼用附子乾姜半夏生姜之類者也。一言其本。一言其標而已

治熱之劑

仲景大黃黃連瀉心湯　治心下痞按之濡其脉關上浮或寸沉關浮而有熱者

大黃二兩　黃連一兩

右剉以麻沸湯漬之須臾絞去渣分溫再服

劉宗厚云此少陰經藥也出陽明例成無己云大黃〻連以導瀉心下之虛熱以麻沸湯漬服者取其氣薄而泄虛熱也又按伊尹湯液論大黃〻連黃芩湯共三味今監本無黃芩脫落之也又保命集無黃芩加甘草乙兩

散寒瀉熱之劑

仲景附子瀉心湯　治心下痞而復惡寒汗出脉沉遲也

大黃二兩　黃連　黃芩各乙兩　附子一枚炮去皮臍別取汁

右剉以麻沸湯浸之須臾絞去渣內附子汁分溫再服

半夏瀉心湯　治汗下後身寒痞滿而嘔飲食不下脉微按之不痛非柴胡症

半夏半升泡　黃芩　乾姜　人參各三兩　黃連一兩

大棗十二枚　甘草炙二兩

右七味以水一斗煮取六升去渣再煮取三升溫分三次服

生姜瀉心湯　治汗下後胃中不和乾噫食臭自利腸鳴脇下有水氣而心下痞滿

即半夏瀉心湯加生姜四兩乾姜用乙兩

甘草瀉心湯　治下之後腹中雷鳴心下痞硬再下之痞益甚此非結熱以胃中虛客氣上逆也

即半夏瀉心湯去人參甘草加作四兩

劉宗厚云以上諸瀉心湯元戎云手少陰藥也以其心下痞故入陽明例兄服梔子黃芩黃柏

大黃為上下通經之劑安得不例陽明乎

秘藏大消痞丸　治一切心下痞悶及積年久不愈者

黃連炒　黃芩各六錢　姜黃　白术各一錢

甘草炙　砂仁　乾生姜　神麴炒各一錢　人參二錢

枳實炒五錢　橘紅二錢　澤瀉三錢　厚朴製二錢　猪苓一錢半

半夏四錢　右為末飪餅糊為丸梧桐子大每五十丸漸加至百丸白湯送下

枳實消痞丸　治右關脉浮弦心下虛痞惡食懶倦開胃進食

枳實 黃連各五錢 乾生姜二錢 厚朴四錢製 人參
白朮 半夏麴 甘草各三錢炙 茯苓二錢 大麥麵二錢
右為末飷餅糊丸梧桐子大每服五六十丸
白湯送下 失笑丸以茯苓治全

劉宗厚云以上二方並半夏瀉心湯加減法也內有枳實湯四君子五苓平胃等利濕消滿痞積虛之藥也

温中散飲之劑

枳實理中丸 治中脘痞滿氣不宣通積寒停飲
食不消化

人參 乾姜炮 白朮 枳實 甘草各一兩炙
右為末煉蜜丸如鷄子黃大每服一丸細嚼
白湯下或沸湯化下 活人書有茯苓

理氣之劑

活人桔梗枳殼湯 治傷寒痞氣胸滿欲絶
桔梗 枳殼各去穰三兩炒 右剉水煎分作二服
按手太陰經藥也活人書云審知是痞先用此湯無不驗也緣枳壳行氣下膈故効每藏云活人用此非治痞也審知錯下必成痞是氣將陷于胸中故先用此使不致于痞也若已成痞復而用之則[illegible]之晚而胃中之氣愈痞矣先之一[illegible]須早之意也

宣明檳榔散 治傷寒陰証下後成痞滿而不痛
按之虛軟 檳榔 枳殼等分
為末每服三錢煎黃連湯調下

寶鑑三脘痞氣丸 治三焦痞滯水飲停積脇下
虛滿 木香 白豆仁 青皮炒 京三稜炮
半夏 橘紅 檳榔 砂仁 沉香各五錢
大腹皮一兩 為末麵糊丸梧桐子大每服五六
十丸食後陳皮湯送下

東垣木香消痞丸 治因憂思氣結中脘腹皮厚

微痛心下痞滿不思飲食
木香 紅花 乾姜各五錢 柴胡四錢 橘紅三錢 當歸
尾二錢 半夏 甘草各一兩炙
為末飷餅糊丸菉豆大白湯送下七八十丸

七氣湯 治憂思鬱結心腹悶 方見氣門

兼治濕熱之劑

東垣黃連消痞丸 治心下痞滿壅塞不散煩熱
喘促不寧
黃連 黃芩 澤瀉各一兩 枳實炒 半夏各七錢 乾

姜二錢 白朮 茯苓 甘草炙各一錢 姜黄一錢 猪苓
右為末飪餅糊為丸梧桐子大每服五七十
丸食前白湯下

藴橘飲 治氣壅發虛浮腫甚効
陳紫藴十四半 全陳皮二片 砂仁六枚 甘草六寸
生姜十片 棗五個
右水煎服

紫藴飲子 治憂思傷脾心腹膨脹喘促胸滿腸鳴氣走漉々有聲大小便不利脉虛緊而濇
藴子一兩 木通 半夏 厚朴 木香 草果
陳皮 枳實 人参 白朮 粉草 大腹皮
各五錢 每服五錢姜棗煎服

陳橘皮散 治腹内諸痞脹
橘紅 紫藴 大腹皮各一兩 漢防己五錢 木香五錢
檳榔 木通 赤茯苓各三分
每服五錢加姜煎服

雜治

東垣木香消痞湯 治因憂氣欝結中脘腹皮急微疼心下痞滿不思飲食々亦不化常覺痞悶
柴胡 木香各七分 半夏 生姜 枳實各一錢
陳皮八分 甘草炙五分 歸尾二錢 草豆仁一錢 紅花少許
水煎食前熱服忌酒麺等物

王海蔵云少陰下痢面赤心下痞瀉心湯加减例
易老单用黄連瀉心湯用錢氏法後随証加减
煩者加山梔 躁者加香豉 嘔加半夏 满加枳實厚朴 腹疼加芍藥 脉遲加附子
下焦寒加乾姜 大便硬加大黄 如用姜附先煎令熟使熱不僣後加黄連同用

内傷之劑

枳朮丸 治痞消食强胃
枳實去穰麸炒黄色一兩 白朮二兩 為末以荷葉裹燒飯為丸梧桐子大每服五七十丸

橘紅枳朮丸 治老而元氣虛弱飲食不消臟腑不調心下痞悶 前方加橘紅一兩

古庵橘連枳朮丸 補脾和胃瀉火消痰
即前方再加姜炒黄連一兩

平補之劑

平補枳术丸　調中補氣血消痞清熱

白术三兩　白芍酒炒一兩半　陳皮　枳實去穰炒　黃連姜汁炒各一兩　人參　木香各五錢　右為末荷葉打米糊丸梧桐子大每服六七十丸米飲下

古庵云白术補脾氣為君白芍藥補脾血為臣陳皮以和胃枳實消痞黃連清熱為佐人參以補元氣木香以調諸氣為使如此平補氣血均去痰火兼通氣道則氣病耶日消而脾胃日壯矣

丹溪云心下痞須用枳實黃連此亦是君以泄之

〈八　五卷〉

攻補兼施之劑

東垣黃芪補中湯　脾虛不能滲濕內痞外浮

人參八分　黃芪　甘草　白术　蒼术　陳皮各五分　茯苓　豬苓　澤瀉各三分

水煎溫服送下大消痞丸

補中益氣湯　治中氣虛心下痞

脉緩有痰而痞加半夏黃連　脉弦四肢滿閉便難心下痞加柴胡黃連甘草　大便秘燥加黃連桃仁少加大黃歸身　心下痞悶者加白芍藥黃連　心下痞腹脹加五味子白芍藥砂仁　天寒月加乾姜或肉桂　心下痞中寒者加附子黃連　心下痞嘔逆者加黃連生姜陳皮假如冬月再加黃連入丁香藿香葉　能食而心下痞加黃連五分枳實三錢　如不食心下痞者勿加止照本方服之　食已而心下痞別服橘皮枳术丸

治痰之劑

濟生瓜蔞實丸　治胸膈痞痛徹背脇脹喘急妨悶

〈八　五卷〉

瓜蔞實研　枳實去穰麸炒　半夏　桔梗各等分

為末姜汁打糊為丸梧子大每服五七十丸食後淡姜湯下

按此方瓜蔞以潤肺降痰枳殼破滯氣半夏豁痰燥濕桔梗開膈載藥可謂善治痞悶喘急矣然痰因火動者加黃連丸妙蓋黃連佐枳殼消痞甚速

五卷終

赤水玄珠第六卷目錄

吐酸門
論吐酸屬熱　論雜病吐酸與病机外邪不同
辨素問東垣論酸不同　停飲
痰飲門
怔忡驚悸門
心澹澹動門
怒門
善太息
善恐
善悲附婦人嫉妬善悲

赤水玄珠第六卷

新安生生子孫一奎著輯

吐酸門

論吐酸屬熱

内經曰諸嘔吐酸皆屬于熱又云少陽之勝嘔酸夫酸者肝木之味也内火勝制金不能平木木自甚故為酸也如飲食熱則易于酸矣是以肝熱則口酸或言為寒者但謂傷生冷硬物而喜噫醋吞酸故俗主于和脾胃豈知人之傷于寒

也則為病熱蓋寒傷皮毛則腠理閉密陽氣怫欝而為熱故傷寒熱在表以麻黄湯發散使腠理開通汗泄熱退而愈也凡内傷冷物者或積陰勝陽而為病寒或寒熱相搏而致腸胃陽氣怫欝而為熱亦有内傷冷物而反病熱得汗泄身凉而愈也或微而止為中酸俗謂之醋心法宜温藥散之亦猶解表之義若久喜酸不已則不宜温之宜以寒藥下之後以凉藥調之結散熱去則氣和也所以中酸不宜食粘滑油膩者

謂能令氣欝不通暢也宜糲食菜蔬使氣通利則酸自不作矣

論雜病吐酸與病機外邪不同

發明云病機吐酸皆屬于熱此上焦受外来客邪也胃氣不受外邪故嘔仲景以生姜半夏治之以雜病論之嘔吐酸水者甚則酸水浸其心不任其苦其次則吐出酸水令上下牙酸澁不能相對以大辛熱藥療之必減吐酸是吐出酸水也酸味者收氣也西方肺金旺也寒水乃金之

子子能令母實故用大鹹熱之劑瀉其子以辛熱為之佐而瀉肺之實以病機作熱攻之悮矣蓋雜病醋心濁氣不降欲為中滿寒藥豈能治之乎

辯素問東垣論酸不同

丹溪云或曰吐酸素問明以為熱東垣又言為寒何也予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣欝積而成欝積之久濕中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其有欝積之久不能自湧而出伏于肺胃之間咯不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱愈欝而酸味刺心肌表温煖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦可暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也但東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治欝結濕熱之法為未合經意予嘗治吞酸用黄連茱萸各炒隨時令迭其佐使蒼朮茯

苓為輔佐湯浸炊餅為小丸吞之仍教糲食蔬菜自養則病易安

劉宗厚曰謹按吐酸一證以病機言之則屬于熱以臟腑論之則脾胃受病以內邪言之則痰飲宿食之所為故治法熱者寒之脾惡濕以苦燥之有痰飲者清之分利之有宿食者消之導之驅逐之局方不察斯故以噫醋吞酸醋心吐酸水之證並入于氣門中率用温熱之藥豈吐酸專主于寒而無他證也故此一門以叙河間東

垣丹溪之論其病源治法無餘蘊矣

停飲門

許學士云余若有二疾一下血二膈中停飲下血有時而止停飲則無時始因年少時夜坐作文左向伏几案是以飲食多墜左邊半夜以後稍困乏必飲酒二三盃仍向左邊側睡壯盛時殊不覺病三五年後覺酒止從左邊下漉漉有聲脇痛飲食減十數日必嘔數升酸水暑月止是右體有汗漐漐常潤左邊痛處絶燥遍訪名醫

〈六卷〉 四

及海上方服之少驗間或中病止得月餘復作其補如天雄附子礬石其利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣予揣度之已成癖囊如潦水之有科臼不盈不行必盈科而行也清者可行濁者依前停蓄蓋下無路以出之也是以積之五七日必嘔而出稍寛數日復作脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝濕崇土以填科臼則疾當去矣于是悉屏諸藥止服蒼朮三月而除自此後不復發嘔胸膈寛飲啖如故暑月汗周體而身凉飲亦從中下前此飲漬其肝目亦多昏眩其後燈下能書細字皆蒼朮之力也故名其方曰神朮丸其蒼朮一觔去皮切末用之白芝麻半兩水二盞研濾取汁大棗十五枚煮爛去皮核研以麻汁成稀膏和入搜臼杵熟丸如梧子大每日空心白湯吞五七十丸一日服二三次忌桃李雀鴿初服時膈間必微燥且以蒼朮製之覺燥甚再進山梔子散一服久之自不燥也予服半年以後止用燥烈味極辛者削去皮不浸

〈六卷〉 五

極有力亦自然不燥山梔散用山梔一味乾之為末沸湯點服故知久坐不可伏向一邊時宜運動亦調息之法

脉經云胃脉虛主胃中冷苦吞酸頭痛寸口脉遲上焦有寒心痛喉酸吐酸水宜服附子湯生姜湯茱萸丸關脉沉心下有冷氣痞滿吞酸 攄

此亦有胃冷吞酸者

張子和治張風村一田叟嘔酸水十餘年乃留飲証也醫皆以燥劑治之不効更以艾火燔針刺

之中脘髒腑痞未嘗合予以苦劑越之出其涎
如膠者二三升談笑而愈

噫腐噯酸或每晨吐酸水數口或膈間常如酸蝕
皆飲食傷胃所致平胃散加神曲麥芽茯苓半夏

口吐清水乃胃中濕熱所為宜平胃散加白朮茯
苓滑石半夏不宜純用涼藥亦有胃寒而然者
理中湯主之　食鬱有痰二陳加南星黃芩香
附之類治酸必用吳茱萸者乃順其性而折之

戴元禮云濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱遏
其食不得傳化故作酸也如穀肉在器則易酸也

治寒酸溫胃之劑

東垣藿香安胃散　治脾胃虛弱不進飲食嘔吐
不待腐熟　藿香　丁香　人參各二錢半　陳皮五錢
右為末每服二錢生薑湯下

加減二陳湯　治痰飲為患嘔吐頭眩心悸或因
食生冷脾胃不和　丁香一兩　半夏　陳皮各五兩
茯苓三兩　甘草一兩半　每服五六錢入生薑煎服

三因麯朮丸　治中脘宿食留飲酸蜇心痛口吐

六卷　六

清水　神麯炒三兩　蒼朮米泔浸三宿洗淨乾炒一兩五錢　陳皮
一兩　一方有砂仁一兩　右為末生薑汁打神麯糊為
丸薑湯下

加味平胃散　治吞酸食鬱所致
平胃散加炒神麯麥芽薑棗煎服

治吞酸因傷冷物所致　治食後吐酸水同
乾薑炒二兩　吳茱萸炒二兩　為末酒服方寸匕一日二服

治噫酢咽方　吳茱萸半斤　生薑三兩　人參二兩　棗十二枚
水六升煮二升分三次食前服

治吐酸清水方　蒼朮陳壁土炒　白朮　茯苓　滑石
陳皮各等分　水煎服

聖惠方乾薑丸　治酒癖停飲吐酸水
乾薑　葛根　枳殼　橘紅　前胡各五錢　白朮
半夏麯各一兩　吳茱萸　甘草各二錢半
右為末煉蜜丸桐子大每五十丸米飲下

三生丸　治中風痰涎眩瞑嘔吐酸水頭疼惡心
半夏二兩　南星　白附子各一兩
右並生為末滴水丸梧子大以生麵裹為衣

六卷　七

陰乾每服十九至二十九生姜湯下

治熱之劑

丹溪方　一方加炒山梔仁三錢

吳茱萸（去梗炒乾）　陳皮　黄芩（陳土炒各五錢）　黄連（陳土炒一兩）

蒼朮（七錢半）　一方有桔梗茯苓（各一兩）

右末神麯糊丸菉荳大每服一錢半白湯下

黄連清化丸

黄連（一兩）　吳茱萸（一錢）　桃仁（廿四枚）　陳皮（五錢）　半夏（一兩半）

右為末神麯糊丸菉荳大每服百丸姜湯下

參萸丸　治湿而帶氣者湿熱甚者用之為向導

上可治呑酸下可治自痢

六一散（一料）　吳茱萸（一兩製）　為末飯丸

丹溪又云噫氣呑酸此係食鬱有熱火氣冲上黄芩為君南星半夏陳皮為佐熱加青黛

解表之劑

丹溪治一人因外感凉氣與宿食相搏心下酸疼嘔清水後有紅　青皮　枳殼　紫蘇　木通

甘草（各三錢）　黄芩　桔梗（各一錢半）　人參（二錢）　麻黄（五分）

加姜水煎服

寛中攻下之劑

遶膈湯　治脾胃不和中脘氣滞胸膈滿悶噎塞不通噫氣呑酸脇肋刺脹嘔逆痰涎飲食不下

木香　砂仁　檳榔　枳殼　厚朴　白荳仁

半夏　青皮　陳皮　甘草　大黄　朴硝

各等分每服一兩生姜三片棗一枚煎至一盞熱服

痰飲（膠固稠粘者痰也　清而稀薄者飲也）

痰飲為病所感不同有因氣脉鬱塞而得之者有因脾胃虛弱不能運行水穀而得之者有因痛飲飽食停滞胃中而得之者有因風寒暑濕之氣入脾相搏而成之者有因七情失節臟氣不行鬱而成之者所感不同病變甚多或為喘為欬為嘔為泄眩暈嘈煩忪悸惕懼寒熱疼痛腫滿攣癖癃閉痞膈如風如癲皆痰飲之所致也

飲有六曰懸飲溢飲支飲痰飲留飲伏飲懸飲者飲水流于脇下咳嗽引痛溢飲者飲水流于四

肢當汗不汗身體疼重支飲欬逆倚息短氣不
得卧其形如腫痰飲者其人素盛今瘦腸間漉
漉有聲留飲者其人背寒如手大或短氣而渴
四肢歴節痛脇下痛引缺盆欬嗽則轉甚伏飲
者腸滿喘欬嘔吐發則寒熱腰背痛目疾出其
人振振悪寒身瞤惕
東垣謂痰飲皆濕熱相乘如濕在心經為熱痰結
而為膠其色紅濕在肝經為風痰其色青如沫
濕在脾經為濕痰濕久為熱其色黄濕在肺經

為氣痰其色白咯出如米粒濕在腎經為寒痰
其色如唾
王隠君云痰清白者為寒黄濁者為熱熱欝之甚
或至帶血血敗則黒口吐白血者不治白血者
桃花色也
子和云入肺則多嗽入大腸則為泄入腎則為湧
水水在上則面浮在下則脚腫在中則為痞膈
痰逆
人之停飲留于胃脘皆由胃氣虚弱飲水飲酒不
能傳化結為痰飲行痰而漉漉有聲者自有癖
嚢在胃内飲水則滲入停蓄于其間其狀若胞
嚢不可速去然亦不能為速害若見變証百端
在上焦須以爪蔕散吐之在胃脘宜十棗湯下
之然後以温藥温胃氣丁香茯苓半夏以蕩散
水飲仍宜丁香半夏湯以拔其根
熱痰則多煩熱風痰多成癱瘓奇症冷痰多成骨
痺濕痰多成倦怠軟弱驚痰多成心痛癲疾飲
痰多脇痛臂痛食積痰多成癖塊痞滿

或心下如停氷雪心氣冷痛或脊上每日一條如
綫之冷起或渾身習習如虫行或胸腹間如有
二氣之交紐又或如烟火上衝頭目烘熱或風
毒脚氣或嘔冷涎緑水黒汁甚為癆瘵肺癰腸
毒種種不一皆痰飲之所為也
嚴氏云人之氣道貴乎順順則津液流通決無痰
飲之患自潤下從小便中出矣又有病人元有
痰積其氣因痰而結滯者則又必先逐去痰結
滞氣自行豈可執一

王隱君云津液既凝為痰不復周潤三焦故口燥咽乾大便秘面如枯骨毛髮焦槁婦人則因此月水不通若能逐去敗痰自然服藥有効脾土上應于天亦屬濕化所以水穀津液不行即停聚而為痰飲夫人之病痰火者十居八九老人不宜速降其火虛人不宜盡去其痰攻之太甚則病轉劇而致危殆須以固元氣為本

有病喜吐痰唾服八味丸而作効者叔和云腎寒多唾蓋腎為水之官腎能攝水腎氣溫和則水

液潤下腎氣虛寒則邪水溢上故用八味丸以溫利之

活人書云中脘有痰亦令人增寒發熱惡風自汗胸膈痞滿有類傷寒但頭不痛項不強為異

丹溪云風痰多見奇症　凡風痰病必用風痰藥白附子天麻雄黃牛黃僵蚕皂角之類　濕痰多見倦怠軟弱　濕痰宜用蒼白二朮又用油炒半夏　熱痰多挾風外症為多用青黛黃連天花粉大快膈上熱痰　痰因火盛逆上者治火為先白朮黃芩石膏之類中氣不足加參朮　食積痰神麯麥蘗山查欲吐食積痰用蘿蔔子油炒為末漿水調下探而吐之　食積痰必用攻若氣虛者用補氣藥送　老痰海石半夏瓜蔞香附五倍子佐他藥大治頑痰　欝痰僵蚕杏仁瓜蔞訶子貝母五倍子　痰而脾虛者清中氣二陳湯加白朮之類兼用升提藥　內傷挾痰必用參朮芪之類多用薑汁傳送或加半夏之類虛甚加竹瀝　眩運嘈雜乃火動其

痰用二陳湯加梔子芩連之類　噫氣吞酸此係食欝有熱火氣上動以黃芩為君南星半夏橘紅為臣熱多加青黛喉中如有物咯不出咽不下此老痰也重者吐之用瓜蒂散氣實用荊瀝仲景用半朴茯夏治之神驗　痰結核在咽喉中燥不能出入化痰藥內加鹹藥軟堅之味瓜蔞仁杏仁海石桔梗連翹少佐以風化硝薑蜜丸噙化　凡人身上中下有塊是痰問其平日好食何物吐下後方用藥　痰之為物隨氣升降無處不到

痰在腸胃間可下而愈　痰在經絡中非吐
不可出吐中就有發散意痰在膈上必用吐之
瀉亦不出　痰膠固及脉浮者俱用吐法　痰
在脇下非白芥子不能達　痰在皮裏膜外以
姜汁竹瀝導之　痰在四肢非竹瀝不能開
二陳湯善治一身之痰如在下加下引藥在上
加上引藥　潤下丸降痰最妙　青礞石丸重
在風化硝　小胃丹能逐貫胃痰積然不宜多
服　蒼朮治痰飲成窠囊者極効　海粉能治

熱痰降湿痰軟結痰消頑痰最効可入丸子不
可入煎藥　枳實瀉痰能衝墻壁　竹瀝能治
腸間有痰或癲狂或健忘或風痰最効又能養
血　荆瀝治痰稍重用此二味効速且穩當二
瀝治痰結在皮裏膜外及經絡必佐以姜汁
韮汁治血滯不行中焦有飲取自然汁冷飲三
四盞以覺胸中煩躁不寧後自愈氣實熱痰吐
難得出或成塊或吐咯不出及薰氣鬱者難治
中焦有痰胃氣亦頼所養卒不便虛若攻之盡

則虛矣　凡治痰用利藥過多致脾氣下虛則
痰反易生而多矣
丹溪云痰之為病方論少有細述者近推三因畧
言亦無加減法夫痰之源不一有因痰而生熱
者有因熱而生痰者有因氣而生者有因風而
生者有因驚而生者有積飲而生者有多食而
成者有因暑而生者有傷冷物而成者有脾虛
而成者有飲酒而成者其為病也驚痰則成心
包痛顛疾熱痰則煩躁頭風爛眼燥結怔忡懊

憹驚眩風痰成癱瘓大風眩暈暗風悶亂飲痰
成脇痛四肢不擧每日嘔吐食痰成癖痢口出
臭氣冷痰骨痺四肢不擧氣刺痛酒痰飲酒不
消但得酒次日又吐脾虛生痰食不美反胃嘔
吐氣痰攻注走刺不定婦人于驚痰最多盖因
産内交接月事方行其驚因虛而入結成塊者
為驚痰必有一塊在腹發則如身孕轉動跳躍
痛不可忍凡人手臂或動不得或骨節遍身痛
坐卧不能此痰入骨也　有人脚氣久不治骨

節痛與脚氣藥不効此痰病也　凡傷寒病後嘔吐藥不得入亦因初病膈中有涎痰也或因下之太早而遂議其非痰未為確論　傷寒發黄亦是痰病蓋因熱搏而成凡大便秘者亦是痰結

左右關脉滑大者膈中有痰也可吐之怕吐者消息下之凡人每日背上一條如線而寒起者宜吐下之凡病百藥不効其關上脉伏而大者痰也用妙應丸加減法（方見走注痰痛即控涎丹）

洞虛子論痰之為病成偏頭風成雷頭風成太陽頭痛眩運如坐舟車精神恍惚或口眼瞤動或眉稜耳輪俱癢或頷腮四肢遊風腫硬似疼非疼或渾身燥痒搔之則隱疹隨生皮毛烘熱色如錦斑或齒頰似痒似痛而疼無定所滿口牙浮痛痒不一或噯氣吞酸鼻聞焦臭喉間荳腥氣心煩鼻塞咽嗌不利咯之不出咽之不下或因噴嚏而出或因舉動而唾其痰如墨又如破絮或如桃膠或如蜆肉或心下如停水鐵閉滯妨悶噯噫連聲狀如膈氣或寢夢刑戮刀兵劍戟或夢入人家四壁圍遶暫得一竇百計得出則不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足膝酸軟或骨節腰腎疼痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戮乍起乍止並無常所或不時手臂麻疼狀如風濕或背如芒刺不安或如毛虫所螫或四肢不舉或手

足重滞或眼如姜蛰膠粘痒澁開闔甚難或陰晴交變之時胸痞氣結或齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳内蟬鳴眼瞤肉惕惟洞虛子備此疾苦述甚詳悉乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交紐噎塞煩鬱有如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃間湧起凜然毛竪噴嚏千百然後遍身煩躁則去衣凍體稍只片時或春秋乍

涼之時多加衣衾亦得暫緩或頃飲水水而定或痛飲一醉而終不能逐去病根乃得神秘沉香丸方屢獲大効愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之詩曰飄裏翻身甲帶金于今頭戴草堂深相逢二八求斤正硝煆青礞倍若沉十七兩中零半兩水丸梧子意須斟驅除怪病安心志水瀉雙身却不任

大黃（蒸八兩） 黃芩（八兩） 青礞石（一兩硝煆如金色） 沉香（半兩）

右為末水丸如梧子大白湯食後空心服

治飲之劑

心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂朮甘草湯主之

茯苓（四錢） 桂枝 白朮（各三錢） 甘草（二錢） 水煎服

小便自利短氣有微飲當從小便去（之亦前湯主之）

病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也甘草半夏湯主之

甘遂（去心麵裹煨乾大者三枚） 半夏（十二枚製） 芍藥（五枚） 甘草（一如指大枚炙）以水二升煮取半升去柤以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

懸飲十棗湯主之

芫花（洗淨醋拌經宿一時炒令黑勿焦先爭日乾） 甘遂（去心同前製） 大戟（去皮長流水煮）（各一等分為末） 以水一升五合先煮肥大枣十枚取八合去查納藥末強盛人五分平旦服之不下更加五分下後以糜粥調之

溢飲者當發其汗大小青龍湯主之大青龍湯

麻黃（六錢去節） 桂枝（二錢去皮） 甘草（二錢炙） 杏仁（四十枚去皮尖） 石膏（二錢研碎） 生姜（二錢） 大枣二枚水三碗半煎去柤溫服取微汗汗多者溫粉撲之

小青龍湯 麻黃（三錢去節） 五味子 半夏（各二錢） 乾姜 甘草（炙） 細辛 桂枝（三錢去皮各） 水七碗煮麻黃至六碗去沫内諸藥煮取二碗

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三日復發復愈不愈者宜防已湯去石膏加茯苓芒硝湯主之微利則愈

木防已 石膏（各三錢） 桂枝（二錢） 人參（四錢）

水三碗煎一碗溫服 加茯苓（四錢） 芒硝（三錢）

去石膏名防已苓硝湯

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

澤瀉五錢 白术二錢 水碗半煎一碗溫再服

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之

厚朴二錢 大黃六錢 枳實五分 水煎溫服

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之

葶藶炒令黃色搗丸如彈丸大 大棗十二枚 先以水三升煮棗至二升去棗內葶藶煮取一升頓服

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也 小半夏湯主之 方在嘔吐門

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣已椒藶黃丸主之

防已 椒目 葶藶炒 大黃各一兩

右為末蜜丸如梧子大先服一丸日三服稍增口中有津液渴者加芒硝五錢

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之 方見嘔吐門

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散主之 白术 茯苓 猪苓各二錢 澤瀉一錢 桂二錢 右為末白飲服方寸匕日三服飲暖水汗出愈

水氣去後心胸間虛氣滿不能食茯苓飲消痰氣能令食 茯苓 人參 白术各三錢 陳皮二錢半 枳實 生姜各四錢 水煎連進三服每一服後如人行八九里復進

欬逆倚息不得臥小青龍湯主之青龍湯服後多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面翕然如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓五味甘草湯主之

茯苓 桂枝各四錢 甘草炙二錢 五味子五錢 作三服

衝氣即降而反更欬胸滿者苓甘五味姜辛湯主之 茯苓四錢 五味子五錢 甘草 乾姜各二錢 細辛三錢 水三鍾煎一鍾日三服

欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾姜為熱藥也服之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復納半夏以去其水苓甘五味姜辛夏湯主之

茯苓 五味子 半夏各四錢 甘草 細辛

干姜各二錢 水煎日三服

水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其症應納麻黃以其人遂痺故不納之若逆而納之者必厥所以然者以其血虛麻黃發其陽故也

若面熱如醉此為胃熱上衝熏其面前方加大黃三錢以利之先渴後嘔為水停心下此屬飲家小半夏茯苓湯主之 半夏二錢 茯苓一半錢 生姜十片 水煎服

五飲湯治五飲最効

旋覆花 人參 橘紅 枳實 白朮 茯苓 厚朴製 半夏製 澤瀉 猪苓 前胡 桂心 白芍藥 甘草炙各等分 每兩分二服姜十片水二盞煎去渣溫服無時忌肉食生冷等物因酒成飲加葛花砂仁

治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉弦細遲旋覆花湯

細辛 陳皮 桂心 人參 甘草 桔梗 芍藥 半夏 旋覆花各半兩 赤茯苓、

每服四錢姜七片煎去渣溫服

木香半夏丸 治痰涎上湧心胸不利常服消痰寬膈 半夏一兩 木香七錢 陳皮 茯苓 姜屑 人參 白附子 草蔻各五錢 右為末麪糊丸

食後生姜湯下五十丸

降痰丸 治三焦氣澁下痰飲消食利膈痞滿欬唾稠粘面熱目赤支體倦怠不思飲食常服升降滯氣消化痰涎 木香 檳榔 青皮 陳皮 枳殼麩炒 大黃 半夏湯泡 京三稜 黑牛各一兩 右為末麪糊丸食後薑湯下

吐劑

治哮嗽妙方 砒霜 麵 海螵硝各一錢

為末水調作餅子慢火炙黃再研令細每服一字用井花水作一呷服良久吐出為度小兒減半 忌食熱物 凡吐寒痰藜芦瓜蒂吐不透者用附子尖妙

瓜蒂散 赤小豆 瓜蒂炒等分 右末香豉一合

水二盞煮作稀粥去查取三之一和末一錢
頓服之不吐少加得快吐乃止
三聖散　防風　瓜蒂各二两　藜蘆去苗及心或一两或半两
右為各粗末每服約半兩以虀汁三碗先用
二碗煎三五沸去虀汁次入一碗煎至三沸
却將原二盞同一處煎二沸去查放溫徐徐
服之不必盡劑以吐為度
稀涎散　猪牙皂角不蛀者去皮弦一两炙用之　緑礬半两　藜蘆
半两　白礬一两　右為末每服一錢溫水下

治濕和中之劑
枳朮湯　枳實半两　白朮二两　水煎作三服
桔梗半夏湯　桔梗　半夏　陳皮　生姜水煎服
導痰湯　治一切痰涎壅盛胞膈留飲痞塞不通
二陳湯加枳實南星改白茯用赤茯苓
此方加桔梗一兩木香一兩沉香半兩名二香
導痰湯又方無二香加人參瓜蔞仁
神朮丸　治痰飲　方在吐酸停飲門
茯苓澤瀉湯　小半夏加茯苓湯並見前

治風痰之劑
玉壺丸　治痰飲　方在頭痛門
水煮金花丸　治風痰頭眩嘔吐咳嗽
南星　半夏各一两生用　寒水石二两　白麵三两　天麻五錢
雄黃一錢　滴水丸菉豆大每服五七十丸日乾煎
漿水沸下藥煮浮為度漉出淡漿水浸另用
姜湯下通聖加半夏亦可服
熱痰之劑
小陷胷湯　半夏　黃連　瓜蔞仁　水煎服

半夏丸　瓜蔞仁　半夏各一两製　姜汁打糊丸
小黃丸　人參　黃芩　南星　半夏　生姜
姜汁糊丸
寒痰之劑
消飲丸　兼治宿酒停飲胸滿嘔逆目視䀮䀮腹
中水聲痛不思飲食　白朮五两　茯苓二两　枳實七錢
乾姜一两　右丸蜜丸菉豆大每服溫水下三十丸
化痰丸　半夏三两　陳皮　乾姜　白朮各一两
姜汁糊丸姜湯下二十丸

温中化痰丸　青皮　陳皮　乾姜　良姜
倍术丸　治五飲
乾姜　肉桂各半斤　白术一斤
為末蜜丸小荳大每服二三十丸米飲下
丁香半夏丸　檳榔半兩　丁香　半夏各一兩　細辛
乾姜　人參各半兩　姜汁糊丸　服三十丸姜湯下
姜桂丸　南星　半夏　官桂各一兩
糊丸菉豆大姜湯下五七十丸

理氣之劑
四七湯　治仝六合
半夏五兩　茯苓四兩　蘇葉　厚朴各三兩　姜棗煎
三仙丸　南星　半夏各五兩　香附五兩
糊丸姜湯下四十丸
蘇子降氣湯　前胡　厚朴　陳皮　甘草
川歸　桂各二兩　蘇子　半夏各五兩　姜棗煎
六合湯　治七情氣鬱結成痰涎狀如破絮或如
梅核咯不出嚥不下嘔逆悪心
陳皮　半夏　茯苓　厚朴　香附　紫蘇莖

等分每服四錢生姜三片水煎服
加味化痰丸　人參　白术　半夏製　茯苓
桔梗各一兩　枳實　香附　前胡　甘草半兩
右為細末用半夏末姜汁糊丸每服五十丸
白姜湯下
二生湯　治胃冷有痰　附子生去皮臍　半夏生各等分
每服四錢水二盞生姜十片煎至七分温服
加木香少許尤佳
水玉湯　治眉稜骨痛不可忍此痰厥也

半夏製每服三錢姜十片煎八分食後温服
又宜服温膽湯
仲景茯苓飲　治胸停水飲吐水氣満不飲食
白术　茯苓各一兩　人參七錢半　陳皮　枳實各五錢半
每服水二鍾生姜一錢煎七分服
又方　治痰飲吐水無時節者其源以飲冷過度
遂令脾胃氣弱食不消化飲食入胃則皆變冷
水反吐不停　赤石脂一觔搗篩服方寸匕酒
飲任服稍稍加至三錢七服盡一觔終身不吐

冷水又不下利補五臟令人肥健有人痰飲服
諸藥不効服此即痊

二賢散　此消痰飲之要藥也

陳皮二兩　甘草半兩　為末每服二錢沸湯下

治一切痰方　陳皮一觔去穰取紅淨外以甘草
塩各四兩水五碗慢火煮乾焙為末白湯點服

清健丸　治一切痰飲

枳實　白朮各二兩　陳皮　半夏　南星　山查
各一兩　白芥子　黄芩　蒼朮各一兩半　川連　川歸

砂仁各五錢　右為末用神麯五兩為粉取竹瀝二
碗姜汁半盞煮糊丸梧子大每服八九十丸
白湯送下

竹瀝達痰丸　半夏滾姜湯泡透去皮臍晾上微火炒二兩　白茯苓
去皮二兩　陳皮去白二兩　大黄酒浸透晒乾二兩　白朮　黄芩酒炒
各三兩　甘草炙　人參　青礞石各一兩搗碎用焰硝一兩煅如金色
沉香五錢　右為細末用竹瀝一大碗半生姜汁二
盞和勻入鍋內火熬一刻許令熟將前藥和
搗為稀醬様磁器盛晒乾仍以竹瀝姜汁如
前法搗勻和晒乾如此三次仍前竹瀝姜汁
和丸如小豆大每服一百食遠白米湯下能
運痰從大便出不損元氣神妙神妙

半夏利膈丸　治風痰頭疼目眩咽膈不利涕唾
稠粘并治酒過停飲嘔逆悪心胷脇引痛腹內
有聲　半夏湯泡三兩　白附子生用二兩　天南星生用一兩半
白朮　茯苓去皮　白礬　人參去蘆　滑石各一兩　貝母
一兩　右為末麺糊丸梧子大每服三十丸食後姜湯下

八味丸　治脾虗不得尅制腎水多吐痰唾而不
咳者　附子炮去皮臍　桂心各一兩　山茱萸肉　山藥

各四兩　白茯苓　澤瀉　牡丹皮各三兩　懷熟地黄
八兩　右為末蜜丸梧子大每服五十丸空心塩湯下

葉氏分涎湯　治風痰留滯膈間喘滿悪心涎唾
不利　橘紅　人參　桔梗　枳實　半夏湯洗七次令軟每切四片用姜汁浸一夕　天南星去外皮濕紙包火煨香熟取出各
等分　姜十片每服三錢水一盞煎食後服

桔迷茯苓丸　治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足
不得轉移　半夏二兩　茯苓一兩　枳殼去穰麩炒五錢　風化

硝半二錢 右為末姜汁麵糊丸梧桐子大每服三
十丸姜湯下
辰砂祛痰丸 治酒食過多酸鹹作成痰飲聚于胸中凝則嘔逆惡心流則臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥神効 右硃砂一兩水飛一半入藥一半為衣 半夏四兩 生姜四兩與半夏製作餅陰乾 陳皮 白礬生
荊芥各一兩 為末姜汁糊丸梧桐子大每食後服
五十丸姜湯吞下忌動風動氣物
檳榔散 治胸膈停滯痰飲腹中虚鳴食不消化
時或嘔逆 杏仁去皮尖 旋覆花去枝梗 半夏湯洗七次

檳榔 桔梗去芦炒 白术 乾姜炮 橘紅各一兩
甘草炙 人參各半兩
吳仙丹百一選方治痰飲上氣不思飲食小便不
利頭目昏眩 吳茱萸湯泡 白茯苓各等分
右為末蜜丸梧子大每服三十丸滚湯温酒任下
辰砂化痰丸 治風化痰安神定志利咽膈清頭
目 白礬枯 辰砂飛各五錢 天南星炮一兩 半夏洗三兩
右為末以姜汁麵糊丸梧子大辰砂為衣每
服二十丸姜湯下

防風丸 治風痰上攻頭痛惡心項急目眩旋暈
痰涎壅滯昏憒 天麻一兩 川芎一兩 甘草炙 川芎各一兩
防風各一兩 硃砂五錢為衣 右為末麵糊丸梧子大
每服一錢荊芥湯下
控涎丹一名妙應丸 凡人忽胷背手脚頸項腰
膀隱痛不可忍連筋骨牽引釣痛坐卧不寧時
時走易不定俗醫不曉謂之走注便用風藥及
針灸皆無益又疑是風毒結聚欲作癰疽亂治
亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變疾狀或

令人頭痛不可舉或神思昏倦多睡或飲食無
味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲口流唾涎手脚
重腿冷痺氣不通誤認為癱瘓亦非也凡有此
疾但用是藥不過數服其疾如失
甘遂去心 紫大戟去皮 真白芥子各一兩
右為末煮糊丸梧子大晒乾臨卧淡姜湯或
滚水下五七丸至十丸痰猛氣實加丸數不
妨其効如神 加減法
脚氣加明松脂一錢檳榔木瓜各一兩卷栢半

兩先以鹽水煎半日次日白水煮半日同前藥為丸每服二十丸加至四五十丸再服下惡物立効　驚痰加硃砂全蝎各二錢每用八九丸常與之三五服去盡　酒痰加雄黃全蝎各二錢每服十丸走注腰痛加核桃三箇燒灰每服三十丸加至五十丸温酒下　脚氣走注于前方内加呉茱萸　驚氣成塊者加川山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索蓬朮各四錢每服五十丸加至七十丸以利為度　臂痺痛加木鱉子去殼研一兩桂半兩　熱痰加盆硝等分每服三兩丸　寒痰加胡椒丁香蝎桂各等分每服二十五丸

茯苓半夏湯　治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆于脾胃之間當先實脾胃方在嘔門

御愛紫宸湯　解宿酒嘔噦惡心痰唾進飲食

木香半兩　檀香俱不見火　藿香　砂仁　葛花　茯苓　官桂各一兩　陳皮　乾葛　良姜　丁香不見火　炙甘草各二兩　每服四錢水煎不拘時服

柴胡半夏湯　治痰症不敢見風眼澁頭痛有痰眼黑惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重難舉居煖處有微汗便減如見風即復作一名補肝湯

柴胡　蒼朮各一錢半　半夏二錢半　茯苓二錢　神麯炒　藁本各一錢　升麻五分　姜五片水煎食遠服

枇杷葉散　治痰逆此藥温胃思食

青皮去穰炒　草豆蔻各半兩　前胡　枇杷葉　人參　半夏湯泡　茯苓去皮　大腹皮　白朮　厚朴去粗皮姜汁炒各一兩　姜三片每服四錢水煎不拘時熱服

清氣化痰丸　治上焦痰火壅盛或嗽或喘煩熱口乾胸膈痞悶　天南星二兩　半夏湯泡二兩　黃連　黃芩各五兩　茯苓　栝蔞仁去殼　杏仁去皮尖各四兩　陳皮　枳實麩炒各六兩　甘草二兩　右為末姜汁煮麵糊丸梧子大每服七十丸食後姜湯下

清氣化痰丸　清利胸膈順氣化痰寬中健脾消導飲食治痰之聖藥也　半夏二斤　南星六兩　栝蔞　黃連　紫蘇子炒　蘿蔔子炒　枳實麩炒　橘紅　茯苓　山查各四兩　乾姜生　香附子炒　甘草炙

黃芩各二兩 右將南星切作十字塊半夏每箇切作二塊皂莢六兩白礬三兩多用水將南星半夏皂莢白礬一處浸三宿煮南星透爲度只將南星半夏晒乾同衆藥爲末水糊丸梧子大每服七八十丸加至百丸食遠茶清下或臨睡

怔忡驚悸門

生生子曰怔忡者心中惕惕然動不自安也驚者從外而入或耳聞異聲目擊異物驚而懼也悸者中心畏怯動而怕驚也怔忡止于心不自安悸則心既動而又恐恐然畏懼如人將捕之驚而駭也治怔忡之法惟當益其心血壯其神氣治驚悸則有諸經之証當分別治之

治驚之法內經曰驚者平之平常也使平日常見常聞則何驚之有張子和治衛德新之妻被盜而驚乃以平法治之良愈

黃帝曰足陽明病惡人與火聞木音則惕然而驚鍾鼓不爲動聞木音而動何也岐伯曰陽明者胃也胃者土也土惡木故驚也 又曰東方青色入通于肝其病發驚駭 脾移熱于肝則爲驚衄肝而驚者屬肝臥則血歸于肝今血不靜血不歸肝故驚悸于臥也

仲景曰食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣飲水多必心下悸 五飲停蓄閉于中脘最使人驚悸痰飲驚悸皆屬于脾土

東垣云六脉俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜氣浮以甘辛溫微苦峻補其血熟地生地柴胡升麻白芍丹皮川芎黃著之類以防血溢上竭甘寒鎮墜之劑謂丹砂之類

丹溪云怔忡大槩屬血虛與痰 有慮便動者屬虛時作時止痰因火動 瘦人多是血虛 肥人多是痰飲 真覺心跳者是血少宜四物安神之類 又曰病自驚而得者驚則神不守舍舍空得液則成痰也血氣入舍則痰拒其神不得歸焉控涎丹加辰砂遠志

猪心血丸 治勞役心跳大虛症

歸身 白芍 側栢 川芎各五錢 陳皮 甘草
黃連各二錢 硃砂一錢 右用猪心血為丸
溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏变生諸症或短氣悸乏或自汗此膽虛不能致脾則脾之水飲作矣
半夏 橘紅 竹茹 枳實炒各一兩 甘草炙一兩
白茯苓一兩半 每服五錢薑五片棗一枚水一盞煎七分食前服
仲景半夏麻黃丸 治心下悸

半夏 麻黃等分為末 煉蜜丸小荳大飲服三丸
鎮心丸 治驚悸 辰砂用黃松節油浸 龍齒用遠志苗醋煮
右只取辰砂龍齒等分為末猪心血為丸芡實大每服一丸以麥門冬葉菉豆灯心白蜜水煎荳熟為度臨卧湯下小兒磨化半丸量歲數與之
蜜佗僧散 治驚氣入心絡不能語者昔有為狼及大蛇所驚皆服此而安
蜜佗僧研極細末茶調下一錢匕服即愈

寒水石散 治因驚心氣不行鬱而生涎結為飲遂為大疾怔悸少遇驚則發尤宜服之
寒水石煅 滑石飛 生甘草各等分 為末每服二錢熱則新汲水下怯寒則姜棗湯下加龍腦少許尤佳
定志丸 心氣不足驚悸恐怯
石菖蒲炒 遠志去心 茯苓各二兩 人參一兩 辰砂五錢為衣
為末蜜丸梧子大每服五十丸米湯下
安神鎮心丸 治驚悸消風痰
石菖蒲 遠志 人參 茯神 川芎 山藥
麥門冬 鉄粉 天麻 半夏 南星 茯苓各一兩
細辛 辰砂各五錢 右為末生薑五兩取汁入水煮糊為丸菉荳大另以硃砂為衣每服二十五丸夜卧生薑湯下小兒減半

茯苓丸 治驚悸 方在癲門
東垣羌活勝濕湯 治卧而多驚悸多魘冒邪在少陽厥陰也加柴胡五分如淋加澤瀉五分此下焦風寒二經合病也經曰肝腎之病同一治為俱在下焦非風藥行經不可也

羌活 獨活 防風 藁本各一錢 蔓荊子三分
川芎二分 甘草炙五分 水二鍾煎服

東垣硃砂安神丸 治外物所驚宜鎮平之
黃連一錢半 甘草炙 當歸 生地各五分 硃砂水飛一錢
右為細末浸蒸餅為丸黍米大硃砂為衣每服十五丸食後津嚥下 一方當歸地黃各一錢

心澹澹動

綱目云澹澹因痰動也心澹澹動者謂不怕驚而心自動也驚恐亦曰心中澹澹恐謂怕驚而心

〔六卷 三十八

亦動也

其澹澹自動之病屬二經一屬厥陰心主經曰心主手厥陰之脈是動則病心中澹澹大動面赤目黃喜笑不休視盛虛寒熱陷下取之是刺灸之法也又曰太陽司天寒淫所勝病心澹澹大動胸脇胃脘不安治以甘熱是運氣之寒傷心主也其二屬少陽病經云一陽發病少氣善欬善噫其傳為心掣是也

怒

怒在陰陽為陰遏而不得伸也經云陰出之陽則怒又云血并于上氣并于下心煩寃善怒東垣云多怒者風熱陷下于地是也

怒屬肝膽經云在臟為肝在志為怒又云肝藏血血有餘則怒又云膽為怒

丹溪治怒方 香附末六兩 甘草末一兩
右和勻每服五錢白湯調下

運氣怒皆屬木太過內經曰陽氣者大怒則形氣絕而血菀于上使人薄厥又云暴怒傷陽怒則

〔六卷 三十九

氣逆甚則嘔血及飧泄是也

生生子曰面青善怒亦是肝氣太過當益肺金以制之毋徒平木此五行勝復之理用藥之法亦當要識此意不然必不能杜根也

善太息

運氣善太息皆屬燥邪傷膽經云陽明在泉燥淫所勝病善太息又云陽明之勝太息嘔苦又云少陰司天地乃燥淒愴數至脇痛善太息是也

內經善太息皆取心膽二經岐伯曰思憂則心系

急心系急則氣道約約則不利故太息以出之
又曰膽病者善太息口苦嘔宿汁視足少陽脉之陷下者灸之

徐仲子士偉曰家君肄業過勞場屋屢北志堅不懈吐衂盈盆虛羸骨立夜卧合睫則夢爭鬪轉鬪轉負恐畏之態無可名狀呼號之聲髴然若雷而不能騰出于口家人侍睡者莫不縮首伸舌如是者十年所矣每五七夜必一發過勞則連發發尤猛歷訪師友多作心血不足治惟補心安神補心安神藥投之漠如也終莫識為何症擱心若思思每達旦更幾寒暑矣一日偶觀素問藏氣法時篇論有曰肝病令人善怒虛則目𥆧𥆧無所見耳無所聞善恐如人將捕之恍然悟乃知為魂遊症也何言之夫夜卧屬氣于肝肝主藏血藏魂者作文既苦衂血過度則魂失養惟是交睫若魘則夢爭鬪肝虛則膽怯故多負多恐也非峻補不奏功又思草木之劑不堪任重乃以鹿角膠三錢侵晨酒熔服五日

而睡卧安半月而肌肉生一月而神氣完始能出户厥後每見血症虛憊者崩中眩暈者投前劑莫不响應夫人徒知鹿角膠補虛之功勝于參耆而不知鹿角膠可以峻補肝血盖血盛而魂自安也

恐

生生子曰恐與驚悸相似實非驚悸也張子和云驚者為自不知恐者為自知故也盖驚者聞響即驚恐者心中恍恍然自知如人將捕之狀及不能獨自坐卧必須人為伴侶方不恐懼或夜必用燈照無燈燭亦恐懼者是也

臟腑恐有四

一曰腎經云在臟為腎在志為恐又云精氣并于腎則恐是也

一曰肝膽經云肝藏血血不足則恐戴人曰膽者敢也驚怕則膽傷矣盖肝膽實則怒而勇敢肝膽虛則善怒而不敢也

三曰胃經云胃為恐

四曰心經云心怵惕思慮則傷神。傷神則恐懼自失
周本心年六十歲形氣俱實因大恐正月間染病
心不自安如人將捕之狀夜臥亦不安兩年後
欲飲以人參白朮當歸身為君陳皮為佐加鹽
炒黃柏炙玄參各少許煎服月餘而安
經云恐傷腎用鹽炒黃柏炙玄參引參朮等藥入補腎足少陰絡也、
治膽虛常多畏恐不能獨臥如人捕之狀頭目不利
人參 枳殼 桂心 甘菊 茯神 五味子
山茱萸 枸杞子各三分 栢子仁 熟地黃各一兩
〈六卷 四十二
右為末每服二錢溫酒調服
治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胸中滿悶
茯神一兩 枳殼半兩 遠志 防風 細辛 白朮
人參 前胡 桂心 甘菊 熟地黃各三分
右為末每服三錢水一盞姜三片煎六分溫
服不拘老幼皆可服
治膽虛目瞶喉痛數唾眼目眩冒五色所障夢見
被人爭訟恐懼面色變者補膽防風湯
防風一錢 細辛 川芎 茯苓 甘草 獨活

前胡各八分 人參七分 棗二枚水煎食前服
運氣善恐皆屬肝木虛經云木不及曰委和。委和
之紀其病搖動注恐是也。
生生子曰經云恐傷腎子在苕見一友人與一女
子私合正值陽敗之際為人驚破恐懼走歸精
流不止而斃又觀六十家小說載一女子與一
少年亦如上故事特揭附此以為好色傷生者
之戒

善悲

〈六卷 四十一
內經云在臟為肺在志為悲又云精氣并于肺則
悲是也。肺虛補母仲景云婦人臟躁喜悲傷欲
哭。象如鬼神所附數欠伸甘麥大棗湯主之
甘草三兩 小麥一升 大棗十枚
水六升煮三升分三服亦補脾氣
許學士治一婦人數次無故悲泣不止或謂之有
祟祈禳請禱備至終不應予忽憶金匱有一證
云婦人臟躁悲傷欲哭象如鬼神數欠伸者
宜甘麥大棗湯予急令治藥盡劑而愈古人識

病制方種〻絶妙如此
運氣云悲證皆属寒水攻心經云火不及曰伏明伏明之紀其病昏惑悲忘從水化也又云太陽司天寒氣下臨心氣上從喜悲數欠又云太陽司天寒淫所勝善悲時眩仆又云太陽之復甚則入心善忘善悲治以諸熱是也

姙娠善悲

綱目述管先生治一姙娠四五箇月臟躁悲傷遇晝則慘感淚下數欠象若神靈如有所憑醫與巫皆無益與仲景大棗湯一投而愈

赤水玄珠第七巻目録

欬嗽門
喘門
氣短 氣促 少氣 産後喘
哮門
善悲 肺痿 肺癰

赤水玄珠第七卷

新安生生子孫一奎著輯

咳嗽門

臟腑皆有欬

黃帝問曰肺之令人咳何也岐伯對曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也（注此邪從外受之 王注云邪謂寒氣）其寒飲食入胃從肺脉上至於肺則肺寒（寒邪從外受也）肺寒則外內合邪因而

客之則為肺欬（時謂肺先受邪也）五臟各以其時受病（王注云時謂王月也）非其時各傳以與之人與天地相參故五藏各以治時感於寒則受病微則為欬甚則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則吐血（取大淵穴也）心欬之狀則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺（取大陵穴也）肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿（取太衝穴也）脾欬之狀欬則右脇下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇（取太白穴也）腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎（取太溪穴也）

帝曰六腑之欬柰何安所受病岐伯曰五臟之久欬乃移於府脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出（取三里穴也）肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁（取陽陵泉穴也）肺欬不已則大腸受之大腸欬狀欬而遺失（取巨虛上廉也）心欬不已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱

失（取巨虛下廉也）腎欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺溺（取委中穴也）久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也（取支溝穴）帝曰治之柰何岐伯曰治臟者治其俞治府者治其合浮腫者治其經（詳見欬論）

按素問曰咳嗽煩冤者是腎氣之逆也（示從容論）一陽發病少氣善欬善泄　夏脉不及則令人上見咳唾下為氣泄

凡咳嗽面赤胸腹脇常熱惟於足乍有凉時其脉洪者熱痰在胸膈也宜小陷胸湯礞石丸之類清膈降痰甚而不已者宜吐下其痰熱也面白悲嚏或脇急脹痛或脉沉絃細遲而咳者寒飲在胸腹也宜辛熱去之

脉治

脉經曰關上脉微爲欬　脉緊者肺寒雙弦者寒

欬而脉弦濇爲少血　浮緊者虛寒

脉細傷濕　脉浮而緩傷風

數則爲熱沉數者裏熱　脉弦爲水偏弦爲飲

洪滑多痰　脉沉爲留飲

肺脉微急爲欬而唾血　欬脉浮直者生浮軟者生

欬證死脉

欬而脉緊者

欬而羸瘦脉形堅大者

肌瘦下脱形熱不去

欬而脱形發熱脉小堅急者

咳而嘔腹脹且泄其脉弦急者皆死不治

仲景曰人欬十年其脉弱者可治實大數者死其脉虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家　上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚　脉浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也　欬嗽羸瘦脉形堅大者死　欬而脱形身熱脉小堅急以疾是逆也不過十五日死全文見診

論欬與嗽本一證

子和云内經陰陽應象論云秋傷於濕冬生欬嗽

五臟生成篇云欬嗽上氣診要經終篇云春刺秋分環爲欬嗽示從容篇云欬嗽煩冤者腎氣之逆也此四篇中連言咳嗽其餘篇中止言欬而不言嗽如生氣通天論云秋傷於濕上逆而咳與大象論文義同而無嗽字乃知咳即嗽明矣

謹按欬與嗽本兩字義内經已作一證連言之愚詳大抵欬者氣動也陽也嗽者兼血也陰也況是證其本雖殊其標則一故世俗不以爲疑唯潔古發内經微旨其義見下

病機機要云欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽謂有聲有痰也因傷肺氣動於脾濕而然也夏月嗽而發熱者謂之熱嗽小柴胡四兩加石膏一兩知母半兩冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍加杏仁服之蜜煎生姜湯蜜煎橘皮湯燒生姜胡桃皆治無痰而嗽者此乃大例更當隨時隨證加減之痰而能食者大承氣微下之痰而不能食者厚朴湯主之

論嗽分六氣無熱無寒

子和因素問言皮毛者肺之合也邪因而客之則為肺欬後人見是斷嗽然可以辯其六者之狀

風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利

熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒乳子亦每多有之

火乘肺者咳喘上壅涕唾出血甚者七竅血溢

燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡燥痒大便秘澁涕唾稠粘

寒乘肺者或因形寒飲冷冬月卧濕地或冒冷風寒秋冬水冷中感之嗽急而喘此非六氣之云乎

論濕痰主嗽

潔古曰嗽者秋傷于濕積於脾經曰秋傷於濕冬必欬嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣必上衝而為欬嗽甚則動于濕而為痰也是知脾無留濕雖傷肺氣不為痰也有痰者寒少熱多各隨五臟而治之假令濕在肝經謂之風痰

也濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂之濕痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰宜隨證而治之欬而無痰者以辛甘潤其肺欬而嗽者治痰為先故以南星半夏勝其痰而嗽自愈枳殼陳皮利其氣而痰自下

劉宗厚曰按此論欬因濕在於經致痰為欬五臟亦皆有之可謂發內經之秘矣然至氣鬱津液不降或停水飲所致或腎氣虛弱火炎水涸津液湧而為痰涎於上此氣飲及真臟為病非諸

經留溼致病也故易老云半夏止能洩痰之標
而不能治痰之本是矣
丹溪曰咳嗽有風寒有火有痰有勞有肺脹風寒者鼻塞聲重惡寒是也宜發散行痰又有聲啞及喘嗽遇冬則發皆為寒包熱也解表則熱自除感冷則嗽膈上有痰也宜解表豁痰火者有聲痰少面赤是也勞者盜汗出兼痰多吐紅作寒熱是也宜補陰清金痰者嗽動便有痰出痰出嗽止是也主豁痰肺脹者動則喘滿氣急聲

重者是也宜收斂此因火傷極遂成抑遏脹滿
肺脹抑遏不得眠者難治
飲水一二口而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫停者冷嗽也熱嗽以小柴胡湯冷嗽理中湯並加五味子
又有先因傷溼傷寒解利不盡病雖退然飲食減少不生肌肉身倦無力稍勞則躰熱瘦痛狀如勞症但不吐血不發潮熱經二三年此是餘毒伏在經絡其脉弦再發則愈

又有咳而不思食飲此皆痰聚於胃關於肺令人多涕唾而面浮腫此氣逆也謂氣上逆肺壅而不下治以異功白朮散
治嗽最要分肺虛實新嗽扶虛者可用人參風寒邪盛及久嗽熱鬱者切不可用五味子亦然
凡飲酒後嗽甚者熱嗽也飲酒後嗽減者寒嗽也
延稠黃者為熱青白者為寒
凡嗽春是春升之氣或外感夏是火炎上最重秋是溼熱傷肺冬是風寒外束也

丹溪曰上半日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降胃火午後嗽多屬陰虛必用四物湯加知母炒栢先降其火黃昏嗽多此火氣浮於肺不宜用凉藥宜五味子五倍子斂而降之
治嗽藥大槩多用生姜以其辛散也　咳逆非蛤粉青黛瓜蔞貝母不除　有痰者加痰藥　用藥發散之後必以半夏逐其痰庶不再來　治嗽多用粟殼不必疑但要先去病根此收後藥也
夫咳之為病有一咳則出痰者脾勝溼而痰滑也

有連欬十數聲不出痰者肺燥勝痰溼也滑者宜南星半夏皂角灰之屬燥其脾若利氣之劑所當忌也澁者宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺若燥肺之劑所當忌也

咳嗽口燥咽乾有痰不用半夏用瓜蔞貝母　飲水者不用瓜蔞恐滞膈不快

乾咳嗽

乾咳嗽者無痰出而欬咳連聲者是也此本於氣澁澁之微者欬十數聲方有痰出澁之甚者雖咳十數聲亦無痰出

丹溪云乾咳嗽極難治此係火欝之症痰欝火邪在中以苦桔梗開之下用補陰藥不已即成劳倒倉法好此不得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒栢之類

陰虛欬嗽四物湯加竹瀝姜汁主之　陰分嗽者多屬陰虛治用知母勿用生姜以其辛散故也

肺虛嗽此好色腎虛者有之人參膏以陳皮生姜佐之

治咳嗽疎表之劑

仲景厚朴麻黄湯　欬而脉浮者

厚朴五兩　麻黄四兩　石膏二兩　杏仁半升　半夏半升　乾姜二兩　細辛二兩　小麥一升　五味子半升

右以水一斗三升先煮小麥熟去渣納諸藥煮取三升溫服一升一日三服

三拗湯　治欬嗽感冒風寒鼻塞聲重方在傷風門

敗毒散　治痰嗽身熱鼻塞方在瘟疫門

華盖散　治感寒而嗽胷滿聲重

蘇子　陳皮　赤茯苓　桑白皮　麻黄各一兩　炙甘草五錢　每服八錢入姜水煎服

橘蘇散　治傷風欬嗽身熱有汗

陳皮　蘇葉　杏仁　五味子　半夏　桑白皮炒　貝母　白朮各半錢　甘草六分

姜三片水煎

神朮散　治四時瘟疫發熱悪寒及傷寒咳嗽

蒼朮五兩　白芷　細辛　羌活　川芎　炙甘草各一兩　每服五錢姜三片葱白三寸水煎服

若傷風鼻塞可為末以葱茶調下

金沸草散　治感寒咳嗽發熱惡寒無汗

荊芥四兩　麻黄去節　前胡各三錢　炙甘草　赤芍藥　半夏各一錢　旋覆花三錢　分二服每姜三片水煎服

橘皮湯　治冷嗽

陳皮　紫苑　麻黄　當歸　杏仁　炙甘草　黄芩各二錢　分二服水煎服

治暑嗽之劑

白术湯　治欬而脉細

白术　白茯苓　半夏　各等分每服一兩水一鍾半姜三片煎調神麯末二錢　一方加黄芩

白术木香散　喘嗽腫滿欲變水氣者

白术　猪苓　甘草　澤瀉　木香　檳榔各三兩　陳皮二兩　桂枝二錢　滑石

右為末每服五錢入姜煎

機要欬氣丸　咳久痰喘肺氣浮腫

陳皮　青皮　檳榔　木香　杏仁　郁李仁　茯苓　澤瀉　當歸　馬兜鈴　苦葶藶各三錢　人參　防已各五錢　牽牛頭末一兩半　右為末姜汁糊丸梧子大每服三十丸至六十丸白湯下

大橘皮湯　感湿面腫上喘

滑石九錢　炙甘草　木香　檳榔各一錢半　陳皮三錢

右分二帖水煎服

治燥嗽之劑

千金五味子湯　治咳嗽不已皮膚乾燥唾中有血胷脇疼痛　五味子　桔梗　紫苑　甘草　續斷各二錢　竹茹三錢　赤小荳一撮　生地　桑白皮各五錢　作二帖水煎服

冲和神功丸　大黄煨　訶子　麻子仁　人參

右為末入麻仁研匀加煉蜜為丸梧子大每五十丸温水下

按丹溪曰訶子治肺氣因火傷極遂欝遏脹滿取其味酸苦有收歛降火之功若佐以海粉香附瓜蔞青黛半夏曲治嗽非止澁之藥也

楊文治痰嗽利胷膈方
大瓜蔞去子洗淨搥破刮皮細切焙乾半夏四十九顆湯洗十遍搥碎焙乾為末以洗瓜蔞實熱水幷穰同熬成膏為丸梧子大生姜湯下二十丸

衍義云有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺癆以枇杷葉木通款冬花紫苑杏仁桑皮各等分大黃减半各如常製蜜丸櫻桃大食後夜卧含化一丸未終劑而愈

〔仝卷〕 十三

丹溪潤肺散 貝母一兩 瓜蔞五錢 青黛五錢
為末姜汁蜜調成膏噙化下

抑痰丸 瓜蔞仁一兩 半夏麴二錢 貝母三錢
為末炊餅丸麻子大

海蛤丸 咳逆上氣痰飲心痛
海蛤燒為粉 瓜蔞仁帶穰同研 和勻為丸麻子大白湯下

杏仁煎 哮嗽寒熱喘多喜少面色不潤食少脉弦緊 杏仁去皮尖一兩 用童便浸一日一換夏月一日三換浸半月取出洗淨焙乾研令極細每服一棗大用薄荷一葉白蜜少許水一盞煎食後服甚不過二劑永瘥

丹溪肺鬱痰嗽睡不安者清化丸 貝母 杏仁
右為末砂糖入姜汁蒸餅丸噙化

潤下丸 治氣實有痰又治積氣并大腸經氣滯痰嗽 陳皮去白六兩 甘草一兩 食盐五錢 右以水拌焙乾為末蒸餅丸如梧子大或為末白湯點服立効

治肺燥痰多 煉蜜一斤 北五味四兩 右用五味入蜜内浸十日后臨卧挑一匙於口内徐徐

〔仝卷〕 十四

嚥下潤肺消痰

玉液散 治久近喘嗽口渴
天花粉 知母 貝母各一兩 人參 甘草各五錢
右為末每服二錢先熔下黃蠟二錢同入米飲中調下

治火熱之劑
丹溪云火嗽宜清金化痰丸 清化丸與清金丸同用專治熱嗽及咽痛盖苦能燥温熱輕能治

上取燈籠草華為細末飯餅為丸每服五十丸
清金丸一名與點丸去肺火降膈上熱痰嗽
清化丸同用黃芩一味炒為末水丸服
痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰用知母止
嗽清肺金滋陰降火　火鬱嗽用訶子海石瓜蔞
仁青黛半夏曲香附以開之　喘嗽不拘老幼
久近上壅喜嗽等疾槐花為末滴水丸如梧子
大白湯或姜湯吞

梔子仁湯　發熱咳嗽煩躁面赤咽痛
梔子仁　赤芍　大青　知母各一錢　升麻
黃芩　石膏　杏仁各二錢　柴胡二錢半　甘草一錢
豉百粒水煎服
麥門冬湯　火熱乘肺欬唾有血方見血門
仲景加減小柴胡湯　欬而寒熱往來李古治夏月熱嗽寅
熟以此三兩入石膏七錢知母三錢　柴胡　半夏　黃芩
甘草　乾姜　五味子　水煎服
地骨皮散　知母　柴胡　甘草　人參　地骨
皮　茯苓　半夏　姜三片水煎服

王節齋治咳嗽活套
杏仁去皮尖　橘紅七分　五味子　桔梗　炙甘草
各五分
春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥各一錢
半夏　門冬黃芩知母各五分　若傷風致咳鼻
流清涕宜辛涼解散加防風薄荷紫蘇黃芩
夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母
黃芩麥冬石膏

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮各一
防風黃芩山梔子炒
冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏生
乾姜防風各一錢　肺經素有熱再加酒炒黃芩知
母各五分　若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎
前胡柴胡各一錢
若有痰加半夏枳殼　風痰加南星濕痰脾困少
食加白朮蒼朮　口燥咽乾勿用半夏南星
宜加知母蜜水炒貝母黃芩瓜蔞仁
若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蔞仁貝母海石

青黛半夏曲軟石膏山查子枳實黃連炒姜汁為
末蜜調噙化
因欬而有痰者咳為重主治在肺因痰而致欬者
痰為重主治在脾該是食積痰或痰氣上升以
致咳嗽只治其痰消其積而咳自止不必用肺
藥以治咳也
熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣其痰嗽而難出色黃且
濃或帶血縷或出血腥臭或堅如蜆肉不似風
寒之嗽痰清而白宜金佛草散仍以辰砂化痰
丸或薄荷煎入風冊含化　熱嗽於金佛草散
中加五味杏仁茯苓
有熱嗽咽痛失聲服冷藥而聲愈啞者宜以生姜
汁調消風散少少進之或只一味姜汁亦得冷
熱嗽後失音者尤宜嗽而失聲者非獨熱嗽有
之宜審其症用藥佐以橄欖丸含化仍濃煎獨
味枇杷葉熱服
有嗽而吐痰與食俱出者此蓋飲食致肝氣不利
而肺又有客邪肝濁道肺清道清濁相干宜二

陳湯加木香杏仁細辛枳殼
有飲冷熱酒或飲冷水傷肺致嗽俗謂之凑肺宜
紫菀飲
癆嗽者所嗽之痰或痰或濃或時有血腥異常語
聲不出補肺湯半帖加杏仁貝母款花阿膠百
合各五分煎去滓調鍾乳粉　咽痛者更加桔
梗五分　熱甚者加秦艽五分　嘔者去地黃
加半夏如其數
時行嗽發熱惡寒頭疼鼻塞氣急用參蘇飲加細
辛
治寒痰嗽劑
東垣曰咳嗽脉弦微面白者寒也難經云肺金太
過則外症面白善嚏悲愁不樂欲哭其內症喘
咳上喝逆氣煩心胸滿煩熱夜則涕出多嚏鼻
塞不通肺金大實以子助母也心脾肺皆受寒
邪涎出口井水反侮土寡于畏也腹中大寒病
名曰寒中痰白有泡肺中氣虛而為大寒子助
母也當於肺中瀉腎水非辛熱之藥不退也口

甘涎沫者胃中寒而不和以辛甘熱去之飲酒
者多有此反化
半夏溫肺湯 治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋
嘈雜常多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲
食此胃氣虛冷所致其脉沉絃細遲 旋覆花
人參 細辛 桂心 甘草 陳皮 桔梗
芍藥 半夏各五錢 赤茯苓三錢
右每服六錢姜三片水煎服
丁香半夏丸 心下停飲冷痰頭目眩運睡卧口
中多涎 檳榔三錢 丁香 半夏各一兩 細辛
乾姜 人參各五錢 右為末生姜汁為丸梧子
大每服三十丸日三次姜湯下
姜桂丸 治寒痰咳嗽脉沉面色黧黑小便急痛
足寒而逆心多恐怖 天南星 半夏各一兩
官桂一兩去粗皮 右為末蒸餅為丸如桐子大每
服五七十丸食後生姜湯下
治嗽加減法 如心下痞悶加枳實五錢 如身
熱甚加黄連五錢 如体重加茯苓白朮各一

兩 如氣上逆者加苦葶藶五錢 如氣促加
人參桔梗各五錢 如氣浮腫加郁李仁杏仁
各五錢 如大便秘加大黄五錢
治氣嗽之劑
羅太無人參款花散 肺胃虛寒久嗽不已咽膈
滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦疼
或虛勞冷嗽及遠年近日一切嗽病
款冬花 人參 五味子 紫苑 杏仁八錢
木香 檳榔 紫蘇葉 桑白皮各一兩 半夏各五
錢 右煉蜜為丸如芡實大每服一丸食後細嚼
淡姜湯下
治痰壅氣嗽群藥不成功者
大半夏五十枚 橘紅十枚 作一帖水二鍾煎至一
鍾不可攪動恐麻人食後連進三帖立効其
名半橘湯
蘇子降氣湯 氣逆咳嗽胷膈痞滿
有人患氣嗽將期或教以橘紅生姜焙乾神曲等
分末為丸如梧子大食後及夜米飲吞二五十

九舊患膀胱氣因服此并瘳
局方四七湯　治咳而痰涎在咽喉間不下
東垣加減三奇湯　欬逆上氣喘促胷膈不利
桔梗　陳皮　甘草　青皮　人參　紫蘇
桑白皮各五錢　半夏七錢　杏仁三錢　五味子四錢
右每服六七錢入姜煎服
經驗方　治久欬氣欬生訶子一枚含之嚥津頻
嚥之瘥瘥后不知食味煎檳榔湯服之便知
滋陰之劑

瓊玉膏　虛勞喘嗽氣促發熱
金櫃腎氣丸　治腎虛不能攝水津液不降致成
痰飲欬逆潮熱盜汗方見虛損門
補肺湯　治勞嗽
桑白皮　熟地黃各二兩　人參　紫菀　黃耆
五味子各一兩　右每服四錢水煎入蜜少許服
治老人虛嗽久不愈者
人參一兩　胡桃肉　杏仁各五錢　五味子五錢　棗五枚
右作一服水煎食後連三服即愈

黃耆劫勞散　治心腎俱勞欬嗽時復三兩聲無
痰夜則發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠躰
劣黃瘦飲食減少唾中有血系名曰肺痿
白芍藥四兩　黃耆　粉草　人參　半夏　熟地
茯苓　北五味子　歸身　阿膠各半兩　右每
服八錢姜三片棗二枚水煎服一日三兩服
紫菀湯　飲食煎煿邪熱傷肺或叫呼走氣咳嗽
咽痒痰多吐血喘急胷滿脇痛
紫菀　欵花　百合　杏仁　貝母　蒲黃

經霜桑葉　半夏　犀角屑　炙甘草　人參各七分
阿膠一錢半　分二帖姜三片水煎服
天門冬丸　咯血吐血大能潤肺止嗽
天門冬一兩　杏仁　茯苓　阿膠各五錢　右為末煉
蜜丸如彈子大日夜噙化三五丸一方有甘草
潤脾膏　治勞証久敷肺燥肺痿時常服
羊肺一具　杏仁　柿霜　真酥　真粉各一兩　白蜜
二兩　右先將羊肺洗淨次將杏仁膏柿霜等白蜜
水解薄打攪五味稀稠得所灌入肺中白水

煮熟如常服之

團參飲子　七情抑鬱飢飽失節咳嗽膿血漸成肺痿勞瘵　人參　紫菀茸　阿膠　百合　細辛　款花　杏仁　天冬　半夏　經霜桑葉　五味子各一兩　炙甘草五錢　每服六錢姜五片水煎服

地黃煎　治肺損吐血嗽血

生地黃四兩　鹿角膠一兩炒　右爲末每服三錢童便一盞煖熱入姜汁少許調下　無鹿角膠阿膠亦可

古方紫菀散　紫菀　款冬花各五錢　百部二錢半

右爲末烏梅湯點服姜湯亦可○如嗽加五味子○喘加杏仁○渴加烏梅○氣逆加橘紅○頭疼加細辛三錢甘草二錢○氣脫者加御米殼蜜炒粗末水煎服

臟腑欬劑

小柴胡湯　治肝臟發咳兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿方見前熱嗽條

黃芩加半夏生姜湯　治膽府發欬嘔苦水若膽汁

黃芩　生姜各三錢　炙甘草　芍藥各二錢　大棗二枚　半夏半合　右㕮咀水煎服

甘桔湯　治心臟發欬欬而喉中如梗狀甚則咽腫喉痺方在前

芍藥甘草湯　小腸府發咳咳而失氣

芍藥　炙甘草　各四錢水煎服

升麻飲　脾臟發咳欬而右脇下痛痛引肩背甚則不可以動　升麻　白芍　甘草各二錢

葛根三錢　水煎服

烏梅丸　治胃府發咳咳而嘔嘔甚則長虫出方在虫門

麻黃湯　肺臟發咳欬而喘息有聲甚則唾血

麻黃三錢　桂枝二錢　甘草一錢　杏仁二十枚　水煎服

赤石脂禹餘粮湯　大腸府發欬咳而遺溺

赤石脂　禹餘粮各二兩碎　水煎服

麻黃附子細辛湯　腎臟發欬欬則腰背相引而痛甚則欬涎　麻黃　細辛各一錢　附子一錢

水煎服

茯苓甘草湯　膀胱府發欬欬而遺溺

苓茯(二錢)　桂枝(一錢半)　生姜(五片)　大炙甘草(一錢)

水煎服

異功散　久咳不已三焦受之其狀欬而腹滿不欲飲食此皆聚于胃干於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆　人參　茯苓　白朮　甘草

陳皮(各一錢)　入姜棗水煎服已上諸方皆傷寒例藥也特存之以備其旨以三因論之則自有一臟一腑之病機亦不止於寒已也

食積痰嗽

凡食積痰嗽非青黛瓜蔞仁不除人面青白黃色不常面上如蟹爪路一黃一白者是也

瓜蔞丸　食痰壅滯喘咳

瓜蔞仁　半夏　山查　神曲　各等分為末

以瓜蔞穰拌為丸竹瀝姜湯送下

又方治食積痰嗽

杏仁　蘿蔔子(各二兩)　為末粥丸服

食積痰作嗽發熱者　半夏　南星　瓜蔞仁

蘿蔔子(為佐)　青黛　石碱(為使)　隨証加減丸服

保和丸　治食積痰嗽飽悶

食飽咳嗽

千金方溫脾湯　治食飽便咳

甘草(四兩)　大棗(二十枚)　水五升煮取二升分三服若咽中痛而聲鳴者加乾姜一兩

醋搶喉欬

甘膽丸　治吃醋搶喉因成咳嗽不止諸藥無効用甘草二兩去皮作二寸段中半劈開以猪膽汁五枚浸三日取出火上炙乾為末煉蜜為丸每服四十丸茶清吞下臥服神効曾有患此諸藥無功服此良愈

酒熱傷肺咳嗽

丹溪云飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎入韭汁就吞瓜蔞仁杏仁黃連丸

又方　治酒嗽

青黛　瓜蔞仁　姜汁蜜丸含化散熱毒也

丹溪白龍丸　治酒積有痰

半夏　滑石　茯苓　枯礬
右為末神麹糊為丸
酒病嗽　白礬一兩另研　杏仁一升　水一升煎乾攤
新瓦上露一宿砂鍋內炒乾每夜飯后細嚼
杏仁十五枚妙
痰嗽
局方桔梗湯　除痰下氣胷膈脹滿痰逆惡心飲
食不進　陳皮去白　半夏姜製　桔梗炒各十兩　枳實去白
麩炒三兩　右末每服四錢水一鍾生姜五片煎服

右用陳皮枳實氣充形實者宜之寒者加姜
桂些小夫南星半夏乃燥濕之劑若嗽而痰
澁者忌服　形肥有汗或脉緩躰重嗜卧之
人有咳者脾濕勝也　形瘦或夏月無汗或
脉澁之人咳者肺燥勝也濕者宜蒼白朮星
半之屬燥之是也燥者宜杏仁瓜蔞仁之屬潤
之是也
寒熱痰咳而嘔吐面腫　蚌粉新瓦上燒紅放地
上出火毒每半兩加青黛五分入麻油數點以

淡虀汁調服妙妙
本事方　化痰涎治咳嗽
枯礬二兩　白姜蚕炒去系五錢　為末研薄荷令爛
為丸菉荳大每服三十丸薄荷湯下日三服
青礞石丸　消痰消痞經絡中有痰作痛皆治之
青礞石煆　黃芩各五錢　半夏二兩　風化硝二錢　陳皮
茯苓各七錢半　白朮一兩　姜汁打神麹糊為丸
又方礞石丸　治痰嗽　礞石　南星　茯苓各五
錢　半夏七錢半　風化硝二錢　神麹糊為丸

風化硝丸　治痰嗽　黃芩酒洗兩半一　滑石　白
芥子去殼五錢　貝母　南星各一兩　風化硝二錢半
飪餅丸
羅太無人參半夏丸　化痰墜涎止嗽定喘或風
痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏
正頭風頭目昏眩耳聾鼻塞咽乾胷膈不利喘方在
丹溪墜痰丸　治食積痰飲咳嗽痞滿氣逆
枳實　枳殼各一兩半　明礬三錢生一半枯一半　風化硝三錢
牙皂角二錢酒炒　黑丑半斤頭末取　右以蘿蔔子汁為

丸每服五十丸鷄鳴時服初有糞次下痰

治久嗽痰積 半夏二兩以江子五錢打碎同煮半夏透爲度去江子不用 杏仁一兩以烏梅五錢同煮去烏梅不用只將半夏杏仁焙乾爲末煉蜜爲丸菉荳大量虛實服

痰泡方 若或作白泡當于肺中瀉火

滑石 貝母 南星 半夏 風化硝 白芥子 陳皮 茯苓 皂角 蒼朮加泡 瓜蔞仁加炒 枳實加結 青黛 黃芩加熱

肺脹

仲景曰咳而上氣此爲肺脹其人喘目如脫狀脉浮大者越婢加半夏湯主之 麻黃六兩 石膏半斤 生姜三兩 大棗十五枚 甘草二兩 半夏半斤 以水六升先煮麻黃去沫內諸藥同煎至二升温分三服

肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水小青龍加石膏 麻黃 芍藥 桂枝 細辛 甘草 乾姜各三兩 五味子 半夏各半升 石膏 水一斗先煮麻黃去沫內諸藥煮取三升壯人服一升弱者減之日三服 仲景之治乃傷寒法也邪從皮毛而入皮毛者肺之合也故肺脹以散邪爲重丹溪之治乃陰虛火動火逼肺金及濁痰瘀血凝結於內故治以收斂消瘀之劑

丹溪云肺脹而咳者用訶子青黛杏仁 訶子能治肺氣因火傷極遂成欝遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂除火之功佐以海石香附瓜蔞仁青黛半夏麴姜蜜丸噙香附童便浸三日

氣欝痰嗽睡不安宜清化丸貝母杏仁爲末砂糖入姜汁飯餅爲丸噙化

肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四物加桃仁訶子青皮竹瀝之類

一法灸之妙左不得眠者灸右足三陰交右不得眠者灸左足立安

張先显年四十二患肺脹咳嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病降火疎肝以清其痰四

物湯加桃仁訶子青皮竹瀝八帖而安

乾咳嗽　前治燥條杏仁青黛貝母瓜蔞等劑皆可用

本事補肺法

生地黃二斤洗淨　杏仁二兩　生姜　蜜各四兩　右搗如泥入甆盆中置飯上蒸五七度每五更挑三匙咽下

一中年婦人乾咳寸脉滑動似豆狀餘皆散大不浮左大于右每五更躁熱有汗但怒氣則甚與桔梗不開諸藥無効遂以石膏香附為君芩連青黛瓜蔞仁陳皮黃柏當歸桔梗為臣五味砂仁川芎紫菀佐之凡二十餘帖而安

咳嗽喉中作聲

咳嗽氣急喉聲如鼾者為虛

一男子五十餘歲病傷寒咳嗽聲如齁與獨參湯一服而鼾聲稍止至二三帖嗽亦漸退凡服三觔始得全愈

喉如水鷄聲者為實

仲景治欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之

射干三兩　麻黃　生姜各四兩　細辛　紫菀　款冬花各三兩　大棗七枚　五味子　半夏各半升　水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥煮取三升分温三服　取此虛實二條為治規

暴嗽　失音

千金治暴熱嗽方　杏仁　紫蘇子一升　陳皮一兩　柴胡四兩　水一斗煮三升分三服

又方　治暴嗽

百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏噙之

貝母散　暴發欬嗽多日不愈

貝母　桑皮炒　五味子　炙甘草各五錢　知母二錢半　款花二兩　杏仁二兩麸炒　每服一兩姜三片水煎服

白蜆殼散　治暴嗽

白蜆殼洗淨研細粥飲下

三拗湯　治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅方見前燥條下

一服散　治暴嗽　生姜十片　阿膠二片炒成珠　烏梅二枚　甘草一錢　紫蘇十片　杏仁七枚去皮尖　大半夏三枚　罌粟殼三个炙　水煎臨睡服

治久嗽失音

真蘇子二两 杏仁三十枚 訶子三枚 百藥煎二两

為末熱酒調一錢

治暴失音

用猪脂油一觔入鍋先煉出渣入白蜜一斤再煉少頃濾過淨磁器内冷定成膏不時挑一茶匙噙化大能潤肺出聲

治失音不語

訶子四个半生半煨 桔梗一两五錢半生半炒 甘草二寸一生一炙

分二服水一鍾童便一鍾煎服

治久寒痰結咽喉音不出

桂心 草烏各一字 半夏五錢 右為細末姜汁浸蒸餅為丸如芡實大每服一丸至夜噙化

治謳欬失音

連翹 桔梗 甘草各二两半 薄荷四两

訶子肉 砂仁 大黄各一两 川芎两半 百藥煎二两

右為細末鷄子清丸如弾子大每服一丸臨卧噙化

治失音不語

百藥煎 杏仁 百合 訶子肉 苡仁等分

為末以鷄子清和丸如弾子大每臨卧噙化丸

治失聲 皂角一挺去皮弦子 蘿蔔三个切片 水一碗煎至半碗服之不過三服能使語聲出

杏仁煎 治嗽失音不出

杏仁三两 生姜汁 蜜糖各一两 木通 桑皮 貝母各一两一分 紫苑 五味子各一两 一方加知母一两 款冬花一两 水三升煎半升去查入杏仁蜜糖姜汁再熬成稀膏食後臨卧每服一匙含化 一方有石菖蒲

訶子飲 治久嗽語聲不出

訶子肉 杏仁各一錢炒 通草一錢半 分二服每服水二鍾姜三片煎一鍾食遠溫服

一方 治暴嗽失聲語不出

杏仁 姜汁 砂糖 蜜 五味 紫苑各三两 通草 貝母各四两 桑白皮五两 右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓内杏仁脂姜汁蜜糖和攪微火煎取四升初服三合日再夜一後稍加

又方　通聲膏
五味　款冬花　通草各三兩　人參　細辛　青
竹皮　桂心　菖蒲各二兩　杏仁　姜汁各一升
白蜜一升　棗膏三升　酥五升　右十三味㕮咀以水五
升微火煎三上三下去查内姜汁棗膏酥蜜
煎令調和酒服棗大二丸
久嗽
羅太無柴胡飲　治虛勞羸瘦面黃無力減食盜
汗咳嗽不止　柴胡　知母　鱉甲酥炙各一兩

五味子五錢　地骨皮半兩　右為末每服三錢烏梅
二枚青蒿五葉水煎服
本事鱉甲丸　治勞嗽虛証及鼻流清涕耳作蟬
鳴眼見黑花一切虛証丈夫婦人皆可服
五味子二兩　鱉甲　地骨皮各三兩　右為末煉蜜
丸如梧子大空心食前溫酒或鹽湯任意服
三五十丸婦人醋湯下　此方廼曲江人家
秘方服効者衆且處方有理
丹溪蛤蚧丸　肺臟內傷咳嗽氣急久不除漸羸
瘦　蛤蚧去頭足炙一兩　訶子肉煨　細辛　炙甘草
熟地　阿膠蛤粉炒成珠　麥門冬各五錢　為末蜜丸
每一兩分十五丸每含化一丸
貝母湯　諸嗽久不瘥
貝母一兩去心姜製　黃芩　桑皮各五錢　乾生姜　五
味子　陳皮　半夏　柴胡　桂心各一兩　木香
甘草各二錢半　右每服六錢加杏仁七枚授之一
服瘥以治諸般嗽通用悉効者緣方內有寒
有熱有收有散也

潔古枳殼湯　日久痰嗽胷膈不利上焦多熱
枳殼炒三兩　桔梗二兩　黃芩一兩半　每早取二兩半水
三盞煎一盞半日三服三日服盡再服後半夏湯
生半夏湯　半夏三錢半水盞半姜五片煎至一
盞食後服一日三服服三日了再服枳殼丸盡
其痰為度論曰先消胷中痰氣后去膈上痰再
與枳朮丸謂首尾合治盡消其氣令痰不復作也
丹溪久嗽丸子　海蛤粉君　膽星臣　杏仁臣　訶子
佐　青黛佐　皂角莢使　右為末姜汁丸如梧子大

姜湯下

久嗽乃積痰久留肺脘粘滞如膠氣不升降或挾濕與酒而作 香附童便浸 姜蚕炒 海蛤粉 瓜蔞仁 蜂房 杏仁 姜汁 竹瀝 神麯

各等分蜜調噙化

夏月無汗成久咳嗽方在汗門

衍義治久咳膿血胷膈咽痛

蛤蚧 阿膠 生犀角 鹿角膠 羚羊角

各一兩除膠外皆為末入膠河水三升煮半

〔七七〕 三十七

升臨睡細呷愈

瘵三十年嗽以百部根二十觔搗絞取汁煎之如飴服二匙一日三服驗 外臺和飴一斤熬成煎以温水飲調下深師方

又今足一升更煎五六沸服二合

百一方 治久咳嗽上氣十年諸藥治不瘥以蝙蝠除翅足炙令存性為末飲服之

紫菀散 久嗽多年不愈

紫菀二兩 欵花二兩 為末米飲調服一錢日三次

三物湯 大人小兒久嗽神効

桑皮蜜炙 百部根 馬兜鈴 等分水煎服

清金湯 遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎声胷滿氣逆坐卧不安 嬰粟殼蜜炙 人參 粉草各五錢 陳皮 茯苓 杏仁 阿膠 五味 桑皮 苡仁 紫蘇 百合 貝母 半夏麯 欵花

每服六錢姜三片棗二枚烏梅半箇水煎服

收歛之劑 肺欲收急食酸以收之

羅太無九仙散 治一切咳嗽

桑皮 人參 桔梗 阿膠 五味子 烏梅

〔七七〕 三十八

欵花各一兩 貝母五錢 嬰粟殼八兩蜜炒

右為末每服三錢白湯調服嗽止住后服

欵花清肺散 治咳嗽喘促胷膈不利不得安卧

人參 炙甘草 枯礬 烏梅連核搗碎 欵花各一兩 粟殼醋炒四兩 甜葶藶生用一錢 右為末每服二錢温米飲湯調服食後忌油膩節言語

人參清肺湯治男婦肺胃虚寒咳嗽氣急胷膈咽塞腹脇脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽嗌隱痛及瘵肺痿劳吐血腥臭乾嘔煩熱声音不出肌肉

漸瘦倦怠減食　烏梅　地骨皮　人參　炙
甘草　阿膠炒　杏仁去皮尖　桑皮　知母　粟
殻去頂蒂各一兩　右每服四錢烏梅一枚水煎服
人參款花散　咳嗽久不愈者
人參　款花各五錢　知母　貝母　半夏各三錢
粟殻炒一兩　右每服六錢烏梅同煎服
人參養肺湯　肺痿咳嗽清痰午後熱并声颯者
人參　炙甘草　阿膠珠各一錢　茯苓一錢半　貝母
柴胡四錢　杏仁　五味　桔梗各一錢半　桑皮二錢　枳實
一錢半　右每服八錢生姜三片棗一枚食後溫服
減柴胡茯苓五味貝母桔梗枳實加地骨皮
知母烏梅罌粟殻　即上人參清肺湯已上
乃御米殻烏梅例收後藥也
丹溪謂黃昏嗽者火浮于肺以酸味歛而降之用
訶子五味五倍子白礬等是也
雜方
血竭散　治勞嗽見血諸治不効
蛤蚧一對蜜炙　訶子三錢　血竭一錢　三味共為末以姜子

汁與蜜等分熬膏入前末調三五分服効
治咳嗽感冒方　及痰嗽熱嗽
雪梨一箇開一竅入明礬一錢用紙封固灰火
中煨令礬化梨熟爲度食之立愈甚者不過枚二
又方　治痰嗽
細芽茶三四兩濃煎濾去渣好蜜六兩水内頓
滚抹去沫入濃茶内同煮二三沸露一宿空心
溫服一碗二三次全愈
阿膠散　一切咳嗽虛人老人皆可服
阿膠　馬兜鈴各一兩　五靈脂　桑皮各一錢　炙甘
草二錢半　右為末每服一錢水一鍾煎六分食
後夜卧通口服
當歸散　治男婦因打撲負重辛苦勞力傷損肺
臟既損遇風寒則為咳嗽或咯紫血宜此藥去
心肺之瘀血　仍炙肺俞穴　蘇木　生地黄
當歸　大黄　芍藥　等分為末每服四錢或
水酒煎服亦可
治血飲　自裁得効方治怒氣積血在胷脇咳嗽

年久不愈每咳則隱隱而痛　滑石一錢五分　兎仁一錢　紅花五分　桔梗五分　粉草四分　瓜蔞二錢　丹皮八分　茜根八分　貝母八分　柴胡五分　香附麴五分　水煎服

躰厚者加大黄川山甲或作末以韭菜汁拌為丸服

本事　治十六般哮嗽

阿膠炒一兩　馬兜鈴　炙甘草　半夏姜汁浸三日　人參五錢　杏仁去皮尖各一兩　右為末每服一大錢水一盞煎至七分臨卧食後服

八七卷　四十一

隨病看湯使為引

心嗽面赤或汗流加乾葛煎　肝嗽眼泪出加烏梅一枚大米十四粒煎　脾嗽不思飲食或惡心一兩時入姜二片煎　胃嗽吐逆酸水入蛤粉煎　膽嗽令人不睡加茯神五分茶清調下　膈咳嗽出痰如員塊生姜汁調藥嚥下　勞嗽入秦艽末煎　血嗽連頓不住當歸末棗子同煎　暴嗽涕涶稠粘入烏梅生姜同煎　產嗽背胛痛甘草三寸黄蠟少許同煎　氣嗽肚痛脹滿入青皮去白同煎　熱嗽夜甚蜜一匙葱白同煎　哮嗽喉如拽鋸入半夏三枚同煎　腎嗽入黄蓍白飴糖同煎　上件十六般嗽依法煎服無不効驗此方京都一家專治此疾因中官厚賂始得其方屢試有効

本事刼痰方　治痨嗽及哮喘痰涌

青黛三錢　辰砂　雄黄　明凡　信石生用各一錢　右俱為極細末淡荳豉一百粒湯浸去殼研如膏入藥丸如梧子大臨卧冷茶吞一丸

八七卷　四十二

瓊珠散　治咳嗽不問遠近其効如神

桑白皮四兩去筋膜用蜜浸一宿晒干再入蜜浸晒干　五味子二兩　甘草二兩　陳皮二兩　粟殼一斤　右為末用冷蜜湯調服忌煎煿油膩酒鹹酸等物

潤肺湯　治上盛下虚脾肺濕熱遠年近日氣喘咳嗽痰盛心胷氣悶不思飲食或寒熱往來或感冒風寒喘嗽氣急五痨七傷吐血等症並皆治之

知母二錢　紫苑五錢半　山梔仁五分　甘草一錢半炒　麻黄五分滚湯泡去白沫晒干　荊芥五分去梗　馬兜苓五分去筋膜　去

前胡去芦二錢 赤芍一錢 桑白皮二錢半去紅皮用蜜炒 半夏三錢
湯泡七火煏 赤茯苓二錢去皮 杏仁五錢半去皮尖研成泥用 黃芩二錢
半去稍土 如婦人加當歸川芎生地黃牡丹皮各一
錢 此藥製度每服一兩四錢半用水二大鍾生
姜五片初感風寒加葱白三根久患咳嗽加棗
二枚不用葱白煎至一鍾半去滓臨睡候將身
右卧用絹帛項住右軟肚次用竹筒緩緩吸藥
熱服不言語呼喚切忌房勞

姙娠咳嗽

八七卷 四十三

馬兜鈴散 治胎氣壅塞咳嗽喘息
馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母各五錢
橘紅 紫蘇 大腹皮 桑皮各一兩 五味五錢
每服六錢姜四片水煎服

麻黃散 姙娠外傷風冷痰逆咳嗽不食
麻黃去節 橘紅 前胡各一兩 半夏 人參 白朮
枳殼 貝母 甘草各五錢 每服六錢姜四片
葱白五根棗二枚水煎服

竹茹紫菀湯 咳嗽不止胎不安
紫菀 天冬各一兩 桔梗五錢 甘草 杏仁 桑皮
各二錢半 每服五錢竹茹一塊水煎去渣入蜜半
匙再煎二沸溫服

天門冬湯 氣逆咳嗽
天冬去心一兩 貝母 人參 甘草 桑皮 桔梗
紫蘇各五錢 赤茯苓二兩 麻黃去節七錢半
每服六錢姜四片水煎服

喘門

岐伯曰不得卧而息有音者是陽道之逆也足三
陽者下行今逆上行故息有音也陽明者胃脉
也胃者六府之海其氣亦下行陽明逆不得從
其道故不得卧也下經曰胃不和則卧不安逆調
論又曰夫不得卧卧則喘者是水氣之客也夫
水者循津液而流也腎者水臟主津液主卧與
喘也

八七卷 四十四

東垣曰肺脹膨膨而喘咳胸膈滿壅盛而上奔者
於隨證用藥方中多加五味子人參次之麥門
冬又次之黃連少許 如甚則交兩手而瞀者

真氣大虛也若氣短加黄耆五味子人參氣盛去五味子人參加黄芩荊芥穗冬月去荊芥穗加草荳蔻仁

丹溪曰哮喘未發以扶正為要　已發以攻邪為主陰虛自少腹下火起衝於上而喘者宜降心火補陰　有陰虛挾痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火　上氣喘而躁者為肺脹欲作風水症宜發汗則愈　諸喘不止者用川椒目研極細一二錢生姜湯調下劫之氣虛不用　又

法用蘿蔔子蒸為君皂角燒灰等分為末姜汁加煉蜜為丸小荳大每嚥化五七十丸劫止之後因痰治痰因火治火氣虛者用人參蜜炙黄栢麥冬地骨皮之類　氣實人因服參耆過多而喘者用三拗湯　喘甚者須用阿膠若久病氣虛而發喘者宜阿膠人參五味補之　新病氣實而喘者宜桑白皮苦葶藶瀉之

凡喘正發時無痰將愈時却吐痰者乃痰于正發之時閉塞不通故喘甚當于其時開其痰路則喘易安也宜桔梗湯及枳殼瓜蔞實杏仁蘇葉前胡等引出其痰候痰出喘退却調其虛實虛者補以參耆歸术實者瀉以沉香滚痰丸之類是也

肺虛則少氣而喘經曰秋脉者肺也秋脉不及則喘呼吸少氣而咳上氣見血下聞病音治則人參五味門冬之屬是也

肺痺肺積則久喘而不巳經云淫氣喘息痺聚在肺又云肺痺者煩滿喘而嘔是肺痺而喘治法

或表之或吐之使氣宣通而愈也

難經云肺之積名息賁在右脇下如杯久不巳令人喘咳發肺癰治法則息賁丸是也

胃喘則身熱而煩經云胃為氣逆又云犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六腑入六腑則身熱不得臥上為喘呼又云陽明厥則喘而啘啘則惡人或喘而死者或喘而生者何也厥逆連臟則死連經則生是也啟玄子註曰啘謂熱内欝而煩凡此胃喘治法加減白虎湯之類是也

腎喘則嘔咳經云少陰所謂嘔咳上氣喘者陰氣
在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故咳上氣
喘也東垣治以瀉白散是也
凡喘不得卧其脉浮按之虛而濇者為陰虛去死
不遠慎勿下之下之必死宜四物加童便竹瀝
青黛門冬五味枳殼蘇葉服之
東垣曰病機云諸痿喘嘔皆屬於上辨云傷寒家
論喘嘔以為火熱者是明有餘之邪中于外寒
変而為熱心火太旺攻肺故屬於上又云膏粱
〈十卷　四十七
之人奉養大過及過爱小児亦能積熱于上而
為喘咳宜以甘寒之劑治之脉經又云肺盛有
餘則咳嗽上氣喘渴煩心胷滿短氣皆衝脉之
火行于胷中而作係在下焦非屬上也蓋雜病
不足之邪起于有餘病機之邪自是標本病傳
飲食勞役喜怒不節水穀之寒熱感則害人六
府皆由中氣不足其䐜脹腹滿咳喘嘔食皆以
大甘辛熱之劑治之立已今立熱喘寒喘二方
熱用人參平肺散　寒用參蘇溫肺湯

三因論曰右寸口陰脉實者肺實也肺必脹上氣
喘逆咽中塞如嘔狀自汗皆肺實之証右寸陰
脉虛者肺虛也必咽乾無津少氣不足以息
喘有寒有熱有水病寒喘遇寒則發熱喘發于夏
而不發于冬水病者小便澁胷膈滿悶脚微腫
是也熱喘宜鉛紒丸寒喘宜煮肺散水病宜當
中分冷熱虛而冷者紫金丹實而熱者防已丸
戴元禮曰有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上
喘痰喘者一喘便有痰声氣急喘者呼吸急促
〈七卷　四十八
而無痰声有胃氣虛喘者擡肩擷項喘而不休
火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘大
槩胃中有實火膈上有稠痰得食入咽墜下稠
痰喘則止稍久食已入胃反助其火痰再升上
喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者
以火濟火也葉都督患此諸醫作胃虛治之不
愈後以導水丸利五六次而安
又心法附錄曰凡此証脉滑而手足溫者生脉濇
而四肢寒者死　傷寒必上氣急不得卧喉中

有声或声不出以三拗湯華盖散九宝湯神秘湯皆可選用　氣不調而痰欝喘逆四磨湯或蘇子降氣湯　若虚喘脉微色青黑四肢厥小便多以活人書五味子湯或四磨湯

腹満脉沉實者為裏實

羅太無治一婦年踰五十身躰肥盛因飲酒及湩乳過腹脹喘満声聞舎外不得安卧大小便澁満氣口脉大兩倍于人迎關脉沉緩而有力時值八月霖雨不止予思霖雨之湿飲食之熱湿

熱大盛上攻於肺神氣躁亂故為喘満邪氣盛則實實者下之故製平氣散以下之　白牵牛二兩一半生一半炒只取頭末一兩　青皮去白　檳榔各三錢　橘紅五錢

大黄七錢

内經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之故以白牵牛苦寒瀉氣分湿熱上攻喘満以為君陳皮青皮苦辛温平散肺中滞氣為臣檳榔辛温性沉重下痰降氣大黄苦寒蕩滌満實故以為使

右為末每服三錢煎生姜湯一大盞調下無時一服減半再服喘愈只有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽再與加減瀉白散

桑白皮一兩　地骨皮　知母　橘紅　青皮去白　桔梗去芦各五錢　黄芩　炙甘草各二錢　每服五錢水二大盞煎至一盞去滓温服食後數服良愈華佗云盛則為喘減則為枯活人云發喘者氣有餘也凡看文字雖要會得本意盛而為喘者非肺氣盛也言肺中之火盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也言肺中之火有

餘也故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺也瀉肺中之火實補肺也不可不知

陰虚者補之

丹溪治一人家豐好内厚味每年到四月九月内必發氣喘擡肩吐痰脉沉澁而細數諸醫用平肺之藥數年不愈用人參生地黄膏和當歸牛膝肉蓯蓉枸杞子五味子知母黄栢天門冬玄參末為丸如梧子大每服百丸空心服以救肺虚又用阿魏黄連山查沉香牛黄辰砂膽星

陳皮神麯糊為丸梧子大臨卧姜湯下三四十丸以治厚味服訖復用瓊玉膏一劑繼服之而愈

東垣調中益氣湯加減法

如秋冬月胃脉四道為衝脉所逆并脇下少陽脉二道而反上行病名曰厥逆其証氣上衝咽不得息而喘息有音不得卧加吴茱萸五分或一錢觀厥氣多少而用之　如夏月有此証為大熱也蓋此証随四時為寒熱温凉宜以酒黄連黄栢知母各等分為細末熱湯丸如桐子大每服二百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以美食壓之使不得胃中停留直至下元以瀉衝脉之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虚勞七損症也當用温平甘多辛少之藥是治其本也如時見寒熱四時証也又将理不如法或酒食過多或食辛熱寒冷之物作病或居大寒大熱之處益其病當暫用大寒大熱之藥而取効此從權也不可以得効之故而久用之必致夭横矣

平居則氣和行動則氣促而喘者亦衝脉之火予族兄六旬有餘素有喘症或嘔吐血痰平居時則不喘稍行動則氣促喘急以黄栢知母滋腎丸空心服七八十丸其症大減此黄栢知母能泄衝脉之火者如此効也

簡易方　治肺氣喘嗽馬兜鈴二兩去殻取子秋石半兩入碗内和匀慢火炒乾甘草一兩炙二味為末每一錢水一盞煎六分温呷之以藥末含嚥津亦得

肺氣虚者宜補之

本事方治咳喘氣急以參一味為末鷄子清投新水調下一錢昔有二人同走一含人參一不含俱走三五里許其不含者大喘含者氣息自如乃人參之力也

仲景治火逆上氣咽喉不利以麥門冬湯主之止其逆而下其氣也　麥冬七升　半夏一升　人參四兩　甘草二兩　粳米三合　大棗十二枚　右六味以水一斗二升煮取六升温服一升日三夜一

許學士治一婦年五十餘素有痰嗽忽一日大喘痰出如泉身汗如油脉浮而洪似命絶之狀予適在彼速用麥門冬四錢人參二錢五味子一錢五分煎服一帖喘定汗止三帖後痰亦漸少再與前方内加瓜蔞仁一錢五分白朮當歸芍藥黄芩各一錢服二十餘帖而安此實麥冬五味人參之功也如自汗兼腹滿脉沉實而喘者裏實宜下之

活人五味子湯　治喘促脉伏而数者

五味子二錢　人參　麥冬　杏仁　橘紅各二錢半

薑三片紅棗三枚水煎服

喘凡遇冬而發此寒包熱也解表則熱自除

枳殻炒二錢　麻黄　防風　黄芩　桔梗二錢　陳皮

木通一錢半通利九竅台肺壅甚當　紫蘇葉五

右分四帖水煎服之

又方　治寒包熱而喘必用發散　半夏　枳殻

片桔梗　黄芩炒　紫蘇　麻黄　杏仁　甘草

如天寒加桂枝

東垣麻黄定喘湯　小兒寒鬱喘喉中鳴腹内响堅滿鼻流清涕脉沉急而数　麻黄　草蔻

益智仁各一分半　甘草　歸身　紅花　黄芩生

柴胡各一分　升麻　神麴各五分　吴茱萸三分　蘇木半分

全蝎　右分二服水煎微〻汗愈

麻黄蒼朮湯　治秋暮冬月每夜連声嗽不絶口喘至天明日高方緩口苦兩脇下痛卧而多驚筋攣肢節痛痰吐涎沫日晚呵欠不能飲食

柴胡　羌活　蒼朮各五分　麻黄一分　防風　甘草稍生　歸尾　黄芩各四分　炙甘草三分　五味子九分

草豆蔻六分　黄蓍一錢半　右分二帖水煎稍熱服　此二方發中外之寒

七情氣欝宜四磨湯以解之庶下其氣而止其喘急也　人參　檳榔　沉香　天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎一二沸放温服

加木香枳殻為六磨湯　有苦寒者加丁香亦可　衍義云烏藥檳榔氣稍走泄但不甚剛猛與沉香同磨作湯治胷中氣膈甚當

丹溪治一婦人發熱氣喘與解表藥汗出而定因夜半食粥畢喘再作心痞口乾 半夏 枳實炒各三錢 黃連 白朮各一錢 木通 陳皮各一錢半 麻黃 紫蘇各一錢 炙甘草 加姜水煎服

分氣紫蘇飲 治脾胃不和洒淅惡寒氣逆喘促

五味子 桑白皮 茯苓 炙甘草 草果

大腹皮 陳皮 桔梗各等分 紫蘇減半

姜三片水煎服

東垣人參平肺散 治心火刑肺傳為肺痿咳嗽

（七卷） 五五

喘嘔痰涎壅盛胷膈痞悶咽嗌不利 桑皮一錢

知母七分 炙甘草 地骨皮 人參各五分 茯苓

天冬各四分 青皮 陳皮各三分 五味子三十粒

如熱甚加黃芩紫蘇葉半夏各五分

參蘇溫肺湯 治形寒飲冷則傷肺喘煩心胷滿短氣不能宣暢 人參 肉桂 甘草 木香

五味子 陳皮 半夏 白朮 桑皮 紫蘇

莖葉各二兩 茯苓一兩 每五七錢姜三片水煎服

如冬寒月每服加不去節麻黃半分

加味華蓋散 肺受風寒胷滿聲重

蘇子 陳皮 赤茯苓 桑皮 麻黃 杏仁各二錢 甘草一錢 姜三片棗二枚水煎服

九寶湯 欬而身熱喘急惡寒 麻黃 薄荷

陳皮 肉桂 紫蘇 杏仁 甘草 桑皮

大腹皮各等分 加姜葱水煎服

發時有痰吐出者宜化痰

婦人大全千緡湯 半夏七枚破四片製之 皂角去皮絃

炙甘草各一寸 生姜如指大 右用水一碗煮去半

（七卷） 五六

頓服一方不用甘草但用半夏末一兩皂角去皮絃半兩生姜七片同入紗袋中水三升煎至一盞五分以手揉洗取清汁分作三服連進之效

咳逆上氣時時濁唾但坐而不得卧者皂莢丸主之方在咳嗽門

水氣凌肺者宜徹之

東垣神秘湯 治病人不得眠眠則喘急水氣逆行上乘于肺肺得水而浮使氣不流通其脉

沉大　蘇葉　陳皮　生姜　桑皮　人參各五
錢茯苓　木香各二錢　右分二帖水煎服
防巳葶藶丸　治肺氣喘嗽面目浮腫小便赤澁
喘促不得卧　漢防巳　木通　貝母各一兩　苦
葶藶炒　杏仁　右為末棗肉膏為丸梧子大桑
白皮湯下
喘咳倚息不得卧仲景小青龍湯加石膏主之方在痰飲門
汚血凝滯胷膈者宜活之
丹溪治卒上氣喘鳴息急欲死者　韭汁飲一
升瘥　蓋韭汁能去胷中悪血滯氣
又方　治上氣咳嗽胷膈妨悶氣喘　䓂仁二兩
去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煮粥食之
東垣加味瀉白散　治陰氣在下陽氣在上咳嘔
喘促　桑皮一兩　青皮二兩　茯苓三錢　甘草
地骨皮七錢　陳皮　五味　人參各五錢
每五七錢入粳米百粒水煎服
清金湯　治男婦不拘遠近肺氣咳嗽上氣喘急

喉中涎声胷滿氣逆坐卧不安飲食不下方在嗽門
丹溪清金丹見哮門　治食積痰喘哮嗽因厚味而發
者
調氣化痰丸　快脾順氣化痰消食治久喘或作
或止者　半夏　南星　白礬　皂角　生
姜　右各一觔水煮南星無白點為度揀去皂
角不用將生姜切作片同半夏南星晒乾再加
青皮去白　橘紅　蘇子炒　蘿蔔子炒另研　乾葛
杏仁去皮尖另研　神麯炒　麥蘖炒　山查　香附子
右各半觔淨與前藥合和一處為細末生姜
汁浸蒸餅打糊為丸桐子大每服五七十丸
食後茶湯送下
飲水多者宜滲利之
仲景云病人飲水多必暴喘滿以五苓散主之
白朮散　治夏月飲冷酒生痰膈滿而喘
白朮　茯苓　黄芩　半夏各等分　每服六七錢
姜三片水煎調陳皮神麯末各一錢食後服
開提之劑

簡易方 治喘急 桔梗一兩半為末童便半升煎取四合去渣溫服

開闔之劑

安肺散 治痰嗽不問新舊喘急氣逆

麻黃(去節二兩) 炙甘草(二兩) 御米殼(去蒂炒黃四兩) 右為末每五錢水一盞入烏梅一枚煎七分溫服

人參理肺散 治喘嗽不止

麻黃(去節炒黃) 川歸 木香(各一兩) 御米殼(炒三兩) 人參 杏仁(麸炒各二兩) 每服六錢水煎服

雜方

保命集半夏丸 傷風痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒 半夏(一兩) 檳榔 雄黃(各三錢) 右為末姜汁浸蒸餅糊為丸梧子大每服五十丸姜湯下

羅太無人參半夏丸 化痰墜涎止嗽定喘或風痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏正頭風疼或壅頭目昏眩耳聾鼻塞咽乾胷膈不利 人參 茯苓 南星 薄荷(各五錢) 半夏 乾姜 白礬 寒水石(各一兩) 蛤粉(二兩) 藿香(二錢半)

右為末水糊為丸梧子大每服三五十丸姜湯下日三服 此方治久喘極効於未發時服之若已發時用沉香滾痰丸微下之累効

孫兆視雷道矩病吐痰頃間已及一升喘咳不已面色鬱黯精神不快兆乃與仲景葶藶大棗瀉肺湯一服訖已覺胸中快利畧無痰唾矣

加味白虎湯 治熱痰喘嗽火迫肺金

白虎湯加瓜姜仁枳殼黃芩神効

雙玉散 治火痰喘嗽痰湧如泉

寒水石 石膏 等分為末人參湯下三錢

羅太無真應散 遠年喘急不能卧百藥不効者

白石英(四兩通明者以絹袋盛以雄猪肚一箇包之緊口煮熟取出再換猪肚一箇如前法煮三次取出英晒乾研極細末入石) 用官局款冬花散二錢入前末二錢再加桑白皮二寸生姜三片棗子一枚水一盞半煎七分通口服其猪肚亦可食只不得用醬椒醋鹽姜等調和

官局款冬散 款冬花(一錢) 貝母 知母 桑葉 杏仁 半夏 阿膠 甘草(各二錢) 麻黃(去節四錢)

為末

陳皮湯 治痰喘 橘紅半斤 明礬二兩半 共炒香
炙甘草二兩 半夏二兩薑汁浸凡水煮 右為末每服二錢米湯
杏蘇飲 治上氣喘嗽浮腫 杏仁一錢半 蘇葉三錢
五味子 大腹皮 烏梅肉 紫菀 炙甘草
各一錢 橘紅 麻黃去節 桑皮 阿膠 桔梗各七分半
姜三片水煎服

玉華散 咳嗽上喘清肺利膈 葶藶 桑皮
半夏 貝母 天冬 馬兜鈴 杏仁 紫菀
百合 人參 百部 甘草各七分 水煎服

定喘膏詩括 一兩麻油二兩蜜半兩生姜自然汁紫
菀麻黃及杏仁桔梗細辛斟酌入更加半夏與
人參慢火熬來成黑漆臨睡之時三兩匙覺來
定喘無蹤跡

定喘 治上氣喘滿倚息不能卧 杏仁 菀仁
俱麩炒去皮尖 桑皮各一兩 人參五錢 姜棗水煎服

二奇方 治水氣發喘方在水腫門

杏仁煎 治喘嗽 杏仁去皮尖 胡桃肉去皮 等分研
為膏入煉蜜少許丸如彈子大每嚼一二丸
姜湯下

又方 治氣虛喘嗽極效 人參三錢 胡桃肉五枚
姜五片水煎服

又方 用胡桃肉三枚生姜三片臨卧嚼下畢飲
湯三兩呷再嚼桃姜如前即就枕勿行動甚効

又方 肺熱胸滿痰嗽 瓜蔞仁研 半夏二味和
勻生姜自然汁打麵糊為丸如梧子大每服
五十丸姜湯下

又方 治諸喘 麻黃七分 杏仁一錢 甘草四分 細茶炒八分
石膏煅一錢半 水煎服

定喘奇方 治稠痰壅盛軀肥實而喘者
廣橘紅二兩 明礬五錢 同炒香去礬不用 半夏
一兩半 杏仁麩炒一兩 瓜蔞仁去油一兩 皂角去皮絃子燒存性三錢
炙甘草七錢 黃芩酒拌晒乾五錢 右為末飪餅用淡姜湯
打糊為丸菉豆大每食後白湯下一錢日二
次服三五日大便下稠痰而愈虛弱人每服七分

治熱嗽喘咳不已 苦葶藶二兩炒另研 知母蜜炒 貝母

各一兩 杏仁二兩去皮尖研為泥 右為末煉蜜丸梧子大食後臨臥桑白皮湯下五七十丸

治喘嗽 貝母一兩 香附二兩半生半炒 為末食後茶調下二錢忌塩油煎煿不拘水嗽鹹嗽並効

劫喘方 牛黃散治熱痰急喘欬丸者 白牽牛炒二兩 大黃煨一兩 蜜水下二錢

又方 蘿蔔子蒸 皂角燒存性 姜汁和蜜丸梧子大每服五十丸白湯下

治喘 用古文錢七箇塩梅七箇水一盞同浸二宿每服一呷空心良久吐出惡痰而効

子和稀涎散 治痰喘氣逆下氣化痰甚速

氣短氣促少氣

短氣而息促似喘非喘也少氣者氣少不足以言也

素問云三陽絶三陰微是為少氣方盛衰論 怯然少氣者是水道不行形氣消索也示從容篇 言而微終日乃復言者此奪氣也 綱目云治此少氣蓋生脉散獨參湯之屬為愈也

一陽發病少氣善咳善泄

運氣言少氣有二 一曰火熱經云火欝之發民病少氣又云少陰之復少氣骨痿又云少陽之復少氣脉痿治以諸寒是也 二曰風湿經云太陽司天之政四之氣風湿交争風化為雨民病大熱少氣是也

喘與短氣辨

成無己曰短氣者氣而不能相續者是也似喘而非喘若有喘上衝而實非氣上衝也夫喘者張口擡肩搖身滚肚謂之喘也氣上衝者腹裏時時氣上衝也所謂短氣者呼吸雖數而不能相續似喘而不搖肩似呻吟而無痛者此短氣也經所言短氣者衆實為難辨愚師莫識惧者多矣要識短氣之真者氣急而短促謂之氣短者是也

脉經曰寸口脉沉胸中短氣

生生子曰短氣少氣治法亦有異也短氣仍有虛有實治法有補有瀉少氣則純不足也治惟有補而已

仲景曰陽脉微而緊〻則為寒微則為虚微緊相搏則為短氣　又曰胸痺氣中氣寒短氣茯苓杏仁甘草湯主之橘枳姜湯亦主之（方見胸痺門）胸痺喘息咳唾胸背痛短氣括蔞薤白半夏湯主之（方見胸痺門）夫短氣有微飲當從小便去之苓桂术甘湯腎氣丸亦主之（腎氣丸方見肺氣中）欵花補肺湯治咳嗽短氣　又曰短氣皆屬飲苓桂术甘湯是其一法也金櫃云咳逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲又云支飲亦喘而不得卧加短氣其脉平也又云膈上有留飲其人氣短而渴四肢歴節痛脉沉者有留飲又云肺飲不弦但苦喘短氣其治法危急者小青龍湯脹滿者厚朴大黄湯冐眩者苓桂术甘湯及澤瀉湯不得息葶藶大棗湯吐下不愈者木防已湯（之類是也）

東垣曰胃滿少氣短氣者肺主諸氣五臟之氣皆不足而陽道不行也　氣短小便利者四君子湯中去茯苓加黄耆以補之如腹中氣不轉者加甘草一半　肺氣短促或不足者加人參白芍藥中焦用白芍藥則脾中陽升使肝膽之邪不敢犯之如衣薄而短氣則添衣于無風處居止氣仍尚短則以熱湯一碗薫其口鼻則不短也　如衣厚于不通風處居止而氣短則宜減衣摩指汗孔令合于漫風處居止　如久居高屋天寒陰湿所遏令氣短者亦如前法薫之　如居周密小屋或大熱而處寒涼氣短則就風日允氣短皆宜食滋味湯飲令胃氣調和

仲景曰平人無寒熱短氣不足以息者實也（丹溪治許白雲先生脾疾瀉痛短氣用大吐大下去是也）

孫尚正元散　治氣不接續兼治滑泄及小便数王丞相服之有効　莪术一兩金鈴子去核二錢半右件為末入硼砂一錢煉過研末和匀每服二錢盐湯或温酒空心調服

苓桂术甘湯　治痰飲短氣（方在痰飲門）

産後喘

産後喘乃急症極危多死郭氏謂此名孤陽絶陰為難治因所下過多荣血暴竭衛氣無主獨聚

肺中故令喘促喉中氣急也治此症用獨參湯為妙 陳無擇云宜大料芎歸湯 若惡露不快散血停凝上薰于肺亦令喘急但服奪命丹血去喘自定

血沒散 產後敗血冲心胷滿上喘命在須臾

真血竭 沒藥 等分為末每服二錢用童便好酒煎一大沸温調下 方產時進一服上床良久再服其惡血自循經下行更不上冲免生百病

參蘇飲 產後血入於肺面赤發喘欲死者

人參一兩為末 蘇木二兩 右以水二碗將蘇木煎至一碗去渣調人參末隨時加減服神効

若因憂怒性氣抑欝而發喘者以小調經散用桑皮杏仁煎湯調服

旋覆花湯 產後傷風寒咳喘嗽痰涎壅盛坐卧不寧 旋覆花 赤芍藥 荊芥穗 半夏麯 五味子 麻黄 茯苓 杏仁 甘草 前胡 各等分 姜五片枣二枚水煎服

一婦孕時足腫七月初旬產後二日洗浴即氣喘但坐不得卧者五個月惡風得煖稍寬兩關脉動尺寸皆虛百藥不効牡丹皮桃仁桂枝茯苓乾姜枳實厚朴桑皮紫蘇五味瓜蔞仁煎湯服之即寬二三服得卧其痰如失蓋作汚血感寒治之也

若傷酸冷飲食而喘者宜見晛丸 姜黄 三稜 蓽澄茄 陳皮 良姜 人參 莪术 右等分為末蘿蔔水煮爛研細將汁煮麵糊為丸梧子大蘿蔔子湯下

小調經散 產後四肢浮腫者敗血循經流入四肢淫留日久腐爛如水故令四肢腫面色黄宜服此血行腫消則愈 沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸各一錢 細辛 射香各五分 右為末每服五分姜汁酒調服之

哮

丹溪曰哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐不用凉藥須當帶表散此寒包熱也亦有虛而不可吐者

哮喘遇冷則發者有二

其一屬中外皆寒者治法乃東垣參蘇溫肺湯調中益氣加吳茱萸湯及紫金丹刼寒痰者是也（紫金丹即砒霜猪肉蒸為末蒸餅丸者）其二屬寒包熱治法乃仲景趂未寒之時先用大承氣湯下其熱至冬寒時無熱可包哮自不發是也

食積痰壅哮喘咳嗽清金丹遇厚味發者用之

蘿蔔子（淘淨蒸熟晒乾為末一兩）猪牙皂角（焼存性三錢）用生姜汁浸蒸餅丸如小菉荳大每服三五十丸噙下

刼喘以姜汁煉蜜如梧子大每服七八十丸噙下止之

遠年近日哮喘痰嗽　蟬退（去足）輕粉（另研）馬兜鈴（各一兩）五靈脂（生）雄黃（生）杏仁（去皮尖）砒（生各五錢）淡荳豉（四十九粒）右為末用生姜葶藶自然汁合輕粉諸藥為丸小彈子大每服一丸細嚼臨睡生姜湯下

治齁嗽　蘇子（二錢）麻黃（去節三錢）欵花　桑葉（蜜炙）半夏（各三錢）杏仁（去皮尖一錢半）甘草　白果（二十一枚去衣炒黃）之水三鍾不用姜煎二鍾徐徐頻服

一方（治仝上）用糯米泔水磨茶子滴入鼻中令吸入口內服之口中橫咬竹管一個片時問則涎自口鼻中流出如綿當日立愈二次絕根

治水哮　芫花（為末）大水上浮湾（濾過）大米粉

右三味搜為粿清水煮熟恣意食之

又方　青皮（一枚）半開者入芭荳一粒鉄線縛定燒存性為末姜汁并酒各一呷同調服過口（便定）

定喘湯　白菓（二十一枚去殼切碎炒黃色）麻黃　欵冬花　桑皮（蜜炙）法製半夏（如無以甘草湯泡七次去皮用各三錢）甘草（一錢）蘇子（二錢）杏仁（一錢半）黃芩（一錢半炒）右用水三鍾煎二鍾分二服不用姜不拘時徐徐服

詩曰　諸病原來有藥方　惟愁齁喘最難當
麻黃桑杏尋蘇子　白菓冬花更又良　甘草
黃芩同半夏　水煎百沸不須姜　病人遇此
仙丹藥　服後方知定喘湯　金陵有一浦舍
用此方專治齁疾無不取効此其真方也

壓掌散　治男婦哮喘痰嗽　麻黃（去節二錢半）炙甘

草二錢 白菓五箇打碎 水煎臨卧服

二黃丸濟生方 治停痰在胃喘息不通呼吸欲絶

好雌黃一錢 雄黃一兩 研極細末熔黃蠟為丸彈子大毎服一丸於半夜時煮糯米粥乘熱以藥投入粥内攪轉和粥吃

善悲

内經云在臟為肺在志為悲又云精氣并于肺則悲是也

肺虚補母仲景云婦人臟躁善悲傷欲哭象如神靈所附數欠伸甘麥大棗湯主之 甘草三兩

小麥一升 大棗十枚 水六升煮三升分三服亦補脾氣

許學士治一婦人數欠無故悲泣不止或謂之有祟祈禳請禱備至終不應予忽憶金匱有一証云婦人臟躁悲傷欲哭象如鬼神靈數欠伸者宜甘麥大棗湯予急令治藥尽劑而愈古人識病制方種種絶妙如此

運氣云悲証皆屬寒水攻心經云火不及曰伏明伏明之紀其病昏惑悲忘從水化也又云太陽司天寒氣下臨心氣上從喜悲數欠又云太陽司天寒淫所勝善悲時眩仆又云太陽之復甚則入心善忘善悲治以諸熱是也

姙娠善悲

綱目述會先生治一姙娠四五箇月臟躁悲傷遇晝則慘感淚下數欠象若神靈如有所憑醫與巫皆無益與仲景大棗湯一投而愈

肺痿 金匱要畧千金方脉經論同

論曰寸口脉數其人病咳口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從痟渴小便利數或從便難被快藥下重亡津液故得肺痿又寸口脉不出而反發汗陽脉早索陰脉不濇三焦踟蹰入而不出陰脉不濇身體反冷其内反煩多唾唇燥小便反難此為肺痿傷于津液便如爛瓜下如豚腦但坐發汗故也其病欲欬不得咳咳出乾沫久久小便不利其脉平弱肺痿吐涎沫

而不咳者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲者自愈自張口者短氣也

王海藏曰此証初得可治久則難愈何者上枯水之源下竭水之本也

又曰寸口脉虛小者為肺痿熱之所過初結為膿始萌可救微發渴者欲愈

又曰凡傷風傷寒後咳嗽唾血者此肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿當以小柴胡去人參大棗、生姜加乾姜五味子

又曰肺痿肺癰其皮如麩糠○有胃脘成癰其皮緊如甲錯有腸癰裏大膿血于腸胃之間

又經云陽明司天唾出白血者其狀淺紅如肺色故曰白血

又曰無汗悪寒脉浮緊得自傷寒法從麻黄○有汗悪熱脉沉實得自傷酒法從葛根

生生子曰痿乾瘺也即早發還先痿之痿

甘草乾姜湯　温臓治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩不渴不咳上虛下不能制溲服此湯已渴者属消渴

甘草四兩炙　乾姜二兩炮　水三升煮取一升半分温日二服　集驗肘後有大棗十二枚

甘草湯　治肺痿涎唾多出血心中温温液液方

千金翼名温液湯　甘草二兩水三升煮取一升半分三服

生姜甘草湯　治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

生姜五兩　甘草四兩　人參三兩　大棗十二枚

右水七升煮取三升分三服

桂枝皂莢湯　治肺痿吐涎沫不止

桂枝　生姜各三兩　甘草二兩　皂莢一兩　大棗十五枚

水七升煮取三升分三服

千金方麻黄湯仲景名小青龍加石膏湯　治肺脹咳而上氣咽燥而喘脉浮心下有水

麻黄　芍藥　生姜仲景用乾姜　細辛　桂心各三兩　半夏　五味子各半升　石膏四兩　水一斗先煮麻黄去上沫内諸藥煮取三升強壯服一升羸者减之日三服

小青龍湯無石膏

知母茯苓湯　肺痿喘嗽不已往来寒熱自汗

茯苓 炙甘草各一两 知母 五味子 人参
薄荷 半夏 柴胡 白术 款花 桔梗
麥冬 黄芩各五钱 川芎 阿膠炒各一二钱
右每服一兩姜三片水煎服
久痨咳嗽肺痿見血 知母 貝母 天冬 麥
冬 款花各三分 川歸 地黄 苡仁 杏仁
天花粉各五分 桔梗 甘草 馬兜鈴 紫菀
阿膠 白蠟各一分半 姜三片枣一枚水煎連進
三服立愈

人參平肺散 治心火尅肺傳為肺痿咳嗽喘嘔
痰涎壅盛胷膈痞滿咽嗌不利 橘紅 甘草
炙地骨皮 茯苓 青皮 蘇葉 半夏各五钱
桑白皮一兩 知母七钱 人参 天門冬各四钱 有
熱加黄芩四钱 五味子三百粒 每服五錢姜三片
水煎服或為末姜汁丸如彈子大噙化亦可
人参款花膏 脾胃虚寒久嗽不已咽膈滿悶咳
嗽痰涎嘔逆悪心腹脇滿脹腰背傷痛或虚劳
冷嗽及遠年近日一切咳嗽諸藥不効欲成肺痿

款花 人参 五味子 紫菀 桑白皮各一兩
右為末煉蜜丸芡實大每食後細嚼一丸淡
姜湯下噙化亦可
肺癰 仲景王叔和論同
孫真人曰病欬唾膿血其脉數實者屬肺癰虚者
屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒
非肺痿若口中辟辟燥欬即胷中隱隱痛脉反滑
而數此為肺癰也問曰病者欬逆師脉之何以知
為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脉何

類何以引之師曰寸口脉微而數微則為風數則
為熱微則汗出數則悪寒風中於衛呼氣不入熱
過于营吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺
其人則咳口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振
寒熱之所過血為凝滞蓄結癰膿吐如米粥始萌
可救膿已成則難治寸口脉數趺陽脉緊寒熱相
摶故振寒而咳趺陽脉浮緩胃氣如經此為肺癰
師曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如
故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之不應愈

也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胷中者為肺癰其脉數欬唾有膿血設膿未成其脉自緊數緊去但數膿為已成也

生生子曰按金櫃要畧脉經元戎論肺痿肺癰皆無分別治亦相須以其俱為肺病也愚歴見今之病此者亦稍有分別不能不為之辯也肺痿近于虚怯故王海藏援内經勞風論証入之謂上枯水之源下竭水之本也何言乎内經五痿論皆以肺熱葉焦為本故今之病肺痿者多乾欬聲啞无力緣肺主聲肺為火爍僊劇枯痿乾癟故聲不充發也虚怯者多有之肺癰雖亦為肺熱所致多有因于外感因于酒熱故間有吐尽膿血而愈者有瀉肺而愈者兹分肺痿肺癰為二門祖千金也

王海藏曰寸口脉實大為肺癰血為凝滯化為五色脉數為弱膿成難已不渴者難治

黄昏湯　治欬有微熱煩滿胷心甲錯是為肺癰者方　黄昏手掌大一片是合昏皮也㕮咀以水三升煮取一升分二服

又方　薏苡仁二十升　瓜瓣半升　桃仁五十枚　葦莖切二升水二斗煮取五升去滓　右四味內葦汁中煮取二升服一升當有所見吐膿血

王海藏加味葶藶大棗瀉肺湯　治脉緊數則膿已成喘而不得卧　葶藶二兩炒黄色　右件杵成丸以水三升煮大棗二十個取二升去渣内麻黄五味子各半兩取清飲頓服令三日服一劑瘥

又一法　治一切欬嗽膿血久欬及出不止好酥三十觔三遍煉停取凝成膏醍醐服二合日三服瘥

如聖丸　治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨悶及肺癰喘嗽膿血胷滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣息腥臭久久咯膿狀如米粥　龍腦另研　牛黄另研　桔梗　甘草生用各一錢　右為細末煉蜜丸每兩作二十丸每服一丸噙化

嗽藥青龍散　石膏八兩　朴硝　甘草生用各一錢

青黛(半兩) 右為細末每服二三錢煎薄荷湯點熱漱冷吐

衍義蛤蚧散 治肺虛欬久成瘵吐膿血 犀角 羚羊角 鹿角 阿膠 蛤蚧

搜膿散 治諸瘡膿汁不絕腐盡 黃蓍 白芍藥 香白芷(各等分) 右為末乾上患處上用膏藥敷貼一日一換

海藏云此方雖云上瘡吐膿血久不盡者亦宜用此藥作湯散煎調服之又宜糊為丸桐子大白

湯下三五十丸或乾糝細末咽津大妙

錢氏如聖散 桔梗 甘草 阿膠(炒白) 煎甘桔瓜清內膠化服

黃蓍鱉甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸脇不利飲食多渴欬嗽稠粘時有膿血

知母(焙) 桑白皮(去皮) 黃蓍(去甘) 甘草(炙) 赤芍藥 紫菀(去蘆已上七味各五錢半) 秦艽(洗去蘆) 白茯苓(去皮焙本忌火人) (焙別有鬚) 生地黃 柴胡(去蘆) 地骨皮(去骨已上五味各六錢六) (分半) 肉桂(去皮不見火) 人參 苦桔梗(已上二味各三錢三分半) 鱉甲(去頭用醋炙更佳) 天門冬(湯洗去心焙一本忌火今聽已上一味各一兩) 半夏(五分) 右為粗末每服二大錢水一盞煎至七分去渣溫服食後 海藏云此方內鬬黃蓍疑黃芩是黃蓍也然內有黃芩有小柴胡今治虛熱妙為有盜汗亦無妨也兼加知母地骨皮赤芍藥即錢氏地骨皮散也○治盜汗亦妙內有桂本治發熱惡寒即柴胡加桂也○天門冬人參地黃即三才也○秦艽柴胡

甘草鱉甲芍藥即黃龍湯也○紫菀桔梗甘草即(紫菀)散也○桂芍黃蓍甘草即黃蓍建中湯也又云此方治本無傷寒風而得○孫真人治嗌膿血用麻黃升麻之類及青龍湯之類亦從傷寒而得也內多五味子皆祖仲景法無論傷寒傷風皆可加五味子 又云桔梗一味有辛有苦辛以散之苦以泄之當如上下之意

硃砂膏 鎮心神解熱除煩嗌血等證

硃砂另研半兩　珍珠末　生犀角　人參　玳瑁末
甘草各一兩　金箔九分半用　輕粉二錢半　蘇合油一分　牛黃
另研麝香另研　龍腦另研　南鵬砂　琥珀　遠志　羚
羊角　赤茯苓巳上各半兩　安息香酒熬去石約半兩
右為細末入研藥極細煉蜜丸蘇合油和諸
藥為錠子更以金箔為衣每兩作五錠每服
一皂角子大嚼化人參湯下亦得並阿膠丸
相雜服尤勝至宝丹
定肺散　知母半兩　貝母二錢半　人參二錢半　桔梗半兩

烏梅肉半兩　御米殼炒二兩　白朮二錢半　為細末水
煎生姜湯點亦得蜜丸彈子大嚼化亦得
定肺丸　款冬花　紫菀　知母　貝母　人參
甘草炙　桑白皮　御米殼　麥門冬　百部
馬兜鈴　五味子　烏梅肉巳上各等分
右為細末煉蜜丸彈子大嚼化一丸
古方紫菀散　紫菀半兩　款冬花半兩　百部二錢半
右為細末烏梅湯點服生姜亦得　如欬加
五味子　喘加杏仁　渴加烏梅　氣逆加陳
皮　頭痛加細辛三錢甘草二錢　氣脫者
加御米殼蜜炒粗末水煎
增損防風通聖散　治鼻塞不通肺氣不利
桔梗　桑白皮　紫菀　鼠粘子　荊芥穗各半兩
三兩　甘草一兩巳上各生用　右為粗末防風通聖散各一
半和勻每服四錢水一盞半生姜五片煎至
七分去滓溫服食後
葶藶大棗瀉肺湯　肺癰胷滿脹一身面目浮腫
鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫

塞先服小青龍湯一帖　葶藶三錢炒研　大棗十二枚
先以水二升煮棗取二升去棗入葶藶煮取
一升服
外臺桔梗白散　咳而胷滿振寒脉數咽乾不渴
時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰
桔梗　貝母各三分　巴荳七分　右三味為散壯人服
五分弱者減之病在膈上吐膿血膈下者瀉
出　若下多不止者飲冷水一杯
欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久

久吐膿如米粥者為肺癰桔梗湯主之亦治血症
桔梗一兩　甘草二兩　右二味以水三升煮取
一升分溫再服則吐出膿血而愈也
欬逆上氣時時濁唾但坐不得卧皂莢丸主之
皂莢刮去皮酥炙　為細末蜜丸梧子大以棗膏和湯
服三丸日三夜一
孫真人治肺癰吐膿血用甘桔湯二十餘條加減
生甘草一兩桔梗二兩水煎服　咳逆氣者加
陳皮咳嗽者加知母貝母　欬而渴者加五味

吐膿血者加紫菀　肺痿者加阿膠　面目腫
者加茯苓　嘔者加生姜半夏　少氣者加人
參麥冬　膚疼者加黃蓍　目赤者加梔子黃
連　咽痛者加鼠粘子竹茹　声不出者加半
夏桂枝　疫毒頭腫者鼠粘子大黃芒硝　胸
痛膈不利者加枳殼　心胷痞者加枳實　不
得眠者加梔子　發狂者加防風荊芥　酒毒
者加葛根陳皮
桔梗湯　治肺癰心胸氣壅咳嗽膿血心神煩悶
咽乾多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澁
桔梗　貝母　當歸　瓜蔞仁　只殼　苡仁
桑皮　防己各一錢二分　甘草節　杏仁　百合各六分
黃蓍一錢八分　分二服姜三片水煎溫服大便秘
加大黃　小便秘加木通
升麻湯　肺癰吐膿血作臭氣　升麻　苦梗
苡仁　地榆　黃芩　牡丹皮　芍藥各一錢八分
甘草三錢六分　分二服水煎食後溫服
紫菀湯　治咳嗽唾中有膿血虛劳癰痿

人參　紫菀　知母　桔梗　甘草　五味子
茯苓　阿膠　貝母各一錢　姜三片水煎服
排膿散　肺癰吐膿以此排膿補肺
黃蓍一兩　水二鍾煎一鍾食後溫服
棗膏丸　肺積在右脇下如杯發為癰　陳皮
苦梗　葶藶　各等分棗肉搗為丸梧子大每
服五十丸米飲下
消濃飲　肺有癰膿腥氣上衝嘔而咳嗽
天南星　半夏　知母　貝母　生地　阿膠

川芎　甘草　桑皮　防風　射干　桔梗
天冬　薄荷　杏仁　白芷　紫蘇　白芨
烏梅　各等分每服七錢姜三片水煎服

赤水玄珠七卷終

赤水玄珠第八卷目錄

瘧門
泄痢辨
泄瀉門
痢門

新安生生子孫一奎著輯

瘧門

内經黄帝問曰夫痎瘧皆生於風其蓄作有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則内外皆熱頭痛如破渴欲飲冷帝曰何氣使然願聞其道岐伯對曰陰陽上下交爭虚實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實而陽虚陽明虚則寒慄鼓頷也巨陽虚則腰背頭項痛三陽俱虚則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於内故中外皆寒陽盛則外熱陰虚則内熱内外皆熱則喘而渴故欲冷也此皆得之夏傷暑熱氣盛藏於皮膚之内腸胃之外此營氣之所舍也此令人汗空疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之内與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而内薄内外相薄是以日作帝曰其間日而作者何也岐伯

曰其氣之舍深内薄於陰陽氣獨發陰邪内著陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰善其作日晏與日早者何氣使然也岐伯曰邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此作日稍晏也其出於風府日下一節二十五日下至骶骨二十六日入於脊内注於伏膂之脉其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早也其間日發者由邪氣内薄於五臟横連募原也其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之始發也不當風府其日作者奈何岐伯曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虚實不同邪中異所則不當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至

腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之發必開其腠理邪氣之所舍則其府也

帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧帝曰先熱而後寒者何也此先傷於風而後傷於寒故先熱而後

寒也亦以時作名曰温瘧帝曰夫病温瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏岐伯曰温瘧得之冬傷於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓爍肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外者也如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰温瘧其但熱不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰癉瘧帝曰癉瘧何如岐伯曰癉瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消爍肌肉故名曰癉瘧

帝曰瘧未發其應何如岐伯曰瘧氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脉躁在陰則寒而脉靜極則陰陽俱衰衛氣相離故病得

休衛氣集則復病也

衛與邪相并則病作與邪相離則病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒已離於陽則熱已至次日又集而并合則復病也

帝曰時有間二日或至數日或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日發者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘧者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴

帝曰夫經言有餘者瀉之不足者補之今熱為有

餘寒為不足夫瘧者之寒湯火不能溫也及其
熱氷水不能寒也此皆有餘不足之類當此之時
良工不能止必須其自衰乃刺之其故何也願
聞其說岐伯曰經言無刺熇熇之熱無刺渾渾
之脉無刺漉漉之汗故為其病逆未可治也夫
瘧之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰
盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽
陽與陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而渴
夫瘧氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝

則寒陽勝則熱瘧者風寒之不常也病極則復
至病之熱也如火之熱如風雨不可當也故經
言曰方其盛時必毀因其衰也事必大昌此之
謂也夫瘧之未發也陰未并陽陽未并陰因而
調之真氣得安邪氣乃亡故工不能治其已發
為其氣逆也帝曰善攻之柰何早晏何如岐伯
曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也
陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不
得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血

者皆取之此真往而未得并者也已上俱內經瘧論
保命集云夏傷於暑秋必痎瘧蓋傷之淺也近而
暴傷之重也遠而深痎瘧者久瘧也是之夏傷
於暑溼熱閉藏而不能發洩於外邪氣內行至
秋而發為瘧也初不知何經受病隨其受而取
之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪氣其
症各殊同傷寒論之也故內經曰五藏皆有瘧
其治各別太陽經者謂之風瘧治多汗之在陽
明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂之

風熱瘧治多和之此三陽受病皆謂之暴瘧也
發在夏至後處暑前者此乃傷之淺者近而暴
也在陰經者則不分三經皆謂之溫瘧宜以太
陰經論之其發處暑後冬至前者此乃傷之重
者遠而深也痎瘧者老瘧也故謂之久瘧
丹溪云風暑之瘧當發汗夏月多在風涼處歇遂
閉其汗而不泄故也　惡飲食者必自飲食上
得之無汗者要有汗發散為主帶補　有汗者
要無汗扶正氣為主帶散邪　瘧病感虛者須

以人參白朮一二帖托住其氣不使下陷後使他藥　內傷挾外邪同發必內生痰外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草菓煎服　久瘧不得汗者二陳湯加檳榔倍加蒼朮　一方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截　老瘧係風暑入於陰分用血藥引出陽分則散當以當歸紅花黃栢川芎白朮蒼朮甘草白芷水煎露一宿空心服

按瘧在陰分須徹起陽分者即格致論中云臟傳出至府亂而失期也又當因其汗之多寡而為補養升發之下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川芎葛根蒼朮升麻柴胡之屬此丹溪治瘧之微旨也

心法附餘曰世用砒霜等毒藥截瘧差悮甚矣且俗名曰脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒况其他乎在陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行氣消堅為主

脉訣舉要曰瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒隨時變遷　心法附錄曰有病久脉極虛微而無力似乎不弦然而必於虛微之中見弦但不搏手耳細察可見也

生生子曰世俗皆視瘧為小病不分外感內傷勞倦虛弱在陽在陰之旨率以砒丹常山等毒劑刼之或以草藥奮之又或指為鬼祟而以符水巫呪禁之稟受厚邪輕者偶中僥倖稟弱邪重者愈刼而愈陷矣於是迁延歲月咳嗽潮熱飲食減少每每變虛怯之候不思經曰邪之所湊其氣必虛輕病重治必成重病都緣不能脫俗故耳良可悲夫

桂枝羌活湯　處暑前後頭痛項強脉浮惡風有汗　桂枝　羌活　防風　甘草炙　各等分為粗末每服五錢水一盞半煎至一盞迎發日溫服吐者加半夏麹

麻黃羌活湯　頭痛項強脉浮惡風無汗

麻黃　羌活　防風　甘草炙　各等分煎法

如前如吐加半夏麯等分〔二方皆太陽經〕

白芷湯　治瘧身熱目疼熱多寒少脉長睡卧不安先以大柴胡湯下之微利為度如下後微邪未盡者以此湯盡之　白芷　知母〔各一兩〕石膏〔四兩〕服法同前〔此陽明經〕

桂枝石膏湯　隔日一發先寒後熱寒少熱多

桂枝〔五錢〕石膏　知母〔各一兩半〕黄芩〔一兩〕右分作三服間日者邪氣所舍深也如外邪已罷内邪未已再下之　從卯至午發者宜大柴胡湯下之　從午至酉者知邪在内也宜大承氣湯下之　從酉至子或至寅發者知邪在血宜桃仁承氣湯下之　前項下藥微利為度再以小柴胡湯徹其微邪之氣

桂枝芍藥湯　寒熱大作不拘先後此太陽陽明合病也謂之大争寒熱作則必戰動經曰熱勝則動也發熱則必汗泄經云汗出不愈知為熱也陽盛陰虚之症治當内實外虚不治恐久而傳入陰經也宜桂枝芍藥湯主之

桂枝〔二錢〕黄芪　知母　芍藥　石膏〔各五錢〕

右服七錢水煎服　如服前藥而寒熱轉大者知太陽陽明少陽合病也宜桂枝黄芩湯以和之

桂枝黄芩湯　治三陽合病　甘草〔四錢五分〕石膏〔五錢〕知母〔五錢〕桂枝〔一錢〕柴胡〔一兩二錢〕黄芩〔四錢五分〕人參〔四錢五分〕半夏〔四錢〕　右水煎服服後如外邪已罷内邪未已用大柴胡大承氣等湯下之

麻黄黄芩湯　治夜發者　桃仁承氣湯亦治夜發者　麻黄〔一兩去節〕　甘草〔炙三兩〕　桃仁〔三十枚去皮〕

黄芩〔去芦〕　桂〔二錢五分〕　服法同前

桃仁味苦甘辛肝為血海血受邪則肝氣燥經云肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此發散血中風寒之劑麻黄桂枝桃仁乃太陽經血藥非三陰經藥也

生生子曰已上皆劉守真分經治瘧法也與内經之旨皆相符合明其邪自外而来故治同傷寒

也予驗今之所發者除傷風所發外亦有多挾內傷者或從飲食所得或從勞倦所得此必先有所感而邪氣潛伏今為新傷所啟發也雖涉內傷而頭疼寒熱口渴等症亦不出前數法外矣予每用所挾症之藥加於前各經治方之內錯綜治之亦不失古人意也故所向輙有功

濟世方治先熱後寒者以小柴胡湯先寒後熱者小柴胡加桂枝湯多熱但熱者白虎加桂枝湯多寒但寒者柴胡姜桂湯

按此亦前分經法也但此以寒熱多少定治然寒多而但寒不熱脉洪實或滑多有熱極而似(水者)為有餘治當下之若便以桂枝投之悞也如或多熱而但有熱者脉虛大或微弱當作虛治若便以白虎湯投之悞也故必須細心體認詳之以脉而以寒熱多少參治庶為穩當

仲景白虎加桂枝湯 治朝發暮解暮發朝解(其脉)如平但熱無寒骨節疼煩便難此治溫瘧

知母(六两) 甘草(炙二两) 石膏(一斤) 粳米(二合) 桂枝(去皮三两) 水煎服出汗愈

柴胡桂姜湯 治往來寒熱胷脇疼小便不利嘔而不渴治瘧寒多熱少或寒不熱

柴胡(半斤) 桂枝(三两去皮) 乾姜(二两) 括蔞根(四两)

黄芩(二两) 甘草(炙二两) 牡蠣(二两煆) 水煎服初服微煩再服得汗便愈

柴胡去半夏加括蔞湯 治瘧病後渴者亦治勞瘧

柴胡(八两) 人參 黄芩(各二两) 括蔞根(四两)

生姜(二两) 大棗(十二枚) 甘草(炙二两) 水煎服一日兩三服効

局方雙解飲子 治瘧疾辟瘴氣神効食瘧尤佳

肉荳蔻 草荳蔻(各二枚一枚麵煨熱一枚生用) 粉草(二两一半生一半炙)

厚朴(二寸一半用姜汁炒一半生用) 生姜(二塊如棗大一塊裹煨一塊生用)

右水煎空心服(東垣云秋暮暑氣衰病熱瘧知其寒也此方主之實治寒瘧也)

人參養胃湯 治飲食傷脾及寒多而熱少者胷膈痞悶不思飲食寒多者加姜桂熱多者加黄芩黄連柴胡(方在寒門)

清脾飲　治癉瘧脉来弦數或但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澁　青皮去白　厚朴姜製　白朮　半夏泡　黄芩　草菓仁　柴胡　茯苓　甘草炙　各等分

右每服七八錢姜五片不拘時服

草菓飲　治内傷飲食作瘧胷腹飽悶

草菓　蒼朮　厚朴　陳皮　半夏　甘草　烏梅去核　姜棗同煎　寒多者加乾姜附子熱多者只加柴胡癉瘧加檳榔

柴苓湯　寒熱汗後或大便作瀉　方出傷寒門

三聖飲　治胸膈飽悶口渴熱多寒少　蒼朮　枳殻　知母各三錢　水煎服

四聖飲　治久瘧　何首烏　白芷　青皮　陳皮　水煎空心服

良方四將軍飲　治瘧作仆厥不知人手足俱冷此雖一時救急之方用之有驗　大附子炮去皮一枚　訶子四枚去核　陳皮四枚洗淨　甘草四兩炙　分作四服水一鍾半姜七片棗七枚煎折一半熱灌下立甦

方廣云瘧疾發作而僵仆不省人事者蓋由頑痰膠固於中營衛不行故也所以中風中暑而卒倒不省人事亦由痰之所致也附子性大熱走而不守本是治寒濕之藥今瘧僵仆而用之以其性能開散頑痰營衛流通故耳乃是劫劑不得已而用之也

瀉瘵露姜飲　胃中痰飲為瘧一作痰　方加蜜治痰嗽

生姜四兩搗汁露一宿空心冷服大治脾胃聚痰發為寒熱　方廣云生姜自然汁凡中風中暑中氣乾霍亂一應卒暴之疾與童便同用立可解散蓋生姜能開痰童便能降火故也

截瘧温脾飲　治脾虚痰涎上湧瘧發作則吐神効　白朮五錢　生姜五錢　水煎空心服

生生子曰按此亦丹溪白朮丸意也彼以白朮一味久服得汗乃愈此以生姜佐之故取汗速而効亦速也　已上五方皆禁方

王節齋治瘧活套

柴胡　白朮各一錢　蒼朮一錢已上三味瘧疾必用之　陳皮七分
粉草炙五分　乾葛一錢二分　若一日一發及午前
發者邪在陽分加枯黃芩茯苓半夏各一錢　熱甚
頭疼再加川芎軟石膏各一錢　口渴加石膏知母
麥冬各一錢
若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川
芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各一錢　酒洗
紅花酒炒黃栢各四分　提起陽分可截之
若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加

八物湯再加黃芪補之
若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡
蒼朮白朮黃芩乾葛以發之
若陰瘧多汗用當歸白芍熟地黃黃著黃栢以斂
之無汗柴胡蒼朮川芎紅花升麻以發之
若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食
者加人參一錢半　酒炒芍藥大麥芽各一錢
若傷食痞悶或有食積者加神麴麥芽枳實炒各二錢
若痰盛加姜製半夏南星枳實炒各一錢　黃芩黃連各六分

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山各一錢　烏梅肉三枚
若日久虛瘧寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣
已無只用八物湯加柴胡黃芩黃芪陳皮以滋
補氣血

瘧母

濟生鱉甲飲子　瘧久不愈脇下痞滿腹中結塊
名曰瘧母　草菓　鱉甲醋炙　黃芪　白朮
白芍　厚朴姜製　檳榔　橘紅　川芎　甘草炙
各等分每服四錢水一鍾姜七片棗一枚烏

梅少許煎服
又方　治瘧母　鱉甲醋炙二兩　三稜　莪朮　香
附醋炒各一兩半　橘紅一兩　阿魏五兩
右醋糊為丸梧子大姜湯下三十丸
瘧母丸　青皮　桃仁　紅花　神麴　麥芽
鱉甲醋炙　三稜　蓬朮　海粉　香附俱用醋煮
右用神麴糊為丸梧桐子大每服五七十丸
白湯下
十將軍丸　久瘧有瘧母不瘥或腹疼

三稜去毛土炒 蓬术生用 青皮去白 橘紅各一兩 草菓去殼
常山各二兩 砂仁 檳榔 烏梅 半夏泡各一兩
右先将常山草菓二味剉好酒醋各一碗入瓦器內先浸一宿後入八味藥同浸至晚炭火煮乾取出晒如無日色用火焙乾為末酒醋各半打糊為丸如梧桐子大每服三四十丸白湯吞下日進三服忌生冷魚腥鹹酸油膩麵諸死毒物服四兩或八兩乃除根 凡有積聚及行瘴湿地方並宜服

小兒瘧疾痞塊 生地 白芍各一錢半 陳皮 川芎 黄芩 半夏各一錢 粉草二分 姜水煎調鱉甲末服

瘧脹

秋深久瘧胃中無物又無痰癖腹高而食少俗謂瘧氣入腹宜蒼术湯主之 蒼术四兩 草烏頭一錢 杏仁三十個 右分作三服水煎一日服盡愈

產後瘧

草菓飲子 產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調之熱多者宜服此

半夏泡 赤茯苓 草菓煨去皮 甘草炙 陳皮 川芎 白芷各一錢二分 紫蘇 良姜 青皮各六分 乾姜二錢四分 右分作二帖姜五片棗二枚
當發日空心連進三服無不愈者

生熟飲子 治寒多者 肉豆蔻 草菓仁 厚朴 半夏 陳皮 甘草 大棗去核 生姜各二錢半
右以一半以湿紙裹煨香熟和匀一半生用和匀分作二帖水煎空心一服食後一服二渣并煎午前服盡

彭用光治瘧活套

如連日或間日悪寒發熱頭項腰背痛此太陽經二陳加柴胡羌活藁本防風

如連日或間日先寒後熱或寒少熱多或但熱不寒目痛鼻乾此陽明經二陳加葛根升麻石膏知母白芷

如連日或間日先寒後熱或寒熱間作脇痛口苦嘔悪此少陽經二陳加柴胡黄芩青皮

如子午卯酉日發寒熱嘔吐舌乾口燥此少陰瘧

二陳加當歸川芎黃栢黃連柴胡
如辰戌丑未日發寒熱嘔吐不嗜食或腹滿自利
此太陰瘧二陳加蒼朮白朮柴胡芍藥
如寅申巳亥日惡寒發熱寒多熱少或腹痛引陰
詔如淋狀善恐此厥陰瘧二陳加桂枝附子乾
姜柴胡升麻
三陽之瘧宜汗宜吐麻黃葛根柴胡常山草菓烏
梅之屬
三陰之瘧宜下宜溫宜和大柴胡湯柴胡桂姜湯
柴胡四物湯附子理中湯加升麻柴胡之類

泄痢

生生子曰仲景河澗東垣諸公多以泄痢混同論治究其源皆本之於難經五十七難五泄中來云小腸泄大瘕泄即是腸澼膿血也故治法亦多相須但初學之士未易尋繹故予不揣膚陋芟繁入簡以經文列之於前而諸賢次之以見古人著方立法之意然後發明泄痢形狀而以丹溪之見析而衷之仍分泄痢為二門初不敢遽分者以其有先痢而後泄有先泄而後痢有痢不因泄有泄不因痢治有次第症有輕重也以古論不可分者為綱以今之名症者為目使後學易以辨別而難治之症亦得以備參考也

難經云有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄名曰後重

保命集曰胃泄者飲食不化色黃以大承氣湯下之脾泄者腹脹滿泄注食即嘔吐逆建中理中湯主之大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛乾姜附子湯主之小腸泄者溲而便膿血少腹痛承氣湯下之大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便莖中痛胃大小腸三症皆清凉飲子主之其泄自止厥陰症莖中痛加甘草以陰症裏急後重加大黃

滑伯仁曰瘕結也謂因有凝結而成者也裏急謂腹內急迫後重謂肛門下墜惟其裏急後重故數至圊而不能便莖中痛者小便亦不利也出難經本義

謝堅白曰小腸大瘕二泄今所謂痢疾也內經曰腸澼故下利赤白者灸小腸俞是也穴在第十

六椎下兩傍各一寸五分累驗 出難經本義
四明陳氏曰胃泄即飧泄也脾泄即濡泄也大腸
泄即洞泄也小腸泄謂凡泄則小便先下而便
血即血泄也大瘕泄即腸澼也
靈樞經曰腸中寒即腸鳴飧泄腸中熱即出黃如
糜脉要精微論曰胃脉虛則泄
仲景曰大腸有寒者多鶩溏有熱者便腸垢　下
痢脉微弱数者為欲自止雖發熱不死　下痢
有微熱而渴脉弱者亦自愈　下痢脉数而渴

者合自愈設不愈必清膿血以有熱故也　下
痢脉数有微熱汗出合自愈設脉緊為未解
下痢脉反弦身熱汗者自愈　下痢脉沉而遲
其人面少赤身有微熱下痢清穀者必鬱冒汗
出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛
故也　下痢脉沉弦者下重　下痢寸口反浮
数尺中自濇者必清膿　洩病若腹大而泄者
脉當細微而濇反緊大而實者死　下痢脉大
者為不止　下痢一日十餘行脉反實者死

素問云泄而脉大難治　病泄脉洪大是逆也
靈樞云飧泄脉小者手足寒難已飧泄脉小手足
温易已　腹鳴而滿四肢清泄其脉大是逆也
如是者不過十五日死矣　腹大脹四末清脫
形泄甚是逆也如是者不及一時死矣
經云五虛者死脉細皮寒氣少泄痢前後飲食不
入此謂五虛其漿粥入胃泄注止則虛者活　丹
溪嘗謂治数人在下則泄瀉不止上則吐痰不
已皆死盖氣脫無所管攝故也若用參朮膏救
之早者十活二三

病機〻要云臟腑瀉痢其症亦多大抵從風濕熱
論之是知寒少熱多寒則不能久也故曰暴泄
非陰久瀉非陽論曰春宜緩形〻動則肝木乃
榮反靜密則是行秋令金能制木風氣內藏夏
至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則
飧泄身熱脉洪穀不能化重則下利膿血稠粘
裏急後重故曰諸泄稠粘皆屬於火經云溲而
便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為

重劑黃芩芍藥湯是為輕劑是實則瀉其子木能自虛而脾土實矣故曰春傷於風夏必飧泄此逆四時之氣人所自為也（此一節謂熱泄而滯下也）

有自太陰經脾受濕而為水泄虛滑微滿身重不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜泄之法曰宜補宜泄宜和宜止和則芍藥湯止則訶子湯久則防變為膿血是脾經傳受於腎謂之賊邪故難愈也若先利而後瀉謂之微邪故易安此皆脾土受濕天之所為也雖聖智不能逃口

八公本　二三

食味臭食氣從臭而入留積於脾而為水泄也（此一節溫泄所謂泄瀉也）

有厥陰經動下利不止其脉沉而遲手足厥逆涕唾膿血此證難治宜麻黃小續命湯汗之法云為有表邪縮於內當散之而自愈（此一節風泄所謂久泄也）

有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難布息脉遲嘔吐急以重藥溫之漿水散是也（此一節寒泄所謂暴泄也）

故法云後重則宜下腹疼則宜和身重則除濕脉弦則去風血膿稠粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥溫之風邪內縮汗之鶩溏為痢溫之又云在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便濇者分利之又曰盛者和之去者送之過者止之兵法云避其來銳擊其惰歸此之謂也

凡病泄而惡寒是太陰傳少陰是土來尅水也用除濕白朮茯苓安脾白芍藥桂枝黃連破血也火邪不能勝水太陰不能傳少陰而反火邪上

八公本　二四

乘肺經而痢必白膿也加芍藥當歸之類

又裏急後重脉大而洪實為裏實痛甚者是有物結墜也宜下之若脉浮大甚不宜下

雖裏急後重而脉沉細弱者謂寒邪在內而氣散也可溫養而自愈　裏急後重閉者大腸經氣不宣通也宜加檳榔木香宣通其氣　如痢或泄而嘔者胃中氣不和也上焦不和治以生姜橘皮中焦不和治以當歸茯苓桂下焦寒不和治以輕熱藥甚者重熱藥　大便虛秘濇久不

愈恐太陰傳少陰多傳變為痢太陰傳少陰是為賊邪先以枳實厚朴湯以防其變若四肢懶倦小便少或不利大便走泄困飲食減宜調胃去湿白朮芍藥茯苓三味水煎服以白朮之甘能入胃而除脾胃之湿芍藥之酸濇除胃中之湿熱四肢沉困茯苓之淡泄能通水道走湿此三味泄痢須用此　如發熱悪寒腹不痛加黄芩為主如未見膿而悪寒乃太陰欲傳少陰也加黄連為主桂佐之如腹痛甚者加當歸倍芍

藥如見血加黄連為主桂當歸佐之　如煩躁或先便白膿後血或發熱或悪寒非黄芩不止上部血也　如悪寒脉沉先血後便非地榆不能除下部血也　如悪寒脉沉或腰痛或臍下痛非黄連不除此中部血也　如便膿血相雜而脉浮大慎不可以大黄下之下之必死謂氣下竭也而陽無所收凡陰陽不和惟以分陰陽藥治之

又云暴泄非陰久泄非陽大便完穀下有熱者脉疾身動聲亮暴注下迫此陽也寒者脉沉而細身困鼻息微薑附湯主之身重不樂朮附湯主之　渴引飲者是熱在膈上水多入則自胷膈入胃中胃本無熱因不勝其水名曰水恣胃受水攻故水穀一時下此証當灸大椎三五壯立已乃督脉瀉也如用藥使車前子白朮茯苓之類五苓散亦可

又有寒泄者大腹滿而泄又有鶩溏瀉者是寒泄也鶩者鴨也大便如水其中有少結糞者是

也如此者當用天麻附子乾姜之類

又法曰泄有虚實寒熱虚則無力不及拈衣未便已泄出謂不能禁固也實則數至圊而不便俗云虚坐努責是也裏急後重皆依前法進退大承氣湯主之

按巳上述泄利寒熱虚實脉証輕重治法極為詳悉最當深玩

泄痢辨

丹溪云泄瀉之症水穀或化或不化並無努責惟

覺困倦若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相雜雖有痛不痛之異然皆無裏急後重逼迫惱人

泄瀉門

生生子曰泄瀉要分新久時令寒熱虛實及飲食痰積數者

內經曰濕勝則濡泄甲乙經云氣客下焦傳為濡泄羅太無曰夫脾者五臟之至陰惡寒濕今寒濕之氣內客於脾故不能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡泄法當除濕利小便治之以

對金飲子　平胃散五錢五苓散二錢五分草荳蔻麵煨五錢　右分二服姜棗同煎

出濟世方名對金飲子

王叔和云濕多成五泄

生生子曰新泄瀉多是濕治濕瀉之法宜燥脾利水胃苓湯五苓散之類　胃中氣不快心不痞氣加枳殼木香　如有痰加半夏　如惡心加

藿香砂仁　如腫滿加桑白皮赤小荳　有熱加黃芩木通滑石之類減桂　有寒加高良姜乾姜桂心之類　稍久不止者東垣升陽滲濕湯或蒼朮防風湯（用風藥者謂風能勝濕也）　若飲食所傷以平胃散加消導之劑

久泄多是積劉河間云有太陰陽明二症當進退大承氣湯主之（既久泄矣而又以承氣湯下之者必其積滯膠固脈結實不虛非常法可效故用此推陳致新不可姑息也）

太陰症不能食也當先補而後瀉乃進藥法也先煎厚朴半兩俱依本方加減水一盞半煎七分服若三兩服後未已如稍加食尚有熱毒加大黃二錢推過泄止住藥如泄未止謂腸胃有塵垢滑粘加芒硝三錢令宿垢去盡則愈也

陽明症能食是也當先瀉而後補乃退藥法也先用大承氣湯五錢水一盞半煎七分稍熱服如泄未止去芒硝後熱稍退減大黃一半煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃以枳實厚朴湯服三兩服如腹脹滿退泄亦自愈後服

厚朴湯数服則已

仲景云下痢已瘥至其月日又復發者以其積去不盡故也當下之以大承氣湯（以熱積夾下也）

本事方治痼冷在腸胃間頻年腹痛泄瀉休作無時服諸熱藥不効宜先取去積滞然後調治不可畏藥以養病也

厚朴丸　厚朴　乾姜　甘草　桂心　附子（生各二錢）　大黄（生細切水一盞浸半日煎汁用之）　右水二碗煎八分後下大黄汁再煎六合温服自夜至曉分三服之盡止或更以乾姜丸佐之

乾姜丸　乾姜　巴荳（去心殻研炒黄）　大黄　人参（各一兩）　右為末同巴荳研匀加煉蜜為丸如梧桐子大食前用湯呑下一丸陳米飲呑亦可後服白术散

白术散　推後以此温補之　白术　木香　附子　人参（各等分）　右為末每服二錢生姜三片棗一枚煎六分温服

痰積泄瀉　海石　青黛　黄芩　神麹　半夏麹（霞天膏造者尤妙）　右為丸每服三五十丸

右積滞泄瀉必腹中耕痛而泄泄而痛止者是也或肚瀉按之堅者亦是也受病淺者以保和丸等消導之深而碩者必須推去陳積（然後乃止也）

實脾固腸丸　泄瀉月久不止及脾泄無度者

白术（陳土炒四兩）　粟殻（去膜蜜炒二兩）　蒼术（米泔浸）　厚朴（姜製）　陳皮（各一兩半）　人参　炮乾姜　炙甘草　茯苓（各二兩）　肉菓（麺煨）　訶子（去核二兩）　砂仁（一兩）　酒糊為丸梧桐子大每服七十丸空心米湯下虚寒加附子一錢滑脱不禁加龍骨赤石脂（煅一兩）

飧泄　素問云清氣在下則生飧泄又云春傷於風夏必飧泄又云久風為飧泄

劉河間曰飧泄者乃水穀不化而完出因水入胃亦非前水恣症也先以宣風散導之（出錢氏方中四味者是也）後服蒼术防風湯　蒼术（去皮四兩）　麻黄（去根節四兩）　防風（去芦五錢）　右為粗末每服一兩生姜七片水二盞煎至一盞温服泄止後服椒术丸

椒术丸　蒼术（二兩）　川椒（一兩去目炒）　為極細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前温湯下

如悪痢久不愈者彌佳小兒亦佳

東垣曰飧泄是清氣在下乃胃氣不升上古聖人皆以升浮藥扶持胃氣一服而愈知病在中焦脾胃也脉訣曰湿多成泄病本在胃真氣弱真氣者穀氣也不能尅化飲食乃湿勝故也以此論之正以脾胃之弱故也初病奪食或絶不食一二日使胃氣日勝泄不作也今已成大泄矣

經云治湿不利小便非其治也又云在下者引而竭之惟此症不然此病既得之於胃氣下流清氣不升陽道不行只宜升宜舉不宜利小便靈樞云頭有疾取之足謂陽病在陰也足有疾取之上謂陰病在陽也中有疾傍取之傍者少陽甲膽是也中者脾胃也甲膽者甲風是也東方春也胃中穀氣者便是風化也作一躰而認故曰胃中湿勝而成泄瀉宜助甲膽風以勝尅之又是升陽氣助清氣上行之法也又一説中焦元氣不足溲便為之變腸為之苦鳴亦縁胃氣不升故令甲氣上行又云風勝湿也大抵此症本謂氣弱不能化食奪食則一日而可止夫奪食之理為胃弱不能尅化食則為泄如食不下何以作泄更當以藥滋養元氣令和候泄止漸與食胃勝則安矣若食不化者於升陽風藥内加炒麪同煎熏食入頓至心頭者胃之上口也必吐沃沫或食入反出皆胃土停寒其右手關脉中弦按之洪緩是風熱湿相合穀氣不行

清氣不升為弦脉之寒所隔故不下也麪之熱亦能去之若物胃者更加半夏生姜入前風藥内同煎奪食少食欲使胃氣強盛也若藥剤大則胃氣不勝藥泄亦不止當漸漸與之今病既久已至衰弱當以常法治之不可多服餌也人之肌肉如地之土豈可人而無肉故肉消盡則死矣消瘦人有必死者八内經有七外經有一又病肌肉去盡勿治之天命也如肌肉不至瘦盡當急療之宜先奪食而益氣便與升陽先助

真氣次用風藥勝溼以助升騰之氣病可已矣
餘皆勿論此治之上法也治用升陽除溼湯之類
車前子散　治水瀉不止以車前子炒為末米飲
調下二錢立止
若秋夏之間溼熱大行暴注水泄以益元散治之
或五苓散加木通口渴者加葛根黄芩芍藥
若胸膈飽悶腹中作脹以胃苓湯治之　又瀉暴
而不止者以止泄丸治之
止泄丸　肉荳蔻五兩　滑石飛　右為末搗飯丸
惟滑石夏三兩五錢秋二兩春冬一兩二錢
升陽除溼湯　治脾胃虛弱不思飲食泄瀉無度
小便黄四肢困倦自下而上引而去之
升麻　防風　柴胡　羌活　神麴　澤瀉
猪苓　陳皮各五分　甘草炙　麥芽各三分　右水煎
食遠服　如胃寒腸鳴加益智半夏各五分
姜棗同煎非腸鳴不用
白术芍藥湯　潔古治太陰脾經受溼水瀉注下
躰重微滿困弱無力不欲食暴泄無數水穀不
化先宜白术芍藥湯　白术　芍藥各一兩　粉草
五錢　俱要炒黄効速分作二服水煎溫服腹疼甚
者宜蒼术芍藥湯
蒼术芍藥湯　治水瀉腹疼并治痢　蒼术　芍
藥各一兩　黄芩五錢　桂一錢三分　分二服水煎溫服
脉弦頭疼者宜蒼术防風湯
蒼术防風湯　治水泄飧泄脉弦頭疼皆効
蒼术五錢　防風五錢　水煎溫服
已上症如心下痞每服加枳實一錢　如小便
不利加茯苓二錢　如腹疼漸已泄下漸少宜
訶子散主之
寒泄者大便完穀不化或口不渴而小水清利腹
中鳴時常喜熱手按摩或過食涼藥所致
調中散　治虛寒停食嘔吐腸鳴泄瀉
砂仁　蓬术　乾姜炮　桂心　茴香炒　草菓
麥芽炒　橘紅　益智仁　藿香葉各一錢　蒼术炒
神麴炒　桔梗各一錢半　甘草炙三分　姜棗煎臨服加鹽少許
大藿香散　治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮

痛如泄瀉不已最能取効　藿香二兩　陳皮、
厚朴薑汁炒　青皮炒　木香　人參　肉荳蔲煨
良姜炒　大麥芽炒　神麴　訶子煨去核　白茯
苓去皮　甘草炒各一兩　乾姜炮五錢　為末吐逆泄瀉不
下食或嘔酸苦水用水一大盞煨生姜半塊
鹽一撮煎服
養胃湯　治脾胃虛寒嘔逆悪心腹脇脹疼腸鳴
泄瀉　方出瘧門
理中湯　寒而虛者

𤇮花丸　赤石脂　乾姜　胡椒
扶脾丸　脾胃虛寒腹中痛溏泄無度飲食不化
白朮　茯苓　甘草炙　訶子　半夏　烏梅肉
各二錢　紅荳　乾姜　肉桂各五錢　麥芽　神麴
各四錢　陳皮一錢　右為末荷葉燒飯為丸如梧
桐子大每服五十丸溫湯下二錢方加藿香一
乾姜散　治水瀉無度　乾姜為末粥飲調下一錢効
衍義云一人大腸寒小便精出諸熱藥服至一斗
二升不効後兼服赤石脂乾姜各一兩胡椒五

錢同為末醋糊為丸如梧桐子大空心及食前
米飲下五七十丸服四劑遂愈
本事方訶子丸　脾胃不和泄瀉不止諸藥不効
訶子皮　乾姜　肉荳蔲　龍骨　木香　附
子　赤石脂各等分　為末糊丸每服四五十丸米飲下
漿水散　治暴泄如水周身汗出一身盡冷脉沉
弱氣少而不能語甚者加吐此為緊病
右為末每服五錢水煎熱服甚者三四服
若下痢為鶩溏大腸不能禁固大便歘了不

了小便清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬
白朮散　羅謙甫云鶩溏者大便如水其中
有少結糞是也
桂枝湯　桂枝　芍藥　白朮各五錢　粉草炙一錢
分四服水煎服
小白朮散　白朮　芍藥各三錢　乾姜炮五錢　甘草炙二錢
如前煎服甚者除乾姜加附子一二錢謂辛
能發散也
熱瀉　口渴小水短赤糞如糜

益元散　燈心湯或井花水調下

白芍黃芩木通湯　治水瀉小水短赤　白芍二錢　黃芩一錢　木通八分　白术一錢　澤瀉一錢　茯苓七分　水煎溫服

厚腸散　治腹疼瀉黃及瀉久不止熱藥不効者及治酒積泄　川黃連好酒煮夜煮乾炒日　為末每用二錢空心米飲下

荳蔻香連丸　治泄瀉不問寒熱陰陽不調下痢赤白腹脹攻痛其効如神　黃連二錢　肉荳蔻　木香各一錢　右為末粟米飲為丸如米粒大每服十丸米飲下漸加二三十丸日夜各四五服

清六丸　去三焦濕熱泄瀉兼治產後腹痛或自痢者能補脾亦治血痢　六一散三兩　紅麴炒五錢用　此治血　酒糊為丸　多與清化丸同服並不單用

虛瀉　脉弱無力飲食少四肢倦足背浮腫口渴皆所當補

錢氏白术散　治瀉久虛弱清氣下陷口渴或腹中氣不轉運或不思食或惡心　人參　白术　茯苓　粉草　葛根　木香　藿香　俱為末每服二錢米飲調下

參苓白术散　脾虛泄瀉浮腫　人參二斤半　白术二斤　薏苡仁一斤　扁荳二斤半　山藥二斤　桔梗各一斤　蓮肉二斤半　砂仁一斤　茯苓一斤　甘草炒半斤　為末每服二錢米飲調下

人參升胃湯　大便一日三四次溏而不多有時腹鳴泄瀉小便黃　黃芪二錢　甘草炙二分　升麻六分　柴胡　歸身　陳皮　益智各二錢　紅花少許　人參六分　水煎食前熱服

一味白术散　治久瀉脾虛脾泄如神　土白术米泔水洗淨切片每一斤用陳皮半斤入甑一層一間兩蒸一日曬乾去陳皮　為末每服二錢米飲調下

理中湯　虛寒作瀉或吐瀉不止精神虛憊甚者加大附子名附子理中湯　方在寒門

參苓滑石湯　治泄而困倦小便不利脉數有虛熱　白术　滑石各一兩　黃芩　人參　芍藥各五錢　木通　陳皮各三錢　乾姜一錢　甘草炙一錢　分八帖水煎服

桂香丸　臟腑虛為風寒所搏冷滑注下不禁老
人虛人危篤累効　大附子(炮去皮臍)肉菓(炮)白茯
苓(各一兩)桂心　乾姜　木香(泡各五錢)丁香(一分)
糊丸梧桐子大米飲下五十丸
固中丸　治脾久泄去後與氣不快者　蒼朮
肉菓(煨各一兩)粥丸桐子大每服五十丸
固下丸　治腎久泄即前方加破故帋一兩炒
東垣白朮神麯丸　老人奉養太過飲食傷脾常
時脾泄　白朮(炒二兩)白芍(酒炒一兩)神麯(炒一兩半)山查
(二兩)半夏(製一兩)黃芩(炒五錢)右為末用青荷葉燒飯
為丸菉荳大每服百丸
實泄　泄瀉腹疼或有積滯雖明新久新者
以消導之劑久者以前久泄門按寒熱調治
枳實導滯丸　木香檳榔丸
七聖丸
腎泄　早晨瀉一次者也
愚謂亦不止如此曾記一老人脾泄二十年一
日夜三五次夜多日少以破故帋(鹽水炒五錢)白朮
(炒二錢)杜仲(鹽水炒二錢)澤泄(一錢)水煎空心服二帖
即愈緣腎者胃之關腎虛則下焦不約故也
東坡四神丸　治腎泄下元虛寒尤宜
破故帋(炒四兩)肉荳(麵煨二兩)木香(五錢)小茴香(炒一兩)
以生姜四兩煮紅棗肉為丸如梧桐子大每
空心鹽湯吞下五六十丸
金鎖正元丹　腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一
切虛冷之症　龍骨(煆)朱砂(另研各三兩)茯苓(八兩)
紫巴戟(去心一斤)肉從蓉(洗焙)葫芦巴(焙各一斤)補骨脂(酒浸
炒十兩)五倍子(八兩)右為末酒糊丸桐子大每服
三十丸空心溫酒鹽湯下
五味子丸　治下元虛寒火不生土及腎中之土
不足以致關門不閉名曰腎泄亦名脾腎泄
人參　五味子　破故帋(炒)白朮(各二兩)山藥(炒)
白茯苓(各一兩半)吳茱萸　川巴戟(去心)肉菓(麵煨各一兩)
龍骨(煆五錢)右酒為丸如梧桐子大每服七十丸
空心鹽湯下
痢門(已前諸公皆釋名帶下經書又云腸澼)

泄痢二症前綱中病機〻要論寒熱虛實治法甚
詳陳無擇朱丹溪劉宗厚王節齋諸公又各有
發明今摘其緊要逐一詮次以便按治
內經曰飲食不節起居不時者陰受之陰受之則
入五臟䐜滿閉塞下為飧泄久為腸澼是也
內經曰腸澼便血身熱則死寒則生腸澼下白沫
脉沉則生浮則死腸澼之屬身不熱脉不懸絶
滑大者生懸澁者死以臟期之
脉經曰腸澼下膿血脉沉小留連者生數疾且大
有熱者死又腸澼筋攣其脉小細安靜生浮大緊死
脉訣舉要曰無積不痢脉宜滑大浮絃急死細沉無害
秘藏云假令傷寒飲食䐜脹滿而傳飧泄者宜溫
熱之劑以消導之傷溫熱之物而成膿血者宜
苦寒之劑以內疎之風邪下陷升舉之濕氣內
勝者分利之裏急者下之後重者調之腹痛者
和之洞泄腸鳴無力不足拈衣其脉絃細而弱
者溫之收之膿血稠粘數至圊而不能便其脉
洪大而有力者寒之下之

陳無擇云滞下之症內經所載血溢血泄血便注
下古方則有清膿血近世呼為痢疾其實一也
多由脾胃不和飲食過度停積於腸胃不能化
又為風寒暑濕之氣干之故為此疾傷熱則赤
傷冷則白傷風則純下清血傷濕則下如豆汁
治法當先用通利之藥疎調臟腑
原病式曰或言下痢白為寒者悮也若果為寒則
不能消穀何由反化為膿也所謂下痢穀反化
為膿血如穀肉菓菜濕熱甚則自化腐爛潰發化
為膿血也其熱為赤熱屬心火故也其濕為黃
濕屬脾土故也燥欝為白屬肺金也然諸瀉痢
皆屬於濕〻熱甚於腸胃之內而腸胃怫欝以
致氣液不得宣通而成腸胃之燥使煩渴不止
也假如下痢赤白俗言寒熱相兼其說尤悮豈
知水火陰陽寒熱者猶權衡也一高則必一下
一盛則必一衰豈能寒熱俱甚於腸胃之間而
同為痢乎如熱瘡瘍而出白膿者亦可以白為
寒歟其在皮膚之分屬金故色白也次在血分

屬心火故為血也在肌肉屬脾土故作黄膿在筋部屬肝木故其膿色帶蒼深至骨屬腎水故紫黑血出也各隨五臟而見五色是其標也本則一出於熱但分淺深而已大法下迫窘痛後重裡急小便赤澁皆屬於燥熱而下痢白者必多有之然則為熱明矣

玉機微義云河間謂赤白不當分冷熱乃屬心火肺金之化也五色各屬五臟本則一出於熱其論甚當緣心主血肺主氣白屬肺金此氣受病也赤屬心火此血受病也赤白相雜氣血俱受病也知此則肝青脾黄腎黑之說亦可得而互明矣

丹溪謂赤自小腸而來白自大腸而來

愚謂大小腸亦心肺之腑也但不若劉宗厚以氣血言尤為明白

統旨曰河間發明痢本於濕熱最為詳切及行血則便膿自愈調氣而後重自除誠哉至言也又謂痢雖有赤白而一本之於熱此足以破局方好行辛熱者之弊也然痢之白者不可盡歸之於熱亦有因於寒者痢如凍膠或如鼻涕明是冷症此緣多啖生冷脾胃受傷氣微而滯下生焉非姜桂之辛熱不可也又其日久而不愈腸胃氣虛始為熱而未變寒或過服冷藥以致脾胃中寒此亦宜有以温之也

滯下亦有挾虛挾寒

丹溪曰或問河間之言滯下似無挾虛挾寒者然乎否乎予曰泄利之病水穀或化或不化並無努圊惟覺困倦若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相混雖有痛不痛大痛之異然皆裹急後重逼迫惱人似乎皆熱症實症也予近年涉歷亦有大虛大寒者不可不知如治予從叔妻長官等皆用參术及乾姜姜汁之類是也

劉宗厚曰按滯下之症古人多與泄瀉同論至三因方始能另立條目盖實有不同夫病有從外感而得者須分六氣之異外既受傷腸胃鬱結

遂成赤白等症當隨其寒熱溫凉以調之有因臟氣發動干犯腸胃而得者須察其何臟相乘以平治之又有因飲食失節而得者則又審其何物所傷以消尅之但其受病之後腸胃怫欝膿血稠粘裹急後重諸方雖有寒熱虛實之論劉河間則以為一出於熱然考之内經似亦熱多而寒少也我丹溪先生則以為亦有挾虛挾寒之症深戒學者須宜識此世之局方不辨三因專用澁熱之藥其失甚矣至河間立說專用

苦寒疎下之藥則亦未甚為當何則葢病有虛寒治有先後若病氣暴至元氣壯實積滯膠固須宜下之病久氣脫腸胃虛滑不禁者亦宜溫之澁之大抵治痢當從仲景河間之法可溫則溫可下則下或解表或利小便或待其自已劉河間分在裡在表挾風挾熱挾寒等症後之作者無越於斯但氣血一條未嘗表出立論其於芍藥湯下有曰行血則便膿自愈調氣而後重自除葢謂便膿血是血之滯下也故曰行血自愈奔迫後重氣之實也故曰調氣自除誠哉是言但膿血赤白亦有氣病血病之分後重裡急亦有氣實血實之異學者尤不可不察

裹急後重有寒熱虛實及在氣在血之異

滑伯仁曰裹急謂腹内急迫後重謂肛門下墜惟其裹急後重故數至圊而不能便也

愚謂此皆脾胃不和或為風寒暑溼令氣所干或為積滯膠固纒墜或病久陽氣下陷

丹溪曰後重本因邪壓大腸不能升上而重墜也

用大黄檳榔藥者乃瀉其所墜之邪也及久痢與通蕩之後而後重仍在者知大腸虛滑不能自收而重是以用御米殻訶子五倍子等澁劑收其氣而固其滑也然大腸為邪壓下之重其重至圊後不減虛滑不收之重其重至圊後隨減以此辨之百發百中也

愚謂氣虛下陷而重者雖用收濇之劑仍必以升補藥兼之

又云有服升消藥不効者用秦艽皂角子大黄當

歸尨仁枳殼黃連等痢若大腸風盛者可作丸服
網目云自古治裏急後重但用梹榔木香調氣及大黃下積至丹溪始用尨仁滑石滑其死血如鼓應桴實發前人所未發也
又云下墜在血活之後此為氣滯宜前藥加梹榔一枚蓋後重者當和氣積與氣墜下者當兼升兼消升謂升麻之類消謂木香梹榔之類

發熱

丹溪曰發熱惡寒身首俱痛此為表症宜微汗和解蒼朮川芎陳皮芍藥粉草生姜
又云有外感者小柴胡湯去人參　又云下痢發熱久不止者屬陰虛用寒凉藥必兼升散并熱藥姜桂之屬是也　又云下痢初發熱必用承氣湯下後恭症用藥發熱不惡寒脉洪者宜大承氣湯若惡寒者忌下
愚謂發熱而小便不利者柴苓湯加滑石木通夏秋發熱惡心胸腹飽悶不思飲食藿香正氣散不飽悶者倉廪湯

冷氣及時疫痢

網目云夏月痢疾用黃連香薷飲加甘草芍藥生姜神効者蓋夏月之痢多屬於暑潔古治處暑后秋冬間下痢用厚朴湯大効者蓋秋冬之痢多屬寒
大全良方云有一境內上下傳染長幼相似是疫毒痢也治法雖當恭運氣之相勝亦不可狎泥當先審虛實冷熱首用敗毒散加人參甘草陳皮姜隨症用之

身重

身重不知穀味及下如豆汁者皆是足太陰脾經受濕也東垣升陽除濕防風湯升陽益胃湯和中益胃湯 出蘭室秘藏濕熱中

腹痛

病機機要云腹痛者宜和劉宗厚云和之一字總言之耳因氣鬱結不行宜行氣開鬱挾寒者溫中湯大熱者黃芩芍藥湯積滯者木香導氣湯血虛者當歸芍藥湯亦有因肺金之氣鬱在大

腸之間以苦梗發之
丹溪云下痢腹痛用姜桂溫散之法如建中湯加
姜是也
內經云寒氣客於小腸小腸不得成聚故腹痛後泄
又云太陽病冬月感寒則泄當臍而痛是以今之
用溫散者良以此也
仲景治痢不分赤白久新但腹痛甚其脉紘急或
濇浮大按之空虛或舉按皆無力以建中治之
甚効

白膿

玉機微義曰白屬肺金此氣受病也
統旨曰痢如凍膠或如鼻涕者為冷非姜桂之辛
熱莫効
丹溪方 治白痢 蒼术 白术 神麯 茯苓
地楡 甘草 水煎服
又方 治白痢腹脹飲水過度者 蒼术 白术
厚朴 茯苓 滑石 神麯 粉草 水煎食
前服飲食不思呑保和丸三五十丸

蒼术芍藥湯 痢疾痛甚者 方在泄瀉
戊己丸 治脾經受濕泄痢不止米穀不化臍腹
刺痛 黃連 吳茱萸 白芍藥各三錢 右為末
麵糊為丸梧桐子大每空心米飲呑下三十丸
升麻去濕防風湯 如大便閉或裏急後重數至
圊而不能便或少有白膿或少有血愼勿利之
升舉其陽則陰自降矣 蒼术四兩米泔製 防風三錢
白术一錢 茯苓一錢 白芍一錢 右每服一兩先用蒼
术以水一盞半煎至一盞納諸藥同煎至一

盞空心稍熱服
胃風湯 治風入腸胃作痢或白或赤或如豆汁
方在下五
溫中湯 治白痢腹疼飽脹不思飲食 蒼术
木香 乾姜炮各一錢五分 厚朴 砂仁 青皮 芍
藥炒各一錢二分 加煨姜二片水煎食前服
又方治大人小兒白痢如魚凍 白鴨血用好酒
泡乘熱服下立止

赤膿

玉機微義曰赤屬心火此血受病也

治赤白痢

香連丸　治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重　黃連去芦二十兩吳茱萸十兩煎湯浸同炒赤色去茱萸不用　木香五兩不見火　右為細末醋糊為丸如梧桐子大每空心米飲下　秘法以生姜細茶濃煎吞下丸妙

導氣湯　治下痢赤白裏急後重日夜無度

白芍藥一兩　當歸五錢　大黃二錢五分　黃連一錢　黃芩二錢五分　木香一錢　檳榔一錢

每服一兩水煎食前溫服

木香枳殼湯　治痢疾裡急後重開胃腸進飲食破滯氣散內熱　木香　檳榔　陳皮去白　黃連　蓬術煨　當歸　枳殼去穰炒　青皮去穰各五錢　香附　黃栢各一兩半　黑牽牛取頭末淨一兩　右為末滴水為丸梧桐子大每服五十丸或七十丸姜湯下如腫毒加至二百丸利五七行立消

木香檳榔丸　治症同前　木香　檳榔　青皮　蓬術　枳殼　黃栢　大黃各五錢　香附二兩　黑丑取頭末二兩　右為末滴水為丸梧桐子大每服五六十丸白湯下

黃連阿膠丸　治冷熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利　阿膠炒二兩　黃連三兩　茯苓二兩　右黃連茯苓為末水化阿膠為丸如梧桐子大每服三五十丸米飲下

木香導滯湯　木香二錢　白芍　當歸　枳殼各一錢二分　檳榔一錢五分　大黃二錢　黃連一錢

水煎食前溫服

純鮮血

傷風而下清血者宜祛逐之風傷肝肝藏血故下清血者為風也

右謂下痢純血者死此亦要看兼症及以脉參之未必盡死予嘗治數人皆生方用佛手散加阿膠秦艽炮姜地黃黃連地榆蒲黃之類或以四物湯擇前所加藥一二味增入不必盡加也又不可純用寒涼衍義云有一男子患血痢醫用寒涼藥逆制專用黃連木香治之此藥始感便

用則可病久腸虛者不宜服戒之○云地榆性
沉寒若惟下熱血痢則可用若寒人及水瀉白
痢皆未可輕用
王好古曰血痢當服胃風湯膠艾湯之類
仲景治下痢便膿血者桃花湯主之丹溪云桃花
湯為下血虛且寒者而用非乾姜之溫石脂之
澁且重不能止其血也用糯米之甘以引入腸胃
集驗方治血痢用乾姜燒黑存性出火毒為末每
服一錢米飲下

八八本　五十本

黃連香茹飲　治感暑下痢純血
清暑益氣湯　治暑病內傷下痢不思飲食發熱
六合湯　治伏熱煩悶或成痢疾俱見中暑出附餘
已上治因暑下痢之劑
敗毒散　加石蓮肉　治下痢熱毒不進飲食
倉廩湯　即敗毒散加陳倉米姜棗　治下痢赤
白或先因寒邪中臟腑致發熱者
防風芍藥湯　治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴
及頭疼微汗　防風　白芍　黃芩　各四錢

水煎食前通口服已上治痢疾身熱者之劑
丹溪治血痢　乾姜一錢　當歸二錢五分　烏梅三箇　黃
柏一錢五分　黃連三錢　水煎食前服或加枳殼
丹溪治血痢後重熱盛者　大黃　黃連　黃芩
黃柏　枳殼　當歸　白芍　滑石　桃仁
甘草　白朮　右各等分為末或作丸用麪糊
或神麴糊丸服　又云悞服熱藥及澁藥毒
氣犯胃者當明審以祛其毒
當歸導氣湯　治膿血痢無度腹中痛

八八卷　五十四

當歸　芍藥各一錢　甘草一錢五分　青皮七分　槐花七分
生地二錢酒洗　水二鍾煎至一鍾食前溫服
若後重加木香檳榔末各三分澤瀉五分小便
利去澤瀉
茜根丸　治一切毒痢及蠱注下血如鷄肝心煩
腹痛　茜根　升麻　犀角　地榆　當歸
黃連　枳殼炒　白芍　右等分為末醋米糊為
丸梧桐子大每服七十丸空心米飲下
潔古蒼朮地榆湯　治脾經受濕下血痢

蒼朮三兩 地榆一兩 右每服一兩水二鍾煎至
一鍾食遠溫服
丹溪青六丸 治血痢清濕熱補脾消痰血用此
止痛活血消食酒糊為丸 方在泄瀉門
當歸芍藥湯 治血虛而下血痢 當歸 川芎
各一錢五分 芍藥酒炒二錢 生地 黃連酒炒 木香各一錢
水煎食前服
黃芩芍藥湯 治火熱下痢膿血 黃芩五錢 甘草
炙一錢 芍藥炒三錢 水煎食前服

大黃湯 治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日
夜無度久不愈者用此微利 大黃一兩 用好
酒二鍾浸半日煎至一鍾去大黃分為二服如
未止再服盡以利為度後服芍藥湯和之利止
再服黃芩芍藥湯以徹其毒也
劉宗厚云此乃陽明經蕩滌之藥用酒煎者欲其
上至頂顛外徹皮毛也
芍藥湯 治腹痛下痢膿血日夜無度裏急後重
是以行血則便膿自愈調氣而後重自除

白芍一兩 當歸 黃連各五錢 檳榔 木香各二
錢 桂二錢五分 大黃三錢 黃芩五錢 甘草炙二錢
右每服五錢水煎食遠溫服如痢不減加大黃
劉宗厚云此行血調氣不熱之藥也大凡用藥之
雜與用藥之多者難以細分經絡當觀其大脉
如何此太陽桂枝例藥也
附禁方
木香散 治腹痛下痢膿血裏急後重 木香五錢
地榆一兩 黃連七錢 赤芍 青皮 枳殼 乳

香 甘草各五錢 右為末每服二錢白湯下
延胡止痛散 治血痢疼痛飲食不進
延胡炒 為末每用二錢米飲調下三服全愈
木香甘連湯 治血痢如神 黃連一兩 甘草二錢
木香二錢 水二鍾煎至一鍾食前服先一日
預服五苓散三帖次早服此即止
又方 韮菜連根取自然汁和好酒一盞溫飲 經驗
又治婦人心痛及治淋散氣行血故也
黃連烏梅丸 治濕熱痢不瘥 烏梅肉炒 黃連

四兩各淨為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十
丸米飲下
車前湯　治熱痢不止及小便不利
車前子搗爛取汁一鍾入蜜一合煎服
已上治濕熱傷血赤痢之劑
苦參丸　治血痢　苦參不拘多少炒焦為末滴
水為丸如梧桐子大每服五十丸米飲下
黃栢丸　下痢純血　黃栢蜜炙令香黃色一兩
為末每服三錢空心溫漿水調下

一方地錦草不以多少晒乾為末每服二錢空心
米飲調下
加劑四物湯保命集治下痢　川芎　當歸　白
芍　生地　槐花　黃連　御米殼各等分　水煎服
樗皮丸　治痢清血腹中刺痛　樗根白皮　不
拘多少炒為末米醋糊為丸如梧桐子大空心
米飲下三四十丸
地榆散　治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢
暑痢　地榆　赤芍　黃連　青皮去白　等分為
末每服三錢湯水調下血痢煎服
烏梅丸　治熱留腸胃臍腹疞痛下痢純血或服
熱藥過多毒蘊於內滲成血痢　烏梅肉二兩
黃連二兩　當歸二兩　枳殼去白二兩　右為末醋糊
丸如梧桐子大每服七十丸米飲下
血痢極効方　當歸一錢　赤芍　地榆　黃連
生地　甘草　罌粟殼各五分　石榴皮三分　水煎服
五香散　治血痢脉滑　五倍子炒焦存性　香白芷炒
等分為末每服二錢白湯調服一日三次

紫黑血
丹溪云其或下墜異常積滯中有紫黑血而又痛
甚者此為死血証當以桃仁滑石行之或口渴
及肛門燥辣是挾熱加黃芩或口不渴身不熱
喜熱手熨湯者是挾寒即加干姜
下痢身熱舌黑下如煤色或去瘀血用犀角人參
湯　犀角　人參　黃連　白芍　生地　甘
草　丹皮　水煎服
臟毒下血

衍義云曾治洛陽一婦年近五十兟飲無度多食魚蟹攝理之方蔑如也後以飲啖過常蓄毒在臓日夜二三十度大便與膿血雜下大腸連肛門痛難任醫以治血痢藥不効又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿又如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下稍服凉藥則泄注氣羸粥愈減服温平藥則病不知将朞歳醫告技窮垂命待盡或有人教服人参散病家亦不敢主當謾與服之

才一服二服減三服膿皆定自此不十服其疾遂愈後問其方云治大腸風虚飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不差樗根白皮人参各一兩為末空心米飲調下二錢忌油膩湿麵青菜果子甜物鷄魚蒜等

槐花散　治血痢久不止腹中不疼不裏急後重此臓毒也　青皮　槐花　荆芥穗

各等分為末水煎空心熱服

又方　治腸風血痢　鯽魚一具破開去腸膽入白礬二錢燒存性為末米飲空心調下

逐瘀血　治赤痢血痢應驗如響病雖垂殆一服即愈　阿膠麵炒成珠　枳殼麸炒　茯苓　川芎　蓬朮　白芷　木通　茯神去木　生地　生甘草　赤芍　五灵芝炒烟尽各一錢　大黄　桃仁去皮尖各一錢五分　水鍾半蜜三茶匙煎七分去渣入大黄仍煎一沸空心温服

豆汁

陳無擇云傷湿則下如豆汁嚴用和云傷湿而下

豆汁者分利之劉宗厚云湿喜傷脾〻胃為五穀之海無物不受常兼四臓蓋豆汁之色如五色之相雜故下豆羹汁者湿也

泄痢作嘔

病機〻要云如痢或泄而嘔者胃中氣不和也上焦不和治以生姜橘皮中焦不和治以芍藥當歸下焦寒不和治以輕熱藥甚以重熱藥

劉宗厚謂亦有胃火冲上而嘔者有陰虚而嘔者有胃虚而嘔者有積滞毒氣上攻而嘔者

統旨謂痢而嘔者乃胃氣不和用生姜橘皮白朮湯因火上逆而嘔者加姜汁炒黃連胃虛加人參倍朮積滞毒氣上攻而嘔者木香導滞湯陰虛者四物加參朮苓栢陳皮下痢吃逆同治

噤口痢

百一選方云禁口痢是毒上冲心肺所致用石蓮子以通心氣便覺思食

玉機微義云痢而能食知胃未病也若脾胃濕熱之毒薰蒸清道而上以致胃口閉塞而成禁口之症理宜除胃口之邪熱而此云毒氣上冲心肺其毒不知指何者之邪然亦有脾胃虛而得者有悞服利劑毒藥犯胃者又有服澁熱之劑太早而邪氣閉遏於胃口者必當求責

丹溪曰禁口痢胃中熱甚大虛大熱故也用人參二錢黃連姜汁炒一錢濃煎汁終日細細呷之如吐再服但得一呷下咽便開又宜引熱下行用田螺肉搗碎畨臍中入射香少許

又云黃連與參各一錢加砂仁三粒煎服

統旨云毒氣上冲心肺用人參茯苓石蓮肉入些小菖蒲以通心氣胸次一開自然思食有脾胃虛弱不能納穀用參朮以健脾胃或參苓白朮散之類加石菖蒲陳倉米

濟世方云治痢疾不納飲食者謂之禁口痢以脉症辨之如脾胃不弱而知其頭疼心煩手足温熱未嘗多服涼藥者此乃毒氣上冲心肺所以嘔而不食宜用敗毒散每服四錢陳倉米百粒姜三片棗一枚水煎温服又方加石蓮子白蔻仁洗炒

若其脉微弱或心腹膨脹手足厥冷初病則不嘔因服罌粟烏梅苦澁涼藥太過以致聞食先嘔者此乃脾胃虛弱用山藥一味一半生一半炒為末米飲調下虛寒甚脉微弱者理中湯

治噤口痢　枇杷葉蜜炙一兩砂仁蜜炒五錢為末蜜調抹口中嚥下

石蓮肉日乾為末每服二錢陳倉米飲調下便覺思食或以受日陳壁土炒橘紅為末姜棗略煎佐之

又方 黃連半觔生姜四兩切片與黃連同炒待姜焦黃色去姜只取黃連為末以陳米飯搗為丸如梧桐子大每服七八十丸赤者陳米飲下白者陳皮湯下赤白相雜者陳皮米飲下

又方 獨核肥皂一枚去核用塩填實其內火燒存性為末先煮白米粥用少許入在粥内食之立効

又方 梨子一枚去心入好蜜一匙蒸熟食之

下痢吃逆 俗名發呃

丹溪曰吃逆病氣從下冲上屬火之象古方悉以胃弱言之殊不知胃弱者陰弱也虛之甚也滯下之久多見此症乃因久下而陰虛也 詳見吃逆本門

一人年五十質弱多怒暑月因飢索食不遂後得瀉痢口乾七八日後發吃逆以人參白术煎湯調益元散數日安此虛熱之治痢倘未止者將此藥蜜丸服之數日全止

下痢大孔痛

大孔痛暴病身熱或脉洪大此熱沉於下也宜清之若久病身冷自汗脉沉小宜温之

又方 治大孔痛熱流於下者檳榔木香黃連黃芩加乾姜

丹溪治一人年二十性好酒色奉養過厚適有事多憂恐患瘧發寒熱忽一日大發熱大便下皆是積滯極臭大孔極痛呻吟不絕其孔陷入囑付後事予曰此大虛也脉皆弦大而浮遂以瓦片令敲如銅錢員様燒紅投入童便中急柔熱取起令乾以紙褁安痛處其時寒恐外寒乘虛而入也以人參當歸陳皮作濃湯飲之食淡味至半月而安 又有用瓦片燒紅投入槐花湯泡上用者 久下赤白大孔痛不可忍炒塩熨之又灸枳實熨之日華子云痢久大孔急痛亦有寒熱者熱艾黃蠟訶子燒薰之

治痢大便不禁其大孔開如空洞不閉者用花椒為末葱搗爛塞谷道中併服酸收澁腸之劑如御米殼訶子皮之類收之神効

痢疾肛脫

初起裏急後重脫肛此為邪壓大腸其氣不得宣

通而脫下也宜木香導滯湯內有木香檳榔調其氣黃芩清上熱大黃下其積滯歸芍活其血而愈也

若用推積滯調氣之後而脫肛者此為氣虛宜補而升之

痢久氣血俱虛虛中有寒滑下不收者補中加溫澁之劑如真人養臟湯之類

有濕熱在大腸因裏急後重而脫肛者宜清之如保命集地榆芍藥湯之類是也

虛坐努圊

東垣曰虛坐而不得大便者皆因血虛也血虛則裏急加當歸身　凡後重逼迫而得大便者為有物而然今虛坐努圊而不得大便知其血虛也故用當歸為君生血藥佐之

痢而小便少

劉河間治身發熱下痢赤白小水不利以益元散盪胃中積聚又散熱從小便中出也

丹溪治一老人年七十面白脉弦數獨胃沉滑因飲白酒作痢下血如淡膿水腹痛小便不利裏急後重以參朮為君甘草滑石檳榔木香蒼朮為佐下保和丸二十五粒第二日前症俱減惟小便不利以益元散服之安

糟粕不實

痢疾已愈惟糟粕不實此腸胃虛間或有濕參苓白朮散錢氏白朮散香椿根白皮丸或訶子皮散蕘花丸之類擇而用之異功散加肉豆蔻亦好

久痢滑泄不固 有寒有熱有虛

濟世方治熱滑側栢葉一錢甘草三錢御米殼蜜炒二錢久者倍之水煎服

仲景治寒滑不禁蕘花湯止之

王好古曰大凡痢疾乃心腹之患老年人尤非所宜若果首尾用平和之劑決難作効必致危篤雖欲服此則已晚矣其秦艽地榆黃栢木通之類其性苦寒卻難輕服　白痢當服理中湯　血痢當服胃風湯　若五色雜下泄瀉無常用熟烏頭一兩厚朴乾姜甘草各等分生姜煎服

今之治痢多用駐車丸黃連阿膠丸之類其
中止有黃連肥腸其性本冷若所感積輕及餘
痢休息不已則服取効若病稍重則非此可瘳
予嘗用斷下湯加減調治百發百中
易簡斷下湯　治下痢無問新久赤白老幼
白朮一錢　茯苓一錢　甘草五分　草菓一枚連皮用
御米殼十四枚去筋膜醋炒　生姜七片　棗子　烏梅各七
箇水煎服　赤痢加黑豆二粒　白痢加乾姜
五分　又云御米殼治痢如神但性緊澁多令
人嘔逆既以醋製加以烏梅不致為害然嘔吐
則不可服　又云大率痢疾古方謂滯下多因
腸胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止
先以巴豆感應丸十餘粒白梅湯下令大便微
痢仍以煎藥服之無不應手作効若脾素弱用
橘紅豆蔻粟殼各等分煮麵糊為丸桐子大每
服五十丸烏梅湯下兼治泄瀉暴下不止一服
即愈更令藥力相倍為佳如覺惡心却以理中
湯四物湯加豆蔻木香輩調其胃氣仍以二陳
湯水煮木香膏等定其嘔逆
又方治冷痢腸滑頻併泄瀉服之神効
白朮二兩炒　乾姜炒　甘草炙各一兩半　木香
粟殼蜜炙　訶子去核各二兩　肉菓十枚生
右為末糊丸梧子大每服五十丸米湯下
錢氏白朮散　治氣血俱虛神氣衰弱或瀉或痢
脾虛口渴惡心等症　方在泄瀉
一方　治白痢久不効乃寒滑症也治當溫澁
酸石榴皮一个　草菓一个　陳皮三錢　烏梅一个
甘草二錢　乾姜二錢　水煎食前服
遇仙立効散　治諸惡痢或赤或白或膿淡相雜
裏急後重臍腹結痛或下五色或如魚腦日夜
無度或禁不食不問大人小兒虛弱老人產婦
並宜服之　御米殼去蒂鹽水炒　當歸各二兩　甘草
地榆　赤芍　酸石榴皮各一兩
右每服一兩水煎食前服忌生冷油膩
神効參香散　治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調
積而成痢或鮮血或豆汁或如魚腦或下紫黑

瘀血或赤白相雜裏急後重日夜無度不問新
久並治　白扁豆　人參　木香各一两　茯苓
肉菓煨各四两　橘紅　御米殼去蒂各十二两
右為末每服三錢米飲下
水煑木香丸　治一切下痢赤白膿血相雜裏急
後重　御米殼去穰二两一錢　青皮去白二两四錢　甘草
炙三两　當歸　訶子肉　木香不見火各六两　右為
末煉蜜為丸如彈子大每服一丸水一鍾煎
化至六七分空心食前服
真人養臟湯　治大人小兒冷熱不調下痢赤白
膿血或如魚腦髓裏急後重臍腹疼痛或脫肛
墜下酒毒便血並治　御米殼去蒂蜜炒三两六錢　人參
當歸各六錢　肉桂八錢　訶子去核一两二錢　木香不見火二两四
錢　肉菓麵煨五錢　白朮炒六錢　白芍一两六錢　甘草一两
八錢　右每服六七錢水煎食前服臟寒者加大附子
固腸湯　三因方　治冷熱不調下痢赤白
御米殼去蒂醋炙三两　白芍一两　當歸　甘草各一两
陳皮　訶子　白姜炮各五錢　人參　木香各三錢

右每服五六錢水煎七分食前服
豈魁固腸丸　治脾胃虛弱臟腑頻滑下痢赤白
木香　赤石脂　乾姜　砂仁　厚朴製　肉菓
煨各三兩為末麵糊為丸梧桐子大每服五十
丸米飲食前服
白朮安胃散東垣　治一切瀉痢膿血相雜裏急後
重日夜無度又治男子小腸氣痛婦人臍虛冷
并產後兒枕塊痛亦治產後虛弱寒熱不止
白茯苓　白朮　車前子各一两　五味子　烏梅
各五錢　御米殼蜜炙二两　右每服一兩水煎服
仲景桃花湯　治下便膿血不止　赤石脂
乾姜　粳米　水煎服
異功散　治久痢脾胃虛弱　四君子湯各一錢
加陳皮二錢　水二鍾煎八分加姜棗食前服

休息痢

休息痢者愈後數日又復痢下時作時止積年累
月不肯斷根者是也此因始得之時不曾推下
就以調理之劑因循而致也又或用兜澁藥太

早以致邪不盡去綿延於腸胃之間而作者或
痢愈之後而腸胃虛弱復為飲食所傷而作者
當看輕重調理或熱或寒或消導或再推下然
後以異攻散等補劑加收澁之藥

張文仲治痢久下經時不愈者此名休息痢取虎
骨炙焦為末日服三次每服二錢

縮砂散　止休息痢　砂仁少為末空心米飲下一錢

木香飲　治隔年痢不止並治血痢尤佳
木香　黃連各五錢二味同炒　右為末入射香少許
每服二錢米飲下

罌粟散　治禁口紅白久不愈者　川芎　罌粟
殼各一兩去蒂膜　為末空心蜜湯調下八分

亟痢

濟世方治似痢非痢挾熱者苦楝根皮去粗皮晒乾為
末糯米飲為丸米飲下

瘧痢

瘧未已因食生冷痢作　人參　白朮　茯苓
陳皮　半夏　甘草　生姜　草菓　烏梅川芎
少許滲少時以厚紗裹水濕煨熱　水煎未發前服
痢未愈繼之以瘧十味六和湯　藿香　厚朴
赤茯苓　人參　木瓜　香茹　扁荳　杏仁
甘草　砂仁

丹溪治痢活套

丹溪曰下痢初得之時元氣未虛必推蕩之此通
因通用之法稍久氣虛則不可下壯實初病宜
下虛弱衰老久病宜升之　其或下積腹痛後
重小水短此為裏症宜和中踈氣用炒枳殼製
厚朴芍藥陳皮滑石甘草　其或在下則纏住
在上則嘔食此為毒積未化胃氣未平寒則溫
之熱則清之虛則用參朮補之毒解積下飲食
自進　其或身倦自覺氣少惡食此為挾虛証
宜加白朮當歸身尾甚者加人參又十分重者
止用此一條加陳皮補之虛回而痢自止　其
或氣行積少但虛坐努責此為無血症倍用當
歸身尾却以生芍藥生地桃仁佐之陳皮和之
血生自安　其或纏墜積退十之七八穢積已

盡糟粕未實當炒芍藥炒白术炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然固腸丸性燥恐尚有滯氣未盡行者但當单飲此湯固腸丸未可遽用盖固腸丸有去湿實腸之功　其或痢後糟粕未實或粥食稍多或飢甚方食腹中作痛切不可驚恐當以陳皮白术各半煎服和之而安　其或久痢後脉虚氣弱滑下不止又當以藥澁之可用訶子皮肉豆蔻白礬半夏甚者牡蠣可擇用之然須用陳皮為佐恐太澁亦能作痛又甚者灸天樞氣海　右前方用厚朴專瀉凝滯之氣然厚朴性太温而散氣久服大能虚人滯氣稍行則去之餘滯未盡則用炒枳殻陳皮然枳殻亦能耗氣比之厚朴稍緩比陳皮稍重滯氣稍退亦當去之只用陳皮以和衆藥然陳皮去白有補瀉之功若為參术之佐亦純作補藥用　凡痢疾腹痛必以白芍甘草為君當歸白术為佐恶寒者加桂恶熱者加黄栢達者更能恭以歲氣時令用藥則萬舉萬全豈在乎執方而已哉

禁方

乳香止痛散　治下痢赤白疼痛不已　御米殼去穣蜜炒五錢　橘紅五錢　炙甘草五錢　乳香二錢另為末　没藥二錢另為末　水煎去渣入乳没食前服如白痢熱服紅痢冷服如痢不止加青皮四錢

治男婦老幼赤白痢　紅花　胡椒　等分為末紅棗煮肉搗為丸如梧桐子大白麯為衣赤痢甘草湯下三十一丸　白痢姜湯下先通為度次早空心再服二十九不拘紅白俱以滚水下即愈

不治症及危症

下如魚腦者半生半死下如塵腐色死下如屋漏水者死下如竹筒注者不治下痢純血身熱而脉洪数者死

王御齋治例

痢乃是湿熱食積三者别赤白青黄黒五色以屬五臟白者湿熱傷氣分赤者湿熱傷血分赤

白相雜氣血俱傷黄者食積治法瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣消化積滞通因通用其初只是下之下症未愈隨症調理稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜温年老及虛弱人不宜下

主方　黄芩炒二錢五分　黄連炒一錢五分　白芍炒二錢已上二味痢疾必用之藥　木香　枳殼炒一錢五分　檳榔三分　甘草炙二分　若腹痛加當歸一錢五分砂仁一錢再加木香芍藥各五分　若後重加活石炒一錢五分再加枳殼檳榔各五分　芍藥生用再加五分　條芩亦加五分

若白痢加白术茯苓炒滑石陳皮各一錢

初欲下之加大黄五錢　兼食積加山查枳實各一錢

若紅痢加當歸川芎桃仁各一錢五分

初欲下之再加大黄五錢

若紅白相雜加當歸桃仁川芎各一錢五分以理血活石陳皮蒼术各一錢五分以理氣有山查枳實

若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減連芩芍藥各七分加白术一錢五分黄芪茯苓陳皮各一錢砂仁五分去檳榔枳殼再加乾姜炮五分

若紅痢人虛弱血虛或下後未愈減芩連各五分加當歸川芎熟地黄阿膠陳皮各一錢白术一錢五分

若色赤黑相雜此濕勝也小便赤澁少加木通澤瀉茯苓各一錢　山梔炒五分以分利之

若血痢加當歸生地桃仁炒槐花各一錢久不愈減芩連各七分去檳榔枳殼再加阿膠炒側栢葉各一五分　乾姜炒黑一錢白术一錢五分陳皮二錢

若痢已久而後重不去此大腸墜下去檳榔枳殼

用條芩加升麻一錢以升提之

若嘔吐食不得下加軟石膏一錢五分陳皮一錢山梔仁炒五分入生姜汁緩呷之以瀉胃口之熱

有一様氣血虛而痢者四物湯加人參白术陳皮黄連黄芩阿膠之類補之而痢自止

有一様寒痢用黄連木香芍藥當歸乾姜砂仁厚朴肉桂之類

若得痢而悞服温熱止澁之藥則雖稍久亦宜用前法以下之後方補之

若得痢便用前正法下之而未愈又用前調理法
治之而久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛補
寒温二條擇用更加龍骨赤石脂御米殼烏梅
肉等收澁之藥

胎前痢疾

本事方　治婦人胎前產後不拘赤白生姜二觔
搗取自然汁以鴨子一枚打碎入姜汁内攪勻
煎之至八分入蒲黃三錢再煎五七沸空心温
服立効

大全良方　治姙娠素弱下痢頻併腹痛瘦甚面
色痿黃不進飲食　厚朴一兩半　白术　川芎
白芍　熟地黃　當歸　干乾　人參各二兩
訶子三錢　甘草一錢　右服五六錢姜三片水煎服

黃芪當歸湯　治姙娠下痢腹痛小便澁
當歸　黃芪各一兩　糯米一合　右和勻水煎分四服

羅太無大寧散　治姙娠下痢赤白灰色泄瀉疼
痛垂死者　黑豆三十五粒　粟殼二兩一半生一半少
甘草二兩半生半少　右加姜三片水煎食前服神効

大全良方　治姙娠挾熱下痢亦治男子常痢
黃連　黃柏各二兩　梔子二十枚　右每服六七錢水
煎濃服　若嘔者加陳皮一兩半生姜三兩

黃連湯　治姙娠下痢赤白膿血不止
黃連八分　厚朴製　阿膠少　當歸　乾姜各六分
艾葉　黃柏各四分　右為末空心米飲調下方
寸匕日三服

厚朴散　治姙娠下痢黃水不絶　厚朴三兩姜製
黃連三兩　肉荳蔻一枚連皮用　右為粗末水煮頓服

肉菓飲　治姙娠臟氣本虛脾胃衰弱臟腑虛滑
臍腹疼痛日夜無度　厚朴二兩姜製　肉荳蔻一枚麫裹
煨　右吹咀每服五錢姜三片水煎服

阿膠湯　治姙娠腹中絞痛心下急痛及療產後
血暈崩中久痢　阿膠二兩　酒二升半煎取一升
頓服

宣明白术湯　白术　黃芩　當歸
各等分水煎食前服

產後痢

救急散　治產後赤白痢腹中絞痛

白芍酒炒 阿膠 艾葉 熟地各一兩 甘草
當歸各三兩 每服二兩水煎濃空心服
當歸芍藥散 治姙娠腹中絞痛心下急痛及療
產後血暈崩中久痢。方見姙娠腹痛
經驗方 治產後胎前痢疾
鴨子一枚 米醋炙為末醋湯調下
丹溪治婦人患墮胎後腸滿食少痢不止脉虚左
手尤甚 滑石二錢 白芍 蒼术各五錢 白术二錢半
乾姜四錢 茯苓一錢 訶子二錢炮 為末水煎下保
和丸四五十粒

雲箕子治產後血痢臍腹疼痛四物湯加槐花黃
連御米殼等藥
仲景白頭翁甘草阿膠湯脉經謂新產虛下熱痢
白頭翁 阿膠各三兩 黃連 黃栢 秦皮各三兩
甘草二兩 分三服水煎食遠服
產後血痢小便不通臍腹疼痛
主馬齒莧搗汁二合煎一二沸下蜜一合調頓
服
八卷終

赤水玄珠氣門第九卷目錄

氣 九氣見症
血 嘔吐血
咳血 喀血唾血痰涎血
鼻血舌衄 齒衄
肌衄 小便血
下血 九竅出血
中蠱下血 金瘡出血

目錄終

赤水玄珠第九卷

新安生生子孫一奎著輯

氣門

內經曰百病皆生于氣〻一也因所觸而為九怒喜悲恐寒熱驚思勞也故怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收炅則氣泄驚則氣亂思則氣結勞則氣耗

九氣見症

怒氣所至為嘔血為飧泄為煎厥為薄厥為陽厥為胷滿脇痛食則氣逆而不下為喘渴煩心為消癉為肥氣為目暴盲耳暴閉筋縱發于外為癰疽

喜氣所至為笑不休為毛革焦為肉病為陽氣所收甚則為狂

悲氣所至為陰縮為筋攣為肌痺為脉痿男為數溲血女為血崩為酸鼻辛頞為目昏為少氣不能報息為泣則臂麻

恐氣所至為破䐃脫肉為骨痠痿厥為暴下綠水為面熱膚急為陰痿為懼而脫頤

驚氣所至為潮涎為目睘為口呿為痴癇為不省人事為僵仆久則為癱痺（癱音攤痺也）

勞氣所至為嗌噎病為喘促為嗽血為腰痛骨痿為肺鳴為高骨壞為陰痿為唾血為瞑視為耳閉男為少精女為不月

思氣所至為不眠為嗜卧為昏目為中痞三焦閉塞為咽嗌不利為痺疸嘔苦為筋痿為白淫為不嗜食

寒氣所至為上下所出水液澄徹清冷

炅氣所至為喘嘔吐酸暴注下迫

凡此九氣內經以五行相勝之理治之故悲可以治怒以愴惻苦楚之言感之喜可以治悲以謔浪褻狎之言娛之恐可以治喜以遽迫死亡之言怖之怒可以治思以污辱欺罔之言觸之思可以治恐以慮彼忘此之言奪之五者之外炅可以治寒〻可以治炅逸可以治勞習可以治驚要在審證察脉而施治之不可執一也

脉沉實者宜下絃急者宜溫虛細微弱者宜補痛

在上者宜散痛在下者宜利氣虛者宜鎮墜氣
結者宜疎順
夫治氣之法惟在適中氣積于中固宜疎順疎導
過劑則又反耗元氣元氣走泄則下虛中滿之
証生焉故曰疎啓于中峻補于下中滿既除下
虛斯實此之謂也
治有餘之症脉沉實而中滿大便秘按之疼則宜
下法當用大黄然亦須入桂皮以辛温和其氣
以苦寒泄其實氣得泄越痛亦隨愈

入九卷　三

凡用利藥其法有三駛利則用大黄芒硝温利則
用硫黄乳粉瀉積則用巴豆硇砂他如磨積化
結聚則以三稜蓬朮為先導引閉塞則以木香
檳榔先使温散凝滞則以姜桂為主疎順暴戾
則以蘇橘為宜補虛益氣則以人參白朮為君
墜下輔陽者以黑錫養正為鎮
生生子曰治氣之劑東垣有法可準如枳殼利肺
氣多服損胸中至高之氣青皮瀉肝氣多服損
真氣木香行中下焦氣香附快滞氣陳皮泄逆

氣紫蘇散表氣厚朴瀉胃氣檳榔瀉至高之氣
藿香馨香上行胃氣沉香升降真氣腦麝散真
氣若此之類氣實所宜設認冷生氣而禁以燥
熱投之是以火濟火病日益甚丹溪曰氣有餘
即是火乃戒好用温熱治氣者之悞也
原病式曰氣為陽而主輕微諸所動亂勞傷乃為
陽火之化子和河間治喜怒悲恐思之証皆以
平心火為主至于勞者傷于動〻便屬陽驚者
駭于心〻便屬火故治皆以平心火為主深中

入九卷　四

病情又曰五志過極皆為火也若用香辛散氣
燥熱傷氣真氣耗散濁氣上騰猶曰腎虛弗能
攝氣歸原遂用降氣鎮墜之劑不悟肺受火炎
子氣亦弱降令不行火無所制丹溪有曰上升
之氣自肝而出中挾相火其熱為甚自覺其冷
非真冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故有
此証認假作真似是之禍可勝言哉又曰氣無
補法俗論也痞悶壅塞似難于補不思正氣虛
者由七情勞傷所致脾土受傷轉輸失職胃雖

受穀不能運化故陽升陰降而成天地不交之
否清濁相混若不補養邪何由行

脉法

下手脉沉便知是氣極沉則伏濇弱難愈其或
沉滑氣兼痰飲滑者血多少氣濇者少血多氣
大者氣血俱多脉来大而堅者血氣俱實小者
血氣俱少

七氣湯 治七情之氣欝結心腹絞痛
人參 炙甘草 肉桂各一錢五分 半夏一錢
姜三片水煎服

指迷七氣湯 治同上
香附二錢 青皮 陳皮 桔梗 蓬术 官桂
益智仁 藿香 半夏 甘草炙
各等分姜三片棗二枚水煎服

縮砂香附湯 調中快氣治心腹刺痛
香附炒十两 烏藥五两 炙甘草二两 砂仁二两
右為末每服一錢紫蘇葉三片塩少許沸湯
調下 大便秘陳皮湯下
一方去烏藥加沉香五錢

大七氣湯 治喜怒不節致臟氣不平心腹脹滿
半夏 茯苓各四錢 厚朴三錢 紫蘇二錢
加姜水煎服

木香流氣飲 諸氣痞塞不通胸膈膨脹面目虛
浮四肢腫喘
半夏 厚朴 青皮 紫蘇 香附 甘草各

錢 陳皮二錢 桂 莪术 丁皮 大腹皮
麥門冬 檳榔 木香 草果各六分 木通八分
藿香 白芷四分 茯苓 白术 木瓜 人參
石菖蒲 加姜棗水煎服

秘傳降氣湯 上盛下衰氣不升降頭目昏眩痰
實嘔逆胸膈不快怒則氣上驚則氣亂尤宜
骨碎補 訶子 草果 五加皮 半夏各五分
桔梗五分 桑白皮 地骨皮 枳殼 陳皮
甘草各一錢 水煎服

升陽順氣湯　七情所傷及勞役飲食不節滿悶短氣恐則氣下者尤宜
升麻　柴胡　陳皮各一錢五分　半夏　人參各三錢
黄芪四錢　甘草　黄柏各五分　川歸一錢　神曲炒一錢五分
草荳仁二錢　每服五六錢姜三片水煎服
蘇子降氣湯　治中脘不快心腹脹滿噎塞喘促咳嗽痰涎宿食留飲脇下支結及脚氣冲心
方在痰飲門
分心氣飲　憂思留滞致使心胸痞悶脇肋脹滿噫氣吞酸頭目昏眩日漸瘦弱或大腸虛秘
紫蘇莖葉四兩　羌活　半夏　肉桂　青皮　陳皮
桑白皮　大腹皮　木通　芍藥　炙甘草
赤茯苓各一兩
每服五六錢姜三片棗二枚灯心十根水煎
四磨湯　治七情傷感上氣喘息妨悶不食
方在喘門
推氣丸　治三焦痞塞大便澁小便赤黄
方在脹滿門

神保丸　治諸氣刺痛流入背膂及脇下諸藥不効者　方在脹滿門
檳榔木香丸　踈導三焦破痰飲快氣消食
木香　檳榔　枳殼　杏仁去皮麩炒　青皮各一兩
半夏曲　皂角去白酥炙　郁李仁去皮各二兩
各為末另以皂角四兩用漿水一碗搓揉成膏更入熟蜜少許和丸如梧桐子大每服五十丸姜湯下
九氣丸　治九氣膈氣風氣寒氣熱氣憂氣喜氣驚氣怒氣痺氣積聚堅牢如杯心腹疼痛時作時止
姜黄　甘草　香附
為末每服一錢入塩少許百沸湯點空心服立効
䐢氣散　治胸膈痞悶腹脇虛脹氣不宣通及傷寒兩脇刺痛攻心
三稜　蓬朮煨各五錢　白朮三錢　枳殼一錢　木香五分
每服二錢加姜三片水一鍾半煎八分食前服用砂糖少許壓下
分氣紫蘇飲　治心下脹滿脇疼氣塞嘔逆不止

方在喘門

匀氣散 胸膈脹滿宿冷不消心腹刺嘔吐

丁香 檀香 木香 白豆仁各一兩 藿香

甘草炙八兩 砂仁四兩

為末每服二錢入塩一字沸湯調服

復元通氣散 氣不宣通流利并閃挫腰脇氣痛

茴香炒 川山甲蛤粉炒二兩 延胡索炒 白丑炒

陳皮 甘草各一兩 木香一兩五錢

為末每服二錢熱酒調服 一方加乳香没藥

入丸卷 九

清膈丸 因湿熱氣滞

黃芩 黃連炒各五錢 香附一兩半 蒼术二兩

為末取黃熟瓜蔞去皮搗爛和丸菉豆大每

服三五十丸

桔梗枳殼湯 諸氣痞結滿悶

桔梗 枳殼各四錢 甘草炙一錢二分 生姜五片水煎服

升降六一湯

香附炒六兩 藿香一兩

為末每服二錢白湯下

二聖散 諸氣痛

芫花醋煮乾五錢 延胡索炒一兩五錢 二味為細末每服

一錢 男子元臟氣痛葱酒調下

婦人血氣痛川歸酒下 諸氣痛薄荷湯下

小腸氣痛茴香湯下

勝金散 治男婦一切冷氣

烏藥酒浸微炒 茴香炒 青皮去白 良姜等分

右為末每服二錢空心温酒調下

婦人用姜煎童便調服

入丸卷 十

半夏湯 治上氣嘔吐不能下食

半夏三錢 陳皮 白术 甘草炙 桂心各五錢 人參

一兩 厚朴二兩 每服五錢姜五片棗三枚水煎服

手拈散 一切氣痛

草果 延胡索 乳香 没藥 五靈脂酒炒

等分為末每服二錢好酒調下 一方加良姜

一人病氣上冲口中如烟霧耳内常鳴此衝脉

逆上與八物湯加炒黃連二分黃栢三分數劑而愈

蘇合香丸和劑 專能順氣化痰并治傳尸骨蒸癆

療卒暴心痛鬼魅瘴癧赤白下痢小兒驚搐等症

沉香　射香研　丁香　青木香　訶梨勒煨用皮

安息香另為末用無灰酒一升熬膏　香附子炒去毛　蓽撥

白术　白檀香　硃砂研飛　烏犀角各二兩　薰陸香

另研龍腦研　蘇合油入安息香膏内　右末研匀用安息

膏并審丸梧子大空心温水化下四丸酒亦

可

諸見血症總論

内經曰陽明厥逆喘咳身熱善驚衄吐血又曰大怒則形氣絶而血菀于上又曰脾移熱于肝則為驚衄脆移熱于膀胱則癃而尿血又曰結陰者便血一升再結二升三結三升夫血者生化于脾總統于心藏受于肝宣布于肺施泄于腎灌漑一身陰氣一傷变生多病妄行于上則吐衄衰涸于中則虚劳忘反于下則便紅移熱膀胱則癃閉溺血滲透腸間則為腸風陰虛陽搏

則為崩中濕蒸熱瘀則為滞下熱極腐化則為臓血火極似水血多紫黒熱勝于陰則為瘡瘍濕滞于血則為痛痒隱疹皮膚則為冷痺畜之在上則為喜忘畜之在下則人喜狂堕恐跌仆則瘀血内凝又細分之則咳血衄血出于肺嘔吐出于胃痰涎血出于脾咯血唾血出于腎便血清者屬營虚有熱濁者屬熱与濕色鮮者屬火黒者火極血與泄物並下者屬有積或絡脉傷也尿血因房劳過度陰虚火動以致營血妄

行而或者又以此為得之虛寒當以脉別有嘔吐紫凝血者原病式云此非冷凝由熱甚銷爍以為稠濁而熱甚則水化制之故赤兼黑而紫也又有汗血者由夫大喜傷心喜則氣散血隨氣行故也又下血先見血後見便為近血自大腸来先有便後見血此遠血自小腸来腸胃中本無血良由氣虛腸薄故血滲入而從下出也

東垣曰除傷寒家衂血外雜病見血多責其熱旨哉言乎大凡血上行為逆其治難下行為順其治易若血上行或嘔或吐忽变而下行為悪痢者吉兆也丹溪曰口鼻出血皆是陽盛陰衰有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸経矣

素問曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何何以得之岐伯曰病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不来也帝曰治之柰何復以何術岐伯曰以四烏鰂骨一藘茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也

王海藏云胸中聚集之残火腹裏積久之太陰上下隔絶脉絡部分陰陽不通用苦熱以定于中使辛熱以行于分升以甘温降以辛潤化嚴肅為春温变凛冽為和氣汗而愈也然餘毒土苴猶有存者周身陽和尚未泰然胸中微躁而思涼飲因食冷物服涼劑陽氣復消餘陰再作脉退而小絃細而遲激而為衂血唾血者有之心肺受邪也下而為便血溺血者有之腎肝受邪也三焦出血色紫不鮮此重沓寒湿化毒凝泣水穀道路浸積而成若見血証不詳本源便用涼折变乃生矣陽証溢出鮮血陰証下如豚肝

上而血者黄芪桂枝湯　白芍當歸湯

中而血者當歸建中湯　增損胃中湯

下而血者芎歸术附湯　桂附六合湯

若三血証在行陽二十五度見黄芪四君

子主之
若三血証在行陰二十五度見當歸四逆加吳茱萸主之
生生子曰按海藏此論雖為傷寒而發實戒用藥者要認血来本原不可妄治以致变乱夫治血當明血出何經時師多宗丹溪有曰吐血衄血多是火載血上錯經妄行越出上竅此論固是猶有未盡乃所以啓後人過用寒凉之惑也夫火者無形之氣也非水可比安能稱載蓋血隨氣行氣和則血循經氣逆則血亂氣有餘即是火也實由氣逆而血妄行無于火化因此為甚經曰怒則氣逆甚則嘔血暴瘅內逆肝肺相搏血溢鼻口是也又東垣曰血妄行上出于鼻口者皆氣逆也况血得寒則凝得熱則行見黑則止迹此觀之治血若不兼之調氣而純以寒凉是施則血不歸經而且為寒凉所凝滞雖暫止而復来也且脾統諸血寒凉傷脾々虚尤不能約束諸血其变証可勝言哉

素問示從容論曰夫傷肺者脾氣不守胃氣不清經氣不為使真臟壊決經脉傍絶五臟漏泄不衄則嘔
綱目云傷肺即傷氣也當于氣虛不能攝血條参治
戴元禮云吐血者荣氣溢入濁道留聚膈間滿則吐血名曰内衄宜蘇子降氣湯加人参阿膠　飲酒太過傷胃吐血用理中湯加青皮梔子乾葛川芎　勞太過吐血不止蘇子降氣湯加人参芍藥　打損吐血黑神散童便調服　有時或吐血兩口隨即無事過数日又發經年累月不愈者宜黑神散吐血發渴名為血渴也或四物湯十全大補湯量胃氣虛實用之
統旨云吐血先哲皆以為熱其因于寒者理亦有之何則寒邪属陰人之榮血亦属陰古人云風傷衛寒傷荣各從其類人果身受寒邪口受寒物邪入血分血得冷而凝則被寒矣在上則從口而出在下則從便而出若此者實病機之所

有爲得為畫無也但其血色之黑與吐血因熱極而反兼水化者相似茲則宜于脉証間求之脉微遲而身又清凉者寒也脉洪数而身又煩熱者熱也寒則温之熱則清之治法大不同矣

嘔吐血

生生子曰吐血成碗吐出者甚至有出而盈盆者冊溪云多是陽盛陰虛故血不得下行因火炎上之勢而上出脉必大而芤大者發熱芤者血滞與失血也

又曰有氣虛中寒陰陽不相守血乃妄行而吐出者經所謂陽虛陰必走者是也當用四物理中湯加乾姜甘草煎服中温則血自歸経矣切不可投苦寒之劑

冊溪云山梔子最能清胃脘之血　先吐紅後見痰嗽多是陰虛火動痰不下降四物湯加痰藥火藥　先痰嗽後見紅多是痰積熱降痰火為急　痰嗽涎帶血出此是胃口清血熱蒸而出重者梔子輕者藍實或暴吐紫血一碗者無事吐出為好此熱傷血死于中用四物湯解毒湯之類　吐血挾痰積吐一二碗者亦只補陰降火四物湯加火劑之類　挾痰若用血藥則泥而不行只治火自止吐血乃火病也　大吐血不止以乾姜炮黑為末童便調從治　喉脘痰血荊芥散妙　又云嘔吐血出于胃也實者犀角地黄湯主之虛者小建中湯加黄連主之

千金方云吐血有三種有内衂有肺疽有傷胃内衂者出血如鼻衂不從鼻孔出是近在心肺間津液出還流入胃中或如荳羮汁或如切衃血凝停胃中因即滿悶便吐或出数斗至一石者是也得之于勞倦飲食過常也（衃音披韻書凝血也）肺疽者或飲酒後熱毒滿悶吐之時血從吐後出或一合半合半升一升是也

傷胃者因飲食大飽之後胃中冷不能消化便煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝蹴因傷裂胃今吐血色鮮正赤腹亦絞痛自汗出其脉緊而数者為難治也

劉宗厚曰凡治血必血屬之藥欲求血屬之藥其四物之謂乎河間謂隨証輔佐謂之六合湯者詳言之矣余故陳其氣味專司之要不可不察夫川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行血滯于氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能補真陰之虛也當歸分三治血中主藥也通肝經性辛温全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經味酸寒能凉血治血虛腹痛也若求陰藥之屬必于此而取則焉脾胃論有云

八九卷　九

若善治者隨經損益摘其一二味之所宜為主治可也此特論治血病而求血藥之屬者也若氣虛血弱又當從仲景血虛以人參補之陽旺則生陰血也若四物湯者獨能主血分受傷為氣不虛也輔佐之屬若桃仁紅花蘇木血竭丹皮者血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛所宜蓯蓉瑣陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所宜乳酪血液之物血燥所宜乾姜桂者血寒所宜生地苦參血熱所宜特取其証治大畧耳若能觸類而長可謂應無窮之變矣

脉訣舉要曰諸症失血皆見芤脉隨其上下以驗所出大凡失血脉貴沉細設見浮大後必難治

治火之劑

大薊散　治辛熱傷肺嘔吐血或一碗或半升名曰肺疽

大薊根　犀角屑　升麻　桑白皮　蒲黃

杏仁去皮尖　桔梗各二錢　甘草炙五分

八九卷　廿

右分作二服每服姜三片水煎服

四生丸　治吐衂血熱妄行

生荷葉　生艾葉　側栢葉　生地黃各等分

搗爛為丸如鷄子大每服一丸用水二鍾煎至一中去渣服

犀角地黃湯　治血積胸中吐血衂血

犀角鎊　赤芍藥　牡丹皮　生地各一錢

水煎服此方若有痰者及氣逆不降者服之皆不効予每用加枳殼桃仁滑石効

茜根湯　治吐血咯血嘔血等症

四物湯加童便浸香附一錢五分茜草根二錢半忌鐵
水煎服二三服立愈

治吐血
大黃末一錢生地黃汁一合
水半鍾煎四五沸服即愈

又方 好墨燒去膠氣為細末每服二錢以白膠湯化開清調服

治吐血暴甚昏運不止
人參一兩為末用雞子清調如稀糊以匙挑服之
盡劲五更服之尤妙

治吐血
生地黃五斤搗汁生蜜二斤半共以瓦器盛貯鍋內重
湯桑柴文武火熬三日夜取出入人參末四兩
茯苓末六兩攪勻不拘時服此即瓊玉膏也
又方加入青蒿汁熬膏再加檳榔末一兩以降
其氣使下行也

奇方 治飲酒過多蘊熱胸膈以致吐血衂血
葛花二兩 黃連四兩
右為末以大黃末熬膏為丸如梧桐子大每

枇杷散 治暑毒攻心嘔吐鮮血
方在暑門

龍肝膏 治吐血不止
伏龍肝一兩 生地汁 麥冬汁 小薊汁
藕汁各三合 姜汁一合
入蜜半匙慢火熬成膏每服一匙

帶補之劑

奇方 治肺損嗽血吐血
生地四兩取汁 鹿角膠一兩炒為末
右以地黃汁拌和每服三錢童便加姜汁少
許調下

側柏散 治內損吐血下血或用酒太過勞傷于
內其血妄行出如湧泉口鼻皆流須臾不救則死
側柏葉一兩半蒸焙 人參 荊芥穗燒灰存性各一兩
為末每服二錢麪一錢新汲水調如糊啜服

服百丸溫湯下或煎服亦可

辰膠散　治大人小兒吐血

阿膠炒　蛤粉各一兩　辰砂少許

右為末藕節搗汁和蜜調下食後服

龍腦雞蘇丸　治膈熱咳嗽或吐血衄血

方在火熱門

茯苓補心湯　治心虛為邪氣所傷吐血

方在心痛門

藕節散　治吐衄不止

藕汁　生地黃汁　生蜜各五匙　大薊汁各三合

右和勻每服一小鍾不拘時服

拔萃犀角地黃湯　治熱甚而血積胸中

生地黃二兩　黃芩　黃連各一兩　大黃五錢

每服一兩水二鍾煎一鍾食後服

雙荷散　治卒暴吐血

藕節七個　荷葉頂七個

搗碎入蜜用水二鍾煎八分去渣溫服或研

末蜜調下

麥冬飲子　治吐血久不愈者

五味子十粒　麥門冬　黃芪各一錢　當歸　人參

生地黃各五分　水煎服

白朮散　治飲食過度負重傷胃吐血

白朮　人參　黃芪炙　白茯苓各二錢　炙甘草一錢

山藥　百合　柴胡　前胡各六錢

分作三帖每服加姜棗水煎

又方　治同上

理中湯加葛根

雞蘇散　治勞傷肺經吐紅咽喉不利

紫蘇葉　白茅花　黃芪　生地　阿膠各二錢

麥門冬　桑白皮　桔梗　貝母　蒲黃炒

甘草　加姜棗煎服

天門冬湯　治思慮傷心吐衄不止

天門冬　白芍藥　麥門冬　生地黃　遠志

藕節　黃芪　阿膠　沒藥　當歸

甘草各一錢五分　人參一錢

分作二服姜三片水煎服

蓮心散　治同上

蓮子心　糯米各五十粒　為末空心溫酒調服

歸脾湯　治思慮傷脾心多健忘其血妄行或吐或下

白朮　茯神　黃芪炙　人參　酸棗仁炒各二錢五分

木香一錢　炙甘草五分　龍眼肉五枚

姜一片棗一枚水煎服

赤茯苓湯　治大怒傷肝氣逆于胸吐血衄血

赤茯苓　人參　桔梗　陳皮各三錢　麥門冬

芍藥　檳榔各一錢五分　分二服姜三片水煎

丹溪方　治見血後脾胃弱精神少血不止者

人參一錢　黃芪二錢五分　五味子十三粒　芍藥　甘草

當歸　麥門冬各五分　加鬱金尤妙水煎服

又方　治同上

人參　白朮　茯苓　陳皮各一錢　甘草　川芎

半夏曲各五分　神曲　青皮各三分　水煎服

如胃不和加藿香　渴者加葛根五分

痰結塊者加貝母一錢　黃芩　橘紅各五分

小便赤加黃栢五分　大便燥結加當歸七分

心煩加酒晒黃連五分　小便滑加牡蠣

若見血多去半夏恐燥加生地一錢　牡丹皮五分

桃仁三分　若胃中不足飲食少進加炒山梔

仁五分　若血溢入濁道留敘膈間滿則吐

紅蘇子降氣湯加人參阿膠各五分

上膈熱壅吐血者以四物湯加荊芥阿膠各五分

更不止于本方中加大黃滑石各五分

胃傷吐血宜理中湯加川芎乾葛各五分　此是

飲酒傷胃也　吐血不止茜根為末用二錢

待冷食後服良

必勝散　治男婦血妄流溢或吐或咳或衄

小薊　人參　蒲黃　當歸　熟地　川芎

烏梅去核各一兩　每服六錢水煎服

大阿膠丸　治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或

有鮮血勞傷脾胃吐血嘔血並皆治之

方在後咳血門

止血之劑

白芨散　治吐血

白芨末井花水調服每服二錢

地黃飲　治衄血吐血

新生地搗煮日服数升三日愈

此方治經閉効甚

乾姜散　治吐血不止

姜炭為末童便調服

治諸血上行用韭菜汁姜汁童便磨欝金飲之其血自清如無欝金以山茶花代之

又方　用血餘灰三錢　為末冷水調下

治吐血咯血用藕節搗汁飲之

花蕋石散　治労証五内崩損湧噴血出成升斗者服之立止

花蕋石煆為末童便一鍾煎温調藥末三錢極甚者五錢食遠服如男子病則和酒一半婦人病則和醋一半與童便和調服之立止其瘀血化為黄水服此藥後患人必疎解其体却服獨参湯補之

調氣止血之劑

芎附散　治衄吐血不歸経

川芎二兩　香附四兩　為末每服二錢茶湯調下

綱目云治怒氣傷肝氣而嘔血以黄連香附青黛柴胡甘草平其肝自愈宜服赤茯苓瀉心湯

大七氣湯入川芎煎調蘇合香丸

咳血（咳嗽有声而痰内有血者是也或咳出純是血痰）

丹溪云乃火升痰盛　身熱多是血虛四物湯加減用

丹溪云痰帶血絲出童便竹瀝止之　經血逆行或血腥吐血唾血韮汁服立効　咯血用姜汁童便青黛入血藥中加四物湯牛膝膏地黄膏之類

又方用韮汁童便二物加欝金研細末合和服之其血自消

脉大發熱喉中痛者是氣虛用参芪蜜炙黄栢荊芥地黄當歸韮汁童便姜汁磨欝金飲之其血自消（火補兼解欝也）

統旨云嗽出痰内有血者名咳血又云嗽血其因有二熱壅于肺者易治不過凉之而已久嗽損於肺者難治火已成勞也熱嗽有血宜金沸草散加阿膠痰盛加瓜蔞仁貝母勞嗽有血宜補肺湯加阿膠白芨嗽血而氣急者加杏仁痰中帶血絲者火是陰虛火動勞傷肺臟（宜滋陰保肺湯）

入方

香附（童便浸）　北杏仁（童便浸去皮尖炒）　山梔仁（炒）　青黛

海粉　瓜蔞仁　訶子　馬兜鈴

為細末入白硼砂少許煉蜜少加姜汁為丸噙化一丸白湯下

天一丸　火壯水之主以鎮陽光劑也與前方相兼服治陰虛火動咳血等症甚効

懷地黄　牡丹皮　黄栢（童便浸晒乾）　知母（童便浸晒乾）

枸杞子　五味子　麥門冬　牛膝　白茯苓

為末煉蜜為丸梧子大空心白湯吞下八九十丸

天門冬丸　潤肺止嗽治咯血吐血咳血

方在咳嗽門

丹溪鹿黄丸　治酒色過度飢飽失時吐血咳血痰血神効

枇杷葉　款冬花　北紫菀　杏仁（去皮尖）　木通

鹿茸（炙）　桑白皮（各一兩）　大黄（五錢）

為末煉蜜為丸臨睡含化

七傷散　治血汚血鬱血熱勞嗽吐血血痰方丹溪
黄藥子　白藥子各一兩　赤芍藥七錢五分　玄胡索
知母各五錢　鬱金二錢半　當歸五錢　山藥　乳香
沒藥　血竭各二錢　為末每服二錢茶湯下
綱目云肺熱咳方極有効本草云白藥子黄藥子治肺熱大有功一方紅花當歸煎湯調下

海藏甘桔加阿膠紫苑湯　治肺痿咳唾膿血
方見綱目傷寒咽痛門

羅太無大阿膠丸　治血虛嗽血吐血
阿膠微炒　卷栢　生地　熟地　大薊　山藥

八九卷　三三

鷄蘇葉　五味子各一兩　栢子仁另研　麥門冬
茯苓　百部　遠志　人参　防風各五錢
為末煉蜜丸如弾子大煎小麥門冬湯嚼
下一丸綱目云保養精血純補劑也血虛有熱者宜之

刼勞散　治肺痿痰嗽痰中有紅線盗汗發熱過
則冷飲食減少　方在咳嗽門
陳日華云有一女子及笄病症甚危百藥不効偶得此只一料除根

羅太無五味黄芪散　治嗽咯血成勞眼痛四肢
困倦脚膝無力
麥門冬　熟地黄　黄芪　桔梗各五錢　白芍藥
五味子各二分　人参二錢　甘草一分
每服五錢水煎服一日三服

人参黄芪散　治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠
五心煩熱咽乾頰赤心冲潮熱盗汗減食咳嗽
膿血
人参一兩　秦芁　茯苓各二兩　知母二錢五分　桔梗一兩
桑白皮一兩五錢　紫苑　柴胡各二兩　半夏洗一兩五錢
黄芪二兩五錢　鼈甲去裙酥炙二兩　每服五錢水煎服

八九卷　三三

人参蛤蚧散　治二三年間肺氣上喘咳嗽咯吐
膿血滿面生瘡遍身黄腫
蛤蚧一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣酥炙黄色　杏仁去皮尖炒五兩
甘草炙三兩　人参　茯苓　貝母　知母各二兩
桑白皮二兩　為細末每日如茶點服神効
海藏云蛤蚧補肺勞虛嗽治久嗽不愈肺間積虛
熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞
胸膈噎痛用蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角
各一兩除膠外皆為屑次入膠分四服每服用

河水三升於銀石器內慢火煮至半升去滓臨
卧微温細細呷之其滓候服盡再槌都作一服
以水三升煎至半升如前服病人久虛不喜水
當歳水（蛤蚧係補中有通久熱不愈者宜之）
麥門冬湯　治傷寒後傷肺咳唾膿血胸脇脹滿
上氣羸瘦
麥門冬　桑白皮　生地黄（各一兩）　紫菀　竹茹
半夏（洗）　桔梗（炒）　麻黄（去根節各七錢五分）　五味子
甘草（各五錢）

一為粗末每服五七錢加棗三枚去核（姜三片水煎服）
羅太無續斷散　治骨蒸勞熱傳屍瘦病潮熱煩
躁喘嗽氣急身疼盜汗兼治咳嗽吐膿血
續斷　紫菀　桔梗　竹茹　五味子（各三錢）
生地　桑白皮（各五兩）　甘草（炙二兩）　赤小豆（半斤）
每服五七錢入小麥五十粒水煎日三服
海藏紫菀湯　治咳嗽吐血虛勞症肺痿变癰
方在咳嗽門
本事方云治勞瘵吐血損肺及血妄行神傳膏用

剪草一斤婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜
草又如細辛每用一斤淨洗為末加入生蜜一
斤和為膏以器盛之不得犯鉄九蒸九晒日一
蒸曝病人五更起面東坐不得語用匙挑藥如
粥服每服四匙良久用稀粟米粥壓之藥冷服
粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺
損咯血只一服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙
可也神驗
治肺經嘔咳諸血及痰中有血初生用蘿蔔汁半
盞入塩少許服之立効如無生蘿蔔用蘿蔔子

一錢紫蘇葉一錢同煎服次用鷄蘇散加阿膠
治之（本草云蘿蔔大下氣氣下則血亦下也）
經驗方　治咳嗽甚者或有吐血
鮮桑白皮（一斤米泔浸三宿淨刮去上黄皮）
右剉細入糯米四兩焙乾同搗為末每服一
二錢米飲調下
本事方　治久嗽咯血成肺痿及吐白涎胸膈滿
悶不食扁荳散

扁荳 生姜各五錢 枇杷葉去毛 半夏 人參
白术各一分 白茅根三分
右水三升煎一升去渣加檳榔末一錢和匀
分作四服不拘時候

千金方 治上氣咳嗽喘息喉中有物唾血
生姜汁 杏仁各二升 糖 蜜各一升 猪膏二合
右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭
令淨擣如膏和姜汁蜜糖等合煎令可丸每
服杏仁一枚日夜服六七次漸次增加

款花補肺湯
人參 麥門冬各一錢二分 五味子十五粒 款冬花
紫苑 桑白皮炒各一錢 當歸一錢五分 芍藥 知母
貝母 茯苓 橘紅各八分 甘草五分
水煎服

寧嗽湯
五味子十五粒 茯苓一錢 桑白皮一錢二分 陳皮壹錢
知母一錢 馬兜鈴一錢五分 川芎一錢 麥門冬一錢二分
粉草五分

滋陰保肺湯
黃栢鹽水炒 知母 天門冬一錢二分 當歸一錢五分 芍藥
生地 橘紅 紫苑 桑白皮炒各八分 大粉草五分
阿膠蛤粉炒一錢二分 五味子十五粒 水煎服

咯血唾血痰涎血

咯血者喉中常有血腥一咯血即出或鮮或紫者是也　又如細屑者亦是也治法四物入姜汁童便青黛之類有咯出痰帶血絲者同治但宜加痰火藥

唾血者鮮血隨唾而出者是也二者皆出于腎亦有瘀血内積肺氣壅遏不能下降用天門冬知母貝母桔梗黄栢熟地遠志或加炮姜

生生子曰唾血症曾見二人口中津唾皆是紫黑血水如猪血之色晦而不鮮形瘦体熱盜汗為有怫鬱所致如此者年餘治以清痰降火開鬱等藥或止或發其一乃娃婦也後因注舡大吐痰涎數椀其症再不復萌由是觀之唾血亦有木鬱之症不可不知

痰涎血出于脾以葛根黄芪黄連芍藥當歸甘草沉香之類主之

丹溪曰咯血痰帶血絲出者用姜汁青黛童便竹瀝入血藥中用如四物湯加地黄膏牛膝膏之類

滑伯仁曰寒凉之溢水乃瀉火也温熱之助火乃折水也衄血手陽明循手經上行入清氣道中咯血乃入于所合也所合肺也

又曰咯血為病最重且難治者以肺手太陰之經氣多血少又肺者金象為清肅之臟今為火所制迫而上行以為咯血逆之甚矣上氣見血下聞病音謂喘而咯血且咳嗽也

唾血責在下焦陽火煎迫而為之也腎主唾為足少陰少血多氣故其証亦為難治

恩袍散　治咯血吐血唾血及煩躁咳嗽

生蒲黄　乾荷葉　茅根各等分

為末每服三錢濃煎桑白皮湯食後温服

丹溪方　治咯血

桑白皮一錢五分　半夏炒　知母　貝母　茯苓各一錢

生地黄　陳皮各一錢　阿膠炒　甘草　杏仁炒各五分

山梔子　桔梗各七分　柳桂二分入此以治上焦

姜葱白水煎服

又方　治喀血與衄血

白芍藥一兩 犀角二錢五分
各為末新汲水調服一錢血止為限
又方 治咯血
荷葉焙乾 為末米湯調下二錢
又方 治痰中血
白朮一錢五分 貝母 芍藥 桑白皮 桃仁各一錢
甘草三分 山梔炒黑一錢二分 牡丹皮一錢五分 水煎服
又方 治痰中血
橘紅一錢五分 半夏 茯苓 貝母 牡丹皮
桃仁各一錢 黃連 甘草 大青各五分

姜三片水煎服
又方 治痰中血
橘紅二錢 半夏 茯苓 白朮 枳殼 黃芩
桑白皮各一錢 五味子十五粒 甘草三分 人參五分
或加青黛五分水煎服
地黃散 治一切吐血咯血能解一切毒及諸熱
煩燥
茜草根四錢 大薊子 黃藥子 甘草各二兩

右為末每服二錢新汲水調下加人參二兩
治痰嗽有血
又方 治吐血熱渴
茅根一味絞汁飲之一日三服効
治虛劳久嗽咯血
五倍子炒為末 每服一錢溫茶調匀米飲送下
白芨散 治咯血
白芨一兩 藕節五錢 為細末每服一錢白湯調下神
効 或云白芨下咽直至血竅〻為之填而血
止也 醫說云治肺損咳血殊効

四血散 治衄血吐血便血
益元散加當歸井泉石 淋者加梔子莖中痛
加蒲黃 水瀉加車前子 米飲調下
元戎方 治鼻血口血大小便血 服時隨病上下食前後服
丹參 蒲黃 紫蘇 滑石等分 為末調服

鼻衄

陳無擇曰衄者因傷風寒暑濕流傳經絡涌泄于清氣道中而致者皆外所因積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷腎暴喜傷心皆能動血隨氣上溢而致者皆内所因飲酒過多啖炙煿辛熱或墜墮車馬傷損而致者皆不内外因也

原病式曰衄者陽熱怫欝干於陽明而上熱則血妄行而鼻衄也

丹溪云衄與吐血同凉血行血為主犀角地黄湯加欝金

又曰衄血出于肺以犀角升麻梔子黄芩芍藥生地黄紫菀丹参阿膠之類主之愚謂言肺者以竅言也言陽明者以血海言也其治亦多相須

戴元禮曰鼻通於脳血上溢於脳所以從鼻而出治宜茅花湯調止衄散服之　有頭風自衄頭風綫發則血不止治頭風兼止衄之劑　有因虚致衄者此為下虚上熱不宜過用凉劑宜四物湯加参芪沉香磨服　傷濕而衄腎著湯加川芎　伏暑而衄茅花湯調五苓散　上膈極熱而衄犀角地黄湯加黄芩茅花荊芥虚者茯苓補心湯　飲酒過多而衄茅花湯加川芎乾葛　病衄愈後血因舊路一月或三四衄又有洗面而衄日以為常四物湯加阿膠蒲黄仍佐以蘇子降氣湯使血隨氣下

綂旨謂風行水動氣行血流治衄者則知血藥以治衄而不知氣降則血歸經古人所以血藥中必加氣藥一二味如上所謂蘇子降氣湯之類是也前人謂身熱則死寒則生亦是大槩言之耳豈無熱生而寒死者乎必兼詳脉症而後可也

治風寒之劑

桂枝湯　方見傷寒

治熱之劑

犀角地黃湯 方見吐血門

茜根散 治鼻衄不止

茜根 阿膠蛤粉炒 黃芩 側栢葉 生地各一兩 甘草五錢 加姜三片水煎服

黃芩芍藥湯 治鼻血不止

黃芩 芍藥 甘草 水煎服

川芎三黃散 直指方 治實熱衄血

大黃濕紙煨 川芎 黃連 黃芩各等分

右為末每服二錢井水調下食後服

黃連散 經驗方 治大人小兒盛熱乘于血血隨熱氣散溢于鼻謂之鼻衄凡血得寒則凝澁結聚得熱則流散妄行

黃連 黃芩 栢葉 甘草各等分 豆豉三十粒

右每服一兩水煎服

治血衄血汗以人中白新瓦上焙乾為末入射香少許酒調下

生地黃湯 治榮中有熱及肺壅鼻衄生瘡一切丹毒等疾

生地 赤芍 當歸 川芎各等分

水煎食後溫服 若鼻衄加蒲黃生瘡加黃芩丹毒加防風

濟生麥冬飲 治衄血不止

麥門冬 生地黃各等分 每服一兩水煎服

一方 治鼻衄及酒疸黃沙淋

萱草根搗汁一鍾生姜汁相和時時細呷

貫衆散 治鼻衄

貫衆根 為細末水調一錢立止

羅太無寸金散 治鼻衄不止

黃藥子五錢 土馬鬃五錢有足者 生甘草一錢

右為末每服二錢新水調下未止再服立差

本草云土馬鬃即苔與垣衣之類垣衣生墻垣之側土馬鬃生墻垣之上皆陰古墻上有

一方 治衄血

蛀竹末米糊調下二錢効

茅花湯 治衄

茅花一大握剉水煎飲之立止

清熱帶補之劑

生地黄散　治咯血衂血吐血諸血証皆治之

枸杞子　柴胡　黄連　地骨皮　天門冬

白芍藥　甘草　黄芩　生地黄　熟地黄

各等分水煎服　治便血加地榆

海藏龍腦鷄蘇丸　治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衂血熱驚悸脾胃口瘡吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩等疾

薄荷一斤　麥門冬去心　阿膠炒　黄芪　蒲黄炒

人參已上藥俱　木通　銀柴胡各二兩剉同木通浸一宿絞出汁

生地黄六兩　甘草一兩五錢　黄連一兩

右為細末好蜜二斤先煎一二沸然後下生地黄末不住手攪勻加木通柴胡汁浸熬成膏勿令火緊焦了然後加前藥末和丸如豌豆大每服二十丸白湯下　虛勞虛煩梔子湯下　肺熱黄芩湯下　心熱驚悸恍惚人參湯下　咯唾吐衂麥門冬湯下　肝熱防風湯下　腎熱黄栢湯下　治五淋及婦人漏下車前子湯下　痰嗽者生姜湯呑下　莖中痛蒲黄滑石水一鍾調下　氣逆者橘皮湯下　室女虛勞寒熱潮作柴胡人參湯下

地黄飲　治衂血往来久不愈者甚効

生地黄　熟地黄　枸杞子　地骨皮各等分

右為末每服二錢蜜湯調下日三服

補虛之劑

止衂散

黄芪六錢　赤茯苓　白芍藥　當歸　生地

阿膠炒各三錢　為末以黄芪湯調下三錢

產後鼻衂

大全云產後口鼻黑氣起及鼻衂者名胃絶此証不可治遇有此者急取緋線一條并產婦頂心髮兩條緊繋中指節即止

治產後鼻衂中風以荊芥為末童便調下氣虛者不可用

齒衂又名牙宣

統旨云血從齒縫中或齒根出者謂之齒衄有風壅有腎虛風壅者消風散外以祛風擦牙散腎虛者以腎主骨齒者骨之餘虛火上炎服凉藥而愈甚此屬腎經下虛而上盛宜鹽湯下安腎丸間服黑錫丹仍用青鹽炒香附黑色爲末擦之亦有胃熱而牙斷出血者宜清其熱清胃散主之

附方

附後方　治齒血不止

苦竹茹以醋浸一宿含之

千金方　治同

礬石一兩滚湯三升煮取一升先拭齒乃含之

又方　濃煎竹葉湯入塩少許含之

衍義方　治齒縫出血不止

用紙撚蘸蟾酥少許插入出血處立止

靈苑方　治虛氣攻牙齒痛血出牙齦痒痛

骨碎補二兩細剉炒黑色爲末擦之早晨漱久吐出臨睡擦畢候津液滿口嚥之

丹溪治陰虛牙出鮮血氣鬱四物湯加香附牛膝生甘草側栢葉服

羅太無治牙痛腫痒動搖牙斷宣露出血口氣等疾

當歸　藁本　地骨皮　防風　白芷　槐花

川芎　甘草　升麻　北細辛各等分

爲末擦痛處甚者取三錢水鍾半黑豆半合生姜三片煎至一鍾乘熱漱之冷則吐出

本事方　治一切牙疼風熱斷常出鮮血以至崩落口臭不可近人者宜服之

大黃米泔浸軟切片　生地黃大者薄切

右二味旋切各用一二片合定貼所患牙上一夜即愈未全可再如前用忌說話恐引風毒津液漬患處

舌衄

舌上或出血如簪孔者香薷汁服一升日三服

又方　髮灰二錢米醋調敷舌上血出處

文蛤散　治熱壅舌上出血如泉

五倍子洗　白膠香　牡蠣粉各等分

右為末每用少許掺患處或燒熱鉄熨孔上

槐花散　治舌上無故出血如線

槐花炒為末掺之仍用麥冬煎湯調下妙香散

妙香散　方在婦人門第二卷夢與鬼交條下

肌衄　一名血汗　入九卷　兒

河間定命散　治膽受熱〻血妄行鼻中衄蠛弁

血汗不止

硃砂　寒水石　麝香　為末每用五分新

汲水調下不拘時候看老幼虛实加减

肌衄者血從毛孔而出前人多主于肺熱

古方以男胎髮燒灰撲之

大全竹茹湯方見便血條

黄芪建中湯　辰砂妙香散

小便血　溺血不痛〻者乃血淋也當與淋門參治

經云胞移熱于膀胱則癃溺血

仲景曰熱在下焦則尿血亦令淋閟不通

玄珠經云小便出血是心伏熱在于小腸宜鏡面

竹自然汁加生蜜一匙服之或以八正散加麥

門冬葱煎服如小便澁痛以海金沙細末調之治

綱目云胞絡絕則溲血故經曰悲哀太甚則胞絡

絕胞絡絕則陽氣内動發則心下崩數溲血也

凡咳而溲血脫形其脉小勁是逆也

入九卷　弄

凡淋不可發汗〻之必便血〻不止用秭一箇

燒存性為末米飲調下

統旨云属熱属血虛有因心腎氣結所致或憂劳

房室過度此得之虛寒不可專以血為熱而涼

二者皆致溺血熱用小薊湯四物湯煎服劾虛

用四物湯調牛膝膏火動禁血妄行者再加黄

栢知母虛寒者十全大補湯加炒蒲黄

滑伯仁曰小便血足太陽隨經入膀胱也與小腸血同

附方

治房失勞傷小便出血

山藥（一兩） 鹿角（五錢） 髮灰（二錢） 為末苧根搗汁打糊為丸梧子大每服五十丸空心食前白湯下（香）

治大小便出血不止

劉寄奴為末茶清調服立止

治尿後有乾血 乾柿餅三枚燒灰陳米湯調服

羅太無髮灰散 治小便尿血

髮灰（本草云髮灰能消瘀血通關格利水道破癥瘕血衄丹溪云髮補陰甚捷）

右一味每用一二錢以米醋二合湯少許服

并花水調亦可

一法茅草根車前子煎湯調下尤妙兼治肺疽心…衄內崩吐血一兩口或舌上出血如針孔若鼻…衄吹內立已

葛氏方 治小便出血

當歸（四兩） 酒（三升） 煎一升頓服

肘後方 治尿血

苧麻根十根水五升煎取二升一服効

外臺秘要 治尿血

車前草汁五合空心服（加茅草根汁亦妙或酒少許冲服）

小薊飲子 治下焦結熱尿血成淋

生地（四兩） 小薊根 滑石 通草 山梔仁 當歸（酒洗） 淡竹葉 藕節 蒲黃（炒） 甘草（各五錢）

右每服一兩水煎空心服

丹溪云尿血有實熱者可用當歸承氣湯後以四物湯加山梔（當歸承氣湯即調胃承氣湯加當歸是也）

又方 治溺血屬熱 山梔（炒） 水煎服

或用小薊琥珀 血虛者四物湯加牛膝膏

又方 治血淋

木通 甘草梢 瞿麥 山梔 水煎服

濟生鹿角膠丸 治房室勞傷小便尿血

鹿角膠（五錢） 沒藥（另研） 油頭髮灰（各三錢）

右為末用茅根湯打糊為丸如梧桐子大每五十丸鹽湯送下

玉屑膏 治氣虛尿血并五淋砂石疼痛不可忍

黃芪 人參（各等分） 為末用大蘿蔔切一指厚三四片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二

兩為度勿令焦至熟蘸黃芪人參末吃不時
仍以塩湯送下
又方 治老人小兒尿血不止
川升麻一兩半作一帖水煎服妙
又方 治虛而尿血
阿膠三兩炙搗為末酒二升和温服
當歸散 治婦人小便出血或時尿血
當歸 羚羊角 赤芍藥(各五錢) 生地黃(一兩)
大薊葉(七錢半) 分作三帖水煎食前服

六味地黃丸 治老人尿血及陰虛尿血
玄胡散 治尿血作痛
玄胡索(一兩) 朴硝(三分) 水煎服
五倍湯 治尿血不止
五倍子煎湯露一宿次早取上面清者温服
龍骨散 治尿血
龍骨末(一錢五分)水調服日三服瘥(此二方皆收澁之劑)
治溺血血淋方 小薊根 琥珀
二味為末水煎服盖二味能治下焦熱結

琥珀散 治五淋澁痛小便膿血
琥珀 海金沙 沒藥 蒲黃(各一兩)
為極細末每服三錢食前煎萱草湯調下
治血淋及小便閉方
杜牛膝根(二兩) 朴硝(一兩) 用雪水二碗煎牛膝至
一碗去渣入朴硝攪勻空心服
治小便出血莖痛不可忍
淡豆豉(一撮) 煎湯温服之甚効
治血淋方

牛膝(一兩) 黃柏 知母 澤瀉(各一兩) 麥門冬
天門冬 山梔仁(各一兩半) 生地黃(二兩)
為末粥糊丸如梧桐子大每空心白湯吞下
八九十九
又方 治同上
人參 白术 川歸 熟地 川芎 山查
茯苓(各八分) 黃芪(七分) 升麻(三分) 水煎服
又方 治同上
牡丹皮 當歸 生地 山梔子 白芍

甘草梢　滑石　澤瀉　白茯苓　木通
各等分每服五七錢加生姜皮二分灯心一
分水煎食前服

下血

素問云結陰者便血一升再結二升三結三升駱
龍吉云結陰之病陰氣内結不得外行血無所
稟滲入腸間故便血也其脉虚澁因血結不行故下
本事方云如下清血色鮮者腸風也血濁而色黯
者臟毒也肛門射血如線者虫痔也

八九巻　五五

仲景云下血先便後血者此遠血也黄土湯主之
先血後便者此近血也赤小豆當歸散主之
潔古云　治血下防風為上使黄連為中使地楡
為下使　若血瘀色紫者陳血也加熟地黄
若血鮮色紅者新血也加生地黄　若寒熱者
加柴胡　若肌熱者加地骨皮　若脉洪実痛
甚者加酒浸大黄
生生子曰便血有湿有熱有虚有寒有食積有酒
積有風入大腸治之ゝ法切不可純以寒凉損
壊脾胃脾虚尤不能約束其血也故丹溪戒人
凡用血薬不可単行単止不可純用寒凉必于
寒凉中加辛味為佐久不愈者復用温薬必兼
升挙薬中加酒炒酒煮凉薬如酒煮黄連之類
丹溪曰腸風獨在胃與大腸出治用黄芩秦艽槐
角升麻青黛　定腸風痛用蒼朮滑石當歸生
地黄芩甘草　下血属虚者當温散之四物湯
加乾姜升麻　便血過多者四物湯加蝟皮
有熱者四物湯加山梔升麻秦艽阿膠　有熱

八九巻　五六

風者蒼朮秦艽芍薬香附　胃清血非鬲實不除
玄珠経云大便下血曰腸風切勿止澁宪其本末
症状先清其表後攻其裏其血自止如脉洪大
又當以四物合解毒湯調理
熱則流通虚則下溜故便血属熱属虚亦有風傷
肝而下陥及湿盛而傷血者　熱而下血或清
或濁宜四物湯加黄芩山梔炒槐花秦艽膠珠
虚者四物加乾姜升麻凉薬隨虚実加減　風
傷胃獨下清血者宜四物湯加防風升麻荊芥

柴胡升提之　濕入腸胃下如豆汁色者宜四物加蒼术白术黄連黄栢地榆槐花　陰虛下血無熱者十全大補湯加止血之劑

綂旨云便血或清或濁或鮮或黑或在便前或在便後或與泄物並下此由内外有所感傷凝停在胃隨氣下通亦是妄行之意便血清者屬榮虛有熱濁屬熱與濕色鮮者屬火黑者火極先血後糞為近先糞後血為遠與泄物並下者屬有積在内或絡脉傷也並宜分治又當别其色

而分寒熱也色鮮多因腸胃蘊熱必是飲酒過多辛熱煿炙之故也宜連蒲散或黄連阿膠湯色瘀或因寒邪凝滯血逐冷氣入客腸胃宜理中湯加膠珠炒黑香附其應甚捷大抵下血後必以胃藥收功胃氣回血自循其經絡矣

伏暑純下鮮血黄連香薷飲治之（方見傷暑門）

風熱流入大腸經下血不止敗毒散治之（方見傷風門）

風濕乘虛入於腸胃下清血或下瘀血胃風湯治之

滑伯仁曰大便前後下血便前由手陽明隨經下行滲入大腸傳于廣腸而下也便後由足陽明隨經入胃淫溢而下者也古人謂近血遠血者是也又有所謂腸風臓毒者腸風則足陽明積熱久而為風風以動之也臓毒則足太陰積熱久而生濕從而下流也風則陽受之濕則陰受之

和中去濕之劑

東垣升麻補胃湯　治宿有腸血症因五月大熱吃杏腸澼下血遠三四尺散漫如篩腰沉沉然

腹中不痛血色紫黑病名濕毒腸澼是陽明少陽經血症

升麻　柴胡　防風（各一錢半）　羌活（一錢）　當歸身　葛根（各二分）　獨活　白芍　生地　丹皮　熟地　甘草（炙各五分）　黄芪（一錢）　肉桂（少許）　水煎食前服

和中益胃湯　治太陰陽明腹痛大便常溏泄設不泄即秘結在後傳為濕熱毒下鮮紅血腹中微痛脇下急縮脉緩而洪弦中指下得之按之空虛　熟地（三錢）　歸身（酒洗）　甘草（炙）　益智（各三分）　升麻

柴胡各五分 蒼朮一分 藁本二分 水煎食前服

升陽除濕和血湯 治腸澼下血另作一派其血唧出有力而遠射四散如篩下春二月中旬日下二行腹中大作痛乃陽明氣冲熱毒所作也當升陽去濕熱和血脉不兩服而愈

生地 丹皮 甘草生炙各五分 白芍一錢半 熟地 黃芪各一錢 升麻七分 歸身 蒼朮 秦艽各三分 肉桂 陳皮各二分 水煎食前服

當歸和血散 治腸澼下血溼毒下血

槐花 青皮 荊芥 熟地 白朮各六分 當歸 升麻各一錢 川芎四分 為末食前米飲調下

椿皮丸 本事方 臭椿皮四十兩 蒼朮 枳殼各二兩 為末醋糊丸梧子大空心食前米飲下三四十丸

玉屑丸 治腸風瀉血久不止者

槐根白皮去粗皮 苦練根去皮各三兩 椿根白皮三四兩于九月後二月前採陰乾 天南星 半夏並生用各五錢 葳靈仙乙兩 寒食麵三兩 右末滴水丸梧子大每服三十丸以水一鍾煎沸下丸子煮令浮以匙抄起溫溫送下不要嚼空心食前服有人下血幾盈盆頓爾疲萎諸藥不効許學士以此治之良愈

槐花飲 治腸風有濕脹滿下血

蒼朮 厚朴 陳皮 當歸 枳殼各一兩 槐花二兩 甘草 烏梅各五錢 每服一兩水煎空心服

治下血方

椿根白皮去粗皮 枯白礬一兩 甘草 滑石等分 血竭五錢 人參三錢 黃連二錢 共為末米飲下

治寒之劑

烏荊丸 治腸風

川烏頭一兩泡去皮尖 荊芥穗二兩 為末醋丸桐子大每服二十丸酒送下白湯亦可下病發時日進三服不發時日進一服

黃土湯 治先便後血名遠血

粉草 熟地 白朮 附子炮 阿膠 黃芩已上各三兩 灶中土半升 右七味以水八升煮取三升分作三服

赤豆當歸散 治先血後便名近血

赤小豆五兩浸令芽出曬乾 當歸一兩 為末白湯調下二錢日三服 梅師云治熱毒下血或因食熱物發動以赤小豆杵末水調下方寸匕

又方 治腸風 赤小豆炒黑為末每服二錢米飲調下由此觀之赤小豆寒熱皆能治也

益智和中湯 治腸澼下血紅或深紫黑色腹中疼腹皮惡寒右三部脉中指下得之俱弦按之無力關脉甚緊肌表陽明分凉腹皮熱而喜熱物熨之內寒明矣 升麻 甘草炙 歸身 黄

芪各一錢 葛根 益智 半夏 丹皮 柴胡 白芍半錢 桂枝 肉桂 乾姜少許 水煎食後服

羅太無治真定總管因免強飲酸酒得腹痛次傳泄瀉十餘日便後見血或紅或紫腸鳴腹痛医以諸見血皆熱治以芍藥栢皮湯之類前証如故仍不欲飲食々則嘔酸形体愈瘦面青黄不澤心下痞惡冷物口乾時有煩躁不得安卧請予治之診得脉弦細而微遲手足梢冷內經曰結陰便血一升再結二升三結三升又曰邪至五臟則陰脉不和陰脉不和則血留之結陰者病陰氣內結不得外行血無所禀滲入腸間故便血也以平胃地榆湯主之

蒼朮一錢 厚朴 陳皮 茯苓 白朮 乾葛 甘草炙各五分 乾姜 當歸 炒麯 白芍 人參 益智仁各三分 地榆七分 升麻 黑附子炮各一錢 生姜三片棗二枚水煎食前温服

此藥温中散寒除濕和胃数服病减大半又灸中脘二七壯引胃氣上升次灸氣海百壯

生發元氣以还少丹服之以長肌肉至春再灸三里三七壯治脾壯胃生發元氣次服芳香之劑慎言語節飲食而安

江海藏云治楊師醉醒發大渴飲水三大盞又飲冷茶三碗後病便鮮血四次得一盆先與吳茱萸丸次日又與平胃五苓各半散三大服血止後自利又與神應丸四服自利乃止或問曰何不用黄連之類以觧毒予曰若用寒藥其疾大变難治寒飲內傷復用寒藥非其治也况血為

寒所凝入大腸間而便下血溫之乃所以得熱則自止
楊氏飲冷酒瀉血對金散止之亦是理中脘分別
陰陽安定血脉之意也　唐生病因飲酪水及
食生物下利紫黑血十餘行脾胃受寒濕與六
神平胃散半兩加白术三錢以利腰臍間血一服愈
胃風湯　治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀
不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀
血日夜無度　人參　茯苓　川芎　官桂
白术　當歸　芍藥各等分　每服五六錢加粟米
一八九卷　八　六二
百粒同煎稍熱服若加熟地黃黃芪甘草等分名
十補湯　若虛劳嗽加五味子　有痰加半
夏　發熱加柴胡　有汗加牡蠣　虛寒加
附子　寒甚加乾姜皆依本方等分　骨蒸
發熱飲食自若者用十補湯加柴胡一兩
氣弱加人參小便不利加茯苓　脉絃澁加
川芎　悪風加官桂　脉澁加當歸　腹痛
加白芍　胃熱濕盛加白术
阜豆蔻散　治丈夫傷血婦人血崩潰入大腸出血

草豆蔻　檳榔各炒紫色　罌粟殻燒灰
等分為末每服二錢米飲下
濟生剪紅丸　治臟腑虛寒下血不止面色痿黃
日久羸瘦　側栢葉炒黃　鹿茸火去毛酥炙　附子炮去
皮臍　川續斷酒浸　黃芪　阿膠蛤粉炒　白礬枯五錢　當歸
酒浸各一兩　為末醋煮米糊為丸如桐子大每服七
十丸空心米飲下
羅氏無結陰丹　寒濕下血者為結陰治腸風下
血臟毒下血諸大血疾
一八九卷　六四
枳殻麩炒　威靈仙　黃芪　橘紅　椿根白皮
何首烏　荊芥穗各五錢　為末酒糊丸桐子大
每服七十丸陳米飲入醋少許煎過少冷送下
血熱之劑
黃連湯　治大便後下血腹中不疼謂之濕毒下血
黃連　當歸各五錢　甘草炙五分　水煎食前服
聚金丸　治腸胃積熱或酒毒大便下血腹中熱
痛煩渴脉弦数
黃連四兩四製生乙兩酒炒乙兩灰火煨乙兩姜汁炒乙兩　黃芩乙兩

防風兩乙右為末糊丸桐子大每服五十丸米泔
浸枳殻水下
保命集芍藥黃連湯　治大便後下血腹中痛謂
之熱毒下血
芍藥　黃連　當歸各五錢　淡桂五分　甘草炙二錢
大黃　右每服一兩水煎服　如痛甚者加木
香檳榔末各一錢調下
抜萃涼血地黃湯　如飲食不節起居不時陰受
之陰受之則入五臟入五臟則填滿閉塞下為

飧泄久為腸澼水谷與血另作一派唧出也時
令值夏濕熱太盛正當客氣勝而主氣弱也故
腸澼之証甚以湯主之
熟地　當歸　青皮　槐花炒各五分　知母炒　黃柏炒各乙錢
水煎服　如腸下悶小便澁或大便後
重調木香檳榔末各五分稍熱空心服如裏
急後重又不去者宜下之如有傳變隨症加減治之
一方　槐花　荆芥穗各等分　為末酒調下一錢半
空心仍食猪血妙

連蒲散
黃連　蒲黃炒各一錢二分　黃芩　當歸　生地黃
枳殻麸炒　槐角　芍藥　川芎各一錢　甘草五分
如酒毒加青皮乾葛去枳殻　濕毒加蒼朮
白朮　水二鍾煎一鍾食前服
槐角丸　治五種腸風下血痔漏脫肛
槐角三兩　地榆　黃芩　當歸　防風　枳殻麸炒各二兩　右為末酒糊丸桐子大每服七十丸空
心米飲下

大臟丸　治腸風下血及痔疾神効
黃連一斤去芦為末入肥大腸頭一段內前後用線縛定蒸爛為度　擣為丸桐子大每服百丸空心米飲下
秘方栢葉散　治便血甚効
扁柏葉乾為末　糯米炒黃為末等分　每服五錢空心白湯
調下如未止再加炒黑木耳末一錢
又方　治臟毒不止
當歸　枳殻　側栢葉　槐角　百草霜
芍藥各一兩　右共一處炒令烟微起為度研末每

服二錢空心温酒調下日午米湯下甚妙

又方 治積血便血

蒼朮 陳皮各二錢五分 黄栢 黄芩各七錢五分 連翹五分 右為末以生地黄膏六两為丸桐子大空心及食前白湯下七八十丸

丹溪方 治脉緩大口渇便血及婦人月水紫色勞挾湿熱

白朮五錢 地黄 黄栢炒 白芍藥各三錢 地榆 香附各二錢 黄芩乙錢 為末飪餅為丸

六九卷

又方 治便血久久傷血并麻風症癖瘡見面者

亀板二两 升麻 香附各五錢 白芍两半 側栢葉一两 椿根皮七錢五分 為末粥丸桐子大以四物湯加白朮黄連甘草陳皮煎湯下

槐花散 治腸風臟毒

槐花炒 側栢葉焙 荊芥 枳殻炒等分俱為末 毎服二錢米飲下空心食前服

又方 治下血

槐花炒 枳殻炒 地榆蜜炒各三錢

水煎露一宿頓温服之立愈

栢黄丸 治腸風臟毒下血鮮紅

生地黄 黄栢各一斤炒 為末煉蜜丸桐子大毎空心食前米飲下八九十丸

枳殻散 治諸便血

枳殻麩炒黄色十两 甘草三錢炙 為末毎服一錢空心米飲調下酒煮黄連丸

酒煮黄連丸

黄連去芦十二两 好酒五升煮黄連以酒乾為度焙乾

八九卷 六八

為末麪糊丸桐子大毎服三十丸空心服

加減四物湯 治腸風下血

側栢葉 生地 川帰 川芎各八两 枳殻 槐花炒 荊芥 甘草炙各四分 地榆 条芩各六分 防風六分 加烏梅一個 姜三片 水煎服

参栢丸 治腸風下血

苦参 黄栢等分

為末酒打米糊丸空心酒呑百丸

補虛之劑

竹茹湯 治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹 熟地各二两 人參 白芍 桔梗 川芎

當歸 甘草炙 桂心各一两 每服一两 水煎食遠服

參苓白朮散 治脾氣虛不能約束其血或為寒

凉藥傷以致飲食少進面色痿黃

補中益氣湯加阿膠蒲黃 治清氣下陷中氣不

足下血不止

十全大補湯 理中湯 胃風湯

雜方

固榮散 治吐血便血

白芷五錢 蒲黃炒 地榆各一两 甘草一錢五分

右為末每服二錢溫酒調服 有氣壯者加石羔一两

一方 治糞後下血不止

艾葉汁 生姜汁 各三合和服

一方 治中毒下血

蝲蝟皮炒成珠 為末每服二錢水調下日三服

烏梅丸 治便血下血

烏梅三两燒存性 為末醋糊丸桐子大空心米飲下七十丸

一方 治便血

白芷 五倍子 為末粥丸桐子大每服五十丸米湯下

靈苑方 治腸風下血久不止

茄蒂燒存性為末 每服三錢食前米飲下

丹溪云茄蒂燒存性山梔炒等分為末丸之米飲香下百丸効

本事方 治腸風

絲瓜燒存性 空心酒調下二錢

五槐丸 治臟毒

五倍子 槐花陳者 百藥煎好者各等分 為末酒糊丸

桐子大每服廿丸空心米飲下日三服

又方 治腸風臟毒酒痢下血

黃連 生姜 二味煎湯下二氣丸 次服五槐丸

又方 金星草五两味苦寒大解丹石毒 陳乾姜

右為末空心新汲水調下一錢

蒜連丸 治臟毒

黃連為末以大蒜煨熟去衣研和丸桐子大每

服五十丸陳米飲下 蒜能清血

東垣烏梅丸　治腸風下血
真僵蚕　烏梅肉各一兩焙乾　為末糊丸鷄頭子
大每服百丸白湯呑下日三服
一方　治腸風下血　馬鞭草搗自然汁服良
一方　治腸風下血及血崩丹溪云亦治瀉血
五靈脂炒去火毒為末　每服二錢
二麯散　治酒積下血不止糞後見諸藥不効者
神麯一兩半　白酒藥二丸　俱為末清水調揑成餅子慢
火上炙黄為末每服二錢白湯下亦治泄瀉神効

丹溪方　治腸澼
陳年棕櫚燒存性百藥煎為丸服
又方　治臟毒便血
生藕節切片清晨蘸平胃散嚼下
治腸痔大便常血　蔥白三五斤煎湯盆中坐浸之瘥
又灸法　平直量骨脊與臍中處椎上灸七壯或
年深者更于椎骨兩傍各一寸灸七壯除根
治腸風下血　椿根皮好酒濃煎服即愈
治下血不止　木賊二兩作二帖水煎空心服如人行五里再服

九竅出血耳目口鼻大小便皆出血者是也
黄金散治九竅出血　牛黄　鬱金等分為末
血餘散　治血淋兼治内崩吐血舌血小便出血
亂髮皂角水洗净晒乾燒灰為末　每服二錢以茅草根車前
草煎湯下本草謂髮灰消瘀血通關格利水道破癥瘕血衄有人生血瘤大如
一栗常被衣擦破則血出不止血餘灰敷之愈一人刃傷血流不止用胎髮灰敷之立愈
孫真人治九竅出血用黄荊葉搗汁酒和服之
丹溪治九竅出血以大薊一握搗汁以酒和服之如無生者以乾者為末
一方冷水調下二錢龍骨末酒煎調口服

中蠱下血
綱目云嚾水沉者心腹絞痛下血如爛肉者為蠱
千金方治中蠱下血如鷄肝出其餘四臟俱壞惟
心未毀或鼻破待死取馬蘭根末水服方寸匕
隨吐即出極神與茵蔓綠紫生子似橘
梅師方治卒中蠱毒下血如鷄肝晝夜不絕臟腑
敗壞待死用白蘘荷葉密置病人卧席下勿令
病人知覺自呼蠱主姓名
百一選方治中蠱毒或吐血下血如爛肝者取蚯

蚓十四條以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已
將死者皆可治
千金翼　治蠱毒下血蝟毛燒末服方寸匕當吐蠱出
肘後方　治中蠱吐血下血皆如爛肝者
苦瓠一枚水二升煮取一升服之吐即愈
又方　用苦酒一升煮苦瓠令消服之神効
金瘡出血
軍中方　治金瘡出血不止
半夏生用為末搽之緊扎立止

又方　風化石灰五月端陽日取苧葉搗汁拌勻
做成大餅子陰乾每用研極細末罨上立止
桃花散　治金瘡出血及杖瘡
風化石灰斤一將軍末子兩四先將灰炒漸投將軍
末子候看灰如桃花色即止每用少許敷之
血立止杖丹以調做膏藥貼之
一方　胎髮灰傳之立止　三七末罨上立止
血竭細末傳之立止
一子墮車血滯于中

大黃　川歸各等分每服一兩水煎服或五錢
血臍湯
桃仁　香附　撫芎　紅花　青黛等分
右糊丸桐子大每服白湯下四五十丸

九卷終

赤水玄珠第十卷目録

虚怯虚損癆瘵總論
辨明醫雜著忌用參芪論
虚損治法
論精氣奪則虚
論形氣不足有餘用補瀉法
癆瘵
傳尸癆　方外還丹　還丹秘要論
固精法　止夢遺　取紅鉛法
取梅子法　製首經金鉛法　生取梅子法
製紅鉛法　製白鉛法
製靈鉛法　製真土法　寶珠丹
煉乳膏法　製金乳粉法
取乳酥法　又取乳粉法　取碧玉仙瓶法
取交梨火棗法　取後天月月一枝花
陰煉秋石法　陽煉秋石法
又陽煉法　秋石氷片法
煉伏火黄芽法　取秋石水花法

煉黄芽法　煉白雪法　晒甜秋石法
取秋石氷法　製混元毬甜石法
取秋石精英法　取秋露水法
取雪水法　三妙丹　三元丹
五精丸　補真膏　紫虚延齡丹
辨鍾乳石　煉鍾乳法　鍾乳丸
鍾乳煎　五子全鹿丸
紫石英散　駐顔小還丹

赤水玄珠第十卷

新安生生子孫一奎著輯

虚怯虚損勞瘵門總論

生生子曰虚是氣血不足怯是不能任勞損是五臟虧損由虚而至怯至損皆自漸而深治之須極體認不可輕易投劑少有差悞則輕者反重重者死矣古患虚怯者雖是不治之症尚或延過二三年今之患虚怯者周歲半載之間卒不可救深可憫也求其死速之由有三大慾不容不急講也病家欲求速効不久任師屢更屢試殊不知虚者精氣奪也須多服補藥非假以歳月不見功病者厭其効遲更師調理故屢換而屢試之後師窺前方之不効疑非其症又更方治詎思其藥力之未逮也由是脾胃轉傷遂至不救猶恨天下無良師也此其一慾也乃慾之小者也自丹溪倡陽有餘陰不足及相火易動之論而明醫雜著和之統旨大旨又和之故今之人纔見虚弱發熱一委之陰虚火動開塲便

用滋陰降火不分陽虚陰虚脾胃勇怯一槩用黄栢知母生熟地黄天麥門冬牛膝天花粉五味子童便之類胃強而陰血不足者間或無虞胃弱氣虚而無實熱者服此純陰苦寒之劑其火愈熾甚至惡心胷滿咳嗽痰沫泄瀉声啞而斃矣哉叩其師則曰書以陰虚火動著其症吾以滋陰降火應其病病之不起天也雖屢試屢死而師家病家終莫能醒其藥之悞而一歸之天何寃也丹溪陽有餘陰不足之論蓋為方温補之藥害人故著此以救一時之弊至於按病投劑陰虚則補陰陽虚則補陽曷嘗固執又曷嘗提防流害一至於此據經云火鬱則發之又曰輕者可降重則從其性而升之蓋火之性上炎以輕揚之劑鼓之則易散也若不察而一以降火為言將逆其性而使之愈熾矣故曰甘温去大熱是也按東垣書只有升陽散火湯火鬱湯二方並無滋陰降火之法豈賢如東垣者尚昧此滋陰降火之法歟緣脾胃喜

温而惡寒形寒飲冷則傷肺體既虛弱腠不密易致風邪由此咳嗽潮熱故以輕揚之劑投之其熱頓釋熱退即以補劑收其功時師暗于此理動藉開口則曰丹溪諸公云云人身之虛皆陰虛也故任前藥而不疑不思滋陰降火之藥皆斂肺助溼滯痰損脾者風邪火熱皆莫能散愈投愈咳愈進愈熱也此弊吳浙間尤罹其毒蓋王節齋吳茭山何大英皆浙產益易見信故耳乚　二懲也乃懲之大者也膏粱之家厚本胡藉才多積聚丹溪曰蒸蒸發熱積病最多嗜慾者中心實怯故每迎師用藥喜補而憚攻抑不知積之不去熱之不去也多補則重閉其氣是資其邪而益其病也初起未久胃氣尚強急當推之而後議補則無反顧之憂若失机會遷延日遠莫能為計欲補則無成功欲攻則胃氣已壞畏首畏尾待死而已此其三懲也乃懲之中者也予壯歲患此百師莫能療幸遇至人指示軒岐要領病之禁忌恬澹內觀三年乃起是以深悟此三大懲不敢自秘謹將續密授受治法吐露篇末以惠蒼生不識同志者寧少易其故轍否耶

凡治虛損之症當從難經治法損其肺者益其氣損其心者調其營衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精此治損之法也今人樂看方書不究竟經義一遇虛熱之症動輒便是滋陰降火顧生平所蘊不過是明醫雜著諸症辨疑活人指掌等小書識見近易于觀覽元宋已前諸大家之旨有至老未嘗觸目者間有涉獵丹溪則又僅能用其粗而略其精丹溪治陰虛之法固未嘗純棄人參節齋則畏之如虎汪石山病用參著論及營衛論云丹溪言陽有餘而陰不足者乃對待之言是大槩之論陰虛乃營中之陰氣虛非特言腎陰也此言發前人之所未發深有功于丹溪者近代諸公所云陰虛非精則血故用劑惟養血滋陰也予既詳之于前復申之于後誠重人命

而懲其偏亦欲同志者有所警悟也

治虛損之症再要識得利害冊溪云脉数而無力者難治大肉脱甚者難治肺脹欝逆不得眠者難治形瘦脉大胷中多氣者死瀉而加汗者死熱不為汗衰者死不為泄減者死欬而下泄上喘者死股肉全消者死左不得眠者肝脹右不得眠者肺脹又嗽而喉疼声啞糞門痿瘡者死皆不治之症

舉要曰骨蒸勞熱脉数而虛熱而濇小必殞其軀加汗加咳非藥可除

治虛損之症吃緊處工夫只在保護脾胃為上如和解攻裏二法義之所當用者雖老弱久病亦所不避乃撥亂反正之意惟要用捨得宜有先攻而後補者有先補而後攻者有攻補並行者當攻則攻當補則補如冊溪治一人久欬吐紅發熱消瘦衆以為瘵脉弦數日輕夜重行倒倉法而愈次年生子滑伯仁治宋無逸病瘵瘠損饘粥鮮下咽者六十餘日殆甚脉數関上尤弦

積久體瘠而神完是積熱居脾上滞于飲食法當下衆疑而難之藥再進而疾去其半繼以甘露飲白虎湯而安觀此乃當攻則攻也縱久病瘦弱法有所不避也冊溪治一人咳嗽惡寒胷痞口乾心微疼脉浮緊而数左大于右盖表盛裏虛問其素嗜酒肉有積後因行房涉寒冒雨忍飢繼以飽食先以人参四錢麻黄連根節一錢半與二三帖嗽止寒除改用厚朴青皮陳皮瓜蔞半夏為丸参湯下二十服而痞除汪石山治一人年弱冠房勞後忽洒洒惡寒自汗發熱頭身肯脘皆痛唇赤舌強嘔吐眼胞青色午後譫語發熱小便長初日脉皆細弱而数次日脉浮弦而数醫以手按臍下痛議欲下之石山曰此疫也疫兼两感内傷重外感輕耳臍下痛者腎水虧若用利藥是殺之也古人云疫有補有降有散茲宜合補降二法以清暑益氣湯除蒼术澤瀉加地黄而安此當補則補也夫業醫者膽欲大而心欲小毅然獨斷于裏病所當瀉則

須瀉之幸無曰虛弱者何敢弄險經曰有故無損亦無損也設務姑息而一惟調補是務此猶南宋和議之說豈知邪正不兩立王業不偏安然不伐賊王業亦亡坐而待亡孰若伐之古人以醫譬國豈徒語哉

抱拙子曰內經云今人未及半百而衰以酒為漿以妄為常醉以入房慾竭其精耗散其真則人之根源從此而虛損矣五臟六腑如何不弱五勞六極七傷如何不至勞傷既至則陰陽虧寒

熱作飲食減脉道乖故虛勞之脉有浮而大者微而弱者弦而數者夫脉浮而大者血氣未衰病勢未羸大肉未消飲食未減雖有寒熱諸邪猶可以治若脉微弱者血氣已衰病勢已羸飲食減骨肉枯寒熱蒸嘔泄作于此則滋補兩難何易下手單弦猶可若帶雙弦則為賊邪侵脾尤為難治加數則正氣已竭病必殆矣善治者當病勢未深之時調養脾胃安鎮心神滋補腎水俾心腎氣交脾胃充實飲食日進血氣自生

病無不差又如經曰精不足者補之以味味陰也補精以陰求其本也然味乃穀粟菜菓出乎天賦自然冲和之味故有食人補陰之功非醯醬烹飪偏厚之味出于人為者也又經曰形不足者温之以氣温養也温存以養使氣自充氣充則形完矣今醫失補之道輕則鹿茸雄桂重則起石丹砂加之灼艾補燥其水夫五行之氣水特其一耳一水不勝五火况又加以熱劑則水愈涸而火轉盛久而咳痰咳血潮熱煩渴喜

猶且喜補不已如此死者醫殺之耳夫凉劑能養水清火熱劑能燥水助火勞為熱証明矣還可用補乎然五臟氣血虛損補劑雖不可無用之亦必有道必先治其諸虫痰飲宿癖一一除盡方可以服補劑不爾必不得力其體虛者最易感風邪尤當先行和解微利微下從其緩而治之次則隨証調之若邪氣未除便行温補邪氣得補遂入經絡致死不治如此死者何啻千萬惟無虫痰積癖之人其脉舉按無力而弱

者方可補之然五臟雖皆有勞心腎為多心主
血腎主精精竭血燥心腎虚矣腎氣虚則水走
于下心氣欠則火炎于上火炎上則為痰為欬
為煩熱為口乾為咯血為上氣為嘔逆為盜汗
為耳鳴目眩為瞎中驚悸水走下則為腰痛為
脚弱為泄瀉為赤白濁為遺精夢泄為小便滑
數為皮毛焦枯皆虚勞変証生于心腎者也故
補法當以調心補腎為先惟冝温養以緩取効
宜用峻烈之劑經又曰脾者孤臟以灌四旁
又曰五臟皆稟氣于胃脾胃健順運納五穀雖
有虚勞復之亦速脾胃苟虚若不先補益而便
用補本臟之藥則脾不能納化滞而不行用力
多而成功少也故治虚勞者須先健順脾胃然
後徐用本臟補藥無不成功否則不効疑其為
悮更法治之以此悮人者可勝計哉然病人亦
須愛惜身命堅心定志絶房室息妄想戒惱怒
節飲食以自培其根否則雖服良藥無益也
拙子曰按勞瘵之證曰骨蒸殗殜伏連尸疰勞
疰虫疰毒疰熱疰冷疰食疰鬼疰若骨髓熱者
為骨蒸半卧半起者為殗殜五臟内傳為伏連
諸疰者即今之傳尸也盖疰者注也自上注下
與前人相似故曰疰其変多種大槩令人寒熱
沉沉默默不的知其所苦而無處不患若寒熱
自汗面白目乾口苦神昏善恐不能獨卧傳在
肝也若寒熱面黑鼻燥善忘大便秘澁口舌生
瘡傳在心也若寒熱面青唇黄舌本強硬言語
不出飲食無味羸瘦吐涎傳在脾也若寒熱面
赤鼻白乾燥毛折咯嗽喘急吐涎膿血傳在肺
也若寒熱面黄耳焦脚胻痠痛小便白濁遺瀝
腹痛傳在腎也此皆傳尸勞瘵之所苦者然世
人聞其名則神驚而志恐一抱其病謂之必死
無生往往淹延竟至不救傷哉此病四方之民
皆有之然東南之民患者接踵有傳染而須絶
子孫者西北之民百無一二是何故耶盖西北
之地土厚水深居民食麪啖肉不嗜湯飲居稟
實臟腑固東南之地土薄水淺居民食米啖魚

多嗜湯飲居稟弱臟腑滑所稟既殊血氣亦異方土之所致也凡人一身之間三尸九虫均有之矣人呼則呼人吸則吸北人肌肉厚腠密有以滋養隱而不動南人肌肉薄腠疎無以滋養動而不隱不隱則害人始而呼吸血氣血氣既少呼吸真氣真氣已衰其虫亦困將道人須獨肺虫一種則稟殺厲之氣已成靈物人將氣絶飛遁而出變化不測一着虛衰之人則至于死所以謂之傳尸癆瘵古方雖有狸骨獺肝

天靈蓋之藥未嘗見効惟在辨證分明氣血未偽精神未散脈不弦數之時早用崔氏灸四花穴法及藥證相對必有所濟若妄意不察凡遇寒熱咳嗽便以鱉甲黃耆為補虛羸之主宰殊不知因風得補非勞成勞或以柴胡黃芩為解勞熱之先鋒殊不知因虛得寒不損成損或以地黃當歸為滋血之良方殊不知此藥性滯大能損脾或以人參白朮為補氣之佳品殊不知此藥力善補偏用無功大要須知傳尸之證乃異常怪病必患者能異常調攝醫者能至誠合神或藥之或艾之則有不測之神以助之而此病可瘳矣若患者如常而調攝醫者如常而療理雖藥之艾之神亦不知助病必不可差矣如以為難治之病而即棄之非仁術也其可乎哉

近世童男室女多患勞怯或失血咳嗽或惡寒潮熱脈弦而數此等之證皆勞心失血之所致乃治者虛則參耆桂附反補其陽而愈耗其陰嗽則枳殼杏仁桑白皮不顧其腎虛而反瀉其肺

是損其至高之氣也陰血既虧氣盛似火乃內虛無邪之熱俗用芩連梔子豈不損其胃耗陰虛潮熱與有邪之熱不同俗用柴胡薄荷子衛寧無傷乎脾陰既虧痰盛似火半夏陳皮南星勝濕之劑能治耶陰火旺則其人不食又豈香砂麥芽消導之劑可治耶至于思慮內傷經絡失血停留亦非側柏棕灰之可止也世俗皆治其標而未治其本安望其能效耶今詳抑火有二法有瀉有降有滋陰芩連梔子瀉火之藥瀉

其有餘黃栢知母降火之藥補其不足天麥門冬生熟地黃當歸助陰生血滋陰之藥川芎芍藥推陳致新行血之藥非甘草白朮難以約脾非陳皮青皮無以導氣以遠志酸棗仁可收其心以柴胡白芍藥可伐其木用括蔞貝母而消此痰用阿膠五味而痊此嗽石蓮芡實治夢遺秦艽養血退其熱茜根藕汁止其血此數味滋陰降火之聖藥其間果是氣虛血少當入參芪亦分不虛決不可入惟寒溼痰氣禁用此方餘者但能知加減決得其宜又能靜心節養無不大効

生生子曰石山醫案行世六十餘年矣內辯王汝言忌用參芪論極其確切而時師尚膠滋陰降火之偏甘棄參芪寧守滋陰降火之說縱至脾胃泄瀉痞脹浮腫痰喘氣逆惡心聲啞雖死無恨予目擊如斯而死者何下數十百人故不得不揭石山之書痛言而極論之石山此辯亦丹溪發揮救時之意豈得已哉石山之書既行而人尚循習如故何也予意時師或未見石山書也或者曰子言實匡時之語也第未免有多言之病予曰吾亦深知多言之足病也且子之不疾固而獨病予之多言亦過矣見孺子之入井孰不欲以手引之況接踵而入井乎接踵而入井安得盡以手而引之予將圖以塞其井也多言惡足病

辯明醫雜著忌用參蓍論 出石山醫案

按王公撰次明醫雜著其中有曰若酒色過度傷損肺腎真陰咳嗽吐痰衄血咳血等症此皆陰血虛而陽火旺也宜甘苦寒之藥生血降火若過服參蓍等甘溫之藥則死不可治盖甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消故也又云咳嗽見血多是肺受熱邪氣得熱而變為火火盛而陰血不寧從火上升治宜滋陰降火忌用人參等補氣之藥又撰次本草集要云人參入手太陰而能補火故肺受火邪咳嗽及陰虛火動勞嗽吐血者忌用之誤用多致不救予常考其所

序固皆本之丹溪然丹溪予無間然矣而王氏未免有可議者丹溪曰治病必分血氣氣病補血雖不中病亦無害也血病補氣則血愈虛散矣此所以來王氏陽旺則陰愈消之說也丹溪又曰補氣用人參然蒼黑人多服之恐反助火邪而爍真陰此所以又來王氏咳嗽見血多是火盛陰虛忌用人參補氣之論而集要復有人參補火肺受火邪勞嗽吐血等症忌用人參之戒也夫王氏之書雖出丹溪但過于矯揉而又

失之于偏也不曰誤服參蓍多致不救則曰多服參蓍死不可治言之不足又復申之惟恐人以咳嗽失血為氣虛不作陰虛主治也篇末雖亦有氣虛欬血之言又恐人因此言復以咳嗽失血為氣虛故即繼之曰但此症不多爾是以愈來後人之惑使凡遇欬血雖屬氣虛終以前言為主而參蓍竟莫敢用也殊不知丹溪立法立言活潑潑地何嘗滯于一隅于此故曰血病忌用參蓍于他章則又曰虛火可補參朮生甘草之類又曰火急甚者兼瀉兼緩參朮亦可是丹溪治火亦未嘗廢人參而不用王氏何獨但知人參補火而不知人參能瀉火邪丹溪又曰陰虛喘嗽或吐紅者四物加人參黃柏知母五味子麥門冬又曰好色之人元氣虛欬嗽不愈瓊玉膏肺虛甚者人參膏凡此皆酒色過傷肺腎欬嗽吐血症也丹溪亦每用人參治之而無疑王氏何獨畏人參如虎邪叮嚀告戒筆不絕書宜乎後人印定耳目確守不移一遇欬嗽血

症不問人之勇怯症之所兼動以王氏藉口更執其書以證欬使良工為之掣肘病雖宜用亦不敢用惟求免夫病家之怨尤耳病者亦甘心忍受苦寒之藥縱至上吐下瀉去死不遠亦莫知其為藥所害與言及此良可悲哉茲取丹溪嘗治驗者以證之一人咳嗽惡寒胸痞口乾心微痛脉浮緊而數左大于右蓋表盛裏虛問其素嗜酒肉有積後因行房涉寒冒雨忍飢繼以飽食先以人參四錢麻黃連根節錢半與二三

帖嗽止寒除敀用厚朴青皮陳皮瓜蔞半夏為丸參湯送下二十服而瘉除夫既咳嗽嗜酒不可謂肺無火也復因行房感冒不可謂陰不虛也初服人參四錢再用參湯送藥不可謂不多服也何如不死又一人患乾咳嗽声啞用人參橘紅各錢半半夏麯一錢白术二錢知母瓜蔞桔梗地骨皮各五分夏加黄芩五分入姜仍與四物加炒栢童便竹瀝姜汁二藥晝夜相間服兩月声出而愈夫患乾咳嗽声啞不可謂肺無

火邪也不可謂陰不受傷也服人參兩月不可謂不多也又何如不死又一壯年因勞倦不得睡欬痰如膿声不出時春寒醫與小青龍湯喉中有血絲腥氣逆上漸有血線自口右邊出晝夜十餘次脉弦大散弱左大為甚此勞倦感寒強以辛甘燥熱之劑動其血不治恐成肺痿遂以參蓍歸术芍藥陳皮生甘草帶節麻黄煎入藕汁服二日嗽止去麻黄與四日血除但脉散未收食少倦甚前藥除藕汁加黄芩砂仁半夏

半月而愈夫欬嗽如膿声不出者不可謂肺不熱也又以甘辛燥熱動其血不可謂血不病也服參蓍亦不可謂不多也又復何如而不死凡此諸病以王氏言之未免皆作酒色傷陰而用滋陰瀉火之藥然而丹溪率以參蓍等劑治之而愈孟不見其助火增病者盖病有所當用不得不用也雖劳嗽吐紅亦有所不避也耳古今治癆莫過于葛可久其保真湯獨參湯何嘗廢人參而不用但詳其所挾之症何如耳豈可謂

其甘温助火一切棄而不用哉肺受火邪忌用人參其源又出于海藏本草湯液之所云而丹溪實繹其義不期流弊至于此又嘗因是而推廣之丹溪曰蒼黑之人多服參蓍恐助火邪而爍真陰肥白之人多服再好此固然矣考其嘗治一人形瘦色黑素多酒不困年半百有別館一日大惡寒發戰言渴不飲脉大而弱又右關稍實畧数重則濇以王氏觀之以形色論之正合滋陰瀉火之法而丹溪謂此酒熱内欝不得

外泄由表熱而虛也用黃芪二兩乾葛一兩煎飲之六汗而愈既不以蒼黑忌用參芪為拘亦不以酒色傷陰忌服參芪為禁是知丹溪立言以示人者法之常施治而不以法為拘者善應變也王氏但知其立法之常而未察其治不以法為拘之變故於參芪等劑每每畏首畏尾若不敢投蓋亦未之考也雜著所制諸方雖未盡廢參芪察其用處必須脉細微而遲者方始用也然而東垣丹溪之用參芪亦不專在于此東

垣曰血虛脉大症象白虎誤服白虎湯者必死乃用黃芪六錢當歸一錢名曰當歸補血湯以治之是血虛脉大東垣亦嘗用黃芪矣丹溪曰一人滯下一夕昏仆目上視溲注汗洩脉大無倫此陰虛陽暴絕也蓋得之病後酒色灸氣海服人參數觔而愈是陰虛脉大丹溪亦嘗用人參矣豈必脉之細微遲者而後用哉考之本草仲景治亡血脉虛以人參補之取其陰生于陽甘能生血故血虛氣弱仲景以人參補之是知

人參不惟補氣亦能補血況藥之為用又無定體以補血佐之則補血以補氣佐之則補氣是以黃芪雖專補氣以當歸引之亦從而補血矣是以東垣用黃芪六錢只以當歸一錢佐之則名曰補血湯可見黃芪功力雖大分兩雖多為當歸所引不得不從之補血矣矧人參功兼補血者耶人參性味不過甘溫非辛熱比也稍以以寒凉佐之必不至助火如此之甚積溫成熱若中病則已亦無是也夫芎歸味辛甘溫或用

治勞熱血虛之病並無所疑然辛主耗散本非血虛所宜彼人參甘溫而味不辛比之芎歸孰輕而孰重故抑勞嗽吐血陰虛之病亦有始終不用人參莫克全其生者何也或肉食不節則古人所謂厚味厝熱也或房勞不遠則古人所謂縱欲傷生也二者不謹而獨致畏于人參是謂不能三年之喪而緦小功之察何其謬邪噫醫之用藥固所當審不可輕視人之死生如咳嗽失血等症若果脾胃強健飲食無阻則當從

王氏所論與之滋陰瀉火固無不可設或上熱嘔逆中妨飲食下生泄瀉汗自泄而洗洗惡寒四肢倦而兀兀多睡則又當從陰虛陽虛權其輕重而兼治之可也苟不知此而專主乎王氏未免陷于一偏而有無窮之患矣故予不得不極論之莫辭乎僭踰之罪焉

虛損治法

脉虛者以牛膝紅花川芎補之　骨虛者蓯蓉鎖陽虎骨補之　筋虛木瓜杜仲破故紙龜板補之　肉虛山藥大棗甘草　皮毛虛者括蔞桂枝黃芪　氣虛人參黃芪附子　血虛當歸地黃芎藥　津虛天花粉玄參升麻麥冬　髓虛五味子地黃當歸補之

秦越人曰損其肺者益其氣四君子加黃芪麥冬五味子山藥之類　損其心者益其營衛八珍湯加枸杞子酸棗仁石斛栢子仁　損其脾者調其飲食適其寒溫二陳湯或加白术益智白芍砂仁人參　損其肝者緩其中四物湯倍加白芍甘草枸杞子山茱萸　損其腎者熟地黃牛膝人參五味子兔絲子蓯蓉之類此補五臟虛損之大槩也

凡心虛者恍惚憂煩少顏色或驚悸多汗宜人參養營湯歸神丹養心丸之類　虛而熱煩而渴者十全大補湯　心懸如大飢之狀者平補鎮心丹主之

肺虛者呼吸少氣閉然喘乏欬嗽嗌乾宜以紫菀散調其氣　若短氣少氣不足以息者四君子湯氣促氣短上焦虛而熱者加生脈散虛而寒者十全大補湯表虛不任風寒者黃芪建中湯皮膚灼熱不耐風寒補中益氣湯　皮膚乾燥日漸黑瘦麥門冬飲子咽喉乾者亦同津液不到咽者四君子加五味子桔梗

脾虛者面黃肌瘦吐利清冷腹脹腸鳴四肢無力飲食少進宜益黃散或參苓白术散加木香藿香香附子　食後便卧精神短少補中益氣湯加砂仁　手足瘦軟行步欹側四君子湯黃芪

湯　手足搐搦筋惕肉瞤似風以十全大補湯
手足痿軟不耐勞役一有動作多汗因熱十
全大補湯　藏腑不調中氣不運病久不能食
理中丸少加附子
肝虛者目眩筋攣面青恐懼如人將捕之狀宜六
味地黃丸加牛膝肉桂人參川歸木瓜主之
眼昏少精神無比山藥丸目中溜火視物昏花
寢汗憎風行步不正卧而多驚補益腎肝丸
視物不明筋弱陰痿陰下濕痒八味地黃丸

腎虛者背脊腰膝厥逆而痛耳鳴精滑小便頻數
宜八味地黃丸去附子加鹿茸五味子山藥以
生其精　若腰背肩胛頭痛不任房事十全大
補湯腰胯腿膝無力牛膝丸脚膝痠軟下元虛
冷八味地黃丸脚弱脛瘦無比山藥丸腎冷精
虛陽事不舉還少丹離珠丹金鎖正元丹三才
封髓丹選用夢遺白濁巴戟丸小便如淋寒精
自出小兎絲子丸小便頻而遺十全大補湯加
益智

東垣謂補腎不若補脾緣脾處于中焦上交于心
下交于腎道家交媾心腎以脾為黃婆正是此意
何栢齋曰丹溪論虛損之症歸之陰虛其言亦有
所取蓋以精血為陰也但所製補陰丸專用寒
凉則偏矣夫五穀化為精血非火不能虛損之
微有真火尚存服寒凉猶可虛損之甚者真火
已虧藥用寒凉豈能使之化為精血以補其虛
乎或問士大夫率喜服補陰丸何也曰虛損之
症皆下寒上熱所謂火水不交者也其重感于

寒者則下焦作痛不感寒者則不痛至于上焦
燥熱則一也上焦方苦煩熱初得寒凉則暫快
遂以為藥之功故喜服之久而下注則下元愈
寒火熱為寒迫而上行使上焦復熱愈甚展轉
反覆遂致沉痼而不可救蓋暗受其害而不覺
也然則治之柰何曰補以寒凉佐以溫熱補三
佐二空心凉服所謂熱因寒用者也久則精生
熱退而病愈矣雖然虛損之疾起于過用必慎
房勞簡思慮節飲食庶服藥有功毋獨恃藥餌也

生生子曰心者萬化萬物萬象之主内經靈蘭秘典曰心者君主之官神明出焉主明則下安主不明則十二官危是故五臟系皆通于心心通五臟系也五藏一有不平心即應之補心之方前哲固不少矣然未能貫通乎五臟也惟趙敬齋有補心丸一方極其縝密可以為法特附于此以為準標

補心丸

麥冬二兩半　遠志甘草湯煮　石菖蒲　香附子童便浸二兩

天冬　括蔞根　白术　貝母　熟地　茯神　地骨皮各一兩半　人參　川歸　牛膝　黃耆各一兩　木通八錢　右方能安養心神又治心氣不足驚恐健忘俱為細末大棗肉為丸梧桐子大每酒或圓眼湯呑五七十丸此方不但補心兼治五臟無偏勝之弊可以久服

論精氣奪則虛

奪謂精氣減少如奪去也出内經通評虛實論

人稟冲和之氣而生身有三曰元精曰元氣曰元神者本身中之真精真氣真脉也夫精乃臟腑之真非榮血之比故曰天癸氣乃臟腑之大經為靜靜之主故曰神机脉為天真委和之一氣經謂其名有三曰命之本氣之神形之道其機運升降皆隨氣而動因血而榮精氣資始相生不失以養一身為人之司命形質之体用也至若精不足則氣失資化氣不足則血失所榮血不足則氣無所附天真散亂則氣精神無稟命矣是以相生長養之道精化氣氣生神而皆

稟乎身之腑臟之真也夫氣血從乎營衛營衛又宗乎經隧營衛者精氣之化為先天清濁之始經隧者胃之水穀之化此經隧不能生營衛營衛不能不散而養經脉經脉不能不順而資天真為生養涵容造化形質理之然也凡人之視聽言動壯壽皆此理之常也疾病盲瞶關格夭折皆此理之失也故有精神氣血不足則病真脉散亂則死者皆由平日攝養之過與不及動止之過踰常度也經云出入廢則神机化滅

升降息則氣立孤危然房勞甚則精血竭而神無所依氣無所附則忽致暴絶也竊嘗第究先哲經義濟生徵古益氣之補肺補精之滋腎皆資其化源也蓋人精血而常不足加之数奪其真資化失則榮氣乃虛〻則衛氣不固精亦滑脱腎氣竭而陰微不能與胃氣上升以接清陽之氣故病多頭重或痛氣弱而食少元氣下陷脉即微弱外欲絶而虛洪或見損脉此實元精不足之所致非有外感賊邪之病也

論形氣不足有餘用補瀉法

東垣曰黄帝云形氣之逆順柰何岐伯曰形氣不足病氣有餘是邪勝也急瀉之形氣有餘病氣不足急補之形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可刺之刺之重不足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絶滅壯者不復矣形氣有餘病氣有餘此謂陰陽俱有餘也急瀉其邪調其虛實故曰有餘者瀉之不足者補之此之謂也

夫形氣者氣謂口鼻中喘息也形謂皮肉筋骨血脉也形勝者為有餘消瘦者為不足其氣者審口鼻中氣劳役如故為氣有餘也若喘息氣促氣短或不足以息者為不足故曰形氣也乃人之身形中氣血也當補當瀉全不在于此只在病勢潮作之時病氣增加者是邪氣勝也急當瀉之如潮作之時精神困弱言語無力及懶語者是真氣不足急當補之若病人形氣不足病來潮作之時病氣亦不足此乃陰陽俱不足也

禁用針宜補之以甘藥不可以盡劑不已臍下一寸五分氣海穴取之（以上出王機微義）

癆瘵

癆瘵之病非止一端其始也未有不由氣体虛弱劳傷心腎又有外感風寒暑湿之氣或先為瘧疾以致咳嗽邪氣入裏失于調理又不能保養過于房劳傷于飲食而成劳瘵之候其為証也令人肌肉羸瘦皮毛乾枯寒熱盜汗遺洩白濁或腹中有塊或腦後兩邊有小結核或聚或散

或欬吐膿血其傳變不可勝言也治宜保和湯
保真湯秦艽扶羸湯黃芪鱉甲散清骨散之類選用
卽齋云男子三十歲前後色慾過度損傷精血必
主陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱咳々欬
嗽倦怠無力飲食少進甚則痰涎帶血咯唾出
血或欬血吐血衄血身熱脉沉數肌肉消瘦此
名癆瘵最重難治輕者用藥數十服重者期以
歲月然必病人愛命堅心定志絕房室息妄想
戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥無
效也此病治之于蚤則易若到肌肉消爍沉困
着床尺脉沉取細數則難為矣
丹溪云此陰虛之極痰與血病亦或有虫者其傳
尸一證不可云無傳尸一證最為惡疾世有闔
門盡死古方雖有天靈蓋等散專治此疾其得
生者亦千百中之一二耳
玄珠經曰骨蒸之極声嗄咽痛面黧脉躁直視汗
出如珠喘乏氣促出而無入毛焦唇反此皆不
治之症雖有神醫亦無如之何矣

千金方云夫衆疾聚積皆起于虛々生百病積者
五臟之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從
舊方不假增損虛而勞其弊萬端宜應隨病增
減聊復審其冷熱記其增損之主耳虛勞而頭
痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參虛而不
安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱
加地黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭
乾姜虛而損加鍾辣剌蒺蔾巴戟天虛而大熱
加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚
悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷則用紫
石英小草若客熱則用沙參龍齒不冷不熱皆
用之虛而口乾加麥門冬虛而吸々加胡麻覆
盆子栢子仁虛而多氣兼微欬加五味子大棗
虛而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加
桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩
虛而客熱加地骨皮黃芪虛而冷黃芪虛而痰
復有氣用生姜半夏枳實虛而小腸利加桑螵
蛸龍骨雞肶胵聊叙增減之一隅處方者宜準此

四君子湯　治真氣虛弱及短氣脉弱
人參　黃芪　白术　茯苓等分　為粗末每服
五錢水一盞煎至七分食遠溫服
生脉散
人參　五味子　麥門冬
益氣丸　治語言多損氣懶語補上益氣
麥門冬去心　人參各二錢　橘紅　桔梗　炙甘草
各五錢　五味子二十二粒　右為極細末水浸餅為
丸雞頭子大每服一丸細嚼津嚥下

人參黃芪湯
人參二錢　黃芪　白术　陳皮去白各一錢　甘草五分
當歸　茯苓各一錢　右㕮咀水煎空心服
四物湯　益營衛滋氣血
熟地黃補血如臍下痛非此不能除乃通腎經之藥　當歸如血刺痛非此不除
川芎治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除　芍藥和血
右為粗末水煎
三才丸
天門冬　地黃　人參等分　為末蜜丸空心服

八物湯四物四君子二方和合也
白术　茯苓　人參　黃芪　當歸　芍藥
川芎　地黃　右為散每用五錢水煎食後服
虛勞憂思諸不足黃芪建中湯主之
黃芪三兩　桂枝二兩　芍藥六兩　甘草炙二兩　大棗
十二枚　生薑二兩　膠飴一升　右水七升煮取三
升去渣納膠飴更上微火消解溫服一升日
三服　氣短胷滿者加生薑　腹滿者去棗
加茯苓一兩半　及療肺虛損不足補氣加半夏一兩

東垣治脉弦自汗四肢發熱或皮毛枯槁髮脫落
宜黃芪建中湯
仲景虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢酸疼手
足煩熱咽口乾燥小建中湯主之
桂枝　甘草炙各三錢　白芍藥六錢　大棗二枚
生薑二錢　阿膠炒一合　水煎服
雙和散　補血益氣治虛勞少力
黃芪　熟地黃　當歸　川芎各一錢　白芍藥錢半
官桂　甘草各七分　右為粗末每服四大錢水

一鍾半生姜三片棗三枚煎至八分服此是
建中四物二方凡傷寒痎疾中暑大病之後
虚勞氣乏以此調治皆驗不熱不冷溫而有補

十全大補散　治心肺損男子婦人諸虚不足五
勞七傷不進飲食久病虚損時發潮熱氣攻骨
脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黄脚膝無力喘
嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之（方見癆門）

八物湯　治心肺虚損皮聚而毛落血脉虚損婦
人月水愆期益氣和血　方見前

金剛丸　治腎損骨痿不能起床益精補腎
方在癆門

牛膝丸　治肝腎損骨痿不能起床筋緩不能收
持宜益精緩中
牛膝（酒浸）　萆薢　杜仲（炒）　蓯蓉（酒浸）　兎絲子
（酒浸）　沙苑蒺藜　防風（等分）　桂（一分）
右末酒煮猪腰子為丸桐子大每服五七十
丸空心酒下

煨腎丸　治肝腎損及脾食穀不化宜益精緩中
消穀及腰痛不起者神効
即牛膝丸加葫蘆巴補骨脂丸法亦同
右陰陽虚損諸方蓋謂虚而無熱者設也若
虚而有熱者作虚熱治之

補腎丸
龜板（酒炙四兩）　知母（酒浸炒）　黄栢（炒焦各三兩）　乾姜
（一兩）　右為末粥丸一方無姜有側栢葉用地黄膏
為丸

補血丸

龜板（酒炙）　黄栢（炒）　知母（炒各三兩）　生乾姜（一兩）
杜牛膝（二兩）　為末粥丸

固真丸
龜板（醋炙二兩）　虎骨（酥炙一兩）　蒼耳（酒蒸九次三兩）　生地（姜汁製炒）
栢皮（半兩）　烏藥（半兩）　乾姜（三錢）　為末姜汁糊丸

三才封髓丹　降心火益腎水
麥門冬（去心）　熟地　人參（各半兩）　黄栢（炒三兩）
炙甘草（七錢半）　縮砂仁（一兩半）　為細末糊丸梧
子大每服五十丸用蓯蓉半兩作片酒浸一

宿次日煎三五沸去渣送下空心服

八味丸　治腎氣虛乏下元傷憊臍下疼痛夜多漩溺脚膝緩弱面色痿黃或黧黑及虛勞不足渴欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利並宜服之脾惡濕腎惡燥古人制方益腎皆濕潤之藥也故八味丸仲景謂之腎氣丸以熟地黃為主

熟地黃半斤　肉桂　附子各一兩　牡丹皮　澤瀉

白茯苓各三兩　山茱萸四兩　乾山藥四兩

右八味為細末煉蜜丸皆君主之藥也若不依易老加減服之終不得効若加五味子為腎氣丸述類象形之劑也益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光此補五臟不足之劑易老迭為賓主是得仲景立方之心拘之以地黃為君則不効也

錢氏地黃丸加減法　如陽事多痿不振依今方然夏月減附子三停精完全減桂附只六味　血虛陰衰熟地黃為君　精滑山茱萸為君　小便或多或少或赤或黃或白茯苓為君　小便淋澀澤瀉為君　心虛腸胃積熱心火熾盛心氣不足牡丹皮為君　皮膚澁乾山藥為君　已上言為君者其分兩用八兩其乾地黃只依為臣分兩銖皆同

離珠丹又名神珠丹　治下焦陽氣虛乏臍下冷痛足附寒

杜仲炒去絲二兩　萆薢二兩　訶子炮五个　龍骨一兩　破故紙

巴戟酒浸去心各三兩　胡桃一百个去皮　硃砂另研一兩半　縮砂

仁半兩　右為末酒為丸梧桐子大硃砂為衣每服三十丸空心溫鹽湯任下

水芝丸又名玉女長春不老丹　牛膝根汁　蒼耳根汁各二碗不可入水和一處磁器熬成膏如稠蜜金櫻子為末半觔用不去皮蓮子實入豬肚內煮熟取蓮子曬乾四兩和前二味膏子丸如梧子大溫酒下二十丸一月身和暖服二月竟精神料驗甚

龍虎丸　補下焦

白芍　陳皮各二兩　瑣陽　當歸各一兩半　知母酒炒

熟地各三兩　虎骨一兩酒浸酥炙　黃栢半斤鹽炒　龜板四兩酒浸

酥炙　右為末酒煮羊肉搗汁丸服冬月加干薑半兩

補陰丸　黃栢　側栢　烏藥葉各二兩　苦參三兩

龜板酒炙五兩 黃連半兩 冬加乾姜夏加縮砂
右為末地黃膏丸梧子大

又方

黃栢半斤鹽酒炒 知母酒浸炒 熟地各三兩 陳皮
白芍炒 龜板四兩酒浸炙 牛膝各二兩 瑣陽 當歸各一
兩半 虎骨一兩酒浸酥炙 為末酒煮羊肉為丸每服五
十九鹽湯下冬加乾姜半兩

又方 治体弱肌肥壯血虛脉大

龜板三兩 生地 白芍各一兩半 側栢酒浸 烏藥葉
酒蒸各七錢半 右除生地細切熬膏餘皆作末同擣
為丸以白朮四錢香附一錢半煎湯下

瑣陽丸

龜板炙 知母酒炒 黃栢酒炒各一兩 虎骨炙 牛膝酒浸
杜仲姜炒 瑣陽酒浸五錢 破故紙 續斷酒浸各二錢半 當歸
一兩 地黃二兩 為末酒糊丸梧子大每服五十丸

補心丸

硃砂二錢半 瓜蔞五錢 黃連三錢 歸身尾三錢半
右為末豬心血為丸

濟陰丸

黃栢酒炒二兩七錢 龜板炙一兩三錢半 陳皮 虎骨酥炙各七錢
當歸 知母酒炒 瑣陽各一兩 牛膝 兔絲子酒浸
各一兩三錢半 山藥 白芍 砂仁 杜仲炒 黃芪鹽水
炒各七錢 破故紙炒三錢半 枸杞子五錢 熟地七錢
右為末以苄黃膏為丸每服七十丸

茯神湯 治脉虛極或欬則心痛喉中介介或腫

人參 黃芪 茯神 遠志 麥冬 通草
桔梗 甘草等分 姜三片水煎

無比山藥丸 治諸虛百損五勞七傷肌体消瘦
膚燥脉弱 赤石脂 茯苓 澤瀉 山茱萸
牛膝酒浸 巴戟去心各一兩 山藥 杜仲炒去絲 兔絲
子 熟地各二兩 蓯蓉四兩酒浸 五味子二兩
右為末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心酒下

遂少丹 大補真氣虛損肌体瘦弱

肉蓯蓉 遠志去心 茴香 巴戟 山藥 枸杞
石菖蒲 熟地 牛膝 杜仲炒 楮實 茯苓
五味子 山茱萸肉各等分 為末煉蜜同棗肉
為丸梧子大每服三五十丸溫酒或鹽湯下

日三服此藥平補力衰体倦小便渾濁宜服
之有熱加山梔子一兩心氣不寧加麥冬一
兩少精神倍加五味子一兩陽弱加續斷一兩

巴戟丸 治腎肝俱虛收斂精氣補戢真陽充肌
膚進食止汗

五味子 巴戟去心 茯苓 人參 熟地 白术
兎糸子 覆盆子 益智炒 骨碎補去毛 茴香各一
兩 白龍骨二錢半 牡蠣煅二錢 右為末煉蜜丸
梧子大每服五十丸空心塩湯下

八味定志丸 補益心神安定魂魄治痰去胸中
邪熱理肺腎

人參 菖蒲 遠志 茯神 茯苓各一兩 白术
麥冬各半兩 硃砂一錢 牛黄二錢另研 右為末煉
蜜為丸梧子大每以米飲下三十丸 若髓
竭不足加生地當歸 若肺氣不足加天麥
二冬五味子 若心氣不足加人參茯神菖
蒲 若脾氣不足加白术白芍益志 若肝
氣不足加天麻川芎 若腎氣不足加熟地
遠志牡丹皮 若膽氣不足加細辛酸棗仁
地榆 若神昏不足加硃砂茯神預知子

海藏大五補丸 補諸虛不足

天冬 麥冬 茯神 遠志 菖蒲 人參
益智 枸杞子 地骨皮 熟地黄
右為末蜜丸梧子大空心酒下三十丸数服
後以七宣丸泄之

補腎丸 有効不燥

熟地 兎糸子酒浸各八兩 歸身三兩半 蓯蓉酒浸五兩
黄栢酒炒 知母酒浸各一兩 破故紙酒炒五錢 山茱萸三兩
五錢 右為末酒糊丸梧子大每服五十丸

小兎糸子丸 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠
夜夢遺精又云心腹脹滿脚膝痿緩小便滑数
股內湿痒水道澁痛小便出血時有遺瀝並宜
服之 石蓮子肉二兩 兎糸子酒浸五兩 白茯苓一兩
山藥二兩七錢半打糊 右為末山藥糊丸梧子大每
服五十丸空心塩湯下脚無力木瓜湯下

人參養榮湯 治積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦

面少顏色吸吸短氣飲食無味

白芍三兩 當歸 陳皮 黃芪 桂心 人參 白朮 炙甘草各一兩 熟地黃 五味子 茯苓各七錢半 遠志五錢 生姜三片棗一枚水煎

若遺精加龍骨 咳嗽加阿膠

固精丸 治心神不安腎虛自泄精

知母炒 黃柏 牡蠣煅 龍骨 芡實 蓮蕊 茯苓 遠志去心各三錢 一方加山茱萸肉三錢

右為末煮山藥糊丸梧子大硃砂為衣每服五十丸

沉香百補丸

熟地六兩 兔絲子四兩 杜仲炒 山藥 當歸 茯苓各二兩 知母炒 黃柏酒炒 人參各二兩 沉香一兩

右為末酒糊丸

滋腎百補丸

當歸四兩酒浸 兔絲子四兩酒浸 知母 黃柏酒炒褐色 山藥 菊花 楮實 杜仲各二兩 沉香五錢 青鹽炒一兩 熟地八兩 右為末酒糊丸或煉蜜丸服

明目益腎丸

枸杞子 當歸酒浸 生地酒浸各一兩 五味子 山藥 巴戟去心 甘菊花 天門冬 人參各五錢 知母 黃柏俱酒炒各七錢 茯神 兔絲子酒浸各一兩

右為末蜜丸梧子大空心鹽湯下五十丸

固真丸 治腎經虛損真元不足

鹿角膠二兩 鹿角霜一斤 茯苓五兩

右為末將膠水為丸梧子大空心米湯或酒服下一百丸

地芝丸 和顏色利血氣調百節黑髮堅齒逐風散氣

生地黃 天門冬各八兩 甘菊花 枳殼麩炒各四兩

右為末酒糊丸梧子大空心酒服下三十丸

黃連茯苓丸 壯水源降心火

黃連 白茯苓各五兩 破故紙炒 菖蒲各五錢

右為末酒糊丸梧子大空心溫水下

栢子仁丸 補益元氣充實肌膚

山茱萸四兩 栢子仁微炒 遠志去心各半兩 覆盆子 山藥各一兩取末 右為末將山藥白麵同酒糊丸梧

桐子大每服三十丸温酒下

八物腎氣丸　平補腎氣堅齒駐顔

熟地黄半斤　山茱萸　山藥各四兩　五味子　桂各二兩　澤瀉　牡丹皮　白茯苓各二兩

右為末蜜丸服

肉蓯蓉丸　壯元氣養精神

蓯蓉二兩酒浸　山茱萸　楮實子　枸杞子　山藥　地膚子　五味子　覆盆子　兎絲子　萆薢　狗脊去毛　遠志去心　破故紙炒　石菖蒲　熟地　杜仲去粗皮炒去絲　石斛去根　白茯苓　牛膝酒浸　澤瀉　栢子仁炒各一兩　右為末酒糊丸梧桐子大每服六七十丸空心温酒下

益壽地仙丹　補五臟填骨髓續絶傷黑髭髪清頭目聦耳聽

肉蓯蓉酒浸四兩　甘菊花　巴戟去心各三兩　枸杞子二兩

右為末蜜丸梧子大每服三十丸空心鹽湯下温酒亦可

秘真丸　治腎水真陰本虚心火陽狂過甚心有所欲速于感動應之于腎疾于施泄此藥秘固真元降心火益腎水

蓮蕊　半夏泡各一兩　白茯苓五錢　砂仁五錢　益智仁一兩　黄栢酒炒二兩　甘草炙二兩　猪苓二錢半

右為末水浸蒸餅丸梧子大每服五十丸空心酒下

固本丸　此方常服甚有補益但因劫遲而有痰者往往泥膈殊不知製方有法耳

懐生地黄揀新肥者竹刀切　麥門冬去心各一斤半用淡酒浸一日盬点　懐熟地黄湯泡一日醋酒浸二日　天門冬去心膝各一斤半用生薑自然汁浸二日　右四味俱不犯鉄器浸足同磨或擂以渣盡為度旋加水亦如造漿粉之法少加杏仁易發脚矣共取澄底藥泥晒乾為末取淨一觔人參四兩另為末　右五味煉蜜丸梧桐子大每服百丸空心酒送下

壯陽丹　此藥強壯陽道固暖精血宜二三日用一服或與固精丸間服

肉蓯蓉酒浸一宿　五味子　蛇床子　遠志　蓮蕊

兎絲子(酒浸一宿蒸半日搗爛晒另研為末) 益智仁(各一兩) 山藥(二兩)
沉香(五錢) 右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服
五十丸空心溫酒下

固精丸 此藥益陰固精壯陽補腎(可常服又能生子)
蓮蘂(四兩揀淨用新者) 山茱萸肉(四兩用酒浸去核肥者) 覆盆子
(四兩酒浸蒸去蒂穰) 兎絲子(一兩酒浸一宿蒸半日搗爛晒乾) 芡實(五百枚去
殼) 破故紙(五錢微香炒) 白蒺藜(五錢去刺角微炒) 五味子(揀紅
潤者五錢) 右為細末煉蜜丸舂千餘下丸如梧桐
子大每服五十丸空心溫酒白湯任下

〈六十卷〉 四十五

班龍丸 治真陰虛極及老人虛人常服延年益
壽 鹿角膠 鹿角霜 兎絲子(酒浸二日研細) 栢子
仁(去殼) 熟地黃(酒浸二日研細) 右為細末以鹿角膠
入好酒烊化為丸或加蜜少許丸如梧桐子
大每服五十丸空心用塩湯或酒送下

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令
人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾
口燥育養精神
人參 丹參 玄參 白茯苓(去皮) 遠志(甘草湯煮去心)
酸棗仁(炒) 百部 石菖蒲 栢子仁(去殼) 五味子
桔梗 天門冬(去心) 茯神(去木) 當歸(酒洗) 熟地黃(酒蒸)
(各等分) 右為細末煉蜜每兩作五丸金箔為衣臨
卧燈心棗湯化下

炙甘草湯 治虛勞不足汗出而悶脉結悸行動
如常不出百日危急者十日死
炙甘草(二錢) 麥門冬(一合) 桂枝 生姜 人參 阿
膠(各一錢) 生地(三錢) 麻子仁(一合) 大棗(二枚)
右㕮咀水煎入酒些小日作三四料服

〈六十卷〉 四十六

嚴氏芪附湯 治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠
黃芪(蜜炙) 附子(炮各等分) 右㕮咀每四錢加生姜水煎

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短
頭暈 人參(半兩) 附子(炮去皮一兩)
右㕮咀分作三服加生姜水煎

瑞竹堂補氣湯 治氣虛脉浮而軟怔忡無力(自汗)
黃芪(蜜炒三兩) 人參 甘草(炙各半兩) 麥門冬(去心) 桔梗(炒各
一兩) 右㕮咀每四錢入姜三片水煎服(三因方名潤神散)

遠心散 治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精

人參 白茯苓 蓮肉 白朮 甘草 黃芪 白扁豆炒 薏苡仁炒 桔梗炒 乾葛炒各一两半 百合 桑白皮 半夏曲 乾姜炮 山藥炒 五味子 木香 杏仁炒 白芷 神曲炒 丁香各一两 當歸半两

右每服三錢生姜三片棗同煎空心溫服

黃芪鱉甲散 治虛劳客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減食口渴咳嗽紅痰

生地三两 桑白皮 半夏 知母 赤芍 黃芪各三两半 秦艽 白茯苓 地骨皮 柴胡各三两三錢 天門冬 鱉甲醋煮各五两 紫菀 甘草各二两半 人參 肉桂 桔梗各二两六錢半

右剉每服三錢水煎服

清骨散 治男子婦人五心煩熱欲成癆瘵

北柴胡 生地各二两 人參 防風 熟地黃 赤茯苓 秦艽各一两 胡黃連半两 薄荷七錢半

右每服四錢水煎溫服

葛可久先生癆症十藥神書內摘書七方

夫人之生也稟天地氤氳之氣在乎保養真元固守根本則萬病不生四體康健若曰不養真元不固根本疾病由是生焉且真元根本即氣血精液也余嘗聞先師有言曰萬病莫若劳症最為難治蓋劳之由因人之壯年氣血完聚精液充滿之際不能保養性命日惟酒色是耽無有休息以致耗散元神虛敗精液則嘔血吐痰骨蒸體熱腎虛精竭面白頰紅口乾咽燥白濁遺精盜汗飲食艱難氣力全無謂之火盛金衰重則半年而斃輕則一載而亡況醫者不究其源不窮其本或投之以大寒之劑或療之以大熱之藥妄為施治殊不知大寒則愈虛其中大熱則愈竭其內所以世之醫劳者萬無一人焉先師用藥治劳如羿之射無不中的今開用藥次第于後如嘔吐咯嗽血先以十灰散遏住如甚者須以花蕊石散止之○大抵血熱則行血冷則凝見黑則止理之必然血止之後其体必倦次用獨參湯補之令其熟睡一覺不要驚動睡起病去五六分後服諸藥○保和湯止嗽寧肺保真湯補虛除熱太平丸潤肺除痿清化丸下痰消氣

保和湯内分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味和之

保真湯内分驚悸淋濁便澁遺精燥熱盜汗六事加味用之餘無加服藥之法每日仍農煎薄荷湯灌漱喉中用太平丸先嚼一丸徐徐嚥下次噙一丸緩緩溶化至上床時亦如此用之夜則肺竅開藥得流入竅中此訣要緊如痰壅却先用餄糖拌清化丸一百丸吞下次又依前噙嚼太平丸令其仰面卧而睡服前七藥後若肺有嗽可煮潤肺丸食之如常七藥之前有餘暇煮此服之亦可續煮白鳳膏食之固其根源病可之後繼以十珎丸完其根本此爲收功起身之妙用也

十灰散　治劳症嘔血咯血嗽血先用此遏之

大薊　小薊　栢葉　荷葉　茅根　茜根

大黄　山梔　牡丹皮　棕櫚灰各等分

右燒灰存性研細用紙包碗盖地上一夕出火毒用時先以白藕搗碎絞汁或蘿蔔搗絞汁亦可磨真京墨半碗調灰五錢食後服病輕用此立止病重血出升斗者如神之効

又方　花蕊石燒過存性研如粉　右用童子小便一盞煎醋調末三錢極甚者五錢食後服如男子病則和酒一半婦人病則和醋一半一處調藥其瘀血化爲黄水服此藥後其人必踈解其病體却用後藥而補

獨參湯　治劳症後以此補之

人參一兩去蘆　右㕮咀水二鍾棗五箇煎細細服之

保和湯　治劳嗽肺燥成痿者服之决効

知母　貝母　天門冬　麥門冬　欵冬花各三錢　天花粉　薏苡仁　杏仁各二錢炒　粉草炙　紫苑　五味子　馬兜鈴　百合　桔梗各一錢　阿膠　生地黄　當歸　紫蘇　薄荷各五分　生姜三片

右水煎入餄糖一匙藥内服之每日三服食後進一方無地黄有百部　若血盛加蒲黄茜根藕節大薊茅花　痰盛加南星半夏橘紅茯苓枳殻枳實括蔞實炒　喘盛加桑白皮陳皮大

腹皮蘿蔔子葶藶子蘇子　熱盛加山梔子
炒黃連黃芩黃柏連翹　風熱加防風荊芥
金沸草甘草菊花細辛香附
寒盛加人參芍藥桂皮五味子蠟片
保真湯　治勞症體虛骨蒸服之決補
當歸　生芐　熟地　黃芪　人參　白朮
赤茯苓　白茯苓　蓮心各半錢　天冬　麥冬
赤芍藥　白芍藥　五味子　知母　黃柏炒
地骨皮　柴胡　甘草　陳皮各二錢
右以水煎生姜三片棗一枚食後服
驚悸加茯神遠志栢子仁酸棗仁
淋濁加萆薢烏藥猪苓澤瀉
遺精加龍骨牡蠣蓮鬚蓮子
便澁加木通石葦萹蓄
燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲
盜汗加浮麥炒牡蠣黃芪麻黃根
太平丸　治勞症咳嗽日久肺痿肺癰並宜噙服
天冬　麥冬　知母　貝母　款冬花　杏仁各二錢　當歸　生地　黃連　阿膠炒各一兩半　蒲黃
京墨　桔梗　薄荷各一兩　北蜜四兩　射香少許
一方有熟地黃　右煉蜜和丸如彈子大食後濃煎薄荷
湯先灌漱喉中細嚼一丸津嚥送下上床時
再服一丸如痰盛先用飴糖拌清化丸一百
丸送下後即噙嚼此丸仰面睡從其流入肺竅
清化丸
白茯苓　青礞石煅黃金色　白礬枯　橘紅　牙皂炙
半夏　南星各二兩　枳實　枳殼各一兩半　薄荷葉一兩
右為末以神曲打糊丸如梧子大每服一百
丸上床時飴糖拌呑欠噙嚼太平丸二藥相
攻痰嗽掃迹除根
草還丹　治陰虛骨蒸
青蒿一斗五升童便二斗文武火熬約童便減
至二斗去蒿再熬至一升入猪膽七箇再熬數
沸用甘草末收和為丸梧子大每服五十丸
丹溪治勞病用四物湯加竹瀝入小便
陰虛發熱四物湯加黃栢降火補陰甚者加龜板

御院瓊玉膏 滋血補氣延年益壽

人參三十六兩辛為末 白茯苓二十四兩為末 生地黃十六斤搗取汁去渣 蜜六斤 右汁入銀石器內以油紙包口外仍以箬包縛緊重湯內懸胎煮之文武火不住三晝夜入井中浸一日出火毒又煮一日出陰毒取出每空心或酒或白湯調下

羅氏清神甘露丸 男子婦人虛勞不足大骨枯大肉陷並治 生地汁 蓮藕汁 生乳汁等分砂石器內文武火熬成膏子用後藥

人參 白朮 黃連 黃芪 五味子 胡黃連各等分為末 以膏和為丸梧桐子大每服五十丸人參湯下

補腎丸 治陰虛有痰膈不清者

龜板酥炙一兩半 黃柏炒一兩半 牛膝二兩 乾姜二錢 陳皮五錢 為末姜汁打糊為丸每服七八十丸

保命集黑地黃丸加五味子為腎氣丸治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補氣益腎

蒼朮一斤油浸 熟地一斤 五味子半斤 乾姜秋冬一兩夏半兩春七錢 右為末棗肉丸梧子大食前米飲或酒服百丸治血虛久痔甚妙經曰腎惡燥急食辛以潤之此藥開腠理生津液通氣又五味子酸以收之此雖陽盛而不燥熱乃是益臟虛損于內故可益血收氣此藥類象品方也

丹溪云虛勞皆積熱做成始健時可用子和法曰後羸敗四物湯加減送消積丸使熱不作也蒸蒸發熱積病最多

退實熱勞積痰方 鱉甲 龜板 側柏 半夏 瓜蔞仁 黃柏 黃連 右為末炊餅丸

又濕痰發熱 黃芩炒 黃連炒 香附生 蒼朮

右為末瓜蔞穰為丸

羅太無柴胡飲子 解一切肌骨蒸熱寒熱往來及傷寒發汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經病不快產後但有如此之症並宜服之

黃芩 甘草炙 大黃 芍藥 柴胡 人參 當歸各五錢 姜三片水煎服

保命集防風當歸飲子　治煩熱皮膚索澤食後煎服空心宜以此飲子下地黄丸

柴胡　人參　黄芩　甘草　防風　大黄　當歸　芍藥各五錢　滑石二錢　每服五錢水一盞半姜三片煎服　如痰嗽加半夏　如大便黄米穀完出驚悸溺血淋閉欬血衄血自汗頭痛積熱肺痿後與大金花丸

大金花丸　黄栢　黄芩　黄連　山梔子生用各一两　右為末水丸小豆大每服百丸温水下日二三服或大便實加大黄自利如中外熱此藥作散煎服名解毒湯或腹痛嘔吐欲作利者每服解毒湯半两加半夏茯苓厚朴各三錢姜三片　如白膿後重下利者加大黄一錢

麥煎散　治少男室女骨蒸婦人風血攻疰四肢

赤茯苓　當歸　乾漆　鱉甲醋炙　大黄煨　常山　柴胡　白术　生地　石膏各一两　甘草五錢　右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後臨卧服若有虚汗加麻黄根一两

東坡云此黄州吴判官療骨蒸黄瘦口臭肌熱盗汗極効吴君寶之不肯妄傳

地骨皮枳殻散　骨蒸壯熱肌肉消爍少力多困夜多盗汗　地骨皮　秦艽　柴胡　枳殻　知母　當歸　鱉甲醋炙等分　右桃柳枝頭各七箇姜三片烏梅一箇水煎臨卧服

羅氏秦艽鱉甲散　骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤日倦盗汗　鱉甲醋炙　柴胡　地骨皮各一两　知母　秦艽　當歸各五錢　右為粗末每服五錢水一盞入烏梅一箇青蒿五葉同煎至七分早晚各一服

人參地骨皮散　治臟中積冷營中熱按之不足舉之有餘陰不足而陽有餘也

地骨皮　人參　柴胡　生地各一两十　茯苓五錢　知母　石膏各一两　每服一两生姜三片水煎細細服

人參柴胡散　邪熱客于經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛夜有盗汗婦人虚劳骨蒸尤宜

白茯苓　白术　柴胡　半夏曲　當歸

人參 乾葛 甘草炙 赤芍藥各等分

每服五錢生姜五片棗三枚水煎食熱服許學士云但有勞症皆可服熱退即止大抵透骨葛根第一柴胡次之一方有苦參五錢

海藏六合湯 治婦人骨蒸

當歸 白芍藥 川芎 地黄已上補血 地骨皮瀉腎 大牡丹皮瀉包絡火各等分 水煎服

外方 治骨蒸 桃仁一百二十枚去皮留尖研

為丸平旦井花水服令盡服訖隨量飲酒仍須

吃水甚効隔日一服百日不得食肉

八一卷 五十七

羅氏逍遥散 血虚勞倦五心煩熱頰赤盜汗室

女血弱營衛不和月水不調痰嗽潮熱肌體羸

瘦漸成骨蒸 白术 茯苓 芍藥 當歸

柴胡 甘草炙 薄荷少許 生姜一片水煎服

蒸病治者各隨經虚實内外淺深加減宜古今錄

驗五蒸湯 茯苓 甘草 人參 竹葉

地黄 葛根 知母 黄芩 石膏 粳米二合

水三盞小麥二合煎至二盞去小麥納藥煎

至一盞温服隨症加減于後忌海藻菘菜蕪荑大醋

實熱 加黄芩黄連黄栢大黄

虛熱氣加烏梅秦艽柴胡血加青蒿鱉甲紫菀蛤粉小麥

肺蒸 鼻乾加烏梅 天冬 麥冬 紫菀

大腸 右鼻孔乾痛加大黄 芒硝

皮蒸 舌白唾血加石膏 桑白皮

膚蒸 昏昧嗜卧加牡丹皮

氣蒸 鼻乾喘促遍身氣熱加人參 黄芩山梔

心蒸 舌乾加黄連 生地

小腸 下唇焦加赤茯苓 生地 木通

八一卷 五十八

血蒸 髮焦加生地 當歸 桂心 童便

脉蒸 唾白浪語脉絡溢脉緩急不調加當歸生地

脾蒸 唇焦加白芍 木瓜 苦參

胃蒸 舌下痛加石膏大黄芒硝乾葛粳米

肉蒸 食無味而嘔煩躁不安加白芍

肝蒸 眼黑加川芎 當歸 前胡

膽蒸 眼色白加柴胡 括蔞

筋蒸 甲焦加當歸 川芎

三焦蒸 乍寒乍熱加石膏 竹葉

腎蒸 兩耳焦加生地 石膏 知母 寒水石
膀胱蒸右耳焦加澤瀉 茯苓 滑石
腦蒸頭眩熱悶加生地 防風 羌活
髓蒸髓枯骨中蒸加生地 當歸 天門冬
骨蒸齒黑腰痛足逆冷瘡虫食藏加鱉甲 地
骨皮 生地 牡丹皮 當歸
肉蒸肢細趺腫藏府皆熱加石膏 黃栢
胞蒸小便黃赤加澤瀉茯苓生地沉香滑石
凡此諸症皆熱病後食肥甘油膩房事飲酒
犯之而成久蒸不除變成瘡病死期近矣
牡丹皮治無汗之骨蒸能瀉陰中之火知母治有汗之骨
蒸 衍義治骨蒸勞用薄荷汁與衆藥熬成膏
經驗方治勞燒香法 玄參一斤 甘松六兩
為末煉蜜一觔和勻入磁瓶內封閉地中埋
窨半日取出更以炭末六兩煉蜜六兩再和
入瓶封窨五日取出燒使鼻中常聞香
氣或于房中或床下燒之癆瘵頓愈

傳尸癆

華佗治傳尸癆太乙明月丹其病肌瘦面黃嘔吐
欬嗽不安先燒安息香令烟出病人吸之若不
嗽者非傳尸也不可用此藥
雄黃 木香各五錢 天靈蓋炙 鱉甲醋炙各一兩
兜粟二兩 輕粉二錢半 右為末用法酒一大升大
黃末一錢三分熬膏入前藥為丸彈子大硃
砂為衣五更初服勿令人知以童便和酒化
一丸服如人行十里許必吐出虫狀如灯心
細長及如爛瓜子又如蝦蟇狀各不同未効
次日再服以應為度
紫庭治傳尸伏尸皆有虫須用乳香薰病人之
手乃仰手掌以帛覆其上薰良久手背上出毛
長寸許白而黃者可治紅者稍難青黑者即死
最驗若薰之良久無毛者即非此症乃屬癆瘵
虛損即用前參芪溫補之藥
取傳尸伏尸癆虫法
天靈蓋十字解者酥炙為末三分 安息香五錢 虎糞骨人骨為上獸骨
次之酥炙五錢 鱉甲大者九肋醋炙一兩 桃仁去皮尖二錢半 射香另研

檳榔一錢 青蒿苗六兩 豉三百粒 葱頭一百二十枚
童便半碗 楓葉二十一葉 桃柳東南枝如筋頭大者各七條各七
十右先將青蒿桃柳葱頭用水二官升煎半乾
去滓入靈蓋虎糞骨鱉甲安息香童便煎取
汁去滓約有四五合將檳榔射香研匀調作
一服早辰空心服以被蓋之使汗出恐汗內
有細虫以白紙拭之投火中須臾必下如有
虫以大火焚之棄流水㪽用藥勿令病人知
之半月後血氣復完再進一服依前法三次

無虫乃止以羮酒食調理其病自愈
又一方有阿魏五錢 右天靈蓋古人不得已而用也如得已可勿用
陳無擇治瘵虫法 桃枝 柳枝 桑枝 梅枝
石榴枝各七莖長四寸 青松一小握 右用童便一升半
葱白七莖去頭葉煎及一半去滓別入安息
香阿魏各一分煎一鍾濾去滓調辰砂末半
錢檳榔一分射香一字分作二服調下五更
初一服五更三點時一服至巳牌後取下虫
色紅者可治青者不治見有所下即進稀粥

飲溫煖將息不可食粉麵生冷毒物合時須
擇良日不得令猫犬孝服穢悪婦人見之
濟生神人阿魏散 治骨蒸傳尸等寒熱羸瘦困
倦喘欬 阿魏三錢 青蒿握研 東北方桃枝一握
甘草如病人中指許大男左女右細剉 右以童便二升半隔夜
浸藥明旦煎取一大升空心溫服分為三服
每次調入檳榔末三分如人行十里再進一
服男病女煎女病男煎合藥時忌孝子孕婦
病人及腥穢鷄犬等物服後忌油膩溼麵生
冷硬物服至一二劑則吐出虫子或瀉出更
不須服餘藥若未吐利即當盡服病在上則
吐在下則利所出虫如馬尾人髮即愈服藥
後覺五臟虛魂魄不安即以白茯苓湯補之
白茯苓湯 茯苓一錢 人參 犀角各五錢 遠志去心
龍骨 防風去蘆各二錢 甘草三分 生地 麥門冬
去心各四錢 大棗七枚 右以水二大盞煎作八分作三
次溫服如人行十里一服仍避風寒若覔未
安隔日更作一劑已上藥餌須連服之

羅氏紫河車丸　治傳尸癆三月必効其餘癆症只消數服
紫河車（一具米泔浸一宿洗淨焙乾）　鱉甲（醋炙）　桔梗　胡黃連　白芍藥　大黃　龍膽草　敗鼓皮心（醋炙）　黃藥子　貝母　知母（已上各二錢半）　芒硝　犀角　莪朮（各一錢半）　辰砂（二錢）
右為末煉蜜丸梧子大辰砂為衣空心溫酒服四十丸

肘後方　治尸疰鬼疰病用桃仁五十枚研碎以水煮取四升作一服盡當吐如病不盡（二三日再服）

又方　以獺爪骨為末酒服之其虫即去妙々

蜈蚣散
赤脚蜈蚣（以竹筒盛薑汁浸焙乾一條）　烏鷄糞（二錢半將鷄于五日前以火麻子餵之然后取其糞用）　檳榔（二錢半）　辰砂（一錢二分半）　麝香（一錢另研）
右五味研為細末和勻入煎藥內服凡合藥宜六甲建除日忌孝子鷄犬婦人見之亦不可與患者知如利下惡物併虫急用火燒其病者所穿衣服被褥尽燒之食葱粥將息以復元氣務要清心靜養

方外還丹
生生子曰余遊方之外殆五十有年所矣至人难遇大藥难煉抱朴子曰不得金丹若服草木之藥及修小術可以延年遲死但不得僊也顧人之难得者生釋曰生死事大無常迅速凡為道者常患於晚不患於早也余故採僊經要語以示人之攝養須當及時藥餌須早修製不可盡委之天命蓋人定亦可以勝天也僊經曰養生以不傷為本傷之一字包括甚廣非獨五味七

情過多為傷諸如才所不逮而困思之為傷力所不勝而強舉之為傷汲汲所欲之為傷久談言笑之為傷寢息失時之為傷沉醉嘔吐之為傷飽食即卧之為傷跳走喘乏之為傷勉強色慾之為傷凡言傷者亦不便覺也久則損壽耳是以養生之家唾不及遠行不疾步耳不極听目不極視坐不至久卧不及疲先寒而衣先熱而解不欲極飢而食々不過飽不欲極渴而飲飲不過多凡食過則結積聚飲過則成痰癖不

歡甚勞甚逸不欲起晚不欲汗流不欲多睡不
欲多唆生冷不欲飲酒當風不欲數數沐浴冬
不極寒夏不窮涼不露卧星下不眠中見肩大
寒大熱大霧大風皆不欲冒之故善攝生者卧
起有四時之早晚興居有至和之常制調利筋
骨有偃仰之方杜疾閑邪有吞吐之術流行營
衛有補瀉之法節宣勞逸有與奪之要忍怒以
全陰氣抑喜以養陽氣然後先服草木以救虧
缺後服金丹以定無窮長生之理盡於此矣

還丹秘要論

夫還丹者乃返本還原之道人稟父精母血而生
初為赤子時元精元氣元神無不純全及其年
漸長成蓋因眼耳口鼻門所誘一靈真性被色
声香味所觸習染深固以是日復日歲復歲元
精化為交感精元氣化為呼吸氣元神化為思
慮神此三元分泄难復天真故祖師垂言立教
載諸丹經示人以修補之法精損則以精補氣
損則以氣補神損則以神補是用返本還元之

道以復之且復者何也以全精為深根以全氣
為固蒂以全神為妙合能全此三者實為身中
之真藥物也諸如以天地為炉鼎以日月為水
火以烏兎為藥物以陰陽為化機以龍虎為妙
用以子午為二至以卯酉為二分此皆法象譬
喻其實無過身心意三者身係乎精心係乎氣
意係乎神返者返此三者而逆行還者還此三
者而復真也三全合真乃曰還丹也

固精法　止夢遺

生生子曰精不可以不秘不秘則無以全乎神夫
精神者猶陰陽然相依相附不可時刻相離也
養生之家全貴秘精然秘精之法妙在水火既
濟倘久曠不泄淫火萌動陽剛時舉為無一法
制之安能攝養若强以固澁之藥澁之恐防作
病當用升降之法制之不惟精固其陽可以立
痿陽痿則精亦隨歸原永無他患勝如服藥遠
矣其法開天門塞地户息心静念以意想於兩
足湧泉穴烘烘然微熱隨以意導之從兩内臁

而上兩腿入兩跨乃用氣縮身一提如忍大便之状升至腰俞又微微縮脇提起自双關夾脊而上直至後項玉枕關畧昂頭導至坭丸宮百會穴內畧聚氣一聚隨又降自額門天庭穴兩眉間分從兩太陽順下將至鼻間即當卷舌尖緘在金津玉液二竅勿使真氣從口漏洩速以鼻吸清氣輕輕然嚥從喉下送之心管之內畧待氣定又即直送至丹田氣海之中水火自然既濟陽事立痿如此三升三降精氣歸原久久

行之自然不洩庶可行功養攝至妙至妙

藥貴全類

傳經曰全類易收功非種难為巧玆求全類之藥配合之方以為補益之助得之者宜寶之

取紅鉛法　凡擇女鼎忌犯十悪須用五善調養百日不可食五葷三厭辛热等物筭他生年月日至五千四百八十日足天應星地應潮紅光滿而發火烧身癸将至矣預備金銀壺籥形如偃月器様時至即鰲合虎穴令騎坐空竅凳上不可欹側倒卧已降取下再换一器外用絹帛以收其餘者器中有一點硬子紅如硃砂者乃黍米珠也急取出以真土為衣金銀器合貯否則氣洩化為黄水不堪用矣餘不成粒者為紅鉛听後製用次早以乳煎湯服之凡覔精神昏悶四大不收渾身火熱急取初生蟠桃乳服之以解燥渴得此一度百病獨除精神強壮益壽延年誠人元服食之妙品也近有十二三歳而来者有十六七歳而来者皆由稟受氣偏調養

失宜但可作首經金鉛而已

取梅子法　夫梅子者乃癸水之先氣五臟之精粹也凡取之須預養女子不使諠譁歌舞以致失墜五千四百八十日之前但見兩腮生花印堂紅見身熱氣粗腰膝痠疼癸将降矣即與壺籥如上法用之候其降取視中有一點結硬如桃紅色者即是急取出以真土為衣如癸水中不見令黄婆視鼎内有血系懸吊如小櫻桃者以中指挑断取出真土為衣乳煎湯服之如覔

燥渴困悶以頭生男乳觧之餘紅鉛另製
製首經金鉛法　取女子真正首經或器或帛以
童便洗下對加清水量投晋礬如紅鉛一碗用
礬一錢撹百餘轉澄清去水又打澄去水盡量
入頭生無病乳置金銀盤或磁盤内紙糊口曬
乾或金銀罐内塩坭封口小火養三日取出為
末乳膏為丸一㕥可作九丸或十五丸真土為
衣擇吉日凈身心夜半無灰酒或乳送下三丸
凡服鉛藥須存神定意黙固守中如覔燥熱以

乳觧之七日不可出户一月戒劳慾此三品皆
可延命一品黍米珠二品梅子三品首經金鉛
此外功効緩矣夫四大流行其間人頼之以营
恭百骸酬酢萬事虧喪之後真陽一衰百病叠
出故假未破女子之陰以補助虧欠之陽正所
謂採陰補陽之義上三等皆純氣未耗為同類
之妙品故特表於先焉
生取梅子法　照前擇㕥癸将動時急以寶珠丹
服之與彼素龠騎坐定額上輕拍兇掌其經即

降已降可照前取梅子法一樣取之取出以真
土為衣銀盒收貯如經不至可服寶珠丹催之
降而後止如無真土或硃砂金箔亦可乳湯服
之其功亦妙以其氣全故也
製紅鉛法　先以烏梅一斤煎水一桶去梅冷定
如浔紅鉛一斤用梅湯三碗多寡量用洗下紅
鉛再對加井水撹百餘轉盖定澄去清水如此
七次或九次去穢穢氣尽預以盆貯灰按實灰
上鋪綿〻上鋪帋傾鉛帋上滲去水日乾為末

配合服之助血養神功効甚大
製白鉛法　照前用梅湯洗下少加礬撹澄去水
如此五七次用乾菉荳粉置碗内按實中做一
圓池傾鉛池内滲乾取出如未白仍以梅湯撹
澄去水荳粉滲乾以白為度晒極乾研細銀器
收貯早晩单服或配藥或乳膏丸服此藥不作
燥熱安神益氣功难尽述
製靈鉛法　将所取紅鉛量多少以燒酒洗下如
紅鉛一碗燒酒二碗撹百轉澄清去酒再用酒

一碗仍攪澄去酒再用清水攪澄去酒味磁盤晒乾真鉛如牛黄色不洩元氣配金乳粉為丸每五更酒下五分自覺身躰輕健精神倍常陽事興壯丹書云先補氣後補血補得丹田温温熱上至頂門泥丸宮下至脚底湧泉穴一身四大俱補完致使精神無漏泄正此之謂也○凡女子首經為金鉛二為紅鉛三則後天紅鉛矣○已上諸品皆能及補真氣真氣既足更求伏氣之法長生之道在是矣

製真土法　秋分後取山東地方人糞在野地上揀擇方圓成顆粒者稀片不用晒乾木槌打碎火燒存性入紅缸中河水煎滚冲泡攪之待冷以布濾去黑查將汁露天熬乾連鍋煅紫色烟尽退火取起研末再用秋露水淋煎乾鏟出入陽城罐内鉄灯盞盖口塩泥封固大火打一炷香取出研末仍用露水再淋煎乾打三炷香如此九次或七次五次取出其土形如氷雪氣味香美听配藥用此藥能擒制真鉛婦我黄舍補食之妙藥也山東人多食黍稷故用之

寳珠丹　催經極妙　當門子一粒　樟腦五分　紫梢花去梗　丁香　大力子　急性子各錢　班猫一對去翅足　紅娘子一對去翅足　右共為細末每服半分無灰酒送下不降再服催之梅落即止

煉乳膏法　取頭生男一二日内小兒未食者擠下銀鍋煉成膏不可火大恐乳焦則力減或慢火焙乾或晒乾為粉　即蟠桃乳

製金乳粉法　取頭生美男乳須嬰兒有神氣年在三七内者擠下乳對同露水攪百轉露一夜水乳自分去水磁盤晒乾漸積听用

取乳酥法　取乳仝上每乳一碗入秋石半分攪匀飯上蒸熟取出冷定面上結如腐皮者是酥挑出晒乾酥下乳晒乾亦可對酒服

又取乳粉法　將乳於磁盤内晒乾為粉配藥或单服皆妙

取碧玉僊瓶法　即初生嬰兒口中血毬也收生之際預以綿裹食指甘草湯蘸湿候兒頭出牝

户速於口中取出如杏核大紅似硃砂者是也一名混元丹一名萬年糧若待落地即吞下矣全在收生婆手快方可取得以乳膏為粉裹之沉香盒收貯盒底内盛硃衣浮仙飛衣上蓋密懸吊井中一夜以解胎火次早煎乳陳黄精酒吞一枚避風将養覺燥熱用乳解之此乃父毌始精元始之氣能補人真一之精消除沉痾宿疾功効難尽配方具後

取交梨火棗法　嬰兒臍帶内有米大珠十餘顆是也取出入沉香盒内照前去胎火配合丸藥功効亜於仙飛或仝首經用之殊妙

取後天月月一枝花　此藥雖是後天渣滓然亦精氣所結服之亦可壯陽却疾擇年三七以内美貌身無疾苦經事調勻者稟僑接下視中有成粒如枸杞子樣者急以真土為衣銀器收貯乳酒送下或配後混元毬霜丸服或配混元丹服又妙每月服二三粒亦可使人精神無敗又服可以生子詩曰月月一枝花陰山是我家有人認得我還精大補他

陰煉秋石法　置缸三四口於靜處每缸貯龍虎二水五分加井水五分明礬二两白朮二两松栢葉各二两柳棍五根一扎順攪千餘轉蓋定待澄清傾去清水又满加井水以絹濾去渣又攪又澄又傾如此十餘次直候水香為止去水尽米篩内鋪薄帋傾渾龍虎水於帋上日乾如粉之白為上用磁罐收貯此藥專治咳嗽痰火虚勞症聽後配用

陽煉秋石法　砌灶二口於露天安大鍋一口次小鍋一口洗去銹以前所積二水每入五杓於大鍋文火煎之撇去沺沫尽起置小鍋中如此煎完就於小釜内文火慢煎鉄鏟不住手鏟之勿使生底候成黑膏子以小缸一口合之周圍塩泥封固留一孔看水氣尽有青氣金星飛出急以泥塞之濕布蓋缸底以水潤之文火燒至釜底紫色為度冷定去封口泥尽将昇上缸的已汞或紅黑白各色各收取候用将黑膏另入釜

内煅烜盡通紅冷定研細下滚水泡之或露水雪水尤妙篩鋪薄帋濾去黒不用看淋下水清碧以磁盤煎出浄石如略黄色仍前煎乾淋過直候清同井水方以磁盤文火漸煎乾少潮日乾其色白如雪即陽煉龍虎石也或入藥服或代塩入肉蔬中食之滋補甚大久久服之陽精堅固肌躰潤澤

又陽煉法　先用塩泥羊毛固濟陽城罐十餘箇陰乾聽用将二水桑柴煎成黒粉入罐内鉄盞盖口鉄線扎緊塩泥固縫三釘支起百眼炉從文至武打火三炷香盞内頻以水激之香尽退火冷定取開昇盞上者另收聽後打黄芽罐内石取出研末滚水淋過銀鍋煎乾如此九次入磁罐蠟封口墜井中三日出火毒毎日空心白滚湯下三五分此石乃人身五臟之精以法煉成大能生腎中之陰水壯丹田之元氣實人元之丹藥也書云九熬九煉大還丹人得餌之壽延長正此謂也

秋石氷片法　将前淋出極清的水不拘多少入大白磁罐盖口緊密於冬至後極寒天埋露天地中凍七日取出傾水於另器取水晒乾銀器收貯空心服之其味甜淡大能消痰降火補氣生津

煉伏火黄芽法　以前所凍龍虎石秋露水淋過打火九次形同白玉方入陽城罐内明炉武火化成清汁将前所取巳汞點之以白點白以紅點紅以黒點黒待汁清取出成一餅其色唯定或紅或白或黒或紫丹書云其白容易得一黒最难求所以外備五色内滋五臟乃養生之妙藥也

取秋石水花法　凡磁盤煎龍虎水時看煎至六分時候飛起圓泡急用銀匙挑起白綿帋晒乾銀器收貯此水花乃先天輕清之藥服之令人肌膚光瑩身躰輕健

煉黄芽法　取小白磁罐口如錢大者以猪毛泥固濟陰乾入前所取巳汞五錢或一两用白碟

底打成圓錢坐口上鉄線扎緊鹽泥封固火灸乾三釘支起二指高百眼炒先文火次略武打三炷香蓋上以水激之香尽取出其芽昇在蓋上金色一餅取下此乃龍虎初結之氣名曰金花又號黃芽服之令人五臟生精元神壯實功効彌大

煉白雪法　照前取黃芽法一樣封固打火黃芽乃初陽之氣易飛易走宜火小火小則色変輕黃丁雪乃二陽之氣火宜略大其色変白此火候　妙造化自然非人力所能為也火足取出成餅如白玉之状此龍虎至英之氣名曰玉英又號白雪服之補三田助五臟蠲病除痰補益非小

晒甜秋石法　擇僻處築一臺高三尺五寸上置缸五口按五行積龍虎水五滿缸於三伏天晒露遇雨蓋之晒至半缸併作三缸以按三才仍晒至三中之一併一缸以象太極又晒至二三斗方入不見水新磚十二塊以合十二時夜浸

日晒水尽為度先掃净陰靜空房一間噴水溼地竹片鋪地側竪磚於竹片上上用筐蓋待生白霜穉毛掃下貯銀器內又生又掃尽而止此石不經水火不泄元氣又受日月精華較之火煅功効尤大

取秋石氷法　臘月極寒天將雪水淋清龍虎石茶碗各盛半碗置露天中次早水面氷結以小刀貼碗輕劃挑出大磁盤內日乾此氷花侵晨噙匕少許極能生津化痰功効甚速餘水以銀鍋煎乾原是秋石

製混元毬甜石法　照前晒甜秋石法一樣待乾至天半缸接混元毬十數箇於內密蓋之待至来年伏天取出毬来日中曝晒伏尽剖開毬內取雪玉英其味甘美大能補心血化痰涎缸底生結如氷者取出晒乾功力亦與毬內者同毬研末猶可入補藥

取秋石精英法　擇童男十六童女十四歲調养於冬至日積起九〻日止桑柴火煎成黒膏子

入磁罐封口待夏至日取出晒乾研細以秋天荷葉五穀上露水拌浸舖大磁盤内晒乾勿動夜露日收陰室其藥自生出盤边上其色紅黃其味如水取下再加露水拌晒直至不生方止所取精英再以秋露拌晒復使生出色淡味甜為佳尽則止以首經乳汁拌濕入潔淨磁盤内日晒夜露盤上架水晶珠五枚以吸日月精華每日加頭生男乳女子首經一次晒至八月十六日止收貯聽用名曰水中金實养生最上一衆神品也

取秋露水法　八月朔起至二十三日止每日天未明時以極淨布拭五穀荷葉上露水捏出新缸中或新罈内密封久留不敗

取雪水法　取十二月入臘後雪貯新缸中或新罈内密封可留五六年不敗

三妙丹　乳酥　紅鉛　秋石　各等分為丸空心每服三分所謂乳補氣鉛補血石補精之氣充足何病之有

三元丹　金鉛一丹　仙鹿一枚　乳粉二錢五分　為丸空心服之久服可為人仙

五精丸　陰煉石　陽煉石　乳粉　紅鉛　仙鹿　混元毬霜　共為丸芥子大真土為衣　空心乳酒下三分

補真膏　黃精　山藥　懐地黃　熟地黃　天冬　麥冬　通肉　巨勝子　栢子仁　松子仁　何首烏　人參　茯苓　兎系子　杜仲各一兩　肉蓯蓉五錢　五味子三錢　黃栢二兩塩酒童便各製　牛膝　白术四兩　當歸三兩　甘草　陳皮　砂仁　知母　白芍　川芎　鹿茸　小茴　蒼术各一錢　已上各製淨入銀罐中封口露水熬出濃汁綿濾去渣再入銀罈封固慢火熬成膏聽用

紫虛延齡丹　碧玉仙鹿男女各三枚　交梨火棗男女各三十六枚　秋石精英二兩四錢　補真膏四兩　右擇天德合月德續世益後福生黃道吉日煉蜜和丸搗三百杵丸如梧子大每空心面東服九丸沉香黃精煎酒對乳下　此藥能却寒暑填精髓有返老

還童之功髮白轉黑之驗服之久〻功効自見一七痊宿患三七精神強七〻功难比量允紅鉛秋石仙䕶諸品皆可配滋補藥中同故止録亦數方以為式耳

辯鍾乳石

鍾乳石本草云甘温無毒主治欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅益氣補虚損療脚弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顔色不老〻人有子治洩精寒嗽壯元氣益陽事通声補〻劳七傷補髓治消渴引飲

生生子曰按鍾乳石本天地冲和之氣融結而成故服食之可以壯元陽而療百病也柳子厚博洽人也目擊當時服食者之有功姑載入文集以廣其傳朱丹溪乃謂金石之藥不可過服以説子厚之多事斯猶不識鍾乳之妙大非衆石比倫衆石躰質堅頑必假火煅煉始乃可服由久經火煉則石之性從火而化為燥烈者矣夫鍾乳之為物服食不必煅煉入腹便化即從营衛之氣流行而至各臟絡以氣補氣故無疑滞以不經火亦無燥烈此古聖所以命名為鍾乳也蓋鍾者聚也云乳者亦非獨謂其形象乳極言其補養之功用氣味象乳也丹溪不惟不識水煉之法玩其辭猶不識鍾乳乃冲和之氣融結而成悉以石類慓悍氣偏目之殆亦智者千慮一失也據本草所載明目益精安五臟補虚損久服延年益壽等語豈神農伊尹之神聖其所〻反不逮丹溪哉此亦可槩見矣余歷驗有功〻特表出以為養生補益之一助云

煉鍾乳法　取上好潔白有蟬翼紋鍾乳石打碎入金銀罐中内着水浸高二指重湯煮五七日夜乾則添水七日足再換清水煮一日則其性皆純矣取出研極細末玉槌着水研之極其光膩點於舌上即化無半毫渣滓之声可為服藥為度工夫全在細上以磁罐收貯聽用

鍾乳丸　治丈夫衰老陽絶肢冷氣乏減食腰痛脚痺久服延年益壽全神駐顔

鍾乳粉三两　兎系子水淘净酒浸三日焙乾　石斛去根各一两　吳茱萸湯泡七次五錢　為末煉蜜和丸梧桐子大每服七丸空心温酒或米湯下一日二服服訖忌食參术及一切臭敗之物初服七日不可犯房失麋藥有功七日外聽行

鍾乳煎　治同上　鍾乳粉三两　以夾絹袋盛之牛乳一大碗煎減三之一取乳飲之一日一服次日用酒将袋淋净再入牛乳照前煎服一袋可七八三十度則力尽再換其用過者和麵餵鳥

丙骨四雞使其生蛋食之有益

五子全鹿丸　補五臟養精神填骨髓壯元陽健筋骨多生育延年益壽功効非常　金櫻子去核　枸杞子去蒂酒洗　兎系子製如前　黄栢去粗皮各五觔　白茯苓去皮　牛膝去芦　杜仲去粗皮姜汁炒各二斤　車前子一斤净洗　五味子酒洗一斤半　右俱粗末用角鹿一隻取血拌藥晒乾其角煎膠肉與五臟煮極爛将藥末拌匀搗成餅焙乾骨用油炙酥皮煮成膠将前餅復磨為細末用鹿角膠及鹿皮膠加酒拌匀再加煉蜜為丸梧桐子大每空心及下午食前淡塩湯送下七八十丸寒月酒下

紫石英散　抱朴子云紫石英久服成仙本草云壯神氣此方治虚怯驚悸飲食不進成癆者服之有奇功　紫石英五两打成粗米粒以水一斗煎取三升澄清去渣将汁作羮粥食之服尽再煎五料見功久服能駐顔住世

陰症毒下元虚冷元氣将絶及陽痿不起諸虚弱 服此可回陽復命　硫黄一两　青塩二錢　全為細末用蒸餅為丸菉荳大每服五丸或十丸空心酒下即以食壓之神効

駐顔小還丹　諸虚百損男子婦人久服返老還童功効殊常真仙品也

鹿角霜八两　亀板霜八两　虎脛骨好酒炙六两　天門冬酒洗去心　熟地黄各四两　人參去芦二两　松子仁二两　栢子仁二两　紫河車一具焙乾　鹿角膠亀板膠各四两酒化開全前藥為丸梧

桐子大每空心秋石湯送下五六七十丸

按此方用龜鹿虎者以其多壽也能壯人之筋骨用天冬地黄人參者法象三才以補人之精髓用紫河車以補人之元神松栢耐歲寒皆足以養神氣非泛常草木可比故有駐顔延筭之功素有火者加雄猪胆汁五枚煉熱入之以寓降火之意

赤水玄珠第十一卷目録

鬱證門
痿證門
脚氣門
白濁門
夢遺門
汗門 附頭汗 手足汗 絶汗
消癉門
口燥咽乾

赤水玄珠第十一卷

新安生生子孫一奎著輯

鬱證門

鬱脉多沉伏鬱在上則見于寸鬱在中則見于關鬱在下則見于尺左右皆然○鬱脉或促或結或澁滑伯仁云氣血食積痰飲一有留滞于其間則脉必因之而止澁矣但當求其有神所謂神者胃氣也夫鬱者結滞而不通暢之謂當升而不得升當降而不得降當変化而不得変化所以為鬱氣血冲和百病不生一有怫鬱諸病生焉丹溪云病之属鬱者十常八九但病有因别藏所乘而為鬱者有不因别藏所乘而本氣自鬱者此五鬱也又有氣鬱血鬱痰鬱食鬱火鬱湿鬱六者此六鬱也蒼术香附子川芎總解諸鬱故製越鞠丸通治之隨証加入諸藥按蒼术氣味雄壯辛烈開發水穀之氣乃足陽明太陰之藥香附子下氣最速乃陰血中快氣之藥一升一降足以解散其鬱川芎直達三焦俾生發之氣上行頭目下行血海通陰陽氣血之使也况蒼术尤能徑入諸經疏泄陽明之湿故諸鬱用之多劾

王汝言云丹溪治病不出乎氣血痰三者故用藥之要有三氣用四君子湯血用四物湯痰用二陳湯久病属鬱故立治鬱之方曰越鞠丸盖氣血痰三病多有兼鬱者或悮藥雜亂而成鬱故用三方治病時以鬱法參之氣病兼鬱用四君子加開鬱藥血病痰病亦然

五臟本氣自鬱証心鬱者神氣昏昧心胸微悶主事健忘治宜肉桂黄連石菖蒲肝鬱者兩脇微膨噯氣連連有声治宜青皮川芎呉茱萸脾鬱者中脘微滿生涎少食四肢無力治宜陳皮半夏蒼术肺鬱者皮毛燥而不潤欲嗽而無痰治宜桔梗麻黄豆豉腎鬱者小腹微硬精髓乏少或濁或淋不能久立治宜肉桂茯苓小茴香又有膽鬱者口苦身微潮熱往来惕惕然如人將捕之治宜柴胡竹茹乾姜

氣鬱者其狀胸滿脇痛脉沉而澁宜二陳湯加蒼朮川芎香附子或分心氣飲木香分氣飲七氣湯之類血鬱者其狀四肢無力能食便血脉沉澁而芤宜四物湯加桃仁紅花川芎牡丹皮香附子或越鞠丸痰鬱者其狀動則喘寸口脉沉而滑宜二陳湯加南星海石枳殼香附子瓜蔞仁或化痰丸食鬱者其狀噯酸胸滿腹脹不能食或嘔酸水惡聞食氣宜二陳湯加蒼朮神麴麥芽山查香附子或保和丸火鬱者其狀瞀悶

小便赤澁脉沉而数骨髓中熱肌痺熱捫之烙手宜二陳湯加黃連青黛貝母香附子川芎蒼朮山梔子或火鬱湯濕鬱者其狀周身腫痛或關節痛陰雨則發躰重頭重痛脉沉而細宜白芷二朮茯苓川芎香附子或升陽除濕湯

又有素虛之人一旦事不如意頭目眩暈精神短少筋痿氣急有似虛證先當開鬱順氣其病自愈宜交感丹不効用歸脾湯

分心氣飮 木通 青皮 半夏 陳皮 茯苓 甘草 桂 桑白皮 大腹皮 羗活 紫蘇 生姜 燈草 大棗 水煎服

交感丹 香附子(童便浸七日晒乾醋炒黃一斤) 茯神(去皮心人乳浸日晒夜露七日夜四兩) 右爲末煉蜜丸彈子大空心滚湯細嚼一丸

開鬱湯 香附子 蒼朮 川芎 貝母 神麴 山梔子 陳皮 半夏 茯苓 甘草炙 生姜水煎服 氣加木香枳殻檳榔紫蘇 血加桃仁紅花牡丹皮 痰加南星 食加

山查麥芽砂仁 熱加黃連黃芩柴胡 濕加羗活倍蒼朮

嚴用和云人之氣道貴乎順順則百脉流通

氣鬱者胸脇痛脉沉澁○濕鬱者周身走疼或關節痛遇陰寒則發脉沉細○痰鬱者動則喘咳寸口脉沉滑○熱鬱者瞀悶小便赤脉沉数○血鬱者四肢無力能食便紅脉沉数○食鬱者噯酸腹飽不能食人迎脉平和氣口脉緊盛

蒼朮撫芎揔解諸鬱隨症加入諸藥凡鬱皆在中

焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假如食在氣上提其氣則食自降餘倣此

氣欝　香附童便浸　蒼朮米泔浸　撫芎

濕欝　白芷　蒼朮　川芎　茯苓

痰欝　海石　香附　南星薑製　瓜蔞

熱欝　山梔炒　青黛　香附　蒼朮　撫芎

血欝　桃仁去皮　紅花　青黛　川芎　香附

食欝　蒼朮　香附　山查　神曲　針砂醋製

春加川芎　夏加苦参　秋冬加吴茱萸

越鞠丸又名芎朮丸　總解諸欝

蒼朮　香附　撫芎　神曲　梔子炒

為末滴水為丸菉豆大

痿證門

痿痿弱無力以運動

帝曰五臟使人痿何也岐伯曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨髓故肺熱葉焦則皮毛虚弱急薄著則生痿躄也王注肺熱則腎受熱氣故足攣躄不得伸以行也心氣熱則下脉厥而上上則下脉虚虚則生脉痿樞折挈脛縱而不任地也肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾則筋急而攣發為筋痿脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿曰何以得之曰肺者臟之長也為心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦肺藏氣志名不揚則氣欝氣欝不利故喘息有声而肺熱葉焦也故曰五臟因肺熱葉焦發為痿躄此之謂也悲哀太甚則胞絡絶胞絡絶則陽氣内動發則心下崩數溲血也故本病曰本病古經篇名也大經大絡脉也以漏血故空虚脉虚則熱内薄衛氣盛荣氣微故發為肌痺後漸脉痿故曰傳為脉痿也大經空虚發為肌痺傳為脉痿思想無窮所願不得意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫也故下經曰筋痿者生于肝使内也下經古經名使内謂勞役筋内貲竭精氣也有漸于湿以水為事若有所留居處相湿肌肉濡漬痺而不仁發為肉痿故下經曰肉痿者得之湿地也地之湿氣感則害人皮肉筋脉此則謂害皮也有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣内伐謂伐腹中之陰氣也内伐則熱舍於腎腎者水臓也

今水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發為骨痿故下經曰骨痿者生于大熱也曰何以別之曰肺熱者色白而毛敗心熱者色赤而絡脉溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而肉濡動腎熱者色黑而齒槁曰如夫子言可矣論言治痿者獨取陽明何也曰陽明五臟六腑之海主閏宗筋宗筋主束骨而利機關也宗筋謂陰毛中横骨上下臍兩傍之豎筋也上絡胸腹下貫髖尻又經于背腹上頭項故云宗筋主束骨利機關然腰者腎之大關節所以司屈故曰機關衝脉者經脉之海也十二經之海主滲灌谿谷與陽明合于宗筋陰陽總宗筋之會會于氣街而陽明為之長皆屬于帶脉而絡于督脉故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也曰治之柰何曰各補其滎而通其輸調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其時受月則病已矣時受月謂受氣時月如肝王甲乙心王丙丁之類也痿論

素問帝曰脾病而四肢不用何也岐伯曰四肢皆稟氣于胃而不得至經必因于脾乃得稟也今脾病不能為胃行其津液四肢不得稟水穀氣

氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉曰脾與胃以膜相連耳而能為之行其津液何也岐伯曰足太陰者三陰也其脉貫胃屬脾絡嗌故太陰為之行氣于三陰手足三陰之經陽明者表也五臟六腑之海也亦為之行氣于三陽手足三陽之經也臟腑各因其經而受氣于陽明故為胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以益衰陰道不利筋骨肌肉無氣以生故不用焉太陰陽明篇

劉河間曰四肢不舉俗曰癱緩故經所謂脾太過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此真所謂膏粱之疾其治則瀉令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則脾陷卑下也陷坑也故脾病四肢不舉四肢皆稟氣于胃而不能至經必因于脾乃能受稟今脾病不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治可十全散

加減四物去邪留正

脾實病痿○經云脾病者肉痿足不收又云脾脉太過則令人四肢不舉又云其犯雨濕之地則為痿者是也（夫所謂實謂太過者皆指脾之涇邪而言也）

今採補通滎俞穴法于左

肺熱葉焦則肺喘鳴生痿躄色白而毛敗者　補其滎魚際通其俞大淵　至秋病已

心熱生脉痿數溲血樞不相提挈脛縱不能任用於地色赤而絡脉溢者　補其滎勞宮　通其俞太陵　至夏病已

肝熱生筋痿下白溢口苦筋急攣色蒼而爪枯者　補其滎行間　通其俞太衝　至春病已

腎熱生骨痿足不任身腰脊不舉骨枯髓減色黒而齒槁者　補其滎然谷通其俞太溪　至冬病已

脾熱生肉痿乾渇肌肉不仁色黄而蠕動者　補其滎大都　通其俞太白　至長夏病已

又痿躄足不收取之少陽陽明之別　經云足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰虚則痿躄坐不能起取之所別也又云淫濼脛痿不能久立治少陽之維在外踝上五寸又云足陽明之別名曰豊隆去踝八寸別走太陰其病虚則足不收脛枯取之所別者是也

骨痿懈惰取足少陰髓海　經云少氣身漯漯也言吸吸也骨痠懈惰不能動補足少陰又云腦為髓之海其俞上在于其蓋下在風府髓海不足則腦轉耳鳴脛痠懈怠安臥審其俞而調其虚實者是也

百節弛縱取脾手太陽之絡經云脾之大絡名曰大包出淵腋下腋三寸布胸脇虚則百節盡皆縱此脉若羅絡之血者取之脾之大絡也又云手太陽之別名曰支正上腕五寸實則節弛肘廢取之所別者是也

甲乙經曰痿不相知太白主之（一云耳重骨痿不相知）足下緩失履衝陽主之足緩不收痿不能行不能言手足痿躄不能行地倉主之

腎脉微滑為骨痿坐不能起起則目無所見

陳無擇曰人身有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以成其形內則有肝心脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒勞佚致內藏精血虛耗使皮血筋骨肉痿弱無力以運動故致痿躄狀與柔風脚氣相類柔風脚氣皆外因痿則內臟不足所致也

論治痿獨取陽明之旨

生生子曰內經治痿獨取陽明之法乃治痿之大槩也原其病皆自肺中來在乎方萌之時故獨治陽明使宗筋閏能束骨而利机関之意是澄其源而流自清之謂也設五痿之疾既痼而陽明虛宗筋縱帶脉不引足痿不用之時而獨治陽明斯亦晚矣當即其五痿之所主者而參治之庶得以盡其用也按內經陽明虛帶脉不引之後帝曰治之奈何岐伯曰各補其滎而通其輸調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其時受月則病已矣然雖兼針刺而言實治痿之綱領也

林氏曰考之內經皮肉肌骨脉五痿分屬五臟如無擇所云者似又當分治之可也治陽明之法只可治脾肺若夫肝之筋痿心之脉痿腎之骨痿其受病又自不同豈可只取陽明而治之乎故治筋痿宜養其肝脉痿宜益其心骨痿宜滋其腎不可執一而論也經亦曰各補其滎而通其輸調其虛實云云然可以見治法之不專于陽明也

東垣清燥湯　治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒水生化之源源絕則腎涸痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能運動 方在暑門注夏類

健步丸　治膝中無力屈伸不得腰背腿脚沉重行步艱難

羌活　柴胡　滑石　甘草炙　防風　瓜蔞根酒洗各五分　澤瀉三分　酒防已　川烏　酒苦參各一錢　肉桂五分　右為末酒糊丸桐子大每服七十丸空心煎愈風湯送下 愈風湯方在中風門

三因加味四斤丸　治肝腎虛弱熱淫于內致筋骨痿弱不能勝持○茯苓酒浸　鹿茸燎去毛切酥炙　五味

子酒洗兔絲子酒煮透炒另研熟地黃　牛膝　木瓜
天麻各一兩　右為末煉蜜丸桐子大溫酒或米飲
下五十丸劉宗厚曰按此熱淫于内而用溫補
何也然陰血衰弱血不養筋筋緩不能自持陽
燥熱淫于内故用此養陽滋陰陰實則水升火
降矣

藿香養胃湯　胃虛不食四肢痿弱行立不能皆
由陽明虛宗筋失養之故也
藿香　人參　茯苓各乙錢　白朮二錢　半夏曲　苡

仁　山藥各八分　蓽澄茄　砂仁　神曲　陳皮
各六分　甘草炙四分　姜三片棗二枚水煎服

大防風湯　氣血兩虛風濕相挾麻痺痿弱或久
病痢後脚弱緩痛不能行履或兩脚腫痛足脛
枯腊名鶴膝風症其効如神
川歸　熟地　白芍　杜仲姜汁炒　黃芪　白朮
各一錢　人參　防風　川芎　牛膝各七分　羌活
附子　甘草炙各四分　姜三片棗二枚水煎服

鹿角膠丸　治血氣虛弱兩足痿軟久卧床褥神
効常服補腎益精壯筋骨
鹿角膠一斤　鹿角霜　熟地黃各半斤　當歸四兩　牛膝
兔系子　人參　茯苓　白朮　杜仲各二兩　龜
板酥炙　虎脛骨酥炙各一兩半　右為末將鹿角膠用無灰
酒熔化為丸桐子大每服百丸空心淡盐湯送下

丹溪云有濕熱有痰有血虛有氣弱亦有死血者
有食積妨礙不降者上文論痿起于肺熱实痰之本論治法之大要也而此云然者盖以其發而為病所因所挾或有不同而主治亦各當著其所重也
東垣取黃柏蒼朮為下部要藥丹溪即此意以治

痿躄痛風取効甚多
濕熱　東垣健步丸加燥濕降火之劑黃柏黃芩
蒼朮〇濕痰　二陳湯加蒼白朮黃芩黃柏之
類入竹瀝姜汁
血虛　四物加蒼朮黃柏下補陰丸
氣虛　四君子湯加蒼朮黃芩黃柏
已上方法雖所主有不同而降火清金所謂治法之大要而無不同也
虎潜丸　補腎丸皆治骨痿之劑也〇肉痿當以
清燥湯治之

五加皮酒　治筋痿拘攣疼痛不便屈伸
五加皮半斤　蒼耳子六兩　枸杞子　苡仁各四兩　生地
黄二兩　木香五錢　以好酒一大埕將藥用囊盛懸
埕中浸七日取出焙乾為末煉蜜丸桐子大空
心酒吞八九十丸其酒聽飲但常使酒氣頻相
接為妙
大生脉湯　治心熱脉痿脛縱不任地
人參　麥冬　五味子　天冬　黄栢　川歸
牛膝　紅花　枸杞子　生地　水煎服，有

汗加黄芪
王啟玄傳玄珠耘苗丹三方序曰張長沙戒人妄
服燥烈之藥謂藥勢偏有所助勝尅流變則真
病生焉猶憫苗不長而揠之者也若稟血不强
合服此而不服是不耘苗者也故名耘苗丹此
丹養五臟補不足秘固真元均調二氣和暢榮
衛保神守中　五味子半斤　巴戟去心　遠志去心　枸杞
子　山藥　茯苓　肉蓯蓉酒浸　百部酒浸一宿焙
杜仲炒　蛇床子　栢子仁　兎系子酒浸另研　防風

各二兩　右為末蜜丸桐子大食前温酒塩湯任下
三十丸　春乾棗湯下　夏加五味子四兩
秋加枸杞子六兩　四季月加肉蓯蓉六兩
衛生湯　補虛勞强五臟除煩熱養真元退邪熱
順血脉○黄芪八兩　當歸　白芍各四兩　甘草炙一兩
年老加酒半盞同水煎
何首烏酒　治骨軟風腰膝痛行履不得遍身搔
痒何首烏大而有花者同牛膝各一斤以好酒
一升浸七宿焙乾于木臼搗末蜜丸每日空心

食前酒下三五十丸
蕭炳丹參酒方　治風軟脚弱可逐奔馬故曰奔
馬草極効　丹參不拘多少酒浸服下
本事治筋骨諸疾手足不遂行動不得遍身風瘡
左經丸　草烏白大者去皮臍　木鱉去殼　白膠香　五靈
脂各二兩半　班猫五枚去頭翅醋炒　右為末用黑豆去皮
生為末一升醋糊同前藥共和匀為丸鷄豆子
大每服一丸温酒磨下○治筋骨疾但未曾
經針傷損者三五服立効　此藥曾醫一人

軟風不能行不十日見功　專治心腎肝三
經通小便除淋瀝通營衛活經絡　此方因
淨聖寺僧得之大有奇功所治乃濕痿污血為病
又方　治丈夫酒色過度下焦虛憊足膝軟乏小
便滑数外腎濕痒　五味子五兩　兔系子酒浸研妙　遠
山藥　石蓮肉　茴香各二兩　白茯苓一兩　右糊丸
梧子大每五十丸温酒或塩湯下空心服如
脚氣及膝無力者木瓜酒空心下六十丸下
午再服妙

龍虎丹　治痿
瑣陽七錢半　敗亀板　虎骨　黄栢俱酒炙　乾姜一錢
半　金箔十片　神曲　如懶言語加山藥七錢
右稉米粉糊為丸空心白湯呑下
丹溪補益丸　治痿
白朮二兩　亀板　瑣陽各酒炙　生地　歸身　牛膝
白芍俱酒浸各一兩　陳皮　乾姜各七錢半　黄栢炒　虎骨酒炙
茯苓各五錢　五味子二錢　甘草炙一錢　兔絲子酒蒸研如餅入
餘搗末焙乾　右以新鮮紫河車為丸如無紫河車用
猪骨髓為丸亦可
神亀滋陰丸　治足痿
亀板酒炙　黄栢　知母各酒炒二兩　枸杞子　五味子
瑣陽各一兩　乾姜半兩　煉蜜丸梧子大空心塩湯
下七十丸　與龍虎丹相兼服妙
丹溪治痢後脚弱漸細
蒼朮一兩　白芍　亀板酒炙二兩半　黄栢酒炒五錢
右粥丸以四物湯加陳皮甘草煎湯呑
劉河間十全散者盖治氣血俱虛而四肢不用也

治男子婦人諸虛不足五劳七傷不進飲食久
病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺
精面色痿黄脚膝無力喘嗽中滿脾腎氣弱五
心煩悶並治　人参　黄芪　白朮　茯苓
甘草　肉桂　當歸　川芎　熟地　白芍藥
各等分　右為粗末每服二大錢生姜三片棗二枚
水一盞煎七分不拘時温服桂芍藥甘草小
建中湯也加黄耆即黄耆建中湯也人参白
朮茯苓甘草四君子湯也當歸川芎地黄芍

藥四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱法天
地之成數故名曰十全散
壯元丸　治下元陽氣大虛及脾有寒濕足膝痿
弱大便不實濕動生痰面色黃白惡風懶語一
切倦弱及陰痿不起飲食不思虛弱等症○此
方得遂州仙茅或漢中仙茅為君妙不可言屢
驗（昔在吳下治行人公孫質庵老先生患痿不出戶者三年用此收功仕至江右憲副）
山茱萸肉　杜仲（各鹽水炒四兩）　破故紙（鹽水炒）　龜板（酒炙）
各三兩　鹿茸（酒炙）　兎絲子（酒浸透研炒）　遠志（去心甘草煮）　頭二
蠶沙（炒）　人參（各二兩）　茯苓（一兩半）　大附子（童便煮麪煨七錢）
俱製淨藥以乾山藥粉四兩打糊為丸梧桐
子大空心淡鹽湯或酒送下五六十丸下午
再服　右方服後須痛斷房失以培其根勿
恃此藥壯陽而助其春興自取其憊也叮之
戒之
金剛丸　治腎損骨痿不能起牀益精補腎
萆薢　杜仲（炒）　蓯蓉（酒浸）　兎絲子（酒浸等分）
右末酒煮猪腰子為丸桐子大每服五七十

丸空心酒下
脚氣門
脚氣
內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰傷于濕者下先
受之蓋脾主四肢足居于下而多受其濕濕欝
成熱濕熱相搏其痛作矣古無脚氣之說內經
名厥兩漢間名緩風宋齊之後謂之脚氣有從
外感而得者有從內傷而致者其為濕熱之患
則一而已北方高燥多飲醴酪肉食及酵酒濕
熱之物下流足脛所致南方卑下濕氣迷滿山
澤血氣虛弱之人或遇房失及負重遠行衝冒
雨雪寒濕乘虛而襲遂成此症大抵風寒暑濕
之氣中于諸陽病在外其診多在足外踝及足
背宜散之而愈中于諸陰病在裏其診多在足
內踝及臁內宜溫利之外症自汗走注為風勝
無汗疼痛攣急為寒勝腫滿重着為濕勝煩渴
熱頑為暑勝如四氣兼有但推其多者為勝寒
則溫之熱則寒之在表則散在裏則下若大虛

氣之間作補湯隨病冷熱而用之不可拘執不
得服補藥之說
大抵麻者爲風痛者爲寒腫者爲濕
痺論云寒勝則虫熱勝則縱（虫者皮膚中如虫行之狀）
嚴氏曰脚氣南北所感雖有内外之殊然皆由腎
虚而生婦人病此者亦由血海虚而得之
發明曰南方自外而入者止于下脛腫痛北方自
内而致者乃或至于手節也○治法初用解散
次必推蕩大便以導其邪氣

又曰脚氣濕熱勝者成水泡瘡或成赤腫丹毒或
如癍氣攻上引下
脉法　浮爲風緊爲寒緩細爲濕洪數爲熱又沉
而弦者亦爲風沉而緊者爲寒沉細爲濕沉數
爲熱
又曰脉弦者風濡弱者濕洪數者熱遲者寒微者
虚牢堅者實結則因氣散則因憂緊則因怒細
則因悲入心則譫妄嘔吐食不入睡不安左寸
脉乍大乍小乍有乍無者死

入腎則腰脚腫小便不通呻吟目與額皆黑氣冲
胸而喘左尺脉絶者死
千金翼云外臺總録所録皆謂南方卑濕霧露之
地其民腠理疎陽氣不能外固因而履之則清
濕襲虚病起于下此因血虚氣弱受清濕之邪
氣與血并行于膚腠邪氣盛正氣少故血氣濇
濇則痺虚則弱故令痺弱也後人名曰脚氣針
經云有道以來有道以去治之多以灸焫爲佳
以導引濕氣外出及飲醪醴以通經散邪所製

之方寒藥少熱藥多用麻黄川烏姜附之屬内
經云濕淫于外以苦發之麻黄苦温發之者也
川烏辛熱走而不能守通行經絡姜附辛甘大
熱助陽退陰亦能散清濕之邪又察足之三陰
三陽是何經絡所起以引用藥爲主治復審六
氣中何氣當之擇其佐使孫真人云醫者意也
隨時增損初無定方真知言哉
東垣曰異法方宜論云北方者其地高陵居風寒
冷冽其俗飲醴酪而肉食凡飲醴酪以飲多飲

速者為能經云因而大飲則氣逆又云食入于陰長氣于陽今乃反行陽道是為逆也夫乳酪醇酒濕熱之属加以奉養太過亦滋其濕水性潤下氣不能响故下注于足脛積久而作腫痛此飲食下流之所致也通評虛實論云穀入多而氣少濕居下也况醍醐醇酒之濕熱甚于穀者也至真要大論云太陰之勝火氣内欝流散于外足脛胕腫飲發于中胕腫于下此之謂也若飲自倍脾胃乃傷胃氣不能施化脾氣不能

四布故下流乘其肝腎之位疰于足脛加之房事不節邪氣乘虛遂成痼疾孫真人云古人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有之亦此意也

活人云脚氣属冷者小續命湯煎成入生姜自然汁服之最快

丹溪曰脚氣須用升提藥隨氣血用

當歸拈痛湯　治濕熱為病肢節煩痛肩背沉重胸膈不利遍身疼痛流注手足痛不可忍

羌活　甘草炙　黄芩酒炒　茵陳酒炒各五錢　當歸身　苦參酒洗　人參　升麻　葛根　蒼术各二錢　猪苓　澤瀉　知母　防風各三錢　白术一錢半

每用一两水煎不拘時服

羅太無治中書粘年四旬躰魁梧丙辰春從征楊州脚氣忽作遍身肢躰微腫其痛手不可近足脛尤甚履不任穿跣以騎馬空兩鐙而以竹器盛之以因急来告予思内經有云飲發于中胕腫于下又云諸痛為實血實者宜決之以三稜

針數刺其腫上血突出高二尺餘漸漸如線流于地約半升許其色黑紫頃時腫消痛減以當歸拈痛湯一两半服之其夜得睡明日再服而愈

蒼术丸　治乾濕脚氣筋脉拘攣疼痛不能行

蒼术米泔浸炒四两　乳香　没藥各二两另研　青塩　牛膝各五錢　熟艾四錢　川烏三錢　全蝎炒二錢

右為細末共研藥和勻以木瓜一個大者切一頭留作蓋去穰入上件藥于内蓋定安木瓜于黒豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成

膏却入生蒼朮末拌匀丸如桐子大每服五十丸空心木瓜湯下以溫塩酒亦可日三服

忌血與蒜

丹溪脚氣腫痛方

黄栢酒炒 蒼朮塩炒 川芎 生地 白朮 甘草梢 黄連 犀角 防風 木通 檳榔 熱加黄芩 痰加竹瀝姜汁 時令熱加石膏 大便秘加桃仁 小便澁加牛膝

食積流注者

蒼朮 黄栢 防巳 南星 白芷 犀角 檳榔 川芎 血虚加牛膝亀板 如尋常腫者專主濕熱肥人加痰藥

一婦人足腫 黄栢 蒼朮 生地 川芎 牛膝酒洗 龍胆草 南星

脚弱筋痛 牛膝二兩 白芍藥一兩半 黄栢炒 知母炒 亀板酒炙各一兩 甘草炙五錢 酒糊為丸

便溺阻澁心下痞滿者宜微下之

東垣曰楊太受云脚氣之疾自古皆用疎下為疾壅故也然不可太過恐傷脾胃使營運之氣不能上行反下注為脚氣又不可不及則壅不能消散今立三方于後詳而用之

羌活導滯湯 脚氣初發一身尽痛或肢節腫痛便溺阻隔先以此導之後用當歸拈痛湯

大黄酒煨一兩 羌活 獨活各五錢 川歸 防巳各三錢 枳實麩炒二錢 〇每服七錢水煎服取微利則巳量虚實加減

開結導飲丸 飲食不消心下痞悶

陳皮 白朮 茯苓 澤瀉 麥蘗 酒麹 半夏各一兩 枳實 青皮 乾姜各五錢

如有積塊者加巴豆霜一錢

右為末飠餅糊丸梧子大每服五十丸溫湯下

又方 治濕熱并諸濕邪腿膝重痛足脛浮腫

甘遂 葳靈仙 葶藶 檳榔 赤芍 澤瀉 乳香各二兩 沒藥一兩 牽牛 大戟炒三兩 陳皮四兩

右為末麵糊為丸梧子大每服五十丸加至七十丸食前溫水送下得更衣止後服忌酒

二日又忌麵及甘草三兩日食溫淡粥以補
胃氣

乙巳春廉平章年三十八身躰充肥脚氣始發頭面渾身肢節微腫皆赤色足脛腫痛不可忍不敢扶策手着皮膚其痛轉甚起而復卧卧而復起晝夜苦楚難以名狀求予治之平章以北土高寒故多飲酒積久傷脾不能運化飲食下流之所致投以當歸拈痛湯一兩二錢其痛減半再服腫痛悉除只右手指末微赤腫以三稜針

剌手爪甲端多出黑血赤腫全去不數日因食濕麵肢躰覺疼再以大黄枳實湯治之

大黄（酒煨三錢）　羌活（一錢半）　當歸（一錢）　枳實（五分）

夫脚氣之疾皆水濕之為也麵滋其濕血壅而不行故肢節煩疼内經曰風能勝濕羌活辛溫透關節去濕故以為君主血留而不行則當歸之辛溫散壅止痛枳實之苦寒治痞消食以為臣大黄苦寒以導麵之濕熱併治諸老血留結取其峻駃以為使也　右㕮咀作一服水一盞半

煎八分空心食前服利下兩行痛止

控涎丹（方見痰飲門）　治脚氣加胭脂一錢檳榔木瓜各一兩巻栢五錢先以鹽水煮半日次日白水煮半日同前藥為丸每服三十丸加至四五十丸取下惡物立効

衍義云有人嗜酒日須五七十盃後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒去米不用大黄一兩剉炒同為末煉蜜為丸梧子大溫水下五七十丸仍戒酒遂愈

本事方治風氣積滞成脚氣常覺微腫發則或痛

茵芋丸　茵芋（炒）　薏苡仁（各五錢）　郁李仁（一兩）　牽牛（生三兩取頭末兩半）　右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸薑棗湯下未利再加十丸日三服以快利為度白粥補之

三因千金丹　治脚氣上攻心腎相擊足心隱痛小腹不仁煩渴小便秘或利關節攣皮疼痛神効　肉蓯蓉　石斛（各酒浸）　狗脊（去毛）　萆薢
茯苓　牛膝（酒浸）　地仙子　遠志（去心炒各一兩）　杜仲（去皮

炒熟地各三兩 右煉蜜丸如梧子大每服五十丸
温酒鹽湯任下
本事療丈夫腰脚痺緩急行履不穩者以萆薢二
十四分合杜仲八分為末每日温酒和服三錢
七增至五錢忌牛肉
活人苡仁酒 治脚痺
苡仁 牛膝各二兩 海桐皮 五加皮 獨活
防風 杜仲各一兩 熟地一兩半 白朮五錢
右為粗末入絹袋内用好酒五升浸春秋冬

二七日夏月七日分作數服逐帖浸酒空心
每服一盞或半盞日三四服常令酒氣醺匕
不絶久服覺皮膚下如數百條虫行即是風
湿氣散
丹溪治一婦人血少多氣大便後脚痛而麻
當歸半兩 芍藥 白朮各二錢 陳皮 青皮各一錢
地黄一錢半 川芎五分 甘草二分 桃仁十八枚
右分二帖水煎服
韓彦正暴得疾手足不舉諸醫皆以為風針手足

亦不知痛召孫尚證之尚曰此脚氣耳用檳榔
末三錢生姜三片乾紫蘇七葉陳皮三錢水煎
服數帖而安
檳榔散 治脚腫
陳皮 蒼朮炒等分 水一大碗酒半盞同煎去
渣調檳榔末二錢
聖惠方 治脚氣及風寒湿四肢攣急脚疼不可
踐地紫蘇六兩搗碎水三升研取汁以蘇子汁
煮粳米粥二合和葱豉椒姜食之即止

濟世方 治一切脚氣神奇
川山甲前兩足者燒存性研細入麝少許多少
随人斟酌要服此藥須去他事在晩不可進飲
食候至夜深腹空時調服坐卧随意及鷄鳴又
一服痛立止過一二日便能步履如常極妙如
神
千金方 治脚氣十二風痺不能行松葉酒
松葉六十斤剉細以水四石煮取四斗九升以
釀米五斗如常法另煮松葉汁以漬米并饋飯

醸封頭七日後澄飲之取醉得些酒力者甚衆

濟世方　諸般脚氣一服除根

防風　羌活　蟬退各三分　薄荷五分　紫蘇四分

右為末每服五錢以無灰酒半碗熱服訖服至一時久即煎後藥湯傾桶内披厚衣于桶上坐勿令走氣将脚腿薫之當自下而上汗出直至頂門其出如水盡為度

薫洗用　紫蘇半斤　忍冬花四兩　木饅頭七個　蘇木二兩

右為粗末以水一鍾煎数沸桶盛分三度添用只一次洗完永除根

東垣曰活人云凡脚氣服補藥及用湯渫洗皆醫之大禁也為南方外感湿氣乗虚襲人為腫痛而言非為北方内受湿氣注下腫痛而言也盖湿氣不能外達宜淋渫開導泄越其邪名曰導氣除湿湯

威靈仙　防風　荆芥穗　當歸　地骨皮

升麻　白芍　蒴藋葉各等分

水二斗煮取一斗五升乗熱淋洗

五味敗毒散　治三陽經脚氣流注脚踝上熱腫寒熱如瘧自汗或無汗

羌活　獨活　前胡　柴胡　枳殻　桔梗

甘草　人参　茯苓　川芎　大黄　蒼术等分

每服四銭姜三片薄荷頭一個水鍾半煎一鍾熱服皮肌瘙痒加蟬退

八味丸　治少陰腎經脚氣腰脊疼小指之下連足心循内踝入跟中腨内膕中内臁皆疼上冲胸咽嘔吐自汗小腹不仁善恐此症最急以腎乗心水克火死不旋踵　方在虚怯門

紫蘇散　治風毒脚氣腹内疼悪脚重虚腫

紫蘇　木通　桑白皮　茴香各一兩　枳殻二兩

羌活　獨活　荆芥穗　木瓜　青皮　甘草各半兩

大腹子十箇每服三銭姜三片葱白一茎水煎服

桑白皮散　治脚氣盛發浮腫小便赤澁腹滿氣急

桑白皮　郁李仁各一兩　赤茯苓二兩　木香

防已　大腹子各半兩　紫蘇子　木通　檳榔

青皮各七錢半 每服三錢姜水煎

薏苡散 治脚氣弱痺腫滿心下急大便澁

薏苡仁 防風 川芎 防已 猪苓 郁李仁 火麻仁 檳榔 羚羊角屑各一兩 枳實七錢 甘草五錢 桑白皮二兩 為末每服三錢熟水調下

紫蘇子湯 通治脚氣中滿喘急嘔吐自汗

紫蘇子炒 前胡 半夏 厚朴 甘草炙 川歸 黄芩各二兩 桂心 桔梗各三兩 虛甚者加炮附子乙兩 每服六錢姜七片棗二枚水煎食後服

茱萸丸 治脚氣入腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸洗 木瓜去穰切片乾

右酒糊為丸梧子大每服五十丸至百丸酒或米湯下或以木瓜蒸爛研膏為丸尤妙

卷栢散 治遠年脚氣難治此方特効躰虛人減半服 卷栢隨用先以塩水煮半日次用湯水煮半日火上焙乾取東向者佳

黒牽牛取頭末 檳榔 甘遂

右各為末不得相雜每服各一錢惟檳榔末二錢五更初濃煎葱白湯下至巳時取下悪物如魚凍隨吃淡粥病安更宜服後藥

後方

大腹子三兩 木瓜二兩半 蘇子炒 檳榔 荊芥穗 烏藥 陳皮 蘓葉各一兩 蘿卜子炒五錢 沉香三錢 桑白皮炒 枳殼麩炒各兩半 每服三錢姜五片煎服

檳榔湯 治脚氣順氣防壅

檳榔 香附子 陳皮 蘓葉 木瓜 五加皮 粉草各一兩 每服四錢姜五片煎服 婦人脚氣多由血虛加川歸半兩 室女多因血實加赤芍藥一兩半大便秘結虛弱者加枳實 盛者加大黄 一方治脚氣冲心大便秘宜服三黄散加土烏藥春夏常服妙

木瓜茱萸湯 治脚氣入腹困悶欲死腹脹喘急

木瓜 檳榔各二兩 吳茱萸湯洗七次炒一兩

每服四錢水煎食前服大木瓜二枚吳茱萸五兩二味併用水四碗煎一碗分二服如人行十里又再進一服或汗或吐或瀉即瘥不

拘時服

三將軍丸　治脚氣入腹冲心大便不通

呉茱萸　木瓜　大黄各等分　大黄或随其病加减　右米糊丸如菉豆大每五十丸粳米杁殼湯下未應加丸數再服以通為度

杉木節湯　治脚氣冲心或心脇有塊毒勝痰逆痞滿喘急汗流搐搦昏悶上視咬齒甚至昏絶不知人

杉木節一大升　橘葉一升無葉用皮代可　大腹子七个連皮剉碎　右以童子小便三升煎一升半分二服若一服得快利停後服

〔八十葉〕　三五

木通散　治脚氣服熱藥太過小便不通臍下脹

川歸　梔子　赤芍　赤茯苓　甘草各一兩

每服三錢水煎

蒼朮散　治一切脚氣

蒼朮米泔浸一日夜塩炒過　黄栢去皮酒浸一日夜炙焦

每服四錢水鍾半煎一鍾日進三四服

烏藥酒　治一切脚氣發動

土烏藥用粗皮揩淨以瓦片刮下屑收于磁器内以好酒一升浸一宿次日空心去藥只將磁器内所浸藥酒熱湯上坐温入生射香少許尤妙一服即安無射香則多服ゝ後溏泄病去

升麻散　治脚氣

升麻　獨活　蒼朮　牡丹皮等分

右每服半兩酒煎空心服如痛甚者加射香

治六經脚氣發起赤腫者

五苓散一帖内用桂枝　蕪木比上藥多ゝ　生姜一塊搗

水二鍾煎一鍾空心連進三服至午時即不痛矣

〔八十一葉〕　三六

治久患脚氣下躰虚冷者

五積散一帖水二鍾半煎一鍾後下木果同服　龍骨　虎骨

乳香　没藥　五苓脂各一錢爲末

右空心連進三服見下肢節漸煖即愈

輕脚丸　逐風去湿消腫行血止痛

地膚子　桃仁麩炒各一兩　白朮　赤茯苓　赤芍藥　蘼蕪葉　葫芦巴　猪苓　澤瀉　檳榔　枳實　茴香各半兩　右煉蜜丸梧子大每三五十丸空心蘼蕪湯下漸加至百丸神効

塗法　猪牙皂角不蛀者　大皂角不蛀者　南木香各等分

右為末醋濃調先于腫上不腫處用藥圍塗之闊三四寸若圍然截斷毒氣不使冲上次塗下面腫只留脚尖不塗仍剪脚甲出毒氣時時用醋潤之

凡用小續命湯活絡湯須兩料候通身得汗如續命湯香疾乃去躰

活絡湯　治寒濕脚氣及一切疼痛諸疾

白术　杜仲各六錢　牛膝　附子炮各五錢　甘草

人叅　官桂各二錢半　川姜炮七錢半　川歸一兩二錢

每五錢水煎病在上食後病在下食前服

椒囊法　川椒二三斤實于踈布囊中置火踏上跣足踏椒囊久之全愈

一方加切片檳榔并熟艾各三之一尤妙

治脚氣止痛　草烏為末同酒糟搗爛貼〈

姜汁調草烏貼亦可　姜汁調赤小豆南星末塗時吃熟蘿蔔令飽以下氣

治脚氣止痛　用牛皮膠一塊剉碎同麥麩炒成

珠研細末每用酒調下一錢其痛立止如大便秘結者服搜風順氣丸亦可

脚氣冲心為厥逆

丹溪云脚氣衝心宜四物湯加炒栢再宜湧泉穴用附子末津唾調傅上以艾灸泄引其熱下行

脚氣衝心用白檳榔一箇如鷄心大者為末用童便生姜汁温酒共半盞調作一服

廣利方不用姜汁酒但用童便五合調服再服治冲心悶亂不知人

三脘散　治脚氣冲心腹氣飽悶大便秘澁者最

良　獨活　白术　木瓜焙乾　大腹皮炙黄　紫蘇各一兩　沉香　木香　川芎　檳榔麵裹煨熟各七錢半　甘草炙一兩半　橘紅三分　每二錢水煎分三服取便利為効

大腹子散　治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹皮　桑白皮　赤芍藥　木通　紫蘇　羌活　獨活　木瓜　荆芥　青皮各一兩

每服四錢姜五片葱白七寸水煎空心温服

常宙方療脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁李仁十二分搗碎水研取汁薏苡仁搗碎如粟米取三合以米作粥空腹食之佳

凡脚氣之病始起甚微多不令人識也食飲嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱不能動此為異耳○凡脚氣之候見食嘔吐憎聞食氣或有腹痛下利或大小便閉濇不通或胸中衝悸不欲見光明或精神昏憒或喜迷忘語言錯亂或壯熱頭痛或身體極冷痛煩或覺轉筋或腫或不腫或背腿頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或小腹不仁此皆脚氣狀貌也○脚氣有腫者有不腫者其小腹頑痺不仁者多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕○其人黒瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黒人耐風湿赤白人不耐風湿瘦人肉硬肥人肉軟則受病難愈○凡脚氣覺病候有異决然氣急即須大言使其恐懼而氣下行為妙治之稍緩則氣上入胸脇逆滿氣上肩息急者死不旋踵寛者数日必死不可不急治也但見心下急氣喘不停或自汗数出或乍寒乍熱其脉促短而数嘔吐不止者死

〔今一巻〕 三五

治腎臓風壅積腰膝沉重蔵靈仙末蜜和丸梧桐子大初服酒下八十丸平明微利悪物如青膿桃膠即是風毒積滞也如未動夜再服一百丸取下後吃粥補之一月仍當服温補薬

治腎臓風攻注脚膝方

連珠甘遂一両　木鱉子一雌一雄去殻

右為末豮猪腰子二箇批開用薬末一銭摻匀湿紙裹数重火煨熟放温五更初細嚼米飲下積水多則利多少則利少宜軟飯将息若患一脚須看左右如左脚用左邊腰子右脚用右邊腰子薬末止許一銭壬子年在昆陵有姓馬鬻酒者宿患腎臓風今一足發腫如瓠自腰以下巨細通為一律痛不可忍欲轉側而人挾持方可動或者欲以鈹刀决之予曰不可吾有薬如上法服之辰巳間下膿

〔今一巻〕 四二

水数升即時痛止腫退一月後尚拄拐而行予再以赤烏散令塗貼其膝方愈後十年至昆陵率其子列拜以謝云向脚疾至今不復作雖積年腎臟風併已失去今健步自若矣

本草云有人重病足不履地者十年良醫殫技莫能治所親置之道傍以求救者遇一遊僧見之告曰此疾一藥可治但不知此土有否因為之入山求索果得葳靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思濟知之遂著其法云採得陰乾月餘擣篩溫清酒和二錢匕空心服之如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但悪茶及麵湯以甘草梔子代飲

白濁門

生生子曰白濁乃小病今人亦有一二年不愈者皆是用藥無律今將吃緊要處次第條陳庶初學者有取則焉大抵屬濕熱為多緣中宮不清痰濁下流滲入膀胱治當審小便痛與不痛若

小便將行而痛者氣之滯也行後而痛者氣之陷也若小便頻數而痛此名淋濁治以二陳湯加木通山梔升麻柴胡之類若只濁而不痛宜燥中宮之濕二陳湯加蒼白朮桔梗升麻之類提之即愈若久濁而不痛為虛宜補中益氣湯陰虛下脫者加牡蠣山茱萸澁之久而陰虛腰膝痠疼六味地黃丸挾熱者加黃栢知母挾寒者加桂心兎系子川巴戟之類虛甚者加鹿茸

○有心脾二經不足但經思慮其濁愈甚者宜定志丸善飲酒人濕熱下流用白螺螄殼火煆醋淬為末三錢用乾葛青蒿苦參酒炒各三錢煎湯調下

治法 以二陳湯 加白朮 蒼朮 黃栢 升麻 柴胡 木通 石菖蒲

加生姜三片灯心二十根食前服

前方加白葵花三五朶極妙白雞冠花亦佳

凡治淋濁二症先當用此以清中宮濕熱痰氣即易愈丹溪云二陳湯加升提之法能使大便

潤而小便長此端本澄源之意服二三帖然後看氣血孰虛乃用對症之藥此最萬全法也時醫好用滲利之藥殊不知久濁不愈者多陰虛而滲利在所當忌又不可先用補劑及止澁之藥蓋此症始未有不因于濕熱下流者補澁太早反閉其邪濁愈甚矣由是有積年累月不効者皆治法失先後次第故也

丹溪加減珍珠粉丸治便濁極妙丸治便濁先時以此丸合前湯煎服其効甚速○蛤粉　青黛此二味主胃中濁氣下陷降入膀胱　樗皮大燥濕熱　滑石　黃柏　乾姜鹽水炒褐色味苦能肺氣下降使生陰血

右等分炒神麯糊爲丸梧子大空心下三五十丸

秘傳二奇湯　治便濁疼痛神効兼治偏墜

升麻　烏藥　煎湯食前服　若小便前痛者以烏藥三錢升麻減半加小茴香五分黃柏五分木通五分龍胆草五分漢防已三分

若小便後痛者用升麻三錢烏藥減半仍加黃柏五分柴胡五分

若服前藥頭覺作運此陰虛因升動其火故也急以六味地黃丸料加黃柏知母麥門冬治之一服而愈○若服前藥胸中飽悶此必中宮有痰宜二陳湯加香附白木炒麯消之

茯苓丸　治心氣不足思慮太過腎經虛損其陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄

兎絲子酒浸研五兩　石蓮子去殼三兩　白茯苓去皮二兩

右酒糊丸梧子大每三十丸鹽湯下常服亦能補虛

金箔丸　治下焦虛小便白濁白淫夜多異夢遺泄　補骨脂炒　韮菜子炒　晚蚕蛾　肉蓯蓉

山茱萸　桑螵蛸　兎系子酒浸　牛膝酒浸

龍骨各一兩　爲細末煉蜜丸梧桐子大金箔爲衣

每服三十丸空心溫酒下

萆薢分清飲　治白濁小便凝如脂油光彩不定漩脚如糊

益智仁　川萆薢　石菖蒲　烏藥

各等分每四五錢水煎臨服入鹽少許

一方加茯苓甘草

定志丸　治心氣不足脾弱不能攝精心腎不交小便白濁

遠志去心尹浄甘草湯煮以　石菖蒲　白茯苓　人参

山藥打糊為丸食遠白湯送下五六十丸

夢遺門 附精滑不禁

丹溪曰夢遺主熱精滑主湿熱許學士曰治夢遺有数種有下元虛憊精元不禁者有年壯氣盛久曠經絡壅滞者有情慾淫動所願不遂者名曰白淫虛憊不禁者宜補澁壅滞者宜清心以决其壅所願不遂者宜清痰熱以猪苓丸治之正如瓶中煎湯氣盛盈溢者如瓶中湯沸而溢慾動心邪者如瓶傾側而出虛憊不禁者如瓶中有罅而漏不可一槩用藥也

内經云主閉藏者腎也又云腎藏精腎衰則不能管攝故妄行而出精不時也又曰思想無窮所願不得意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為白淫夢遺等症先賢治法有五○用辰砂磁石龍骨之類鎮墜神之浮遊是其一也○其二思想結成痰飲迷于心竅而遺者許學士以猪苓丸導利其痰是也○其三思想傷陰者潔古以珎珠粉丸降火補陰是也○其四思想傷陽者羅謙甫以鹿茸蓯蓉兎系子等補陽之藥是也○其五陰陽俱虛者丹溪治一人形瘦便濁夢遺作心虛治用珎珠粉丸定志丸内傷氣血不能固守以致夢遺精滑便濁不禁者當補以八珍湯加减吞樗根皮丸予嘗治一少年夢遺無度且精滑甚玉莖純舉其精即流目見婦人精即注下夫婦之私皆廢背心痛如被槌両耳皆聾腰瘦膝軟此大虛症也用補天丸加止澁之藥鹿茸沙苑蒺藜白蠟之類服之一月精固二月耳聰而背心痛止次年育女

仲景云夫失精家少腹弦急陰頭寒冷目眩髮落脉極芤虛遅為清穀亡血失精脉得諸芤動微緊男子失精女子夢交以桂枝龍骨牡蠣湯主之

桂枝 白芍藥 生姜 牡蠣煅 龍骨煅各三兩
甘草二兩 大棗十二枚 作八帖水煎服

猪苓丸

半夏一兩剉如豆大 猪苓末二兩 先將一半炒半夏色黄不令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大候乾更用前一半猪苓末子同炒微烈入砂瓶内養之空心温酒鹽湯下三四十丸常服于申未間温酒下○蕭氏云此古方也今盛行于時而人多莫測其用盖半夏有利性而

〈八一卷〉 四七

猪苓導水縁腎司閉藏久用澁藥及有鬱滞用之使氣通而鬱散予醫囊中嘗貯此藥緩急與人三五服皆隨手而驗又云詳治夢遺方屬鬱滞者居大半庸醫不知其鬱但用龍骨牡蠣等濇劑固脱殊不知愈濇愈鬱其病反甚常治一壯年夢遺白濁少腹有氣冲上每日腰熱卯作酉凉腰熱作則手足冷前陰無氣腰熱退則前陰氣耕手足温平旦多泄尿暮多噫時振隔一旬二旬必遺脉朝弦滑而大午後洪大予知其有鬱滞也先用沉香和中丸大下之次用四物湯呑滋腎丸百粒若稍與蛤粉等濇藥則遺與濁反甚或一夜二遺遂改用導赤散大劑煎湯服之遺濁皆止漸安又一中年夢遺醫或與濇藥反甚連遺數夜愚先與神芎丸大下之却再製此猪苓丸服之皆得全安又丹溪先生治鎮守萬户蕭伯善便濁精滑不禁百藥不効試倒倉法而安于此見夢遺屬鬱者多矣

〈六十二卷〉 四八

嘗治丁氏一友壯年躰肥而色蒼善飲酒常兼人之食每五日則夢遺一度准二如此醫近一年罔効季冬就予治診左弦数右三部皆滑数知其酒多濕熱重况厚味生痰但清其濕熱或可愈也乃製一方名曰端本丸

苦参二兩本草苦參解酒毒補陰氣清濕熱補陰最捷 川黄栢二兩 牡蠣 蛤粉 白螺螄殻煅各一兩 此三味燥濕熱清痰 葛根一兩解酒熱而引清氣上升 青蒿一兩清熱而利小便是上下分消其濕也 以神麯糊為丸梧子大空心及食前

白湯吞下七十丸服至第五夜竟不遺至十九夜又被酒過醉其夜又遺乃令却酒一月未終劑而精固矣次年生子論本丸至今行之百發百中

潔古珍珠粉丸　治白濁夢遺精滑不收年壯節慾精溢者降火補陰為主　黃柏一斤新瓦上炒赤　真蛤粉一斤

滴水丸如梧子大每服一百丸空心温酒送下法曰陽盛故精泄也黃柏降火蛤粉醎而補腎陰

丹溪云精滑不禁用蛤粉青黛香附黃柏知母之類

卷十一　四十

大鳳髓丹　治心火太盛陽狂不已又補腎水真陰虛損心有所欲速于感動應之于腎疾于施泄此方固真元降心火益腎水大有神効

黃柏炒二兩　縮砂一兩　甘草半兩　半夏炒　猪苓　茯苓　蓮蕋　益智仁各三錢五分

右神麯糊丸梧子大每服七十丸

若只用黃柏甘草縮砂三味名正鳳髓丹若只用黃柏甘草二味名小鳳髓丹古人云瀉心者非也乃瀉心包絡相火益腎水之劑

許學士清心丸　治經絡熱夢遺心忪恍惚膈熱

黃柏一兩研為末加生腦子一錢同研極細煉蜜丸梧子大每服十丸至十五丸濃煎麥門冬湯下

大智禪師云夢遺不可全作虛冷治亦有經絡熱而得之者嘗治一男子至夜脊心熱夢遺用珍珠粉丸猪苓丸遺止終服紫雪脊熱始除又一男子脉洪腰熱遺精沉香和中丸下之導赤散治其火而愈由此知身有熱而夢遺者皆熱遺也

卷十一　三十

治夢遺之藥若清之不止者為虛寒愚壯年得夢遺疾每四五夜必一遺累用鳳髓丹秘真丸雖少効終不能除根後改用石菖蒲遠志韭子桑螵蛸益智酸棗仁牡蠣龍骨瑣陽等劑為丸服良愈又一中年男子夢遺以珍珠粉丸等藥與服了無効亦以遠志菖蒲等劑服之隨手而愈矣

河間秘真丸　治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐多泄

龍骨一兩另研　砯砂一兩一分研細留為衣　大訶子皮五枚　縮砂五錢

右麪糊為丸菉豆大每服一二十丸空心温酒白湯下不可多服恐太秘也

思想外淫者宜鎮心導滯補虛此方得之矣

五苓丸　治虛而泄精脉弦大累與加減八物湯吞秘真丸及珍珠粉丸精泄不止後用五倍子澁脫之功敏於龍骨蛤粉矣

海藏烏金散　治夢泄精滑不禁九肋鱉甲每用二枚以清酒一碗童便三盞葱白七寸同煎七分服之日進二次　此亦補陰意也本草云主心腹癥瘕堅積

東垣治男子夢與鬼交心神恍惚刮鹿角屑為末三錢酒調下日進二服

本草云鹿角逐惡氣惡血然亦是精削否則何能治此

婦人良方鎖精丸　治下元虛弱小便白濁白淫白帶淋漓小便頻數

破故紙炒　五味子炒　白茯苓　青塩各等分

右酒糊丸梧子大每三十丸塩酒或塩湯下

固精丸　治胞冷虛寒小便白濁白淫夢遺等症

兎絲子酒浸蒸炒　五味子炒　白茯苓　桑螵蛸　牡蠣　龍骨各煅　韮子炒　白石脂各等分　酒糊丸梧子大每七十丸空心塩湯送下

汗門　附頭汗　盜汗　手足汗

治汗之法有數種各列治於後

陽虛自汗者宜嚴氏耆附湯黃耆建中湯　陰虛盜汗者當歸六黃湯　熱甚盜汗者正氣湯

濕勝自汗者表虛不任風寒者周衛湯　痰熱者涼膈散或滾痰丸　飲食飽甚汗出于胃宜消其食詳所飽何物以枳實山查之類治之

驚而奪精汗出於心宜紫石英小草龍骨酸棗仁人參之類　搖體勞苦汗出於脾宜歸脾湯或當歸補血湯　疾走恐懼汗出于肝宜龍齒酸棗仁當歸枸杞山茱萸之類　持重遠行汗出于腎以山藥山茱萸熟地黃鹿角膠羊脊髓之類

東垣治汗春夏用黃耆秋冬用桂枝　此亦是治自汗法也

夏月汗多口渴氣喘促者及陰虛注夏躰熱自汗或盜汗者急以生脉散加黄蓍治之　六味地黄丸加知母龍骨牡蠣治勞損盜汗殊妙

蓍附湯　治陽氣大虛汗出不止肢躰倦怠

黄蓍去芦蜜炙　大附子炮去皮臍各等分

每服四錢姜十片水一鍾煎八分食前温服

冊溪治陽虛汗多者人参黄蓍少佐桂枝湯甚者附子亦可用按此即東垣黄蓍建中湯意也

東垣當歸六黄湯　治陰虛盜汗之聖藥也

當歸　黄連　黄芩　黄栢　黄蓍　生地黄　熟地黄各等分　每服七錢水煎服

東垣正氣湯　治熱在陰分盜汗

黄栢炒二錢　知母炒三錢　甘草一錢　水煎食遠服

許學士人参丸　通治諸虛補精氣止肝邪平補五臟虛羸六腑怯弱充肌膚進飲食止虛汗

人参　白术　茯苓　山藥　石斛　五味子　黄蓍取頭末　各一两為細末蜜丸梧子大每服三十九空心食前米飲下久服不熱尤宜少年

東垣周衛湯　治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風寒

黄蓍　麻黄根各一錢　生甘草　當歸梢　生黄芩　半夏各五分　猪苓　羌活各七分　麥門冬　生地黄各三分　五味子七粒　紅花　蘇木各一分

水煎温熱服中風症必自汗汗多不得重發汗故禁用麻黄而用根節也

羌活勝濕湯　治濕勝自汗惡寒重添厚衣心胸悶躁頭目昏憒壅塞飲食減濕熱大盛汗出不休以風藥去其濕以甘草瀉其熱

甘草炙三錢　黄蓍七分　生甘草五分　生黄芩　酒黄芩　防風各三分　人参三錢以取氣益胃已上藥瀉胸中之熱　獨活二分　川芎　藁本各三分　升麻　柴胡各五分已上風藥勝其濕　細辛　羌活　蔓荊子各三分　薄荷一分已上清利頭目

右水二鍾煎一鍾半纔入後四味細辛等藥再煎至一鍾熱服一服而止諸症悉去

凉膈散方見熱火門　滚痰丸方見痰門

附雜方

陳無擇牡蠣散　治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗 許學士云亦治盗汗不止

黄蓍　麻黄根　牡蠣 煅研各二錢

右水煎入浮小麥一百粒不拘時服

河間白术散　治飲酒中風汗多不可單衣食則汗出如洗久不治必成消渴症

牡蠣 煅三錢　白术 一兩二錢半　防風 二兩

為末每服一錢温水調下不計時如悪風倍

防風白术如多汗面腫倍牡蠣

丹溪白术湯　治盗汗

白术 四兩分作四製○一兩黄芪同炒○一兩石斛同炒○一兩牡蠣同炒○一兩麸皮同炒 各味炒黄色餘藥不用只用白术研末每服三錢用粟米煎湯送下藥盡為効

濟世良方　治盗汗

山藥為末臨卧酒調下三錢

衍義云椒目治盗汗尤切將椒目微炒擣細末用五錢以生猪上唇煎湯一合調匀臨卧服無有不効蓋椒目能行水治水蠱尤勝

治盗汗桑葉為末茶服之 治藥不應者累驗出医說

豆豉能治久盗汗以一升微炒令香清酒二升漬兩三日取汁任人服之不瘥更作三兩劑即止

愚謂此方出綱目必是傷風表中有風邪以致毛腠不閉豆豉原能發汗散邪以邪散而腠理閉也今取其能治久盗汗豈豆豉亦能補陰乎錄此以備參考

衍義以煅過牡蠣麻黄根等分同研細末治盗汗及陰汗

頭汗

王海藏云頭汗出劑頸而還血症也額上偏多何謂也曰首者六陽之所會也熱薰蒸則汗出也額上偏多以部分左頰屬肝右頰屬肺鼻屬中州頤屬腎額屬心三焦之火涸其腎水溝渠之餘迫而上入于心之分故發為頭汗而額上偏多者屬心之部而為血症也至于雜症陰火迫腎水上行入於心為盗汗或自汗傳而為頭汗出者或心下痞者俱同血症例治之無問傷寒雜病酒積下之而心下痞者皆血症也 可參痞門同治

生生子曰頭汗亦非止血之一字可盡予族伯每飲食入腹則登時頭面汗出如雨劑頸而還稍頃自收此胃中有熱陽氣虛甚而然何則頭面屬陽明為多飲食入胃冲動其熱如霧露之升騰越出而為汗經謂雲出天氣雨出地氣是也觀海藏以痞症為對俱同血症例治之緣其以下多亡陰謂亡陰而陽失依附故飛越也今益脾土而以血藥兼之可謂得治法之本矣

手足汗

手足汗乃脾胃濕熱內鬱所致脾胃主四肢亦有腸胃中有實熱者仲景承氣症謂手足濈濈然汗出乃腸胃熱甚而傍達四肢也

東垣安胃湯　治因飲食汗出日久心中虛風虛邪久則令人半身不遂見偏風痿痺之病先除其汗慓悍之氣按而收之

黃連　五味子　烏梅去核　生甘草各一錢　炙甘草六分　升麻四分　水二鍾煎一鍾食遠溫服忌濕麵五辛大料發熱之物

治脚汗

白礬　乾葛等分　每用五六錢水三碗煎十數沸洗逐日洗一次纏三五日自然無汗

無汗

丹溪曰盛夏浴食無汗為表實一人脉濇而短重取而弱此久受濕傷且多年無汗遇勞身熱倦怠如沙病狀

蒼朮　白朮　芍藥　甘草　紅花各五錢　陳皮六兩　當歸身二兩　分六帖姜三片煎服

治夏月無汗成久嗽病半藕散

半夏　紫藕葉　二味為末入蛤粉神麯蜆殼灰等分為末以桃仁泥五錢瓜萎穰一枚為丸先服三拗湯三帖却服此丸臨卧白湯送下七十丸

治虛勞自汗不止芍藥黃耆湯

黃耆二兩　白芍藥　白朮各一兩半　甘草一兩

每服五錢煨姜三片棗一枚水煎服

參朮散　治同前陽虛甚者加附子

人參一兩半 白术二兩 桂心七錢

每服五錢水煎服

消癉門 啟玄子註癉為消熱病也

渴而多飲為上消 消穀善飢為中消 渴而便數有脂膏為下消

東垣曰上消者舌上赤裂大渴引飲經曰心移熱於肺傳為膈消是也以白虎湯加人參主之

潔古曰上消者上焦受病又謂之膈消多飲水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦治宜流濕以潤其燥

十卷 五九

上消者經謂之膈消渴而多飲是也

治上中下三消水火圖

上消

熬猪肚湯

羊肉冬瓜湯

上消手太陰 大渴不止

麥門冬飲子

化水丹

中消

調胃承氣湯

癉成消中而數小便

消中足陽明

胃熱消穀善飢

易老順氣散

下消

益火之源以消陰翳則便溺有節

十卷 六十

腎氣丸

地黃丸

腎消足少陰 飲少溲多小便如青

內化丸

鳳髓丹

壯水之主以制陽光則渴飲不思

東垣論消渴末傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹聖濟總録皆為必死不治之

症惟潔古分而治之能食而渴者白虎加人參湯主之不能食而渴者錢氏白朮散倍加葛根主之上中既平不復傳下消矣前人用藥厥有旨哉或曰末傳瘡疽者何也此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經曰有形而不痛者陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死末傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢繩墨而更其道也然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其至所為故知過與不及皆誅罰無過之地也如膈消中消制之太急速過病所久而成中滿之疾正謂上熱未除中寒復生非藥之罪失其緩急之宜也處方之際宜加審焉

總録論消渴有三種一曰渴而飲水多小便數有脂似麩片而甜者消渴病也二者吃食多不甚渴小便少有似油而数者消中病也三者雖渴飲水不能多腿脚瘦小痿弱小便数此腎消也特忌房劳千金方云消渴病宜慎者有三一忌酒二忌房劳三忌鹹食及麪能慎此三者雖不服藥亦可自愈消渴之人愈與未愈當須慮患大癰必於骨節間忽發癰疽而卒

內經云熱中消中不可服膏粱芳草石藥石藥發瘨芳草發狂芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此二者

東垣謂滑石治渴本為竅不利而用之以燥能亡津液也天令濕氣太過者當用之若無濕而用之是犯禁也 小便不利而渴知內有濕也小便自利而渴知內有燥也濕宜泄之燥宜潤之

內經云脉實大病久可治脉懸小堅病久不可治

又脉經曰消渴脉数大者生細小浮短者死

上消治例 渴而多飲為上消

丹溪云治消渴養氣降火生血為主瓜蔞根治消渴之神藥心移熱于肺傳為膈消

人參石膏湯 治膈消上焦煩渴不欲多食

人參五錢 石膏一两 知母七錢 甘草四錢

每五錢水煎食後温服

潔古治能食而渴者白虎倍加人參湯主之

王海藏治脾胃虛弱大渴不止而食少小便不利大便不調精神短少腹窄狹如繩束

白茯苓 橘紅各一兩 生姜五錢

右煉蜜丸彈子大每二丸空心白湯化服忌生冷硬物怒發思慮過度如脉弦或腹中急甚者加甘草三錢

易老門冬飲子 治老弱虛人大渴

人參 枸杞子 白茯苓 甘草各三分 五味子 麥門冬各五錢

加姜水煎服之

羅太無門冬飲子 治膈消胸滿心煩精神短少多爲消渴

知母 甘草炙 瓜蔞仁 五味子 人參 葛根 茯神 生地 麥門冬各一兩

每五錢加竹葉十四片同煎服

火府丹 治消渴

本事方云一卒病渴日飲水三斗不食者三月心中煩悶時孟冬予謂心中有伏熱與此丹數服每服五十丸温水下越二日來謝云當日三服渴止又次日三服飲食如故此方本治淋用以治渴得効信乎藥要變通曷能執一

丹溪治消渴泄瀉先用白芍藥白朮各炒爲末調服後隨症用藥

錢氏加減地骨皮散 治上消

知母 柴胡 甘草炙 半夏 地骨皮 赤茯苓 黃芪 石膏 黃芩 桔梗 白芍藥

每三錢姜五片水煎食遠服

東垣止渴潤燥湯 治消渴大便乾燥喜温飲陰頭縮舌上白燥唇裂口乾眼澁難開及於黑處如見浮雲

升麻一錢半 柴胡七分 甘草五分 紅花少許 杏仁六個研 桃仁研 麻仁研 防風 歸身 荊芥穗 黃栢 知母 石膏各一錢 熟地二錢 川椒 細辛各一分 水煎食遠熱服

化水丹 治手足少陰渴飲不止或心痛者本事治飲

冷水多者川烏(大者四枚炮去皮)甘草(炙一兩)牡蠣(生用三兩)蛤粉
(用厚者炮六兩)為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新
水下心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服
愈王海藏此藥能化停水
甘草石膏湯　治渴病全愈再劇舌白滑微腫咽
喉嚥唾覺痛嗌腫時渴飲冷白沫如膠飲冷乃
止　升麻(一錢半)　柴胡(七分)　甘草梢(五分)　石膏(六分)
黃栢　桃仁　防風　荊芥穗　生地　知母
當歸身(各一錢)　杏仁(六枚)　熟地　黃連(各三分)　細辛(一分)
紅花(少許)　川椒(三粒)　水煎食後熱服

〔全纂〕 六五

丹溪云消渴病退後而燥渴不解此有餘熱在肺
經可用參苓甘草少許生姜汁冷服虛者可用
人參湯

東垣六經渴治例
太陽經渴其脉浮無汗者五苓散滑石之類主
之陽明經渴其脉長有汗者白虎湯凉膈散之
類主之少陽經渴其脉弦而嘔者小柴胡湯加
瓜蔞之類主之○太陰經渴其脉細不欲飲縱
飲思湯不思水者四君子湯理中湯之類主之
○少陰經渴其脉沉細自利者猪苓湯三黃丸
之類主之○厥陰經渴其脉微引飲者宜少少
與之

聖濟治時氣煩渴用生藕汁一盞入蜜一合和匀
分為三服

中消治例(消穀善飢為中消)
癉成為消中胃中熱則消穀善飢東垣曰消渴中
消自古只治燥止渴悞矣殊不知內經云三陽

〔全一纂〕 六六

結謂之消三陽者足太陽也又手陽明大腸主
津液所生病熱則目黃口乾是津液不足也足
陽明主血所生病熱則消穀善飢血中伏火是
血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱為
病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為
消渴治之以蘭除陳氣也不可服膏粱芳草石
藥其氣悍烈能助熱燥也越人云邪在六府則
陽脉不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉
盛矣陽脉太盛則陰氣不得榮也故飢肉皮膚

而消削也
素問有病口甘者病名為何何以得之岐伯曰此五氣之溢也名曰脾癉夫五味入口藏于胃脾為之行其精氣津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必数食甘美而多肥也肥者令人多熱甘者令人中滿故其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也
潔古治胃熱善消水穀以甘辛降火之劑治之用黄連末生地白藕各自然汁牛乳各一升熬成膏和黄連末一斤丸如桐子大每服三十丸白湯下日進十服
河間猪肚丸　治消渴
猪肚一具　黄連一兩　天花粉四兩　麥門冬四兩
知母一兩　為細末納猪肚中線縫置甑中蒸極爛乘熱于石臼中杵可丸為度如硬加蜜丸如桐子大每服三十丸漸加至四十丸渴則進之○三因方多粱米杜仲本草云猪肚能補中益氣止渴

調胃承氣湯　治消中渴而飲多食此劫起時宜服之
三黄丸　治三焦熱渴
易老順利散　治中熱在胃而能食小便赤黄微利至不欲食為効不可多服
厚朴　枳實各一兩　大黄煨四兩
每服五錢水煎食遠服
大腸移熱于胃善食而瘦又謂之食㑊食㑊者謂食移易而過不生肌膚亦易飢也東垣云善食而瘦者胃伏火邪于氣分則能食脾虚則肌肉削也
胃移熱于胆亦曰食㑊
河間參蒲丸　治食㑊胃中結熱消穀善飢不生肌肉　人參　菖蒲　赤茯苓　遠志
地骨皮　牛膝酒浸各一兩　右煉蜜丸每服二十丸米飲下
下消治例渴而小便数有膏為下消
羅太無治張芸夫四十五歲病消渴舌上赤裂飲水無度小便数多先師以此方治之良愈消渴多傳瘡瘍為不救之疾既効後亦無患享年七十五而終名之曰生津甘露飲子治消渴上下

齒麻舌硬赤爛腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色黄目白睛黄甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛善噫善怒健忘腎肉腰背疼兩丸冷甚

生津甘露飲子 一方石膏用一兩二錢

石膏一錢二分 人參 甘草生 山梔 白豆蔻 白芷 連翹 蓽澄茄 黄連 姜黄 藿香 炙甘草 杏仁 木香各一錢 白葵 麥冬 當歸身 蘭香 柴胡各五分 黄栢酒炒一錢五分 升麻根 知母酒炒各二錢 桔梗三錢 全蝎二枚去毒

右為末湯浸蒸餅和勻捏作餅子晒乾杵碎如黄米大每服二錢抄于掌内以舌舐之津液送下或白湯食後服之神效凡消渴為病燥熱之氣勝也内經云熱淫所勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷氣氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之劑不能故以石膏之甘寒為君啟玄子曰壯水之主以鎮陽光故以栢連梔子知母之苦寒瀉熱補水為臣以當歸杏仁麥門冬全蝎連翹白葵蘭香甘草甘寒和血潤燥為佐柴胡升麻苦平行陽明少陽二經蓽澄茄白豆蔻木香藿香反佐以取之又用桔梗為舟楫使浮而不下也

東垣和血養氣湯 治口渴舌乾小便数舌上赤裂此藥生津除燥生肌又名地黄飲子

黄連酒炒 生地各七分 紅花少許 黄栢酒炒一錢 升麻一錢 甘草炙 防已酒洗各三分 桃仁六枚 當歸四分 知母酒煮 羌活各五分 麻黄根三分 口渴舌乾再加杏仁六枚 生甘草三分 小便数加石膏六分

右作一服水煎稍熱 忌酒麵房失

清涼飲子 治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結小便数

羌活梢 柴胡梢 甘草梢 知母酒製 黄芪 黄芩酒炒一錢 升麻梢四分 防風梢 防已 生地酒洗各五分 當歸六分 石膏 龍胆草 黄栢各一錢五分 紅花少許 桃仁 杏仁各五枚 甘草炙一錢

水二鍾酒一小盞煎服

甘露膏　治消渴飲水極多善食而瘦大便結燥
小便頻数又名蘭香飲子
石膏二錢 知母一錢五分 甘草生 防風各一錢 炙甘草
人參　半夏　蘭香　白豆蔻　升麻　桔梗
連翹各五分　右浸蒸餅為丸或捏作餅子晒乾
碎如米大每用淡姜湯下二錢
黄連末治消渴要藥加天花粉末人乳生地黄汁
生藕汁二物為膏入山藥末溲和以姜汁和煉
蜜為膏徐二挑于舌上以白湯少許送下亦可

能食而渴者加石膏
治消渴以天花粉為末用人乳汁生韮汁煎膏丸
如菉豆大每服百丸食後白湯下
肘後方治消渴小便多者煮瓜蔞根汁飲之良
濟世方云治消渴無方可治者用天花粉大烏頭
炒等分為細末蒸餅丸每服百丸黑豆湯下
已上四方皆以天花粉為君本草主消渴止小
便通月水乳汁夫既能止小便又能通月水知
其流湿潤燥治消渴之要藥也

千金地黄丸　治腎渴
黄連四兩為末 生地半斤取汁連查拌黄連末和匀晒乾用
為細末煉蜜為丸食後麥門冬湯下五六十
丸
麥門冬湯　治消渴日夜飲水無度飲下即溲
麥門冬　黄連　冬瓜各二兩
每服五錢水煎去渣温服若無乾冬瓜用新
冬瓜肉三斤去穰分作十二片為十二服每
服用一片劈破水煎日三服

冬瓜飲子　治消渴能食而飲水多小便如脂麩
片日夜無度
冬瓜一枚 黄連十兩為細末　先以冬瓜破開去穰摻
黄連末在内却用頂蓋定于熱灰中煨熟去
皮切細爛研絞汁每服一盞至二盞日三服
夜一服
三消丸　用好黄連為細末不拘多少切冬瓜肉
研取自然汁和成餅陰乾再為細末用汁浸和
加七次即用為末仍以瓜汁為丸煎大麥仁湯

送下尋常渴疾只一服効　已上五方黃連冬
冬為君丹溪云冬瓜性走而急久病與陰虛者
忌之又有黃連為佐用者尤當裁酌
治消渴飲水不止小便数用田螺五升水一斗浸
一宿渴則飲之每日一度易水換螺為妙
又方以水煮取汁飲之螺亦聽食
愚按已上諸方列于下消之例觀其用藥在
上中為多亦是端本澄源之意上中既平不
復傳下消矣故于真陰虛腎消之病而又自

有補下焦之藥也用藥者宜審焉
張子和治飲水百杯尚猶未足小便如沙或如杏
色此方三五日小便毒大注下十日除根 此方子和自云此重劑也誠有驗
水銀四錢　錫二錢熔化同水銀炒成砂子　牡蠣
知母　密佗僧　紫菀　苦參　貝母各一兩
天花粉半斤　黃丹半兩　俱為細末用雄猪肚婦
人用獖猪肚一具納藥于內以麻線縫之用
新瓦二片繩縛一二遭別用米一升天花粉
末半升于新水內煮熟取出放冷不用米及

天花粉只將猪肚併肚中藥爛搗和為丸如
硬加蜜食前米湯下三四十丸　三因方無
貝母
河間胡粉散　治大渴百方不瘥者亦治腎消
黃丹　胡粉　澤瀉　石膏　赤石脂　白石
脂各五錢　天花粉二兩半　甘草一兩　蜜為丸菉豆大
每服十五丸至二十丸止多則腹痛日進二
服
葛根湯　治消渴消腎日飲石水者

葛根三兩　瓜蔞根　黃丹各二兩　大附子炮去皮臍一兩
蜜丸桐子大每十丸日進三服春夏去附子
六味地黃丸　治腎消効
經驗方　治消不止下元虛者用牛膝五兩細剉
為末生地黃汁五升晝曬夜浸以汁盡為度蜜
丸空心溫酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑
鬚髮生津液
仲景治消渴小便反多如飲水一斗腎氣丸主之
張子和治腎消以腎氣丸本方加山藥一味外桂

附從四時加减冬用一兩春秌用三錢夏用一錢　又法腎氣丸去附子加五味子一兩半

張子和治諸虛不足胸中煩悸時常消渴唇口乾燥或先渴而欲發瘡或病癰疽而後渴宜用黄耆湯多服　方見癰疽門

凡消渴而小便反多有脂者皆腎氣不嘗攝津液也宜多服黄耆黄耆乃補氣之要藥

外臺秘要　治消腎小便數鹿角一具炙焦擣爲極細末酒服方寸匕漸漸加之

心移寒于肺消者飲一溲二不治腎臟消爍氣無所攝故飲一溲二也

口燥咽乾　此尋常口乾者非前消渴症也

本事方以黄耆湯治心煩躁不生津液不思飲食

黄耆　人参　五味子　麥門冬　熟地

甘草　白芍藥各三兩　白茯苓一兩　天門冬五錢

每服三錢姜棗烏梅同煎食後服

燥熱咽乾忌南星半夏　又渴者不得利小便是以五苓散在所當禁也

赤水玄珠第十二卷目録

痺證

痛痺　附鼻額夾車痛　肩背痛　臂痛

著痺　附麻木　口舌麻木

鶴膝風

攣

一身盡痛　産後身痛

赤水玄珠第十二卷

新安生生子孫一奎著輯

痺門

生生子曰：按内經靈樞所云痺證有臟腑營衛筋脉肌皮骨及俞合刺法論包甚廣，而世之認痺証者絶少。丹溪擬名痛風編門論治，是從内經寒氣多者為痛痺論，得其一也。其有不痛及各臟腑俞合等証，世皆不詳載者，意其以風寒濕三氣為病之本，散寓于各証之下，隨各証而分治之，如胞痺寓淋，腸痺寓飧泄，心痺寓噫氣，肺痺寓喘滿之類皆是。然則痺之不名也久矣，宜乎其有認為痿，認為風，認為脚氣同治者。此不務研經旨而惟務求同俗也，可慨夫！予今列經旨於篇首，以全軒岐舊意，以痛風復痛痺，以昭中古諸賢証治得痺之一，俾合前後而考之，庶可因名而循其實也。設不復之，則痛者固可以為風，而于不痛者獨不可以為風乎？抑凡見筋骨作痛，而亦有血虚、有陰火、有痰涎者，又皆可以風名之乎？在丹溪諸公，必自能融會體認，其如因名迷實之弊，流害已久，名不正則言不順，予故不能無容言也。後之明哲，幸鑒予心。

黄帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而為痺也。其風氣勝者為行痺，行痺者行而不定也，今稱為走注疼痛及歷節風之類是也。寒氣勝者為痛痺，痛痺者疼痛苦楚，世稱為痛風及白虎飛尸之類是也。濕氣勝者為著痺，著痺者著而不移，世稱為痲木不仁之著而不移，劉河間所謂氣之道嘗者而痲者得矣，或痛者一處始終不移著是也。啓玄子註曰：風則陽受之，故為痺行；寒則陰受之；濕則皮肉筋骨受之，故為痺著而不去也。故乃痺從風寒濕之所生也。

帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者為骨痺，以春遇此者為筋痺，以夏遇此者為脉痺，以至陰遇此者為肌痺，以秋遇此者為皮痺。此皆以所遇之時所客之處命名，非行痺痛痺著痺之外又別有此五痺也，以時令配五臟所合而言也。

帝曰：内舍五臟六腑，何氣使然？啓玄子註曰：言皮肉筋脉骨痺，以四時之外遇，然内居腑臟何以致之。岐伯曰：五臟皆有合，病久而不去者，内舍於其合也。故骨痺不已，復感於邪，内舍於腎；筋痺不已，復感於邪，内舍於脉脉痺

不已復感於邪內舍於心肌痺不已復感於邪內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺所謂痺者各以其時重感於風寒濕之氣也凡痺之客五臟者肺痺者煩滿喘而嘔心痺者脉不通煩則心下鼓暴上氣而喘嗌乾善噫厥氣上則恐肝痺者夜臥則驚多飲數小便上為引如懷孕腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭脾痺者四肢解墮發欬嘔汁上為大塞腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄胞痺者少腹膀胱按之內痛

若沃以湯澀於小便上為清涕陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷淫氣喘息痺聚在肺淫氣憂思痺聚在心淫氣遺溺痺聚在腎淫氣乏竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾 王注淫氣謂氣之妄行者各隨藏之所主而入為痺也 諸痺不已亦益內也其風氣勝者其人易已也帝曰痺其時有死者或疼久者或易已者其故何也岐伯曰其入藏者死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間者易已帝曰其客於六腑者何也岐伯曰此亦其飲食

居處為其病本也六腑亦各有俞風寒濕氣中其俞而飲食應之循俞而入各舍其腑也帝曰以鍼治之柰何岐伯曰五臟有俞六腑有合循脉之分各有所發各隨其故則病瘳也 甲乙經以隨為治 帝曰營衛之氣亦令人痺乎岐伯曰營者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於六腑乃能入於脉也故循脉上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣也其氣慓疾滑利不能入於脉也故循皮膚之中分肉之間熏於肓膜散於胸腹逆

其氣則病從其氣則愈不與風寒濕氣合故不為痺也帝曰善痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深營衛之行濇經絡時疏故不通 甲乙經作痛 皮膚不營故為不仁其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒也其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽遭陰故為痺熱其多汗而濡者此其逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也帝曰夫痺之為病

不痛何也岐伯曰痺在於骨則重在於脉則血凝而不流在于筋則屈不伸在於肉則不仁在皮則寒故具此五者則不痛也凡痺之類逢寒則急逢熱則縱帝曰善

刺痺穴法

冬感風寒湿者為骨痺久不已則内入於腎病腎脹足攣尻以代踵身踡脊以代頭　取太溪委中

春感風寒湿者為筋痺久不已則内入於肝病卧則驚多飲数小便　取太衝陽陵泉

夏感風寒湿者為脉痺久不已則内入於心病心下滿暴喘嗌乾善噫恐惧　取太陵少海

長夏感風寒湿者為肉痺久不已則内入於脾病解堕發欬嘔汁　取太白三里

秋感風寒湿者為皮痺久不已則内入於肺病煩滿喘嘔　取太淵合谷

靈樞黃帝問於岐伯曰周痺之在身也上下移徙隨脉其上下左右相應間不容空愿聞此痛在血脉之中邪將在分肉之間乎何以致是其痛之移也間不及下鍼其搐痛之時不及定治而痛已止矣何道使然願聞其故岐伯荅曰此衆痺也非周痺也黃帝曰願聞衆痺岐伯曰此各在其處更發更止更居更起以右應左以左應右非能周也更發更休也帝曰善此痛安在何因而有名岐伯曰風寒湿氣客於外分肉之間迫切而為沫々得寒則聚々則排分肉而分裂也分裂則痛々則神歸之神歸之則熱々則痛解々々則厥々則他痺發々則如是此内則不在

臟而外未發于皮獨居分肉之間真氣不能周故命曰衆痺

仲景金櫃要略論血痺乃尊榮人骨弱肌膚盛重因疲勞汗出卧不時動揺加被微風遂得之但以脉自微濇在寸口関上小緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈血痺陰陽俱微寸口関上微尺中小緊外証身體不仁如風痺状黃耆桂枝五物湯主之

嚴用和曰痺証因體虚腠理空踈受之而成逢寒

則急逢熱則縱隨所受邪氣而生証也診其脉大而濇為痺脉来急亦為痺脉濇而緊者亦為痺又有風血痺陰邪入于血經故也

劉宗厚曰人之感三氣而為痺者以其形虛血虛耳但有在肌皮血脉淺深之異故入藏者死緣痺之為証有筋攣不伸肌肉不仁者與風証絶相似故世俗類於風痿痺証通治此千古之弊也大抵固當分其所因風則陽受之痺感風寒湿之氣則陰受之為病多重痛沉着患者難易

得去如錢仲陽為宋之一代明醫自患周痺止能移于手足為之偏廢不能盡去可見其為難治也况今世俗多類于風証通治宜乎不能得其病情也

統旨曰風痺者遊行上下隨其虛邪與血氣相搏聚于関節筋脉弛縱而不收也宜防風湯

寒痺者四肢攣痛関節浮腫宜五積散

湿痺者留而不移汗多四肢緩弱皮膚不仁精神昏塞者宜茯苓川芎湯

熱痺者臟腑移熱復遇外邪客搏經絡留而不行陽遭其陰故瘰痺熻然而悶肌肉熱極體上如鼠走之狀唇口反裂皮膚色変宜升麻湯

三氣合而為痺則皮膚頑厚或肌肉痠痛此為邪中周身搏於血脉積年不已則成癮疹風瘡搔之不痛頭髮脫落治宜踈風涼血

腸痺者数飲而小便不通中氣喘争時作飧泄宜五苓散加桑白皮木通麥門冬或吳茱萸散木香丸

胞痺者少腹膀胱按之內痛若沃以湯濇於小便上為清涕宜腎著湯腎瀝湯　方見淋閉門

血痺者邪入於陰血之分其狀體常如被風所以骨弱勞瘦汗出卧則不能揺動也宜當歸湯

周痺者在血脉之中上下遊行周身俱痛宜蠲痺湯大豆蘗湯

支飲者手足麻痺臂痛不舉多睡眩冒忍尿不便膝冷成痺也宜茯苓湯

東垣云身體沉重走注疼痛湿熱相搏而風熱欝

不得伸附著於有形也宜蒼朮黄柏之類
行痺治劑　即走注疼痛
仲景桂枝芍藥知母湯　治諸肢節疼痛身體尫羸脚腫如脱頭眩短氣兀兀欲吐痛風神効
桂枝　知母　防風(各四兩)　芍藥(三兩)　甘草　麻黄　附子(各二兩炮)　生姜　白朮(各五兩)　水七升煮取二升温服一日三服
烏頭湯　歷節風不可屈伸疼痛　麻黄　芍藥　黄耆(各三兩)　甘草(炙)　川烏(五枚㕮咀以蜜二升煎取一升即去烏頭)水三升煎一升去渣納蜜再煎七合不(盡服之)

河間防風湯　治行痺走注無定　痛風神効
防風　當歸　赤茯苓　杏仁(去皮尖炒各一錢)　甘草　桂(各五分)　黄芩　秦艽　葛根(各二分)　麻黄(五分去節)
水酒各二盞棗三枚姜五片煎一盞去渣(温服)
本事方薏苡仁散　治濕傷腎〻不能生肝〻自生風遂成風濕流注四肢筋骨或入左肩髃肌肉疼痛漸入左指　薏苡(一兩)　當歸　芎藭　乾姜　甘草　官桂　川烏　防風　白朮　茵芋(卵炒)　山　麻黄　獨活(各五錢)　右末每服一錢空心臨卧酒調下一日三服
麝香丸　治白虎歷節風疼痛遊走無定狀如虫嚙晝静夜劇及一切足疼痛　川烏(大者三箇生用)　全蝎(二十一箇生用)　黑豆(二十一箇生用)　地龍(五錢)　右末入射香半字同研勻糯米糊為丸菉豆大每服七丸甚者十丸夜卧令膈空温酒下微出冷汗一身便瘥予得此方凡是歷節及不測疼痛一二服便瘥在歙州日有一貴家婦人遍身走注疼痛至夜則發如虫嚙其肌多作鬼邪治予曰此正歷節風病也三服愈

丹溪龍虎丹　治走注疼痛或麻木不遂半身疼痛　蒼朮　草烏　白芷(各兩)　右末水拌侍發熱過再入乳香二錢當歸牛膝各半兩酒糊為丸彈子大酒化下
無擇附子八物湯　治歷節風四肢疼痛如鎚鍛不可忍　附子(炮去皮臍)　乾姜(炮)　芍藥　茯苓　半夏　桂心(各三兩)　白朮(四兩)　人參(三兩)

每服五六錢水煎

加味二妙散　痛風走注疼痛　黄柏酒炒　蒼朮酒炒各二錢　水煎調酒洗葳靈仙末羚羊角灰臣　蒼朮佐　白芥子使　生姜一片入藥末一錢擂碎以前藥再温服

東垣和血散痛湯　治兩手十指一指疼了一指疼疼後又腫骨頭裹痛膝痛左膝痛了右膝痛發時多則五日少則三日晝輕夜重痛時覺熱行則痛輕腫却重註云先血後氣乃先痛後腫形傷氣也　羌活　升麻　麻黄去節各一錢半　桃仁十箇　柴胡　防風　黄柏　知母酒炒各一錢　黄連酒炒　防已各六分　猪苓　獨活各五分　當歸各一　甘草炙二分　紅花一分　分二服水煎食前熱服

羅太無治真定府張大素好嗜酒五月間病手指節腫痛屈伸不利膝臏亦然心下痞滿身體沉重不欲飲食食即欲吐面色痿黄精神減少至六月間求予治之診其脉沉而緩緩者脾也内經云諸濕腫滿皆屬脾土仲景云濕流關節肢體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之　羌活　升麻各一錢　獨活七分　蒼朮　防風　甘草　葳靈仙　茯苓　當歸　澤瀉各五分　分二帖水煎食前一服食後一服忌酒麵生冷硬物

牛蒡子湯治風熱成歷節手指赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱或大便閉　牛蒡子　新豆豉炒　羌活各三兩　生地二兩半　黄耆一兩半　為末湯調二錢空心食前日三服　此病胸膈生痰久則赤腫附着肢節久久不退遂成厲風此孫真人預戒也宜早治之

河間大荳蘗散　治周痺走注五臟畱滯胃中結聚益氣出毒潤澤皮毛補腎　大荳蘗一升炒香熟為末　每服五分温酒調下空心服加至一錢日三服　本草云大荳消淤血破婦人悪血治熱痺筋攣膝痛古人多用酒沃豆蘗取汗蓋表藥也

犀角湯　治熱毒流入四肢歷節腫痛　犀角二兩　羚羊角一兩　黄芩　梔子　射干　大黄　升

麻各四兩　豉一升　每七八錢水二鍾煎服
張子和治一稅官風寒湿痺腰脚沉重浮腫夜則
痛甚兩足悪寒経五六月間猶綿纏靴足膝皮
膚少有跣露則冷氣襲之流入経絡其病轉劇
走注上下往来無定其痛極處便攣急而腫起
肉色不變腠理如虫行每遇風冷病必轉增食
減肌體瘦乏起須人扶所服者烏附姜桂種種
燥熱燔針着灸莫知其數前後三年不愈一日
予脉之其兩手皆沉滑有力先以導水丸通経
散各一服是夜瀉三十餘行痛減半漸服赤茯
苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治痺
方是也日三服煎七八錢漐漐然汗出余欲作
玲瓏竈法薰蒸血熱必增極諸汗法古方中多
有之惟以吐法者世罕知之
丹溪控涎散　治身及脇走痛痰挾死血加桃仁
泥丸治走注疼痛　葳靈仙　梔子炒　蒼术
當歸各一錢　川芎七分　肉桂一分　桃仁七箇　甘草
五分　生姜五片　水二盞煎半乾入童便半盞竹
瀝半盞熱服忌肉雞麵
定痛方　治一切風湿痺痛　乳香　没藥
地龍　木鱉子肉　金星石　五靈脂等分
蜜丸彈子大每一丸臨卧酒下
升麻湯　治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反
縱皮毛黒悪治諸風　升麻三兩　茯神　人参
防風　犀角鎊　羚羊角　羌活各一兩　官桂五錢
每服五六錢生姜一塊搗碎竹瀝少許同煎
至一盞温服
八珍丸　治痛風走注脚氣頭風　乳香　没藥
代赭石　穿山甲生用三錢各　羌活　草烏生用五錢各
全蝎二十一箇炒　川烏生用不去皮尖一兩　右末醋糊丸梧
子大每服十一丸
四妙散　治痛風走注　葳靈仙酒浸五錢　白芥子一錢
蒼耳子一錢五分又云足蒼术　羊角灰二錢　右末每服
一錢姜一大片搗汁入湯調服　二妙散同
調尤妙
麻生羌活湯　治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛

發作不定 羌活（二兩） 附子（炮去皮臍） 秦艽 桂心
甘草（炙） 木香 牛膝（酒浸） 桃仁 骨碎補、
川芎 當歸 防風（各一兩） 姜五片每服五六
錢水煎

痛痺（丹溪編爲痛風門今改之以復舊經旨也）

丹溪痛風論曰痛風者四肢骨節走痛也他方謂之白虎歷節風夫氣行脉外血行脉内晝行陽二十五度夜行陰二十五度此乎人之造化也得寒則行遲而不及得熱則行速而太過内傷于七情外傷於六氣則氣之運或遲或速而疾作矣彼痛風者大率因血受熱已自沸騰或再涉冷受湿取凉或坐卧當風熱血得寒汚濁凝澁所以作痛夜痛甚者行於陰也治當以辛熱之劑流散寒湿開發腠理則血行氣和而愈然亦有數種治法不能無少異也因湿痰濁血流注爲病以其在下焦道路遠非烏附氣壮者不能行故用爲引經若以爲主治非惟無益而有殺人之毒此病必行氣流湿舒風導滯血補新

血降陽升陰治有先後須明腫與不腫可也不可食肉〻屬火大能動火素有火盛者小水不能制若食肉厚味下有遺溺不已上有痞悶之甚雖魚麵醬醋酒皆斷之先以二陳湯加酒浸白芍藥少佐以黄連降心火看作何應而（爲之區處）

生生子曰按丹溪不以痺分門而以痛風分門謂血先受熱而後受冷湿乃所以爲痛夜痛甚行於陰也及戒人不可徒以烏附爲主斯言不惟補前人之餘蘊而猶有深意存焉者實懲時俗與脚氣痿証混治之悞而另立痿門脚氣門分治之而又另分麻木爲一門者此尤有見也麻木固亦有湿有痰所致者而氣血不足居多分而治之良有特識設一槩而作風寒湿治則虚虚之禍無有窮已不獨麻木爲然而行痛者三痺其中未能無虚〻者或久作風寒湿治用䟽風剛燥之劑太過而氣血爲之暗損或氣血先虚而後受邪經曰邪之所凑其氣必虚此皆不可以不慎也陳無擇謂有支飲作痺此均有補

于經文者誠以今之患痛痺者歷之每每如用溪無擇肟論治驗數條循其精工故畢錄之以爲法

大法用蒼朮南星川芎白芷當歸黄芩在上者加羌活桂枝桔梗威靈仙在下者加牛膝防已木通黄栢治痛風取薄桂者以其味淡獨此能橫行手臂領南星蒼朮等藥至痛處

一方四物湯加桃仁牛膝陳皮茯苓甘草白芷龍膽草在上屬風在下屬濕加藥同但倍之桂等分無桔梗氣虛者加蒼朮龜板痰加南星血虛加芎歸佐以桃仁紅花

因痰者二陳湯加酒炒黄芩羌活蒼朮

因濕者蒼白朮之類佐以竹瀝及行氣藥或曰有濕鬱而周身走痛者或關節間痛遇陰寒即發當作濕鬱治

因於風者小續命湯極驗

因血虛者芎歸之類佐以桃仁紅花

肥人多是濕與痰飲流注經絡

瘦人多是血虛與熱

下部有濕腫痛防已龍膽草黄栢知母固是捷藥

若肥人病此宜蒼朮白朮南星滑石茯苓之類

瘦人宜當歸紅花桃仁牛膝檳榔等同用

上中下痛風黄栢酒炒蒼朮米泔浸一宿南星各二兩神麯炒台芎各一兩龍膽草五分白芷防已桃仁各五錢威靈仙酒洗桂枝羌活各三錢紅花酒洗一錢五分

右為末麯糊丸食前下百丸威靈仙治上體痛風虛弱勿用

肢節腫痛痛屬火腫屬濕兼受風寒而發動于經絡之中濕熱流注肢節之間而無已也用麻黄去根節赤芍藥各一錢防風荆芥羌活獨活白芷蒼朮威靈仙片芩枳實桔梗乾葛川芎各五分甘草歸尾升麻各二分下焦加酒炒黄栢婦人加酒炒紅花腫多加檳榔大腹皮澤瀉更加沒藥一錢定痛尤妙一云脉濇數者有瘀血宜桃仁紅花芎歸及大黄微利之

氣血兩虛有痰濁陰火痛風人參山藥海石南星各一兩白朮熟地黄栢炒黑龜板酒炙各二兩乾姜炭瑣陽各五錢右為末酒糊丸

二妙散 治筋骨疼痛因濕熱者有氣加氣藥血虛加血藥痛甚者加生姜汁熱辣服之 黄栢炒 蒼朮米泔浸炒 右為末沸湯入姜汁調服

二物皆有雄壯之氣表實者加酒少許佐之
若痰帶熱者先以舟車丸或導水丸神芎
丸下伐後以趂痛散服之一法二妙爲君加甘草羌活各二錢
陳皮芍藥各一錢酒炒葳靈仙半錢服之佳
趂痛散 乳香 沒藥 桃仁 紅花 當歸
羌活 地龍酒炒 牛膝酒洗 甘草 五靈脂酒炒
香附童便浸 右爲末每服二錢酒調或加酒炒芩栢
潛行散 黃栢酒浸爲末入湯藥調服
治酒濕痰痛風 黃栢酒炒 葳靈仙酒炒各五錢 蒼朮
八十二卷 十九
羌活 甘草三錢 陳皮 芍藥各一錢 右爲末
每服一錢或二錢沸湯入姜汁調服
治氣實表實骨節痛方 滑石飛六錢 甘草一錢 香附
片芩各三錢 右爲末姜汁糊丸梧子大每服五
七十丸白湯吞下
治食積肩腿痛 龜板酒浸炙一兩 酒栢葉 香附五錢
辣芥子 凌霄花半錢 右末酒糊爲丸桐子
大煎四物湯加陳皮甘草湯下
丹溪治一男子家貧多勞秋凉忽渾身發熱兩臂

髆及腕兩足并胯皆疼痛如煆晝輕夜劇醫與
風藥則增痛與血藥則不効惟待斃而已脉之
兩手俱澀而數右甚于左飲食則如平時形瘦
削蓋大痛而瘦非病也用蒼朮酒黃栢各一錢
生附子一片生甘草三分麻黃五分研桃仁五
箇作一帖煎入姜汁些少令辣服至四帖後去
附子加牛膝一錢至八帖後来告急云氣上喘
促不得睡痛似微減意其血虛因服麻黃過劑
陽虛被發動而上奔當與補血鎮墜及酸劑收
八十二卷 二十
之遂以四物湯加川芎芍藥人參二錢五味子
十二粒與二帖服之喘隨定是夜遂安三日脉
之數減大半澁脉如舊問其痛則曰不減然呻
吟之聲却無察其起居則疲弱無力病人却自
謂不弱遂以四物湯加牛膝白朮人參桃仁陳
皮甘草檳榔入姜三片煎服如此藥與五十帖
而安一月後因負重擔復痛作飲食亦減再與
此藥加黃芪三分又二十帖全愈
一人年踰六十性急作勞患兩腿痛動作則痛甚

視之曰此蓋虛証當補血則病自安遂與四物
加桃仁陳皮牛膝生甘草煎入姜研潛行散熱
飲三四十帖而安
何縣長年四十餘形瘦性急因作芳背痛臂疼骨
節疼足心發熱可與四物湯帶熱下大補丸保
和丸共六十粒食前服
一婦人脚疼怕冷夜劇日輕　生地　白芍　歸
尾各五錢　黄栢炒　黄芩　白朮　右分四帖水煎
帶熱服

鮑子年二十餘因患血痢用澁藥取効後患痛風
喊叫撼隣里予視之曰此惡血入經絡證血受
湿熱久為凝濁所下未盡留滞隧道所以作痛
經久不治恐成枯細遂與四物湯桃仁紅花牛
膝黄芩陳皮甘草煎生姜汁研潛行散入少酒
飲之數十帖又與刺委中出黑血近三合而安
朱閣内年三十味厚性急患痛風攣縮數月醫不
應予視之曰此挾痰與氣症當和血疎痰導氣
病自安遂以潛行散入生甘草牛膝枳殼通草

陳皮桃仁姜汁煎飲半年而安
陸郎左腿叉骨旁痛小便赤澁此積憂痰涎所為
白朮　枳殼　赤芍錢　條芩　連翹　通草
甘草梢三分　右剉水煎服
一婦脚叉骨痛　蒼朮　白朮　陳皮　芍藥三分
木通二錢　甘草五分　分二服送大補丸五十
粒　右丹溪治痛風法主於血熱血虛血汚或
挾痰皆不離四物潛行牛膝甘草桃仁陳皮
蒼朮姜汁而随症加減發前人之餘蘊醫世

俗之所不能醫其有功於後人也大矣
凡痛在胃之脉絡者宜解食毒
許學士醫檢正患鼻額間痛或麻痺不仁如是
數年忽一日連口唇頰車髮際皆痛不開口言
語飲食皆妨在額與頰上常如糊手觸之則痛
予作足陽明經絡受風毒傳入經絡血凝滞而
不行故有此症或者以排風小續命透髓丹之
類與之皆不効製此犀角升麻湯贈之數日愈
犀角一兩二錢　升麻　防風　羌活各三兩　川芎

白附子、白芷　黃芩各五錢　甘草一分
右用四大錢水煎服食後臨卧各一服一日
共服四次夫足陽明胃也經云腸胃為市又
云陽明多血多氣胃之中腥羶五味無所不
納如市鄽無所不有也以其腐熟飲食之毒
聚於胃此方以犀角為主解飲食之毒也陽
明經絡環唇挾舌起于鼻合頞中循頰車上
耳前過客主人循髮際至額顱今所患皆一
經絡也故以升麻佐之餘藥皆滌降風熱升
麻黃芩專入胃經稍通者自能曉

海藏四物蒼术各半湯　治肢腫不能舉動
四物湯蒼术各半两各煎服効與活血丹相表裏
活血丹　治遍身骨節疼痛如神與蒼术四物各半湯相表裏
熟地黃三两　當歸　白术　白芍、續斷
人參各一两　右末酒糊丸如桐子大
東垣蒼术復煎散　治寒濕相合腦户痛惡寒項
脊強肩背胛卯痛膝臏痛無力行步能食身沉
重其脉沉緩洪上急　蒼术四两水二碗煎至二大盞去渣入下
[illegible]羌活一錢　升麻　柴胡　藁本　澤瀉　白
术各五分　黃栢三分　紅花一分　右用蒼术二盞
煎至一大盞空心温服微汗為効忌酒麵
緩筋湯　治目如火腫痛兩足及伏菟骨筋痛膝
少力身重腰痛夜惡寒痰嗽項頸筋骨背急痛
目多眵淚食不下　羌活　獨活各二錢　藁本
麻黃　草荳蔻　黃栢　黃芩　歸身　生地
柴胡各三分　生甘草二分　升麻二分　炙甘草　熟
地黃各二分　蘇木一分　蒼术五分　水一鍾煎一鍾熱服

羅太無活血應痛丸　治風濕客於腎經血脉凝
滯腰背腫痛不能轉側皮膚不仁遍身麻木上
攻頭目虛腫耳目常鳴下注膝重痛少力行履
艱難項背拘急不得舒暢常服和血脉壯筋骨
使氣脉宣通　金毛狗脊去毛六两　蒼术米泔浸十两
香附子炒十二两　陳皮九两　沒藥一两二錢　草烏炮二两五錢
葳靈仙三两　右末酒糊為丸桐子大每服十五
丸不拘時温酒或熱湯送下忌食桃李雀鴿
諸血物

烏靈丸　治患風寒痛風及麻木行步艱難
五靈脂二兩　川烏一兩炮去皮臍　右末酒糊為丸桐子大每服十丸加至五十丸空心温酒下忌冷物
史丞相遇仙方　諸般痛風手足艱難筋骨疼痛口眼喎斜言語蹇澁　附子炮去皮臍　川烏同製　當歸　川芎　肉蓯蓉酒浸焙　杜仲姜汁炒　羌活　黄芪　人參　白朮　白芍藥　牛膝酒浸　防風　天麻　白茯苓　狗脊炒去毛　萆薢　續斷　獨活　肉桂　赤芍藥各一兩　虎脛骨酥炙二兩五錢　右以生絹袋盛之用無灰酒浸密封罐口春三日夏二日秋七日冬十日取出晒焙乾為末酒糊丸桐子大用浸藥酒一盞空心送下五十丸忌生冷油膩荳腐麵食發風物
五加皮酒　治風湿遍身疼痛俗名痛風或腫或癱或脚氣不能履動者　五加皮不拘多少入白麯内同釀白酒飲之効
丹溪治環跳痛不已防生附骨疽方以蒼朮佐黄栢之辛行以青皮冬加桂枝夏加黄芩體虚加杜仲牛膝以甘草為使大料煎入酒深者恐朮栢桂枝十數帖發不動以少黄連一二帖又不動者恐毒将成㧞地成坑以火煅紅沃以小便赤體坐其上以被席圍包下體使熱蒸腠理開血氣暢而愈
仲景治婦人六十二種風及腹中血氣刺痛以紅藍花酒主之　紅花一味以酒一大碗煎減半頓服一半須之再服
虎骨丸　治經絡凝滞骨節疼痛筋脉攣急遇陰寒愈痛　乳香　沒藥各另研　赤芍藥　熟地　當歸　虎脛骨酥炙黄　血竭各五錢　右末用木瓜一枚切破去核入乳香末在内以麻線纏定勿令透氣好酒六升煮酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟蜜少許杵和為丸桐子大每服五十丸看病上下服
麒麟散　治寒湿傳於經絡疼痛不可忍　血竭　乳香　沒藥　白芍　當歸各六錢　水蛭杵炒

烟盡射香各三錢 虎脛骨酥炙黃五錢 右為末和勻每
服二三錢食前溫酒調下
統旨云痛痺五積散佳四肢攣痛關節浮腫殊効
治白虎歷節風及腫痛者以釅醋五升熱煎三四
沸切葱白二三升煮一沸漉出布帛包裹患處
熨之以瘥為度
嚴氏蠲痺湯 治身體煩疼四肢項背拘急或疼
或痛重舉動艱難手足冷痺腰腿沉重筋脉無
力 當歸 芍藥 黃芪 羌活 片子姜黃各一兩五錢
甘草炙五錢 每服六七錢姜棗煎服
獨活寄生湯 治肝腎虛弱感風濕致痺兩脛緩
縱痺弱不仁 方出腳氣門
河間茯苓湯 實氣勝者為痛痺宜通氣溫經尤
治四肢疼痛拘倦浮腫 赤茯苓 桑白皮各二兩
防風 官桂 川芎 芍藥 麻黃去節各一兩半
每服六七錢棗一枚水煎服繼以姜粥投之
汗出愈
腳跟痛有血熱有痰血熱者四物加黃柏知母牛
膝之類痰用二陳加南星黃柏防已

肩背痛 附臂痛

肩背痛不可回顧者此太陽氣鬱而不行或脊痛
項強腰似折項似拔者此足太陽經不通二者
俱宜通氣防風湯有因濕熱肩背沉重而痛者
當歸拈痛湯有因汗出小便數而欠者風熱乘
脾脾氣鬱而肩背痛也當瀉風熱則愈宜升麻
柴胡湯有痰飲流注肩背作痛宜星香散或導
痰湯有腎氣不循故道氣逆挾背而上致肩背
作痛宜和氣飲加鹽炒小茴香少許有勞力或
肩書著棋久坐而致脊背疼者補中益氣湯或
八物湯加黃芪背者胸之府肺主氣居胸中肺
氣滯則血脉澁肺氣虛則不能運行陽道肺中
有痰流注肩背皆能作脹疼
有背痛乃肺分野之病經云西風生于秋病在肺
俞在肩背故秋氣者病在肩背大過為病在外
則令人逆氣背痛慍慍然也
臂痛 臂為風寒濕所搏或痰流氣滯或因提挈

重物皆致臂痛有腫者有不腫者因于風寒宜五積散加羌活因于湿蠲痺湯多加蒼术因於痰導痰湯因於氣烏藥順氣散因提重傷筋用劫勞散或和氣飲加姜黄盖姜黄能入臂故也有人坐卧為風湿所襲但遇外有寒邪所侵即痛者宜羌活散有飲酒太過湿痰流注者用二陳加南星蒼术桔梗枳殼桂枝酒芩有血不榮于筋者用四物加姜黄秦艽羌活有氣血凝滞經絡不行所致者舒筋湯

控涎散　治肩背臂痛如神　方在行痺

控涎丹加去油木鱉子一两　桂五钱　治臂痛每服二十丸加至三十丸妙

丹溪治臂痛　南星　半夏　白术　香附　酒芩各一钱　蒼术二钱　陳皮　茯苓各五分　威靈仙三分　甘草少許

花麯散　治臂痛　紅花炒　神麯炒　為末酒調下

姜黄散　治臂痛非風非痰　姜黄　甘草　羌活各一两　白术二两　腰已下痛者加海桐皮　當歸　芍藥

東垣治臂痛分六道經絡者痛在何經絡之間以行本經藥通其氣血ゝ氣通則愈矣若表上諸痛若便擬下之則不可當詳細辨之

右東垣云認經絡用藥盖以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而定之則其臂臑之前廉痛者屬陽明經以升麻白芷乾葛行之後廉痛者屬太陽經以藁本羌活行之外廉痛者屬少陽以柴胡行之内廉痛者屬厥陰以柴胡青皮行之内前廉痛者屬太陰以升麻白芷

水煎服如面色白脫色氣短者勿服

舒筋湯　臂痛不能舉有人常左臂痛或以為飲以為風以為湿諸藥悉試継以針艾俱不効得此方服之而愈盖是氣血凝滞經絡不行所致非風非飲非湿腰以下食前服腰以上食後服

又名通氣飲子　片子姜黄四两如無用嫩莪术代之　甘草炙　羌活各一两　赤芍藥　海桐皮去外皮　白术　當歸各二两

每服五钱姜三片水煎臨服入磨沉香少許

治背痛　姜黄四两　甘草炙　羌活　白术各一

每服一两水煎

防風飲子　治項筋急痛諸藥不効者　黄芪
附子　甘草　蒼术　陳皮　羌活　防風
桔梗等分　每服五钱姜一片水煎

丹溪治一男子忽患背胛縫有一線痛起上肩跨至胷前側脇而止其痛晝夜不歇不可忍脉絃而數重取豁大左大于右夫背胛小腸經也此必思慮傷心〻臓未病而腑小腸先病故從背胛起及慮不能决又歸之於膽故痛至胷脇而

葱白行之内後應痛者屬少陰以細辛獨活行之并用灸法視其何經而取之也

通氣防風湯　肩背痛不可回顧者此太陽氣鬱而不行以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔者此足太陽經不通也　羌活　獨活各一钱
藁本　防風　甘草各五分　川芎　蔓荊子各三分
水煎服

當歸拈痛湯　湿熱為病肢節煩痛肩背沉重胷膈不利及遍身疼痛下注于足脛痛腫不可忍

方在脚氣門

加减當歸飲子　治肩背忽痛　當歸　防風
柴胡　生地　大黄各一两半　芍藥　黄芩　人参各一两
黄連五钱　滑石六两　甘草一两三钱
每服六七钱水煎

人参益肺散　治肩背痛汗出小便数而少者風熱乘肺肺氣鬱甚也當瀉風熱則愈　升麻
柴胡　黄芪各一钱　防風　羌活　人参　甘草
陳皮各五分　藁本三分　青皮　黄芩　白荳蔻各三分

止乃小腸火乘膽木子来乘母是為實邪詢之果因謀事不遂所致故用人参四分木通二分煎湯吞龍膽丸数服而愈

著痺治例　麻木同

經謂湿氣勝者為着痺河間曰着者畱着其處而不去或四肢麻木拘攣也經又曰其不痛不仁者病久入深營衛之行澁經絡時踈故不痛皮膚不榮故為不仁夫所謂不仁者或周身或四肢溢〻然麻木不知痛痒如繩扎縛初解之狀

古方名為麻痺者是也靈樞曰衛氣不行則為麻木丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中分而為二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而感風寒濕三氣乗之故周身掣痛麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也當以類而推治

丹溪云十指麻木乃胃中有濕痰死血宜二陳湯加蒼朮白朮桃仁紅花附子

脈法 脈沉而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體也 脈浮而緩者屬濕為麻痺脈緊而緩屬寒為痛痺脈濇而芤屬死血為木不知痛痒

東垣神效黄芪湯 治渾身麻木不仁或左或右半身麻木或面或頭或手臂或腳腿麻木不仁並皆治之 又治兩目緊急縮小羞明畏日隱澁難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少睛光或目熱如火服五六帖神效 黄芪 蔓荊子(各二兩) 人參 甘草(炙) 白芍藥(各一兩) 陳皮(五錢) 每服五六錢 如小便淋澁加澤瀉(五分) 如有大熱症加黄栢(酒炒三四次各三錢) 如麻木不仁雖有熱不加黄栢再加黄芪(一兩) 如服縮小去芍藥 忌酒醋濕麪葱韭蒜大料等物及淡滲生冷硬物 麻木重甚者加芍藥(一兩) 木通(一兩)

芍藥補氣湯 治皮膚間有麻木此肺氣不行也 黄芪 橘紅 甘草(炙各一兩) 白芍藥(一兩半) 澤瀉(五錢) 每服一兩水煎 如肌肉麻必待瀉營氣而愈 如濕熱相合四肢沉痛當瀉濕熱(此家古立効神方)

東垣治杜彥達患左手右腿麻木大指次指亦嘗麻木至腕已三四年矣諸醫不効脈之曰麻者氣之虛也真氣弱不能流通填塞經絡四肢俱虛故生麻木不仁與一藥決三日効遂製人參益氣湯服二日便覺手心熱手指中間如氣滿脹至三日後又覺兩手指中間皮肉如不敢觸者似痒痛滿脹之意知其氣已通至乃於兩手指甲傍各以三稜針一刺之微見血如黍粘許

則痺自息矣又爲處第二第三方服之全安

人參益氣湯　治五六月間兩手麻木四肢倦怠情嗜卧乃濕熱傷元氣也　黃芪(八錢)　人參　甘草(生各五錢)　芍藥　升麻(各三錢)　柴胡(二錢半)　五味子(一百二十粒)　甘草(炙二錢)　每六七錢水煎空心服服後令少睡於麻痺處按摩屈伸少時午飯前一服日二

第二次藥煎服如前　黃芪(八錢)　紅花(五分)　陳皮　錢　澤瀉(一錢)

第三次服藥　黃芪(六錢)　黃柏(一錢三分)　橘紅(三錢)　白芍藥(五錢)　升麻　澤瀉(各二錢)　黃芩(八錢)　五味子(百粒)　甘草(炙一分生一分)　分四帖煎服如前(秋天去五味子冬月去黃芩)

除濕補氣湯　治左腿麻木沉重　黃芪(八錢)　甘草梢(六錢)　升麻梢　柴胡　當歸　澤瀉(各二錢)　五味子(百二十粒)　紅花(二錢半)　青皮(四錢)　陳皮(一錢)　分四服水煎熱服

治趙節使年七旬病體熱麻股膝無力飲食有汗妄喜笑善飢痰涎不利舌強難言声啞不鳴身重如山診得左脉洪大有力是邪客於經絡兩臂外有數瘢遂問其故對以燃香所致予曰君之病皆此也夫人之十二經灌溉周身終而復始盖手之三陽從手至表上行至頭加之以火邪并於陽勢甚熾焉故邪熱毒行散于周身而熱麻經云胃中有熱則虫動虫動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下熱傷元氣而沉重無力飲食入胃慓悍之氣不循常度故多汗心火盛則妄喜笑脾胃熱則消穀善飢肺金衰則聲啞不鳴仲景云微數之脉慎不可灸焦枯傷筋血難復也君奉養以膏粱之味無故加以火毒熱傷于經絡而爲此病明矣乃製清陽補氣湯服之不旬日而愈

清陽補氣湯　蒼朮(四錢)　藁本　知母(酒浸一)　當歸　升麻(六錢)　甘草(生各二錢)　柴胡　黃柏(酒浸)　黃芪(各三錢)　陳皮(二錢半)　五味子(一錢半)　每七錢(水煎空心服)

治李正夫人病診得六脉中俱弦洪緩相合按之

無力弦在其上是風熱下陷入陰中陽道不行其症閉目則渾身麻木晝減夜甚覺而目開則麻木漸退久則絶止常開其目此病不作懼其麻木不敢合眼故不得眠身體皆重時有痰嗽覺胷中常是有痰而不利時煩躁短促而喘肌膚充盛飲食大小便如常惟畏麻木不敢合眼為最苦觀其色脉形病相應而不逆内經曰陽盛瞋目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脉皆屬于目靈樞曰開目則陽道行陽氣遍布周身合目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木為風雖三尺之童皆以為然細按之則非如久坐而起亦有麻木假如繩縛緊之人釋之覺麻木作而不敢動久則自已以此驗之非有風邪乃氣不行也不須治風當補其肺中之氣則麻木自去矣知其經絡陰火乘其陽分火動于中為麻木也當熱去陰火則愈矣時痰嗽者秋凉在外溼在上作也當實其皮毛以溫劑身重脉緩者溼氣伏匿而作也時見躁作當升陽助氣益血微瀉陰火去溼通行經脉調其陰陽則非五臟六腑之本有邪也補氣升陽和中湯主之

補氣升陽和中湯　黄芪五錢　人參　白芍各三錢　甘草炙　佛耳草各四錢　陳皮　白朮　歸身各二錢　甘草生去腎熱　黄柏酒浸除溼瀉火　白茯苓除溼導火　澤瀉上同　升麻行陽明經　柴胡　草荳蔻益陽退寒各一錢

每服三五錢水煎稍熱服入帖愈

溫經除溼湯　李夫人冬寒霜時病作四肢無力乃痿厥溼熱在下焦也醋心者是濁氣不降欲滿也合眼麻木者陽道不行也開眼不麻木者目開助陽道故陰寒之氣少退也頭旋眩運者風氣下陷于血分不伸越而作也　羌活七分　獨活　當歸　麻黄去節　黄柏各三分　白芍三錢　柴胡　黄連　黄芪　草荳蔻　神麹　木香各二分　陳皮　蒼朮各二錢　人參　甘草炙　白朮　猪苓　澤瀉各一錢　升麻五分　分二服水煎熱服　治肢節沉重疼痛無力之聖藥也

湿氣風症不退眩運麻木不已除風湿羗活湯主之 羗活 防風各一兩 柴胡 獨活 甘草炙各五分 藁本 陳皮 黄栢 川芎各三分 蒼术 黄芪各一錢 猪苓 澤瀉各二分 茯苓二錢 黄連一分 升麻 每服五六錢水煎熱服 量虚實用如不盡症候依加减法用之

濟世茯苓湯 治停飲支飲手足麻痺多睡眩冒 赤茯苓 半夏 陳皮各一兩 枳實炒 桔梗 甘草炙各半兩 每服五六錢姜三片水煎

宣明茯苓川芎湯 治着痺湿地水氣甚重着而不去多汗而濡者著痺留注不去四肢麻木拘挛浮腫 赤茯苓 防風 川芎 麻黄 芍藥 桑白皮 甘草炙 官桂 當歸各五分 棗三枚水煎服如欲出汗以粥投之

五痺湯 風寒湿之氣客留肌體手足緩弱麻頑不仁 片子姜黄一兩 羗活 白术 防巳各二兩 甘草炙五錢 每五六錢姜三片水煎服

續斷丸本事方 治風湿流注四肢浮腫肌肉麻痺 川續斷 當歸 萆薢 天麻 防風 大附子各一兩 川芎七錢半 乳香 没藥各五分 煉蜜為丸梧子大每四十丸温酒米飲任下

又增减續斷丸 治寒湿之氣痺滞関節麻木疼痛 人參 防風 鹿角膠 白术炒各七兩 黄芪 續斷 苡仁 山芋 牡丹皮 麥門冬 地黄 桂心 山茱萸 白茯苓 石斛各二兩 蜜丸桐子大每服六七十丸空心酒下

三痺湯 治血氣涩滞手足拘挛風痺等疾 川續斷 杜仲姜汁炒 防風 桂心 人參 當歸 白茯苓 白芍藥 甘草 黄芪 牛膝 細辛各一兩 川獨活 川芎 秦艽 生地各五錢 每服六七錢姜三片棗一枚水煎

濟生黄芪酒 治風湿痺痛筋脉挛急身體頑麻 黄芪 當歸 白术 虎骨 萆薢 雲母粉 木香 防風 官桂 天麻 石斛 茵芋葉 仙靈脾 川續斷 白芍藥 甘草炙各一兩 用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七

冬十日每服一盞溫飲之常令酒氣相續為佳
宣明防風天麻散 治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴瘖難語內外風熱壅塞 天麻 甘草 羌活 防風 白芷 川芎 歸尾 草烏頭 白附子 荊芥穗各五錢 滑石二兩
右末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻為度煉蜜丸彈子大熱酒化下半丸或一丸細嚼白湯下
衍義方 治風冷氣血閉手足體疼痛冷麻

五靈脂二兩 沒藥一兩 川烏頭一兩半炮去皮 乳香五錢
右末水丸彈子大每一丸生姜酒磨服
河間前胡散 治榮虛衛實肌肉不仁致令痺重名曰肉苛 前胡 白芷 細辛 官桂 白朮 川芎各二兩 附子炮 吳茱萸 當歸 川椒去子并開口者生用各二兩 以茶酒三升拌勻同窨一宿以煉成猪脂膏五斤入藥煎候白芷黃紫色濾其渣成膏病在處摩之丸癥瘕瘡痍皆治併去諸風瘡痒痛傷折墜損丸摩內皆可用之

吳茱萸散 吳茱萸 肉豆蔻麵裹煨 乾姜 甘草炙 神麯炒 砂仁各一兩 白朮 厚朴姜製 陳皮各二錢 為末每服二錢空心米飲調下
腎瀝湯 麥門冬 五加皮 犀角各一錢半 杜仲 桔梗 赤芍藥 木通各一錢 桑螵蛸一箇
水二鍾入羊腎少許煎至八分食前服
加味五痺湯 治五臟痺症 人參 茯苓 當歸 白芍 川芎各一錢肝心腎痺倍之 五味子十五粒 細辛七分 白朮一錢脾痺倍之 甘草五分 姜一片水煎

食遠服 肝痺加酸棗仁柴胡 心痺加遠志茯神麥冬犀角 脾痺加厚朴枳實砂仁神麯 肺痺加半夏紫菀杏仁麻黃 腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黃芪萆薢
活絡丹 治手足攣拳筋脈不舒皆風邪濕毒留滯經絡渾身走注疼痛 南星 川芎 草烏 地龍各六兩 乳香 沒藥各二兩 為末酒糊丸桐子大每服五七十丸空心酒下
清涼潤燥湯 治風熱血燥麻木 當歸 生地

各一錢半　黃連　黃芩　芍藥　川芎各一錢　天麻

防風　羌活　荊芥各八分　細辛六分　甘草五分

水煎服　麻甚者加川烏炮過三分　以行經絡

止麻清痰飲　治口舌麻木延及口角頭面者

黃連一錢二分　貝母　瓜蔞仁　黃芩　茯苓

桔梗　枳殼　橘紅　南星用白丸皂角生薑同煮透各一錢

天麻　甘草　細辛各五分　血虛加當歸一錢　水

煎入姜汁一匙竹瀝三四匙食遠服

經驗三妙丸　治濕熱下流兩脚麻木如火熱

蒼朮六兩　黃柏四兩酒炒　川牛膝酒浸二兩　麵糊丸

桐子大每服五七十丸空心淡鹽湯下

仲景治血痺桂枝五物湯　血痺陰陽俱微外証

身體不仁如風痺狀　黃芪　桂枝　芍藥各三

兩　生姜六兩　大棗十二枚　水六升煮取二升溫

服七合日三服

木香丸　腸痺腹疠痛時發飡泄氣不消化小便

秘澁　木香　白朮　官桂　蕪荑　良姜

訶子皮各一兩　附子炮　厚朴　肉蔻各二兩　乾姜

三分　甘草五錢半　為末麪麵糊丸桐子大每服

二十丸空心姜湯吞下

鶴膝風

羅太無蚌蝍丸　蚌蝍用頭尖全者一條　桃仁生　白附子

阿魏　桂心　安息桃仁同研　白芷各一兩　乳香

沒藥已上童便酒浸炒熟各三分　北漏蘆　當歸　白芍

牛膝　羌活　地骨皮　威靈仙各一兩　蠶為

丸彈子大空心酒化下一丸昔有人病風痓

手足指節皆如桃李痛不可忍服之悉愈

宣明方安息用胡桃穰全研

丹溪治一人年七十患膝腫痛此血虛而挾濕熱

也　生地　當歸頭　白芍　蒼朮　黃柏炒各

三錢　川芎　桂二錢　木通一錢半　分四帖水煎熱服

又一人年近三十厚味多怒秋間髀樞左右一點

發痛延及膝晝靜夜劇痛劇惡寒口或渴或不

渴或痞或不痞醫多用風藥兼用補血至次年

春其膝漸腫痛愈甚食愈減形瘦至春末膝腫

大不可屈伸其脉左弦大頗實寸澀甚大率皆

数知其小便必数而短乃作飲食疾積在太陽陽明治之炒柏一两生甘草梢犀角屑蒼术塩炒各三錢川芎二錢陳皮牛膝木通芍藥各五錢遇暄熱加條芩三錢為細末每三錢與生姜汁同研多少以水盪起煎令沸帶熱食前飲之一日夜四次至半月後数脉漸減痛漸輕去犀角加牛膝龜板半两當歸半两如前服又半月腫漸减食漸進不悪寒惟脚膝痠軟未能久立久行去蒼术黄芩時當夏熱加炒黄柏至一两半依本方内加牛膝春夏用莖葉冬用根杵取汁用之效尤速須斷酒肉湿麵胡椒當仲夏加生地半两冬加茱萸桂枝

接骨丹 治諸風及鶴膝風 防風 牛膝 當歸 虎骨酥炙各一两 枸杞子二两半 羌活 獨活 龜板 秦艽 萆薢 松節 二蚕沙各一两 茄根二两 蒼术四两 酒糊丸空心服

脚筋急痛 淡酒煮木瓜令爛作粥樣用裹痛處冷則易一宿三五度便瘥

攣

經云肝氣熱則筋膜乾筋膜乾則筋急而攣又曰湿熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短為拘弛為痿

丹溪曰大筋緛短者熱傷血也不能養筋故為拘攣小筋弛長者湿傷筋不能束骨故為痿弱寔皆屬於肝〻主筋故也

丹溪治王秀湿熱大作脚痛後手筋拘攣足乏力 生地 當歸 川芎 白术各二錢 蒼术一錢半 木通 甘草炙三分 煎湯下大補丸三十丸 其大補丸炒燥用

薏苡仁散 治筋脉拘攣久風湿痺 薏苡仁一斗搗散以水二升取末数匙作粥空腹食之衍義云筋急拘攣有兩等内経大筋受熱則縮而短故攣急不伸則可用薏苡仁若因寒筋急則不可用也

有寒攣 經曰寒多則筋攣骨痛

本事云張徳操内子昔患筋攣脚不得伸踰年動則令抱持求醫于泗水楊吉老曰此筋病下

三方一年而愈

治筋極養血地黃丸（春夏服之） 熟地 菟絲各一分 山茱萸五錢 狗脊 地膚子 白朮 乾漆 蠐螬炒 天雄 車前子各三分 萆薢 山芋即山藥 澤瀉 牛膝各一兩 為末煉蜜丸桐子大每服七十丸酒下

治筋痺肢節束痛羚羊湯（秋服之） 羚羊角 肉桂 附子 獨活各一兩三錢半 白芍藥 防風 芎藭各一兩 每服五七錢水煎姜三片一日三服

治寒冷濕痺留于筋脉縮不能轉側烏頭湯（冬用之） 大烏頭 細辛 川椒 甘草 秦艽 附子 官桂 白芍各七分 乾姜 防風 當歸 白茯苓各一兩 獨活一兩三錢半 每服三錢棗二枚水煎空心服

千金薏苡湯 治筋攣不可屈伸 薏苡仁 白斂 芍藥 桂心 乾姜 酸棗仁 甘草 牛膝各一兩 附子三枚 醇酒二斗漬一宿微火煎三沸每一升日三服扶杖起行不耐酒服五合

活血通經湯 董監軍臈雪初霽因事到真定忽覺風氣暴作六脉俱弦甚按之洪實有力其症手攣急大便閉澁面赤熱此風寒始加于身也四肢者脾也風寒傷之則攣痺乃風淫末疾而寒在外也内經云寒則筋攣正此謂也平素多酒實熱乘於腸胃之間内則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而緩其急搐用黃栢之苦寒以瀉實熱而潤燥急救腎水用升麻乾葛以升陽氣行手足陽明之經不令遏絶更以桂枝辛熱入手陽明之經為引用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加人參以補元氣為之輔佐加當歸身去裹急而和血潤燥名之曰活血通經湯

升麻 葛根 當歸 人參 甘草炙各一錢 桂枝 黃栢酒炒各二錢 白芍藥五分 水煎熱服令煖房中近火摩搓其手乃愈

虛攣 經所謂虛邪搏於筋則為筋攣又云脉弗榮則筋急 仲景云血虛則筋急此皆血脉弗

榮于筋而筋成挛故丹溪治挛用四物加減本
事方治筋急極用養血地黄丸盖本乎此也
丹溪治一村夫背傴僂而足攣已成廢人脉之兩
手皆沉弦而濇遂以戴人煨腎散與之上吐下
瀉過月餘又吐瀉交作如此凡三帖然後平復
煨腎散　甘遂末三錢猪猪腰子細批破塩椒淹
透摻藥末在内荷葉包裹火内燒熟温酒嚼下
蒼耳湯　治風湿痺四肢拘挛　蒼耳子三兩擣末
水一升半煎七合服　木瓜粥裹筋痛處佳

方見鶴膝

一身盡痛

綱目云一身盡痛其病㬥似傷寒屬湿痺並見傷
寒太陽症門其留連難已者於此求之寒而一
身痛者甘草附子湯熱而痛者當歸拈痛湯
甘草附子湯　治風湿相搏骨節煩疼掣痛不能
屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利悪風不
欲去衣或身微腫者　甘草　白朮各二兩　桂枝
二兩　附子炮一枚　分四帖水煎服　活人書云
身腫者加防風一兩悸氣小便不利者加白
茯苓一兩半
東垣當歸拈痛湯　治湿熱相搏肩背沉重疼痛
上熱胷膈不利及遍身疼痛　方見脚氣門
東垣麻黄桂枝升麻湯　李夫人患渾身麻木睡
覺則少減開目又則全已閉目則麻復至此症
用藥已全去又因家事不和心中煩惱遍身骨
節疼身體沉重飲食減少腹中氣不轉運
麻黄　人參　升麻　黄芪各五分　桂枝　甘草

炙　白朮　茯苓　澤瀉各三分　陳皮　半夏　草
荳蔲　厚朴　黄栢　附子各二分　木香　生姜
各一分　水煎熱服
本事方　治遍身皆痛如勞者若傷寒身躰痛者
不可服但少年虚損冷憊老人諸疾皆治之
人參　黄芪　附子炮　甘草　木香　羌活
知母　芍藥　川芎　前胡　枳殻　桔梗
白朮　當歸　茯苓　半夏各五錢　柴胡　鼈甲
醋炙各一兩　酸棗仁　桂心各三分　杏仁炒五分　每服

二錢姜三片烏梅三箇葱白三寸同煎空心服

產後身痛

趂曰趂痛散　產後氣弱血滯遍身疼痛身熱頭疼　當歸　牛膝　桂心　白朮　黄芪　獨活　生姜各五錢　甘草　薤白各三錢五分

每服五六錢水煎

五積散加酒煎　治感寒頭疼身痛　方見傷寒與四物湯各半服之治一身痛甚𤸎加桃仁治腰痛逐敗血去風濕

大全牛膝散　產後遍身青腫疼痛及衆疾

牛膝　大麥芽為細末以新瓦罐子中填一層麥芽一層牛膝如此填滿用鹽泥固濟火煅赤放冷研末但是產後諸疾熱酒調下二錢

金棗丹　治一切風疾等症　川烏生用去皮臍兩頭尖　防風　白芷　獨活　蔓荆子　荆芥各四兩　白朮　羗活　細辛各五錢　全蝎　姜蚕　天麻　葳靈仙各二兩　雄黄　木香　乳香各兩　蒼朮八兩　川芎五兩　何首烏一兩八錢　沒藥　草烏各一兩半　槀本三兩半　當歸三兩　右末糯米糊丸棗樣大金箔為衣每服一錠傷風流涕好酒化下　中風不語生姜湯下　左癱右瘓好酒調下　白虎歷節風遍身走痛生姜湯或好酒下　破傷風昏倒在地牙關緊急好酒調服仍磨敷患處　雷頭風并乾癬麻痺濕酒調服洗頭風酒服　偏正頭風及夾腦風研末吹鼻中吐涎再用生姜汁調藥塗兩太陽穴仍用茶清調服　風狗咬傷礬水洗淨敷之　蜈蚣傷礬水洗過敷之　蛇傷入白礬少許敷患處就以津唾調搽亦可　蝎咬唾調搽　痔漏口漱漿水洗過敷之　多年惡瘡口不合者口漱鹽水洗過敷之徐收　喘嗽桑白皮湯調服　紅絲魚眼瘡脚腿疽發背疔瘡裡外臁瘡用自己小便洗過井水調敷薄紙貼上再用棗外搽之　丹瘤井花水調藥鵝毛掃二三次　不發灸瘡礬水洗過貼上二三次起發方止

十二卷終

赤水玄珠第十三卷

內傷門
傷飲　傷食　不能食
積聚門
附五臟積方　石瘕　腸覃

赤水玄珠第十三卷

內傷門

茲以傷飲傷食為一門而勞心竭力不足之症則節抄東垣脾胃論附之

新安生生子孫一奎著輯

傷飲傷食

生生子曰傷飲傷食之症多是有餘當另標一門不當與內傷門混治何者夫內傷二字乃病機總辭凡諸勞心勞神耗竭精氣及損傷營衛臟腑筋骨血脉莫不皆內傷病也故古人有五勞七傷之謂斯為不足之疾証多類似東垣內外傷辨惑已詳之矣夫有餘當消不足當補天壤懸絶症涉疑似而又溷為一門恐初學於有餘中之不足不足中之有餘及純有餘純不足之証茫無分别則用藥未免有虚虚實實之悞予故所以另標為一門庶幾易於尋治也且也此証所患甚多緊關妙處只三節隨輕重緩急治之百發百中初食傷之時填塞胸膈脹滿疼痛急宜用吐法吐而出之緣食未入於胃停積膈間吐之甚易經謂在上者因而越之是也食已

下腸入胃則不可用吐法強吐之亦不能盡出又不宜遽用下藥下之早則傷中氣胃既為飲食所傷又復能受藥之傷乎而清純冲和之氣幷為之下陷故曰雜病酒積下之早亦作痞氣惟當健脾消導俟其盡入大腸而痛在臍腹乃可用下法下之經謂在下者引而竭之是也是皆順其勢而利導之殊易為力故治亦無所悮也

東垣曰陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六腑痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為二飲也食也飲也者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺肺病則為喘咳為腫為水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解酲湯五苓散生姜半夏枳實白朮之類是也如重而蓄積為物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脉橫解腸澼為痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿

或下痢腸澼當分寒熱輕重治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾姜三稜廣茂巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麦蘗黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而越之瓜蒂散之屬然而不可過劑過則反傷腸胃盖先因飲食自傷又加之以藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五常正大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病十去其九不可過之此聖人之深戒　傷飲多以五苓散為主

五苓散　治飲煩渴飲水過多或水入即吐心中澹澹停濕在內小便不利　方見暑門　治傷冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸　治傷飲不惡寒胸中微覺疼悶身重飲食不化者或小便不利者五苓散去桂依前斟酌服之　如瘀熱在裏身發黃疸食前濃煎茵陳湯調服愈

除濕散　傷馬牛乳酪及氷水一切冷物

半夏湯炮 乾姜各三錢 車前子炒 澤瀉各五錢 甘草
炙 紅花各二錢 茯苓七錢
右為細末每服二錢食前白湯調下
導飲丸 治水飲 吳茱萸三錢 白茯苓 蒼术
各一兩 黃連五錢 獨活七錢 右為細末神麴糊丸服
丹溪茱萸丸 治飲 白滑石六兩 甘草
吳茱萸各一兩 水丸服

傷酒

東垣曰酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也

若傷之只當發散汗出則愈矣其次莫如利小便乃上下分消其濕今之病酒者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之亦損腎水真陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是以元氣消爍折人長命不然則虛損之病成矣酒疸下之早久則為黑疸慎不可犯宜以葛花解醒湯主之

王海藏曰治酒病宜發汗若只利小便炎焔不肯下行故曰火鬱則發之以辛溫散之是從其體性也是知利小便則濕去熱不去若動大便尤為疎陋盖大便者有形質之物酒者無形之水從汗而發之是為近理濕熱俱去故治以苦溫發其火也佐以苦寒除其濕也

統旨曰傷酒惡心嘔逆吐出宿酒昏冐眩暈頭痛如破宜二陳湯加黃連乾葛煎服或冲和湯縮脾湯五苓散用乾葛煎湯調服久困於酒遂成

酒積腹痛泄瀉或暴飲有灰酒亦能致之並宜酒煮黃連丸○多飲結成酒癖腹中有塊隨氣上下冲和湯加黃連蓬朮酒停胸膈為痰飲者枳實半夏湯加麴蘖用吐法尤妙

劉宗厚曰酒者是有形之物即水飲同體也今言無形元氣受病不得傷于有形陰血者盖謂酒者濕熱之物入胃則臟氣俱熱逐氣升降之際而半有消耗之矣至傷於腸胃則升之不散降之不下鬱於氣分無形之地位故言無形之物

非若水飲性躰全降於腸胃中也若今人之飲醇酒則便少此其可驗是以傷則宜汗之瀉之不得用重峻下劑蓋此等藥不能入氣分反傷有形陰血耳但斯意隱然使人不能無疑故或有辨之者茲不復具然昔人有用下劑者蓋或有酒飲傷積日久而汗之泄之不能愈則重峻下劑而或可哉故用者自宜對症詳審勿以辭害意可也

東垣葛花解酲湯　飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

青皮三分　木香　橘紅各五分　人參　茯苓　猪苓各一錢　神麯炒　澤瀉　乾姜　白术各二錢　白荳蔻　葛花　砂仁各五錢　右為細末每服三錢白湯調下　但得微汗則酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃此酗飲成病自損元氣惟病酒者宜之

丹溪烏梅丸　治酒毒化痰消食　烏梅一斤　半夏　白礬各八兩　生姜二兩　右為細末以新瓦

二片夾定火焙三日夜為度次入神麯麦芽陳皮青皮莪术枳殼丁皮大腹子各四兩糊丸每服四五十丸姜湯下

潔古百杯丸　酒停胸中膈氣痞滿面色黃黑將成癖疾飲食不進日漸羸瘦如欲飲者先服不醉

生姜一斤去皮切片以塩二兩淹一宿焙乾　橘紅　乾姜各三兩　木香　茴香炮各一錢　廣茂炮三錢　益智仁二十粒　丁香五十粒　砂仁　白豆蔻各三十粒　甘草炙　三稜炮各二錢　右煉蜜丸每一兩作五丸硃砂為衣姜湯嚼下

酒煮黃連丸　方見下血門

濟世方酒積烏梅丸　烏梅一兩　青木香四錢　砂仁五錢　巴豆霜一錢　半夏麯七錢　枳實五錢　杏仁三錢　黃連一兩酒浸一宿　右飩餅糊為丸菉荳大每服八丸白湯下

傷食

生生子曰傷食痛急者用前上中下三法不痛而發熱頭疼痞悶者究其所傷何物寒熱孰多而

為之治今收各家方法詳列於後東垣脾胃論中已具者茲不復入但于彼參治可也

丹溪曰傷食惡食者胸中有物宜導痰補脾用二陳湯加白术山查川芎蒼术服之

憂抑傷脾不思飲食炒黃連酒炒芍藥同清六丸末加香附以姜汁浸蒸餅糊為丸服

統旨曰傷食胸膈痞塞吐逆嘸酸噫敗卵臭畏食頭疼發熱惡寒病似傷寒但身不痛氣口脉緊盛治中湯加砂仁或十香丸

潔古枳术丸　治痞積消食强胃

王海藏云本仲景枳术湯也今易老改為丸治老幼虛弱飲食不化或臟腑軟弱者

枳實去穰麩炒一兩　白术二兩　右為末荷葉包燒飯為丸桐子大每服五十丸白术湯下服白术者本意不取其食速但久服令人胃氣强食不復傷也

麯糵枳术丸　為人强食所致心胸滿悶不快

神麯炒　麦糵炒　枳實各炒一兩　白术二兩

右為末荷葉燒飯為丸每服五十丸

木香枳术丸　破滯氣消飲食開胃

木香　枳實各一兩　白术二兩　照上法為丸服

又方　開胃進食　木香三錢　人参　乾姜各一錢半　枳實一兩　白术二兩　為末照上法為丸白湯吞五十丸

檳榔丸　消食破滯氣　檳榔三錢　木香　人参各二錢　陳皮五錢　甘草一錢　右蒸餅糊為丸每服五十丸

羅太無檳榔木香丸　疎三焦寬胸膈破痰飲快意潤腸　方在氣門

丹溪保和丸　治食積酒積　山查肉一兩　半夏姜製　蘿蔔子炒　黃連姜汁炒　橘紅　神麯各五錢　麦芽炒三錢　右神麯糊為丸每服七八十丸姜湯下

大安丸　脾經消導之劑　山查二兩　神麯炒　半夏製　茯苓各一兩　陳皮　連翹　蘿蔔子各炒五錢　白术二兩　右神麯糊為丸每服五十丸

白术丸　治傷豆粉濕麪油膩之物

白术 半夏製 神麹 枳實各一兩炒 橘紅七錢 黄芩五錢 枯礬三錢 右浸蒸餅糊為丸量所傷多寡加減服之如素食多用乾姜故以黄芩瀉之

半夏枳术丸 治因冷食內傷

半夏姜製二兩 枳实炒 白术各一兩

右末荷葉飯為丸 一方有澤瀉一兩為小便淋也

木香乾姜枳术丸 破滯氣消寒飲食

木香三錢 乾姜炮五錢 枳實炒一兩 白术二兩

右荷葉飯為丸每服五十丸

丁香爛飯丸 治食傷太陰又治卒心痛胃疼

丁香 甘草炙 三稜炮 廣茂炮 木香各一錢 丁皮

甘松净 砂仁 益智仁各三錢 香附五錢

右浸蒸餅糊為丸每服七十丸

香砂和中湯 治飲食所傷脾胃嘔吐胸滿噯噫或胸腹脹疼

藿香 砂仁各一錢半 蒼术二錢 厚朴 陳皮 半夏 茯苓 青皮 枳實麸炒各一錢 甘草三分 大便瀉去枳实青皮加麥蘖山查

水二鍾姜三片煎八分食遠服

加味枳术丸

白术四兩米泔浸 枳实二兩去白麸炒 陳皮 半夏泡 神麹炒 麦芽炒 山查肉各一兩半 如胃寒或冬月加砂仁一兩 氣滯不行加木香五錢 常有痰火又兼胸膈痞悶加黄連姜汁炒 茯苓各一兩

右末荷葉飯為丸每服五六十丸

化食養脾湯

人參 白茯苓 陳皮 半夏 神麹炒 麦芽炒 山查各一錢 砂仁八分 甘草三分 白术一錢半 胸膈痞脹甚者加厚朴枳實各一錢 胃脘痛加草蔻仁一錢 氣滯痰盛者去人參加香附一錢半 夏倍之 水三鍾姜三片煎八分食遠服

秘方思食調中丸 脾胃久弱飲食不消氣滯胸膈痞悶嘔逆痰水

白术二兩米泔浸 人參七錢 木香五錢 砂仁 香附 陳皮 半夏麹炒 神麹炒 麦芽各一兩炒 甘草四錢炙 右末陳米糊為丸梧子大每服百丸白湯下

治中湯 即理中湯加青皮陳皮

十香丸 傷飲食胸膈腹疼或氣滯積聚皆可服

甘松炒 益智仁炒 香附子各四兩 京三稜二兩

莪朮二兩　青皮　陳皮各三兩　砂仁一兩半　木香
甘草一兩炒　水浸蒸餅糊為丸梧子大每服五
十丸姜湯下
枳實半夏湯　枳實麸炒　半夏泡各五錢　姜五片水
二鍾煎服
治心腹膨脝　多食積所致　南星姜製　半夏姜製
瓜蔞仁各一兩半　香附一兩童便浸　黄連三兩姜汁炒　青蒙石
煅　蘿蔔子炒　連翹　陳皮各五錢　射香少許
右末神麯糊為丸

治因麪内傷發熱頭痛作吐　白朮一錢半　白芍
陳皮　蒼朮各一錢　茯苓　黄連　人參　甘草
各五分　姜三片　口渴加葛根二錢
楊氏家藏荳蔻橘紅散　温脾養胃升降陰陽和
三焦化宿食　丁香　木香各一兩　人參　白荳
仁　厚朴姜製　橘紅　神麯炒　乾姜炒
半夏麯　甘草炒　霍香　白朮各五錢
每服五七錢姜三片棗一枚水煎服
紅丸子　温脾胃消寒冷食積併治冷瘧

京三稜　莪朮　陳皮去白　青皮去白各五斤　乾姜
胡椒各二斤炮　右末醋煮糊為丸梧子大以礬
紅為衣每服二十丸食後姜湯下
消食化氣香殼丸　醒脾去積順氣化痰
青皮炒　陳皮炒各四兩　蘿蔔子炒　木香　三稜炒
蓬朮　神麯　麥芽各一兩炒　枳殼二兩炒　半夏二兩半
枳實一兩炒　香附子一兩半醋炒　檳榔　山查　草菓
各一兩　陳倉米一升同巴豆二十粒炒黄色去巴豆不用
右末醋糊丸梧子大每服四五十丸漸加至

七十丸食後白湯下
青橘皮散　食過飽痞悶消食化氣醒酒
青橘皮去白炒　葛根一兩　砂仁五錢　為細末濃茶
調服
寛中丸　治胸膈痞悶停滯飲食　山查肉
蒸熟為末丸服
除湿益氣湯　傷湿麪心腹滿悶肢躰沉重
枳實麸炒　白朮　黄芩各一兩　蘿蔔子炒半兩　神麯
紅花三錢　荷葉一兩　飯為丸菉豆大每服六十丸

白湯下

二黃丸　傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩（二兩）　黃連（酒炒一兩）　升麻　柴胡（各三錢）　甘草（二錢）

枳實（炒五錢）　餌餅糊為丸每服七十丸姜湯下

白术和胃丸　病久不能食而臟腑或結或溏此由胃虛弱也常服則和中理氣消痰去温熱飲食　厚朴（炒）　半夏（各一兩）　白术（一兩二錢）　陳皮（八錢）　檳榔

枳實（各二錢半）　木香（一錢）　人參（七錢）　甘草（炙三錢）

右末姜汁浸蒸餅糊為丸梧子大每服五十丸白湯送下

〈今十三卷〉　十四

吳梅坡冲和健脾丸　益心開胃健脾寬胸順氣進食和中資扶三焦培植五內凡躰欠强盛者多服大有益也慎勿以人參見疑膈氣膈食飜胃噎食中滿者亦効

白术（炒四兩同參飯一蒸）　白豆蔻（一兩拌白术末勻飯上蒸）　人參（三兩）　陳皮（三兩）　白茯苓（二兩）　山查肉（二兩）　石斛（鹽水洗同茯苓小盒飯上蒸熟）　甘草（綿紙上炒焦黃色七錢）　右各自為末麦芽粉打糊為丸每服五十丸白湯下

家傳三因冲和丸　養心扶脾踈肝開胃暢達三焦通貫五臟賛坎離有升降之能和表裏無壅塞之患利用一元斡旋五內家傳四世之秘也

歌曰　醫家綱領在三因　多少鑚研那得真

發出肺肝玄妙處　信乎一決勝千金

人參　石斛　白荳仁　廣陳皮（各為末各一兩）　山查肉（末二兩）

已上五味合研勻碗盛碟盖飯上蒸熟取起待冷方開此乃調胃補心接丹田之氣也

遠志（甘草湯泡去心取末一兩）　山梔（炒焦色取末二兩）　香附（童便浸半日炒常鯖炒末二兩）　此三味共研勻如上法蒸熟勿令洩氣乃透暢心胞達膈間之滯氣也

〈公三卷〉　十五

海石（末一兩）　蒼术（米泔浸洗去黃皮炒取末二兩）　此二味如上法同蒸乃消痰飲而通內外之用也

川芎（末二兩）　北柴胡（末一兩）　青代（一兩）　此三味和勻蒸如上法乃踈肝鬱調達者也

夫心為脾母補心則土有力肝為脾賊平賊則土乃和故曰安穀則昌用穀蘖取粉打糊為丸梧子大（晒）乾用益元散五錢水飛過神砂五錢

為衣食後少頃白湯下量人大小輕重丸数服之常用五十丸胃開氣順少覺舒泰則減数服之可與補中益氣湯六君子湯相兼服此丸不犯炎涼久服無妨平康為度不拘内外諸病服其該科之藥而兼此丸每日一服則胃和脾壯行諸藥以健成功此秘妙之囑慎毋忽焉

参苓造化糕　人参二兩虚者用四兩　白茯苓四兩　乾山藥　芡実　蓮肉去皮心炒　苡仁炒　白扁豆炒各半斤　粳米打白炒五斤　白糖霜二斤半　右為末磁瓶收貯每用四五銭白湯随加白糖霜調服一日三四次此平調脾胃久服精神倍加

吐法

瓜蒂散　上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死　瓜蒂　赤小荳　為末每服一銭七温漿水調下取吐為度設兩手脉不絶無者不可便用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胸中窒塞不通以指探去之如不得吐者以物探吐之得吐則已如是食不得去者方用此藥吐之

攻下之劑

備急丸　療心腹諸疼卒百病　大黄　乾姜　巴豆去皮各一兩　右揀精品者為末蜜和搗千杵丸如小豆大每服三丸大小量之若中惡客忤心腹脹満卒痛如錐刀刺痛氣急口噤尸厥卒死者以酒或湯服之口噤以物攪開灌之藥一下咽須臾差如未差更與三丸以腹中鳴轉即吐下便愈若口噤須折齒灌之忌蘆筍猪肉冷水肥膩之物易水張先生又名獨行丸乃急劑也

神妙列仙散　飲酒所傷以致遍身疼痛腰脚強跛手足頑麻胃脘疼痛胸膈満悶肚腹膨脹嘔吐瀉痢及酒食停久或一切積聚黄疸熱鼓並皆治之　沉香　木香　茴香炒　檳榔各一銭　萹蓄三銭　大黄微炒一兩　麦芽一兩半　瞿麦五銭　右末每服三五銭五更熱酒調下能飲者多飲二三杯不妨仰面卧手叉胸前至天明取

下大便如魚腦小便如血劾忌生冷硬物葷腥
惟啖米粥
木香和中丸　和脾胃消宿食利胸膈化痰涎除
膈熱進飲食　木香　黄芩　青礞石　枳殼
檳榔　青皮　橘紅各五錢　白滑石二兩　沉香二錢
大黄一兩一錢　黒牽牛取頭末二兩三錢　右末水丸梧子大
每服五十丸姜湯或茶清下
木香檳榔丸　一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大
小便結澁不利者　木香　檳榔　青皮去白

陳皮去白　枳殼　莪朮煨　黄連　黄柏各一兩　香附
大黄炒　黒丑取頭末各三兩　右末水丸梧子大每服
六十丸生姜湯下以利為度
枳實導滯丸　傷湿熱之物不得施化痞悶不安
茯苓　黄芩　白朮　黄連各三錢　澤瀉二錢
大黄一兩　枳實炒　神麹炒各五錢　右蒸餅糊丸菉豆
大每服七十丸
三黄枳朮丸　傷食肉湿麵辛辣厚味之物填塞
悶亂　黄芩二兩　黄連　大黄煨　神麹炒　白朮

陳皮各一兩　枳實炒五錢　飪餅為丸服如上
海藏神應丸　一切冷物冷水及潼乳酪小腹痛
腸鳴水穀不化　巴豆　杏仁　乾姜　百草霜
各五錢　木香　丁香各二錢　黄蠟一兩　先將黄蠟用
醋煮去渣將巴豆杏仁同炒黒烟盡研如泥將
蠟再上火入少油溶化入在杏仁等藥内攪匀
旋下丁香等藥研匀搓作挺子油紙裹了旋丸
每用三五丸食前米飲下
秘方化滞丸　理一切氣化一切積奪造化有通

塞之功調陰陽有補瀉之妙久堅沉痾磨之自
消暴積乍留導之立去　丁香去苞　木香　青皮
去白　橘紅　黄連各二錢半　京三稜煨　莪朮煨各五錢
半夏麹二錢五分　俱為末　巴豆去殼滚湯泡過再研開去心膜以毛器用
好酒煑乾用六錢研細和前藥末再研入後藥　烏梅肉厚者去核焙乾為末用五錢以米
醋調略清慢火熬成膏入前藥　右共和匀以麺糊為丸粟米大
每服五七丸人盛者十丸五更陳皮湯下常
服磨積不欲瀉者津液嚥下
停食飽悶枳殼湯下　但有所積物取本物

煎湯冷下　因食吐不止津液燥下即止
食瀉不休及霍亂嘔吐俱用冷水下
赤痢甘草湯冷下　白痢乾姜湯冷下
心痛石菖蒲湯下　小腸氣痛茴香酒下
婦人血氣當歸湯下　若欲攻積熱姜湯下
仍加丸数未利再服瀉不止飲冷水一口立
止　小兒量歲数加減服　瘧積米飲下
孕婦勿服以藥得熱則行冷則止

丹溪小胃丹　芫花 好醋拌勻過一宿於瓦器上不住手炒至黑色勿令焦
甘遂 濕麵包水浸半日洗曬乾一云水浸冬七日春秋五日或用水煮亦可
大戟 水煮一時洗曬乾各半兩　大黃 以濕紙裹煨勿焦焙乾再以酒潤炒熟焙乾一兩半
黃栢 三兩炒　右末以白朮膏丸蘿蔔子大臨

卧津液吞下或白湯送下取其膈上濕痰熱
積以意消息之欲利空心服　一方加木香
檳榔各五錢飪餅糊為丸每服七八十丸
東垣䦨飲枳實丸　逐飲消痰導氣清膈
枳實炒　半夏製　橘紅各二兩　黑丑取頭末三兩
右末麵糊為丸每五十丸食後姜湯下如所
食在膈間兀兀欲吐及憎悶亂以物探吐甚
若用瓜蒂散
海藏金露丸　肉傷心痞氣不升降水穀不消
大黃一兩　枳實炒五錢　桔梗二兩　黑丑半二錢
右末荷葉燒飯丸每服白湯下三五十丸常
服減半一方姜糊丸
傷狗肉不消心下堅硬或腹脹口乾發熱妄語水
煮蘆根汁飲之
傷魚鱠及生鮓停在胸膈不化必成癥瘕

馬鞭草搗汁飲之　飲生姜汁亦消

橄欖煎湯飲之亦佳
傷豆腐以蘿蔔煮食或用蘿蔔子煎湯飲之消
傷蟹用紫蘇生姜煎湯飲
傷瓜菓以健脾消食之劑內加射香服之立消
不能食
生生子曰不能食者由脾胃餒弱或病後而脾胃
之氣未復或痰客中焦以故不思食非心下痞
滿而惡食也治當補益以開豁之丹溪導痰運

脾之法皆是也下元虛亦令人不思食宋黄山谷刀筆手東載云有將兔絲子淘净炒乾日服數匙酒下服之十日飲食如湯沃雪又有服補脾藥不効用二神丸治之愈

羅謙甫云脾胃弱而飲食難任者不可一槩用尅伐之劑宜錢氏異功散補之自然能食或嗜食太過傷脾而痞滿嘔逆權用枳朮丸一服慎勿多服昔人有治久瘧後食少汗多先用補劑加黄連枳實月餘食反不進汗亦不止因悟謙甫之言純用補劑又令粥多于藥氣虚甚者加附子一二分佐之

錢氏異功散　治脾胃虛弱難任飲食

人參　白朮　茯苓　粉草　橘紅　木香各等分　加姜棗煎服

二神丸　脾胃虛弱全不思食服補脾藥不効者

破故帋四兩炒　肉果二兩生　右末肥棗四十九枚生姜四兩切片煮爛去姜剝去棗核研膏入藥末和丸桐子大每三四十丸鹽湯下

積聚門

黄帝針經百病始生得三云積者蓋厥氣生足悗悗生脛寒脛寒則血脉凝濇凝濇則寒氣上入腸胃則䐜脹䐜脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積卒然多飲食則腸滿起居不節用力過度則絡脉傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血内溢血内溢則後血腸胃之絡傷則血溢于腸外有寒汁沫與血相摶則并合凝聚不得散而成積矣或外傷于寒内傷于憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通温氣不行凝血蘊裹不散津液凝濇滲著而不去而成積矣

難經云肝之積名曰肥氣肥氣以季夏戊巳日得之何以言之肺病傳于肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受故留結爲積故知肥氣以季夏戊巳日得之心之積名曰伏梁云云脾之積名曰痞氣云云肺之積名曰息賁云云腎之積名曰奔豚云云並見本方

滑伯仁曰越人之意盖以五行之道推其理勢之所有者演而成文爾初不必論其感亦不必論其還不還與其必然否也請以所勝傳不勝及王者不受邪遂畱結為積觀之則不以詞害意而思過半矣

論婦人腸覃石瘕

水脹篇云石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒氣客于子門子門閉塞氣不通惡血當瀉不瀉衃以畱止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生于女子可導而下

寶鑑曰夫膀胱為津液之府氣化則出矣今寒客于子門氣塞不通血壅不流而衃以止之結硬如石是名石瘕也此氣先病而血後病故月事不來則可宣導而下出者也故難經云任之為病其內苦結男子為七疝女子為瘕聚此之謂也非大辛之藥不能已可服見晛丹

腸覃何如岐伯曰寒氣客于腸外與衛相搏氣不得營因有所繫瘜而内著惡氣乃起瘜肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也

夫腸者大腸也覃者延也大腸以傳道為事乃肺之府肺主衛衛為氣氣得熱則泄寒則凝今寒客於大腸故衛氣不營有所繫止而結瘕在内貼著其延久不已是名腸覃也氣散則清氣聚則濁結為瘕聚所以惡氣發起瘜肉乃生小漸益大至期而鼓其腹則如懷子狀也此氣病而血未病故月不斷以時下本非娠娠可以此為辨矣

劉宗厚曰按此謂石瘕為血壅不流故月事不來腸覃為氣聚而濁結成瘕故血未病月水不斷而知此二積之異然亦有諸積所致或有病癰膿而似此二證者不可不察也

丹溪曰痞塊在中為痰飲在右為食積一云痰積在左為血塊氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血而成也用醋煮海石醋煮三稜蓬朮

桃仁紅花五靈脂香附之類為丸石醎白术湯吞下 瓦壟子能消血塊次消痰石醎一物有痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積 治塊當降火消食積食積即痰也 行死血塊塊去須大補 凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不去當用消積藥使之融化則根除矣 凡婦人有塊多是血

生生子曰積聚一證難經以某日得積及不受欲還之說後人皆難尊信與下諸書雖亦各有發明終未有能擴其蘊而可為萬世法者近汪子良特揭而辨之乃分表裏邪正臟腑內外曰積曰聚及著治驗數條多有啟悟與丹溪治案可相表裏深有功於難經者而後人得以此取則焉幸亦大矣謹述於左

汪子良曰嘗讀難經積聚之說而疑之雖有及於病情而其說自相矛盾有膠固而難通之處後學之惧于承用也為之辨論附以積聚常變之法亦有自效於匡救之忠已乎

五十五難曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟之所生聚者六腑之所成積者陰氣也其始發有常處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處又五十六難曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發欬逆年不已以季夏戊己日得之（何以言之肺病傳肝肝當傳脾脾季夏適旺旺者不受邪肝復欲還肺肺不肯受故留結為積故知肥氣以季夏戊己日得之）心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心以秋庚辛日得之（何以言之腎病傳心心當傳肺肺秋適旺旺者不受邪心復欲還腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以庚辛日得之）脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盆久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬癸日得之（何以言之肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適旺旺者不受邪脾復欲還肝肝不肯受故留結為積故知痞氣以冬壬癸日得之）肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久不已令人洒洒寒熱喘嗽發肺癰以春甲乙日得之（何以言之心病傳肺肺當傳肝肝以春適旺旺者不受邪肺復欲還心心不肯受故留結為積故知息賁以春甲乙

得之腎之積名曰奔豚發於少腹上至心下或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病傳腎、當傳心心以夏適旺、者不受邪腎復欲還脾、不肯受故留結爲積故知奔豚以夏丙丁日得之夫謂積者陰氣也聚者陽氣也是以血氣分陰陽也殊不知陰血陽氣也皆能成積但臟腑所主之不同耳心肝多主于血丹溪所謂在左屬血是也脾肺多主於氣本文所謂肺積息賁者是也息者氣之息也是陽氣亦能成積況又曰氣之所積名曰積

與其積陰之說不相合矣又謂積者五臟之所生也聚者六腑之所成也殊不知有形質之物積滯不行則為之積五臟六腑俱有之如仲景所謂熱結膀胱搏血畜積下焦其人如狂小腹滿硬而小便自利抵當湯主之又東垣所謂食積腸胃腹滿卒痛者備急丸下之是六腑之位亦有其積豈謂積于臟乎至論肝積肥氣夫肥氣者言其皮裹膜外有塊以致皮膚有肥滿之狀所謂瘧母是也此肝之外積非肝之內積也

又謂脾積痞氣夫脾居於右脇今積在於心膈之位乃與本文積在本位之說不相合矣又謂腎積賁豚發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時乃與聚証走動相類與本文積屬陰沉伏之比不相合矣且五臟之積未言所因治何所據又謂肝積於季夏戊己日得之之類其說之失明者自當知之愚謂積伏而有常處其症靜也因於血氣痰食水火之所成聚者對散而言散而無形或集為有象其症動也因於氣虛

不能運行之所致作於腹中者屬內作於皮膚四肢者屬外如血積左脇作痛日輕夜甚其脉沉濇者所謂在左屬血治用芎歸紅花蘇木射香肉桂莪朮之類又有火鬱左脇而痛甚者治用當歸龍會丸之類又有裹熱畜水在於左脇而作痛者如仲景所謂心下痞硬痛引脇下乾嘔短氣汗出不惡寒者十棗湯主之又有食積右脇而作痛者所謂在右屬食丹溪云右脇一條降起作痛色不紅者此食積也予嘗用補中

益氣湯去陳皮加青皮草果木香之類又有食塊積於右脇而不痛者宜治消導為主如白术枳實三稜莪朮砂仁吳茱萸之類又有痰飲積於心膻作痛纔食熱辣湯則暫止而脉沉滑治用白螺丸之類又有氣積胸中而為脹痛喘急脉沉者治用紫蘇杏仁之類又有水積胸膈作痛手不可近身凉脉沉緊者治用陷胸湯之類又有濕鬱心膈而為痞滿者治用大消痞丸之類所謂五臟之積者如此又有積于六府之位

者余嘗治一人膈下大痛有塊不移嘔吐不食吐糞腹痛此中焦吐也從於積用紫沉丸下之而愈又嘗治一人腹中大痛不移纔得大便其痛稍減兩尺脉沉弦而濇他醫作房後陰症治之弗應余曰據其尺脉陰沉當作陰症治之據其大便去後而痛減者此食積也用備急丸下之而已又嘗治一婦產後將及一月小腹之左有塊如雞卵作痛日輕夜重嘔吐寒熱此血積也治用芎歸肉桂莪朮乳沒琥珀射香之類一

服而塊消諸症悉退又寶鑑云寒氣客於子門則氣塞不通血壅不流而衃以止之結硬如石是名石瘕見覸丸主之又云清濁之氣結聚腸外成如懷娠按之則堅推之則移月事以時下名曰腸覃晞露丸又嘗治一婦人經閉三月臍下脹痛不移他醫作血積治弗効予曰此氣虛不能上升而陷於下也丹溪所謂陽病極於下者此也治用人參陳皮而安又嘗治一人臍左有塊不痛或時降起此亦食積也治用白术三

稜莪朮砂仁吳茱萸木香神麯糊丸服之外於塊上炙之而消又嘗治一人小腹左邊有塊堅痛不移大便燥結或因惱怒辛苦即作膈痛嘔吐不食諸醫罔効已一年餘余作痰火治用順氣消痞丸（遠志肉酒炒黃連姜製厚朴各二兩海藻昆布青皮山査肉神麯蒼朮川歸枳實各一兩玄明粉六兩同牛肉一斤切碎煮熟焙乾同前諸藥為末醋煮蒸餅糊丸每服一錢空心湯下未及一月而塊消痛止）又治一人右脇塊痛用三補丸加梔子蒼朮服至半月而愈所謂六府之積者如此其餘菜菓酒肉寒冷等積可類推焉

腑之積甚者倒倉法治之此皆內積之症治者也又有外積者作于皮膚四肢之位也如瘡疽瘰癧瘡毋之類治各從其所宜夫瘡疽屬陽者仙方活命飲之類屬陰者內托復煎湯之類瘰癧未消者破結散之類已破者如神散之類瘡毋又名肥氣宜降痰火之劑余嘗治一人瘡後左脇之下皮裏膜外有塊大如掌許用七胰散治之（瓦壟子煅 天蓼花子各二兩為末 猪胰七箇針亂刺孔同玄明粉四兩煮熟入前二末搗爛焙乾為末每服二錢酒下為丸服亦可）服之而効此皆外積之

症治者也且以聚病言之夫內聚者腹中走痛也由於氣虛不能運行故耳余嘗治一人腹中有塊作痛或上或下或有或無此聚也治用人參黃芪白朮當歸枳殼木香之類而止此內聚之症治者也又有外聚者亦由氣衰滯於四肢百節作痛痛作隨腫痛退腫消經曰先痛而後腫者氣傷形也此也治用補氣散邪之劑如人參黃芪白朮為君佐以羌活五加皮薏苡仁之類此外聚之症治者也由是觀之積者由于氣血痰食水火之所成而有臟腑外內之分也聚者由于氣虛不運之所致而表裏邪正之別也則常變虛實之治得矣難經之說云乎哉

湯氏三稜散 治積氣肚痛 砂仁 甘草（炒） 益智仁（去殼炒） 三稜 莪朮 青皮（去穰炒各等分）

右末白湯點下

散聚湯 久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下心腹絞痛攻刺腰脇小腹瞋脹大小便不利

半夏 檳榔 當歸（各三分） 陳皮 杏仁（去皮尖炒）

桂（各二兩） 茯苓 甘草（炙） 附子（炮） 川芎 枳殼 厚朴 吳茱萸（湯泡各一兩） 大黃（看勢輕重用）

每服四錢水煎 大便利者去大黃

大七氣湯 治同上 京三稜 蓬朮 陳皮 益志 香附（各一兩半） 肉桂 霍香 甘草 青皮 桔梗（各三兩） 每服五錢水煎

玄胡丸 內消癥瘕氣結虫煩心腹脹痛

玄胡索 川歸 青皮 木香 雄黃（另研飛） 檳榔 廣朮（炮各四兩） 京三稜（炮六兩） 右末入雄黃

拌勻糊丸梧子大每服三十丸姜湯下不拘時

木香三稜散　和胃進食消化生冷物心腹刺痛

木香　神麴炒各一兩　京三稜炮　甘草炙各二兩　廣茂六兩

益志　橘紅各四兩　右末每二錢入鹽沸湯點服

五食丸　虛實積氣蠱脹積塊水氣年深癥瘕

大戟去皮　甘遂生各半兩　牙皂去皮子生　芫花醋浸一宿炒黄

胡椒各一兩　巴豆十箇去心膜醋煮二研半兩　右末入巴豆和

勻糊丸菉豆大每服五七丸氣實者十丸夜卧

水一鍾用白米白麵黑豆生菜猪肉各少許煎

至半鍾去渣用湯下藥忌油膩粘滑物

聖散子　遠年積塊及婦人乾血氣

硇砂　麦櫱各六兩　大黄八兩　乾漆燒過　萹蓄　茴香

炒　檳榔各一兩　一如婦人乾血氣加川山甲炮二兩

右細末每三錢溫酒調下仰卧此藥只在心

頭至天明大便如魚腸小便赤為驗並無毒

神効小兒用一錢十五以上二錢空心服之

更効

荊蓬煎丸　破痰癖消癥塊及冷熱積聚順氣消

食　木香　檳榔　枳殼　青皮　茴香

三稜各二兩酒浸冬三日夏一日　廣茂二兩醋浸冬三日夏一日　以去皮

巴豆二十箇同炒黄色去巴豆不用

右末糊丸如菉豆大每服三十丸姜湯下

三稜丸　治五穀等積食

陳倉米一兩巴豆五枚去殼同炒焦色去巴豆不用　陳皮　三稜各一

兩　砂仁各二錢　麥芽　木香一錢　右末醋糊丸

菉豆大每十五丸至二十丸姜湯食遠服

麴糵丸　治熱酒積噯酸脇痛

神麴　麥芽各一兩　黄連五錢同巴豆五粒炒黄色同用

右末沸湯和丸桐子大每五十丸食遠姜湯

送下

一方　治冷酒積　平胃散加丁香砂仁麥芽神

麴姜棗鹽煎服

水積丸　甘遂一錢為末以猪槽頭肉一兩細切搗

爛和末作一丸紙裹火煨令香熟取出臨卧嚼

細酒嚥下致下病根　若治酒積用棗湯吞下

涎積炒粉丸　積聚涎塊結於心腹乾嘔刺痛

蚌粉一兩 巴豆七枚去殼及膜 右二味同炒赤色去巴豆以醋丸桐子大丈夫臍腹痛炒茴香酒下二十丸婦人血氣姜酒下敗血冲心童便和當歸酒服常服姜湯下

茶積丸 治茶積飲食減少面黄腹痛

陳倉米半升巴豆七粒去殼同炒赤色去巴豆 青皮 陳皮各二兩

右末醋丸如菉豆大每二十丸食後淡姜湯下

又方 花椒為末麵糊丸桐子大每二十丸茶湯任下

茶癖散 治茶積 黄芩 石膏 升麻等分

為末每三錢砂糖湯調下

鱉甲桃仁煎丸 治諸積 桃仁泡去皮尖五兩水研濾汁三升

三稜煨 木香 檳榔 青皮各一兩 鱉甲三兩醋炙黄

右末將桃仁汁慢火熬二升再加醋一升再熬如糊和藥丸桐子大每服七十丸淡醋湯下空心食前日二服

晞露丸 感寒氣凝結腸外久為癥瘕疼痛名腸覃

廣朮 三稜各一兩酒浸用巴豆三十粒去殼同朮稜炒黄色去巴豆不用 乾漆炒 川烏炮各五錢 茴香炒 青皮 雄黄各三錢

川山甲炮二錢 硇砂四錢研 輕粉一錢 麝香五分

右姜汁糊丸桐子大每服二三十丸空心姜湯下

阿魏丸 諸積聚癥瘕痞塊 山查 南星皂角水浸

半夏同上 麦芽 神麯 黄連姜炒一兩各 連翹炒

阿魏醋炙 瓜蔞 貝母各五錢 石礦 風化硝

蘿蔔子 胡黄連各二錢半 右末姜汁浸蒸餅糊為丸桐子大每服五十丸姜湯下

晛晛丸 婦人石瘕狀如懷子者 大附子炮

鬼箭羽 紫石英各三錢 肉桂 玄胡索 澤瀉

木香各二錢 血竭 水蛭一錢炒烟盡 檳榔二錢半 桃仁三十枚炒 三稜五錢 大黄二錢酒浸一宿同三稜焙 右末酒糊丸桐子大每三十丸食前塩湯或酒下

脾積膏 治諸積神効 雞子五枚 阿魏五分 黄蠟一兩

鍋内一處煎分作十服温湯空心服諸物不忌設腹痛是積化動十日後當有血大便中

出是其効也

剪紅丸　專治久積有虫者　雷丸　檳榔
三稜　莪术各醋煑　木香　蕪荑　黒丑
狗脊　大黄　史君子　鶴虱　牙皂　錫灰
茵陳　黄丹各等分　為末以茵陳煎湯為丸梧子
大外以黄丹為衣大人每服三錢小兒每用一
錢空心以酒下福建昔以冷茶呑

奇驗方　黒羊肝一副入左顧牡蠣三錢黄蠟一
两水煮肝爛食肝并湯空心食肝盡即効但不
厭其苦須多服効

敷方　蕎麦麺水調圍硬處内用皮硝葱重重鋪
三層以火熨之日三次　外服橘半枳术丸加
莪术

又方　以紅麺為糟將生威霊仙同搗極爛敷之
外覺痞塊消即拭去遅恐壊肌膚

熨痞方　吴茱萸三升研碎酒煮熱以布裹熨癥
上冷更炒更沓熨之癥逐移走熨之消乃止

二仙膏　貼痞氣及積塊
明礬　雄黄　為末先將二两水糊和成膏貼
患處候大便如膿下即愈未愈再以二两和
膏貼之即効

七膁散江子良論中七膁散有兎楞子　只用皮硝七錢每一
錢搽一膁醃七日鉄器上焙乾燥為末又水
紅花子只用七錢無兎楞子

羅太無乾柿丸　取虚實積下膈甚妙
硃砂飛為衣　没藥　牙皂去皮弦子為末　乾姜炮　乾漆炒烟尽
三稜炮　輕粉　青礞石煅各一錢　巴豆三十粒去皮膜醋煮十沸　水銀一錢　鉛一錢結成砂子　右末和匀飯丸菉豆大
煎柿蒂湯冷下三丸或五丸　有孕婦人勿服

神功助化散　男婦腹中痞塊不拘氣血食積所
成　扁蓄　麥芽各五錢　瞿麦穗　甘草各五分
木香一錢半　沉香　神麯各二錢半　大黄二两
右末和匀男以淡竹葉甘草等分煎湯及無灰
酒同調服　婦以紅花灯心當歸等分煎湯及
無灰酒同調服俱多湯酒於　忌油膩動氣之物
及房事一月其藥夜服大小便見悪物為度

此方神妙不可盡述

紅丸子　大人脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹脹四肢無力酒積不食乾嘔不止脾連心胸及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃腹脹氣急不嗜飲食漸成脾虛並宜服之方見傷食

二賢散　進食消積塊　橘紅一斤淨　甘草四兩　塩半兩　用水三四碗從早煮至夜以爛為度水乾則添日乾為末淡姜湯調下　有塊者加姜黃半兩　氣滯者加香附二兩俱同前藥煮　氣虛者加沉香半兩　噤口痢加蓮肉二兩去心俱另入

小三稜煎　食癥酒癖血癥氣塊時發刺痛全不思飲食積不消心腹堅脹痰逆嘔噦噫酢吞酸

京三稜　蓬术各四兩　芫花一兩去梗葉

右同入甕器中用米醋五升浸滿封器以炭火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微焦焙乾為末醋糊丸菉豆大每十五丸姜湯下

猪腰子方　治腹中有塊

猪腰子一雙切薄片木鱉子肉一兩與猪腰片相間縛定外用溫紙包火煨熟去紙擂盆內搗如泥入黃連末和丸每二十丸烏梅甘草湯下第二服二十五丸三服三十丸漸加至以痛為度大便利其塊自消神効

元戎溫白丸　治心腹積聚久癥痞塊大如杯碗黃疸嘔吐滿悶上氣腹脹心下堅結上搶心傷及脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆噎膈五種淋疾九種心疼積食不消成瘧連年不瘥及一切風身躰頑痺不知痛痒或半身不遂眉髮墮落七十二種風三十六種遁尸疰忤癲癇或婦人諸疾斷續不生下淋瀝五邪失心憂愁思慮不樂飲食無味月水不調及一切病有似懷孕羸瘦困弊或歌如鬼所使等症

川烏二兩半去皮臍炮　紫菀　菖蒲　柴胡　厚朴製

吳茱萸　桔梗　皂莢去弦子炒　茯苓　乾姜炮

人参　黃連　巴豆去油研炒　桂　蜀椒去目炒各五錢

右末入巴豆令匀蜜丸桐子大每三丸姜湯
下食後臨卧服加至五六丸止
肝之積肥氣温白丸加柴胡川芎治之　心之積
伏梁温白丸加菖蒲桃仁黄連治之　脾之積
痞氣温白丸加乾姜吴茱萸治之　肺之積息
賁温白丸加人参紫菀治之　腎之積奔豚温
白丸加丁香茯苓遠志治之
肥氣丸　肝之積在左脇下如覆杯脉弦而細
青皮　當歸　蒼朮各一兩半　蛇含石煅醋淬七次

八十二卷　四二

右末醋煮米糊丸菉豆大每四十丸當歸酒
送下
蓬朮　三稜　鈌孕粉各二兩與三稜蓬朮同入醋煮一伏時
伏梁在心下結聚不散用桃奴三兩為末空心温
酒調下桃奴樹上乾桃子是也正月採經冬不落者
肺喘久不愈為息賁五靈丸
五靈脂二兩半　木香半兩　馬兜苓一兩炒　葶藶
右末棗肉丸桐子大每二十丸姜湯下日三
本事云肺之積曰息賁在右脇下大如杯令人洒

洒寒熱喘嗽發肺癰棗膏丸
葶藶子　陳皮　桔梗各半分
右下二味末入葶藶研匀煮肥棗肉和丸桐
子大每五七丸米飲下予嘗患停飲久漬肺
經食已必嚏喘覺肺系大急服此良驗
當歸丸　治婦人月經不調血積
當歸　赤芍　川芎　熟地　京三稜　廣茂各五分　神麹　百草霜各二錢半　右末酒糊丸桐子大
温水下

八十三卷　四三

尚書媳婦馬氏年三十二腹中血塊作疼經五六
年形已骨立衆皆曰不可為案其未死何家甚
貧而大小愍之一日召杜至告杜曰但以濟物
為懷則可業已請召明公非所言也遂以少物
帛贈杜杜不受曰但服其藥必獲安無以是為
疑遂示方用浸藥牛膝乾漆當歸各半兩硇砂
木香水蛭炒紅娘子炒紅花牡丹皮硃砂各一
分海馬一箇班猫去翅足炒十四箇為末酒醋
各半升熬為膏每日天明用一皂子大酒醋化

下一月病退六十日漸安果如其言

黒神丸　神麯　茴香各四两　木香　川椒炒香出汗
丁香各半两　檳榔四箇　乾漆六两半生半熟用
右除椒漆外五物皆半生半炒為細末用前生熟漆和丸彈子大又用茴香十二两鋪陰地蔭乾候外乾并茴香收器中至乾去茴香用治腎氣膀胱痃癖及疝墜五膈血崩産後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸皆綿灰酒下若難産炒葵子四十粒杵碎酒煎下諸疾不過三服痃氣十服膈氣癥癖五服血瘕三丸一婦有塊如杯每發痛不可忍諸藥莫愈投以丸三服杯塊盡消終身不復作矣

沒藥散　治一切血氣臍腹作痛産後悪露兒枕痛
血竭　沒藥並研　桂心　當歸　蒲黄
紅花　木香　玄胡索　乾漆炒　赤芍各等分
右細末每服二錢熱酒調下食前　血塊衝心痛甚者以大順散三錢酒調服立止

牡丹散　婦人久虚羸瘦血塊走注心腹疼痛
牡丹皮　玄胡索　桂心　當歸各一两　牛膝
赤芍藥　莪朮各三两　京三稜一两半
每服三錢水酒各半盞煎服

芍藥湯　治産後諸積不可攻宜養去熱
芍藥一斤　黄芩　茯苓各六两
右每服半两水煎日三服

帝曰病脇下滿氣逆二三載不已是為何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可刺灸祗為導引服藥藥不能獨治也　奇病論○王註云氣逆息難故名息積也
用息賁法治之亦可

磨積丸　胡椒一百五十粒　木香二錢半　全蝎十枚去毒
右末粟米糊丸菉豆大每十五丸陳皮湯下

化氣湯　治息積
木香　砂仁　桂心各二錢半　甘草炙　茴香炒
丁香皮　青皮　陳皮　乾姜　蓬朮各半两炮
沉香　胡椒各一錢　右末每服二錢姜蘇塩湯調下婦人醋湯服

肝之積肥氣丸 治積在左脇下如覆杯有頭足
久不愈令人欬逆瘖瘧連年不已
厚朴半兩 黃連七錢 柴胡二兩 椒四錢 巴霜五分 川烏炮去
皮臍一錢二分 乾姜五分 皂角去皮弦子煨一錢半 白茯苓一錢半
廣茂炮 昆布 人參各二錢半 甘草三錢
右除茯苓皂角巴豆外爲極細末再另研巴
霜旋入和勻煉蜜丸桐子大初服二丸一日
加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從
兩丸加服周而復始積減大半勿服 右後
八十三卷 四六
積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在
各條下秋冬加厚朴一半通前重一兩減黃
連一錢半若治風癇於一料中加人參茯苓
菖蒲各三錢黃連只依春用七錢雖秋冬不
減淡醋湯空心服下
加減肥氣丸 治同前仲夏合此
柴胡 厚朴各半兩 黃連一兩 川椒 甘草各五分
肉桂 川烏各二錢 巴霜六錢 乾姜 人參各半兩
右細末旋入巴霜研勻煉蜜丸桐子大初服

二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便
微溏再從二丸加服空心淡醋湯下大便利
秋冬去乾姜半錢加厚朴一倍減黃連一半
心之積伏梁丸 起臍上大如臂上至心下久不
愈令人心煩 黃連一兩半 人參 厚朴去皮姜製各半
兩 黃芩三錢 肉桂 紅豆 茯神 丹參各一錢
菖蒲 乾姜 巴霜 川烏炮去皮臍各五分
右末研巴霜旋入和勻煉蜜丸桐子大初服
二丸日加一丸漸加至大便溏從二丸加服
八十三卷 四七
食遠淡黃連湯下周而復始即減半勿服秋
冬加厚朴半兩減黃連半兩黃芩不用
鱉甲湯 治伏梁積氣心下如臂痞痛不消小便
不利 鱉甲去裙醋炙黃色 三稜 大腹皮 芍藥
當歸 柴胡 生地各一兩 官桂 生姜切片焙乾各三
分 每服三錢水一大盞入生姜木香半錢同煎
至八分空心溫服
脾之積痞氣丸 在胃脘腹太如盤久不愈令人四
肢不收發黃疸飲食不爲肌膚

厚朴製半生半炒 黃連八錢 吳茱萸 黃芩 白术各三
錢 白茯苓另為末 澤瀉各一錢 巴豆霜另研四分 乾姜炮
縮砂 茵陳各一錢半 川烏炮去皮臍 川椒炒各五分 桂四分
人參一錢 右末旋入巴霜茯苓和勻煉蜜丸桐
子大初服二丸日加一丸漸加至大便微溏再
從二丸加服食遠淡甘草湯下周而復始積減
大半勿服

加減痞氣丸 孟秋合此

黃芩酒炒 益智 吳茱萸 歸尾 橘紅
附子各三分 厚朴一錢 黃連酒炒 半夏 紅花各五分
青皮 廣茂 神麴 茯苓 昆布 熟地
人參 炙甘草 巴霜 葛根各二分 澤瀉
右末蒸餅糊丸桐子大初服二丸日加一丸
加至大便微溏再從二丸加服淡甘草湯下

宣明白术丸 治息積脇下氣逆妨悶喘息不便
呼吸引痛不已不可針灸宜導引服藥爾
白术 枳實 官桂各一兩半 人參二兩 桔梗炒 陳皮
甘草各一錢 為末煉蜜丸桐子大每服二十丸
溫酒下日三服

加減息賁丸 仲夏合此其積為病寒熱喘欬氣
上奔脉濇失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒
熱相參氣分寒血分熱治宜益元氣泄陰火破
氣消其堅也 川烏 乾姜 桔梗 白豆蔻
各一錢 人參 桂枝各二錢 陳皮八錢 黃連一兩三錢 紫菀
厚朴 茯苓 川椒炒去汗 京三稜 天門冬去心
各一錢半 青皮七分 紅花少許 巴豆霜四分 右末蒸餅糊
為丸桐子大初服二丸日加一丸加至大便
微溏從二丸加服食前姜湯下忌酒麵辛辣
生冷物

腎之積奔豚丸 發於小腹上至心下若豚狀或
上下無時久不已令人喘逆骨痿少氣及男子
內結七疝女子瘕聚帶下 苦楝酒煮三錢 黃連炒五
錢 白茯苓 澤瀉 菖蒲各二錢 川烏炮 丁香各五
分 玄胡索一錢半 全蝎 附子 獨活各一錢 巴豆
霜四分 厚朴姜製七錢 肉桂三分 右末旋入巴豆霜茯
苓和勻蜜丸桐子大服法如前食遠淡塩湯

下秋冬加厚朴半两　如積熱堅大先服前
藥不減於一料中加牡蠣三錢痞帶勿加
如大積大聚消其大半乃止藥過劑則死
如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先
服本臟積藥諸疾自愈是其本也餘積皆然
如服藥人覺熱加黃連　如服藥人氣短加
厚朴　如服藥人悶亂減桂
治積要法　許學士云大抵治積或以所惡者攻
之所喜者誘之則易愈如硇砂水銀治肉積神

麴麥蘖治酒積水蛭虻虫治血積木香檳榔治
氣積甘遂牽牛治水積雄黃膩粉治痰積巴豆
礞石治食積各從其類也若用群隊之藥分其
勢則難取効須要認得分明是何積聚兼見何
證然後增加佐使之藥不爾反有所損要在臨
時通變也治積當察其所痛以知其病有餘不
足可補可瀉無逆天時詳臟腑之高下如寒者
熱之結者散之客者逐之畱者行之堅者削之
强者奪之鹹以耎之苦以瀉之全真氣藥補之

隨其所積而行之節飲食慎起居和其中外可
使必已不然遽以大毒之劑攻之積不能除反
傷正氣終難復也可不慎歟
治魚蟹積　香蘇散多加生姜陳皮橄欖煎服
菓菜積　平胃散加丁香麝香為末鹽湯調服
索粉積　紫蘇濃煎汁加杏仁泥服即消
麺積阿魏丸　濃煎羅蔔子湯下
糍糕傷積　酒麴五錢木香一錢為末鹽湯調服
口有酒香是効

治婦人血塊有孕難服峻藥
香附子四两醋煮　桃仁一两去皮尖　海石二两醋煮　白术一两
神麯糊為丸
奇方　治一切癥瘕積聚　鱉甲一两醋煮　三稜五錢煨
白术五錢　青皮　桃仁　紅花　昆布各二錢　香附醋煮七錢
右末糊丸梧子大每一錢煎白术湯下
治中脘有塊中常跳動　橘紅四錢　桃仁二錢去皮尖
木通一錢　白术八錢　水煎服
治中脘水飲積塊堅大如盤　白术二两　枳實七枚

分三服水煎

治小兒癖積　大安丸加胡黃連末五錢神麯糊丸黍米大米飲下

丹溪治一人肚左邊帯脇下有塊先吃匾食牛乳者成氣痛又因酒肉塊大如桃食減三分之一

滑石五錢　白术四錢　陳皮　三稜各三錢　蘿蔔子　黃連　連翹各一錢　乾葛二錢半　桃仁二十枚　甘草炙一錢半　黃芩一錢　分三帖水煎服

一婦脇下有塊大如掌脉濇時作熱此虛中有氣積先與補虛次與磨積藥

白芍藥　當歸尾各四錢　白术三錢　青皮　川芎　木通各一錢　甘草五分　水煎服

磨積藥　三稜醋煮一錢　青皮　枳實　桃仁　大黃各五錢　桂枝半錢　海藻醋煮二錢　神麯糊為丸梧子大每服五十丸

一人有塊在脇内有痰熱汗不得泄兩脉大而散軟此挾虛症　三稜五錢　黃連　白术　連翹　木通各三錢　人參二錢半　桂　川芎各一錢　甘草五分　水煎呑下保和丸

一婦瘧後左脇下有塊小便少

厚朴　柴胡各二錢　三稜　青皮　木通各五錢　白术六錢半　甘草五分　姜一片水煎服

一人因飽食牛肉豆腐患嘔吐又不節飲食右脇下生一塊漸長大如掌痛發則見痛止則伏脉弦數性急塊上不可按按之愈痛痛則必吐黃酸苦水此足太陰食積濕痰

荔枝核二枚燒　山梔仁五枚炒　枳實十五枚　山查九枚　吳茱萸九粒炒

一方有人參　急流水一盞煎沸入生姜汁服四帖止其痛却與消塊藥

消塊藥方

半夏末六錢皂角六枚水煮取汁拌半夏末晒乾　黃連五錢炒　石碱二錢　右末以糖毬膏為丸胡椒大

驚風成塊者妙應丸加川山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索蓬术各四錢每服五十丸加至七十丸以利為度　妙應丸即控涎丹方見痰門

酒積方累効（即烏梅丸方出傷飲門）
經義有人病心腹懣煩彌二歲診曰腹有蟲誤食
髮而然令餌雄黄一劑少刻吐一蛇如拇指無
目燒之有髮氣乃愈此殺毒蟲之驗也
丹溪治食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈
雜眩運身熱時作時止
黄連（一兩半呉茱萸益智仁同炒） 山梔（半兩炒） 川芎 神麯
桃仁（去皮尖） 三稜 蓬朮（各半兩醋煮） 香附（童便浸）
山査（各一兩） 蘿卜子（炒一兩半） 一方有青皮（半兩） 白芥
子（炒一兩半） 右麯糊丸
治婦人血塊
牛膝根切焙乾酒煎温服効
腸覃生於腸外月事時下石瘕生於胞中月事不
以時下二病皆似蠱脹（並見脹門）
産後消血塊
滑石（三錢） 沒藥（二錢） 血竭（一錢）
右末醋糊丸如悪露不下以五靈脂爲細末
麪糊丸白湯下陳皮湯下妙

又方 消血塊
香附（童便浸） 桃仁（去皮尖） 爲末醋糊丸
陳無擇云導引法隨意行之皆可愚謂或按摩滿
處或手足相屈伸或八段錦或六字氣之類以
氣通爲効

赤水玄珠第十四卷目録

癲狂癇門
顫振
瘈瘲
痓痙門
不得卧　附多卧
煩躁
健忘

赤水玄珠第十四卷

新安生生子孫一奎著輯

癲狂癇門（此三證大旨已於醫旨緒餘中詳言之矣當參看）

生生子曰靈樞云癲癇瘈瘲不知所苦兩蹻之下男陽女陰（後人以癲癇為一門者遠此也）又曰暴攣癇眩足不任身取天柱（後人言風癇者迹此也）

明癲症

書云多喜為癲多怒為狂難經謂重陰者癲重陽者狂

素問厥論篇曰陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言長刺節論篇曰病之初也歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲病又通評虛實論篇曰癲疾厥狂久逆之所生也脉搏大滑久自已小堅急死不治虛可治實則死

靈樞癲狂篇曰癲疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚則極已而煩心嗁呼喘悸先反僵因而脊痛又有骨癲筋癲脉癲嘔多沃沫氣下泄者不

治又曰癲疾者疾發如狂者死不治（據此言疾發如狂者死不治可見癲狂非一病也）

素問奇病論篇黄帝曰人生而有病癲疾者病名何安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發為癲疾（啓玄子註曰癲謂上巔即頭首也）

綱目曰以其病在頭巔故曰巔疾治之者或吐痰而鋭高越之或鎮墜痰而從高抑之或内消其痰邪使氣不逆或隨風寒暑濕之法用輕劑發散上焦或針灸頭中脉絡而導其氣皆可使頭巔脉道流通孔竅開發而不致昏眩也是知巔癎之癲與厥成癲疾眩冒癲疾之癲一疾也王註悮分癲為二疾獨孫真人始能一之今特冠此氣亂頭癲等經文於癲癇篇首使人知疾有所歸而治有所據也

今十四卷　二

王機微義曰按内經言癲而不言癇古方以癲癇或併言或言風癇或言風癲或言癲狂所指不一蓋癇病歸于五臟癲病屬之於心故今以風癇另立一門而癲狂合為一門也

生生子曰按此以風癇另立一門明其不與癲狂相類則是之矣而云癲狂合為一門今終集考之並無癲狂門目豈未之補歟

孫兆治相國寺僧充忽患癲疾半年名醫皆不効召孫療之孫曰但有鹹物儘與食之但待云渴可来取藥今夜睡着明日便愈也至夜僧果渴孫乃與酒一角調藥一服與之有頃再索酒與之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故僧謝之問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏得睡此乃靈苑方中硃砂酸棗仁乳香散也人不能用耳

今十四卷　三

辰砂散　治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴目魂魄不守醫藥無驗

辰砂（光明有墻壁者一兩）　酸棗仁（微炒半兩）　乳香（半兩）

各為末右量患人能飲酒幾何先令恣飲但勿令吐至静室中以前藥都作一帖温酒調

下作一盞調之令頓飲如飲酒素少者但隨量取醉服藥訖便安置床枕令臥病淺者半日至一日病深者二三日令家人伺之鼻息勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺須待其自醒則神魄定矣萬一驚寤不可復治正肅吳公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

經云悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正此悲哀傷魂而狂當用溫藥補魂之陽仲景方以地黃湯本事驚氣丸之類即

是也

經云喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人此喜樂傷魄而狂當用涼藥補魄之陰辰砂鬱金白礬之類是也

濟世方　治失心

鬱金七兩須四川蟬肚者乃真　明礬三兩

為末薄糊為丸梧子大每六十丸湯水任下

昔有婦人癲狂數年不愈後遇至人授此方初服覺心胸中有物脫去神氣洒然再服頓甦至人云此病憂鬱得之痰累心竅此藥能去鬱痰

明狂症

靈樞癲狂篇曰狂之始生也先自悲也喜忘善怒善恐得之憂飢及狂之發少卧不飢自高賢也自辨智也自貴倨也善罵詈日夜不休狂言驚善笑好歌樂妄行不休者得之大恐目妄見耳妄聞善呼多食善見鬼神善笑而不發于外者得之有所大喜

林億公曰狂為痰火盛實癲為心血不足狂病宜大吐下

生生子曰據此言心血不足者乃醫治攻尅太過以致中氣餒弱而神志不定非癲病一起初便有此不足症也

丹溪曰神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清心除熱如痰迷心竅當去痰寧心大率多因痰結於心胸間治當鎮心神開痰結亦有中邪而成此疾者大槩是熱又曰狂病宜大吐

下則除之

素問云陽厥強怒飲以鉄落狂怒出于肝肝屬木鉄落金也以金制木之意予曾用數次果効考本草能治鬼打鬼主安心神治驚邪主癲癇鎮心熱狂走除胃腸中熱氣疾涎

病能篇帝曰有病狂怒者此病安生岐伯曰生于陽也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥曰何以知之曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也曰治之柰何曰奪其食即已夫食入於陰長氣于陽故奪其食即已使之服以生鉄落為飲生鉄落者下氣疾也

夫狂之為病少卧少卧則衛獨行陽不行陰故陽盛陰虛令昏其神得睡則衛得入於陰而陰得衛填則不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈矣

王海藏治許氏病陽厥狂怒罵詈親疎或哭或歌六脉舉按無力身表如氷石發則叫呼聲高內經云奪其食即已因不與之食乃以大承氣湯下之得臟腑積穢數升狂稍寧數日復發下如此五七次行大便數斗疾瘥身温脉生良愈此內經奪食法也

保命當歸承氣湯

當歸　大黃各一兩　芒硝七錢　甘草五錢

右每二兩水一大碗姜五片棗十枚煎至一半温服若陽狂奔走罵詈不知親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加姜棗者胃屬土此引入胃也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以

大利為度微緩以瓜蒂散入防風末藜蘆末吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散解毒湯等調之安

明癇症

生生子曰癎痰火所致前人有稱為風癎者劉河間謂由熱甚而風燥為其兼化涎溢胸膈而癖瘛昏冒僵仆也

東垣曰病癇者涎沫出于口冷汗出于身清涕出

于鼻皆陽蹻陰蹻督衝四脉之邪上行腎不任煎熬沸騰上行為之也此奇邪為病不係五行陰陽十二經所拘當從督衝二蹻四穴奇邪之法治之

癎症亦從衝任督三脉氣逆而發者當尋此三脉治之○督脉尋長強撅骨間灸之○任脉尋氣海陰交衝脉附足少陰脉上行去中行各五分陰交穴乃任脉陰衝之會

潔古曰晝發灸陽蹻夜發灸陰蹻各二七壮陽蹻

起於跟中循外踝上行入風池申脉穴也陰蹻亦起于跟中循内踝上行至咽喉交貫衝脉照海穴也

劉宗厚曰癎與痓畧相類而實不同其病發身軟時醒者謂之癎身強直反張如弓不時醒者謂之痓癎病隨其痰之潮作故有時而醒痓病比癎為甚而有挾虛者故因其昏冒而遂致亡者多矣

綱目曰癲癎即頭眩痰在膈間則眩微不仆痰溢膈上則眩甚仆倒于地而不知人名之曰癲癎

徐嗣伯云大人曰癲小兒曰癎其實一疾也然與中風中寒中暑尸厥等仆倒不同凡癲癎仆時口中作聲將省時吐涎沫省後又復發時作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲省時無涎沫後不復發間有發者亦非如癲癎常發狀也

千金方云病先身熱掣瘲驚啼叫喚而後發癎脉浮者為陽癎病在六腑外在肌膚猶易治也病

先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉沉者為陰癎病在五臟内在骨髓為難治也劉宗厚謂此論癎之陰陽後世有認為寒熱者悞也蓋此疾皆以痰熱所作而淂在表而淺為陽故云易治入裏而深為陰故曰難治乃表裏淺深之謂非寒熱之謂也

張子和曰夫癎病不至目瞪如愚者用三聖散投之更用火盆于煖室中令汗吐下三法並行次服通聖散百餘日則愈矣至于目瞪愚者不可

治內經曰神不守謂神亂也大凡此疾乃肝經有熱吐後可服瀉青丸下之劉宗厚謂多由風痰膠固胸膈上下故大法先宜吐之吐後可用清熱之藥如東垣安神丸守真龍會丸之類皆可服不獨通聖散也痰實在裏不解宜導痰清熱亦不獨瀉青丸也

劉宗厚曰按癎病古方或云風或云驚癎或云癲癎由此疾與中風顛狂急慢驚相類故命名不同也原其所由或在母腹中受驚或因聞大驚

而得盖小兒神氣尚弱驚則神不守舍舍空則痰涎歸之或飲食失節脾胃有傷積為痰飲以致痰迷心竅而作者治法必當尋火尋痰而論前人多用鎮墜清心之藥固可以治熱可以清痰若有頑痰膠固者此藥未易驅逐在上者必先用吐吐後方宜服此更有痰實在裏者亦須下之隨病輕重而用也或曰癎有陰陽何也予曰此與急慢驚者可同論也陽癎不因吐下由其有痰有熱客于心胸之間因聞大驚而作若盛熱雖不聞驚亦自作也宜用寒藥以攻治之陰癎亦本于痰熱所作醫以寒凉攻下太過損傷脾胃变而成陰宜用温平補胃燥痰之藥治之若曰不因壞症而有陰陽之分則是指痰熱所客表裏臟腑淺深而言癎病豈本自有陰寒者哉

丹溪曰癎屬驚與痰不必分五等大率行痰為主黄芩黄連瓜蔞半夏南星随痰火多少治之無有不愈　有熱以凉藥清其心　此症必用吐

吐後用平肝之藥青代柴胡川芎之類

素問大奇論篇云心脉滿大癎瘛筋攣肝脉小急癎瘛筋攣

凡灸癎必須先下之乃可灸不然則氣不通能殺人針則不拘　鳩尾穴必高手乃可下針但宜灸亦不可多壯壯多則令人健忘

心癎面赤心下熱短氣喘息灸巨缺三壯

肝癎面青反視手足揺動灸丘墟三壯

脾癎面黄腹大善利胃脘并脘傍一寸各三壯衝

陽隱白
肺癇面白口吐沫炙肺俞少商少陽各三壯
腎癇面黑正直視身不搖如尸厥金戶少海至陰
湧泉各三壯刺一分
礬丹丸　治癲之劑始治多用攻痰法繼以養心壯神補劑收功
治五癲五癇無拘陰陽冷熱
號丹　晉礬各一兩　右用磚鑿一窠可容二兩
許先安丹在下次安礬在上以炭五斤煅令
炭盡取出研細以不經水豬心血為丸如菉
〔八〕四卷　二三
豆大每服十丸至二十丸橘皮湯下
元戎二白丸　治癲與癇
白礬一兩以溼麵包蒸熟去麵入輕粉三五分
量虛實加減丸如桐子大每服二三十丸生
姜湯下小兒丸小些
鴟頭丸
皂角五條酥炙　鴟頭一枚燒存性　號丹五錢研細
右末糯米糊為丸菉豆大每服十五丸加至
二十丸米飲下

神應丸　治風癲久服其痰隨糞而下
生明礬一兩　臘茶五錢
右末蜜丸桐子大每服三十丸臘茶下
乳硃丹
乳香　硃砂飛
右用乳香熔化拌和硃砂丸如龍眼大每服
一丸以側栢葉浸酒磨化溫服
天冬散　治風癲脇痛耳鳴吐逆
天門冬去心皮　乾為末酒調下二錢
〔八十四卷〕　十三
寶鑑龍腦安神丸　治男婦五種癲癇無問遠近
發作無時　地骨皮　麥門冬　桑白皮
甘草　人參各二兩　茯神三兩　馬牙硝二錢
射香　冰片各三錢　牛黃五錢　烏犀一兩
硃砂二錢　金箔大者五帖
右細末煉蜜丸彈子大金箔為衣如風癇病
冬月溫水化下夏月涼水化下不拘時二三
歲者日進二服小兒一丸分作二服　虛勞
發熱咳嗽新汲水化下

茯苓丸　常服治心疾良驗
人參　石菖蒲　遠志　茯神　茯苓　辰砂飛　南星　半夏麴　真鐵粉各等分
右末姜汁打糊丸桐子大另用辰砂為衣每服十丸加至三十丸夜卧姜湯下

養心湯　治心虛血少驚悸癲痴
黄蓍炙　茯苓　茯神　半夏　川歸　川芎各五錢　酸棗仁　栢子仁　五味子　人參
遠志　桂心各二錢半　甘草炙四錢　加姜棗水煎服

〔入十四卷〕 十四

加赤茯苓檳榔治停水怔悸

星黄湯　治心風及邪祟
南星　大黄　等分水煎服　吐痰

蓋珠丸　治心恙及邪祟
猪心血　硃砂一兩　乾青靛花一匙
先将猪心血同靛花研勻入硃砂末和丸桐子大每二十丸茶酒任下　甚者不過三服

治癲癇經驗方一宗四方　先服此一劑伐邪
竹茹一錢　半夏麴八分　枳實　橘紅　甘草炙各五分　山梔炒黑一錢半　玄明粉　灯草各三分　加姜棗水煎服

第二次服方可服三劑又服前方一劑又再服此方三劑　人參一錢半　黄芪五分　歸身一錢　百合二錢半
酸棗仁生三分　熟酸棗仁四分　貝母　小草各一錢
麥門冬五分　白芍藥吳茱萸炒過八分　甘草梢三分
茯神　酒紅花各二分　姜三片　棗二枚　水煎服

第三方服前二方半月覺神氣稍完繼服此藥
紫河車一具洗淨砂鍋煮爛入塩少許與服後

〔入十四卷〕 十五

半月勿服藥覺少減又服前方一劑第二方三劑又再服下項丸藥仍将前二藥間服

丸藥方
牛膽南星八錢　真牛黄四錢　辰砂三錢　真射香三分
煮甘草膏為丸芡實大金箔為衣薄荷湯下五丸

清柚湯　治痰迷包絡心熱癲痴
茯神　黄連各一錢　酸棗仁炒　石菖蒲　栢子仁肉　遠志各一錢　甘草五分　水煎服
痰盛者加南星半夏橘紅瓜蔞竹瀝姜汁

海藏治癲癇狂邪不欲眠自賢自智妄行不休此方能安五臟下心氣
白雄鷄一隻煮熟五味調和作羹粥食之
仲景防己地黄湯　治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脉浮　防己一錢　桂枝　防風各三錢　甘草二錢　右以酒一杯漬一宿絞取汁生地黄二斤蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黄汁和匀分二服効
一醉膏　治心恙　無灰酒二碗香油四兩和匀用楊柳枝二十條逐條攪一二百下候香油與酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒時或吐下即安矣

治狂之劑

瀉心湯　治心受積熱譫語發狂踰墻上屋
大黄　黄芩　黄連
每四錢水煎服瀉數行然後用安神藥調理
苦參丸　治狂發無時披髮大叫殺人不避水火
苦參為末蜜丸梧子大每服十五丸薄荷湯下

調胃承氣湯　治狂方在火熱門
大承氣湯　治陽明大實發狂　方在傷寒門
抱膽丸　治癲狂不定非輕劑所能愈者
水銀二兩　黒鉛一兩半　辰砂　乳香各一兩
右將鉛入銚内熔化離火畧冷入水銀攪硬研碎入辰砂乳香乗熱用柳木槌擂匀丸如芡實大每服一丸灯心湯下病者得睡切莫驚動覺來即安再進一丸又方以猪心血為丸井水吞下用治狂言妄語

牛黄瀉心湯　治心經邪熱狂言妄語心神不安
牛黄　冰片　硃砂各一錢半　大黄生一兩
右末每服三錢生姜蜜水調下
六神散　治發狂　此二方皆禁方
寒水石　黄連童便炒各一兩　丹皮三錢　青礞石煆過　龍膽草各五錢　冰片二分　右末童便調下
鎮心丹　治驚悸自汗心煩短氣喜怒悲惡不自知忘魂失魄狀若神靈所憑及男子遺泄女子帶下　辰砂飛　白礬枯

右末水丸鷄豆大每一丸人參湯下
婦人熱入血室發狂不認人以保命集牛黄膏妙
牛黄二錢半 硃砂 鬱金 丹皮各三錢 甘草
氷片各一錢 右末煉蜜丸棗子大新汲水化下
本事方寧志膏 治狂不睡
人參 酸棗仁各一兩 辰砂五錢 乳香二錢半
右末煉蜜丸弾子大每一丸薄荷湯化下
予族弟緣兵火失心與此方服二十丸良愈
親舊多傳去服之皆驗

治癇之劑
碧霞丹 治五種癇疾時作搐掣痰涎壅塞牙関
緊急心神迷悶目睛上視
石緑研九度飛一兩 附子尖七枚 烏頭尖七枚 蝎梢七枚
右末麵糊丸芡實大每用薄荷湯化下一丸
更以酒半合温服之須臾吐出痰涎然後隨
症治之口噤者斡開灌之
仲景風引湯 除熱治癲癇又治大人風引少小
驚癇瘈瘲日數十發醫所不療又治脚風

大黄 龍骨 乾姜各四兩 桂枝三兩 甘草 牡蠣各二兩
寒水石 赤石脂 白石脂 滑石 石膏 紫石英各六兩 右粗末以韋囊盛之取三指
撮井花水三升煮三沸温服一升 治風熱瘈瘲食後量多少呷之無不効不用滓
犀角丸 治風癲癇發作有時揚手擲足口吐痰
涎不省人事暗倒屈伸
犀角末五錢 赤石脂三兩 朴硝二兩 白僵蚕一兩
薄荷葉一兩 右末麵糊丸梧子大每服二十丸
至三十丸温水下日三服不拘時 如覺痰多

即減数忌油膩煿炙
楊氏家藏五癇丸 治癲癇不問新久並宜服之
南星炮 烏蛇肉酒浸一宿去皮骨焙乾 白礬各一兩 辰砂二錢半
全蝎二錢去尾炒 半夏二兩酒洗焙 雄黄一錢半 蜈蚣半條去頭足炙
姜蚕一兩半炒 白附子半兩炮 射香三錢 皂角四兩
右先将皂角搥碎水半升揉汁與白礬同熬
乾為末入各藥末以姜汁打麵糊丸桐子大
每服三十丸姜湯下

丹溪金凢丸　治諸癎
明礬　欝金　防風　牙皂角各一两　川芎二两
鋘鉛各一
右末蒸餅糊丸梧子大空心茶下十
五丸一日除根
錢氏五色丸　治五癎
辰砂五錢　水銀二錢半　雄黄飛　珎珠一两　鉛三两同水銀結砂子
右末蜜丸麻子大每四五丸金銀薄荷湯下
三因六珍丹　治風癎失性顛倒欲死或作五畜
等聲掣縱吐沫久而方甦

丹砂五錢　水銀半两　鉛二两與水銀結砂子　雄黄　雌黄
珎珠各一两　右細末煉蜜丸梧子大每服三五丸
姜棗湯下丸此藥須要搗二三萬杵不然難丸
嚴氏控涎丸　治諸癎久不愈頑涎聚散無時
生川烏　半夏　姜蚕不炒以生姜自然汁浸一夕各五錢　全蝎去尾七枚
鉄粉三錢　甘遂二錢半
右生姜自然汁打薄糊為丸菉豆大硃砂為
衣每服十五丸食後姜湯下忌甘草此下痰
癎也

千金龍膽湯　治嬰兒血脉盛實四肢驚掣發熱
并諸驚癎　龍膽草　鈎藤　柴胡　黄芩
桂枝　芍藥　茯苓　甘草各六銖　蜣蜋二枚
大黄一两　右水一升煮取五合服之
本事人參散　治諸癎并慢脾風神昏痰盛
人參五錢　南星一两切片以生姜汁并漿水浸煮過性晒乾為末
右每服一錢姜三片水煎服加冬瓜仁少許
斷癎丹　治因驚成癎者
黄芪　鈎藤　細辛　半夏　南星　菖蒲各三

錢　蟬退　甘草　桂心　遠志　防風　露蜂
房各二錢　杏仁二錢半　煉蜜丸菉豆大用硃砂麝少
許為衣每服二十丸棗湯下日二服夜一服
甘遂丸　甘遂不蛀者三錢為細末將猪心剖開
入甘遂以線縳定用紙裹數層慢火煨熟不可
令焦取甘遂乘潤入辰砂末一錢搗匀作四丸
每服一丸猪心煮湯下
鮀黄丸　鮀黄小者二十枚以猪膽汁拌匀入火
煅通紅取出地上出火毒研極細　右用狗膽

一枚取汁和粟米飯丸菉豆大每服十五丸溫酒下吐涎乃効

蛇黄丹　治諸癎及小兒急驚風

蛇黄四枚磁盒內煅紅以猪胆汁一碗淬乾　白附子　南星　辰砂另研　麝香各五錢　右末稉米糊丸桐子大每服量大小或一二丸或三五丸溫酒米湯任下

當歸龍膽丸　治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸瘈搐　即龍會丸　方在脇痛門

補胃燥痰丸　治陰癎服凉藥大過損傷脾胃

白术二錢　蒼术　陳皮　半夏　南星　茯苓各一錢半　木香一錢　藿香七分　甘草四分　甚者加附子五分　姜五片水煎服

寶鑑沉香天麻丸　治一小兒四歲因長老摩頂受記生人念呪恐懼發搐痰涎有声目多白睛強項背一時許方醒後每見皂衣人即發多服犀珠腦射鎮墜之藥已四年餘無功又添行步動作神思如痴脉沉弦而急針經云心脉滿大癎瘈筋攣病久氣弱多服鎮墜寒凉之劑復損

正氣故添動作如痴先灸兩蹻各二七壯次服此藥

又肝脉小急盖小兒神氣尚弱因而被驚神思無依又動于肝肝主筋故癎瘈筋攣

沉香　益智　川烏各二錢　天麻　防風　半夏　附子炮各三錢　羌活五錢　甘草　當歸　姜蚕各一錢半　獨活四錢　經云恐則氣下精氣怯而上焦閉以羌活獨活善溫引氣上行又入太陽為引用以為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血之不足養胃氣以為臣附子川烏益智大辛溫行陽退陰又治客寒傷胃腎主五液入脾為涎以生姜半夏燥溼化痰沉香辛溫躰重氣清去怯安神故以為使　每服五錢生姜三片水煎去滓溫服食前三劑愈

劉宗厚曰按癎症本從熱治然亦有壞症而成陰者如錢仲陽所治王氏子吐瀉諸醫藥下之至虛变慢驚手足瘈瘲而身冷醫復與八正散錢氏曰不能食而胃中虛若利大小便即死久則

脾腎俱虛當身冷而閉目必用益黃散史君子丸補脾遂能飲食後又不語錢氏以地黃丸補腎一月而安皆此意也此方用大熱之藥乃從權以救前治之失非常治之道也

蜜陀僧　治驚風癲癇以開痰迷心竅

蜜陀僧成塊者纏以鉄線又用鉄線掛火中煅紅用酒醋一升淬盡出火毒為極細末每服一錢射香湯調下

許學士驚氣丸　發則牙関緊急涎潮昏塞醒則精神若痴

附子　木香　姜蚕　白花蛇　橘紅　天麻

麻黃　乾蝎　天南星姜汁浸一夜各五錢　蘓子一兩

硃砂二錢半為衣

右為末加氷射少許煉蜜丸如龍眼大每服一丸金銀薄荷湯化下溫酒亦可此予家秘方也一軍人犯法臨刑滑釋縛精神頓失如痴與一丸服訖而寐及覺病已失矣一婦因避盜失心数年授此方不終劑而愈又一婦狂厥者十年諸治不驗予授此方去附子加鉄落亦不終劑而愈鉄粉非但化痰鎮心至如摧抑肝邪特異若多恚怒肝邪大盛鉄粉能制伏之此金制木之意也

顫振門

生生子曰顫振者非寒禁鼓慄乃木火上盛腎陰不充下虛上實實為痰火虛則腎虧法則清上補下

新寨馬叟年五十九因秋欠税官杖六十得驚氣成風搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺口目張睒唇舌嚼爛抖擻之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜臥發熱衣被盡褰遍身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌奪則愈矣今已秋寒可三之如未更刺腧穴必愈先以通聖散汗之繼服涌劑則痰一二升至晚又下五七

行其痰小愈待五日再一漏出痰三四升如鷄黃成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探妻與代探咽嗌腫傷昏憒如醉約一二時許稍〻省又下數行立覺足輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筋未至三漏病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可以熱劑溫之恐反成他病也

生生子曰據戴人此治非真知其為痰火盛實者

莫敢如此療也木之有餘由金之衰弱病既久恐亦有始同而終異者況吐汗下之後謂絕不必補養得乎病之輕者或可用補金平木清痰調氣之法在人自斟酌之

摧肝丸 鎮火平肝消痰定顫

膽星 鈎籐 黃連(酒炒) 滑石(飛) 鉄華粉(各一兩)
青黛(三錢) 姜蚕(炒五錢) 天麻(酒洗二兩) 辰砂(飛五錢) 大甘草(二錢)
右末以竹瀝一碗姜汁少許打糊丸菉豆大食後及夜茶下一錢五分忌鷄羊

本事鈎藤散 治肝厥頭搖眩運能清頭目

鈎藤 陳皮 半夏 麥冬 茯苓(各七分) 人參
甘菊(勿誤用野菊花) 防風(各五分) 石膏(一錢) 甘草(三分)
姜二片水煎服

參朮湯 氣虛顫掉

人參 白朮 黃芪(各二錢) 茯苓 甘草 陳皮(各一錢)
甚者加附子 水煎服

統旨秘方補心丸 心虛手振

當歸 生地(各一兩半) 川芎 甘草 人參(各一兩)

栢子仁 酸棗仁(各三兩) 遠志(去心二兩半) 辰砂(飛)
膽星(各五錢) 金箔(二十片) 麝香(一錢) 琥珀(三錢) 石菖蒲(六錢)
茯神(去皮心七錢) 為末飠餅糊丸菉豆大辰砂為衣
每七八十丸津唾嚥下或姜湯下

統旨秘方定心丸 老人戰動風氣所致及血虛而振

天麻(蒸熟) 秦艽(去芦) 全蝎(去頭尾) 細辛(各一兩)
熟地 生地 川歸 川芎 芍藥(各二兩) 防風
荊芥(各七錢) 白朮 黃芪(各一兩半) 葳靈仙(酒洗五錢)
為末酒糊丸梧子大每服七八十丸食遠白

湯或酒送下

痺瘲門

生生子曰瘈縮也瘲伸也伸縮不止手如拽鋸搐之類也汗多不止為虚無汗能食為實

内經曰心脉急甚者為瘈瘲此心經虚寒治宜補心牛黄散之類

又曰心脉滿大癇瘈筋攣此心火實熱也治宜瀉心火凉驚丸主之

又曰肝脉小急亦癇瘈筋攣此肝虚也宜續斷丸主之若肝脉盛宜救脾加減建中湯内經謂脾脉急甚亦為瘈瘲此脾虚肝乗之而瘈也故宜實土瀉木之劑建中湯是也

劉河間曰諸熱瞀瘈皆屬于火熱勝風摶并于經絡風主動而不寧風火相乗是以瞀瘈生矣治以祛風滌熱之劑折其火熱瞀瘈立愈若妄加灼艾或飲以發汗之劑則死不旋踵矣

東垣人參益氣湯　熱傷元氣四肢困倦手指麻木時時瘈瘲　黄芪二錢　甘草炙　升麻各五分　柴胡六分　五味子三十粒　甘草生五分　人參一錢二分　白芍七分

水煎服

獨活湯　風虚昏憒不自知覺手足瘈瘲或為熱血虚不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

獨活　羗活　人參　防風　川歸　細辛　茯神　遠志　半夏　桂心　白薇　菖蒲　川芎各五錢　甘草炙二錢半　每一兩姜五片煎温服

胃風飲　虚風症能食麻木牙關緊急手足瘈瘲目肉蠕瞤胃中有風面腫

白芷一錢二分　升麻二錢　葛根　蒼术　蔓荊子　川歸身各一錢　甘草　柴胡　藁本　羗活　草豆仁　黄柏　麻黄不去節各五分　姜三片棗二枚水煎温服

千金薯蕷丸　腎氣虚弱風氣百疾頭眩驚悸瘈瘲　薯蕷廿八分　當歸十分　桂心七分　神曲炒　熟地黄　人參各十分　川芎　芍藥　白术　麥冬　杏仁各六分　甘草二十分　柴胡　桔梗　茯苓各五分　鹿角膠七分　乾姜　白歛各三分　防風　黄芩各六分　大豆

黃耆七分 大棗百枚爲膏 右末和棗膏加煉蜜丸如彈子大空心酒服一丸日三服

續斷丸 肝勞虛寒脇痛脹滿眼昏不食攣縮瘈瘲 續斷酒浸 川芎 川歸 半夏姜製 橘紅 乾姜炮各一兩 桂心 甘草炙各五錢

右末煉蜜丸桐子大每百丸白湯下

牛黃散 心虛風筋脉攣搐神昏語澁

牛黃 氷片 硃砂 射各一錢 蟬退 烏蛇肉各一兩 全蝎炒 姜蚕炒 桑螵蛸 羚羊角 天麻 阿膠 防風 甘菊 桂心 細辛 蔓荊子 側子去皮 獨活 犀角各五錢 麻黃七錢半

右爲末和勻再研每服一錢荳淋酒下

續命煮散 風氣留滯心中昏憒四肢無力口眼瞤動或時搐搦或渴或自汗

防風 獨活 當歸 人參 細辛 葛根 熟地黃 芍藥 川芎 甘草 遠志 荊芥 半夏各五錢 官桂七錢半 每一兩姜三片煎汗多者加牡蠣一錢半

獨活散治風熱化痰 細辛 石膏 甘草炙各五錢 獨活 防風 藁本 旋覆花 川芎 蔓荊子各一兩 右每服三錢姜三片水煎服

痓門 附勞風

生生子曰内經云肺移熱于腎傳爲柔痓痓古云痙勁切之謂也仲景諸公傷寒書皆以爲太陽風湿所致亦有兼陽明經者仲景謂汗下過多及瘡家發汗過度皆成痓此指外感之邪原係傷寒家法也陳無擇張子和諸公云亦有風火痰熱之内因者謂此病多由亡血筋無所營故邪得以襲冊溪謂比癎爲虛此皆指内傷之症也觀剛柔二字則亦當有虛實之别大抵剛者多從外感柔者多從内傷故治斯疾者但明知從外感而来則用傷寒家法若從雜症而来則用陳無擇冊溪劉宗厚張子和諸家之法庶表裏詳盡始無遺此失彼之患矣

内經云諸痓項強皆屬于湿王注太陽傷湿 又云諸暴強直皆屬于風王注陽内鬱而陰行于外 劉宗厚云按内經言

痓肺腎太陽皆脉與夫六氣皆能為之大抵皆
主于濕
仲景云太陽病發熱無汗反悪寒者名曰剛痓
成無巳曰痓者痓也强也千金曰太陽中風重
感寒濕則变痓太陽病發熱無汗為表實則不
當惡寒今反惡寒者則太陽中風重感于寒為
痓病也以表實感寒故曰剛痓
太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔痓
成無巳曰太陽病發熱汗出為表虚則當惡寒

其不惡寒者為陽明病今發熱汗出而不惡寒
者非陽明証則是太陽中風重感于濕為柔痓
也表虚感濕故曰柔痓
太陽病發熱脉沉而細者名曰痓
成無巳曰太陽主表太陽病發熱為表病脉當
浮大今脉反沉細既不愈則太陽中風重感于
濕而為痓也金匱要畧曰太陽病其証備身體
强几几然脉反沉細此為痓括蔞桂枝湯主之
太陽病發汗太多因致痓

成無巳曰太陽病發汗太多則亡陽内経曰陽
氣者精則養神柔則養筋陽微不能養筋則筋
脉緊急而成痓也
病身熱足寒頸項强急惡寒時頭熱面赤目脉赤
獨揺頭卒口噤背反張者痓病也
成無巳曰太陽中風為純中風也太陽中寒為
純傷寒也皆不作痓惟是太陽中風重感寒濕
乃变為痓也身熱足寒者寒濕傷下也時頭熱
面赤目脉赤風傷于上也頭揺風主動也獨頭

揺者頭為諸陽之會風傷陽也若純傷風者身
亦為動揺手足為之搐搦此皆内挾寒濕故頭
揺也口噤者寒主急也卒口噤者不常噤也有
時而緩若風寒相搏則口噤而不時開此皆加
之風濕故卒口噤也足太陽之脉起于目内眥
上額交巔上其支别者從巔入絡腦還出别下
項循肩膊内夹脊抵腰中下貫臀以下至足風
寒客于經中則筋脉拘急故頸項强急而背反
張也

風病下之則痓復發汗必拘急

瘡家雖身疼痛不可發汗〻出則痓

劉宗厚曰按此謂汗下而致痓則不專于風寒湿之外傳矣是又因壞證而成也發汗下之太過皆亡津液損血之所由也

劉宗厚曰按痓症屬風寒湿所傷有汗者脉必浮緩無汗者脉必浮緊若其脉沉細者湿所傷也堅直上下行皆緊之象也發汗已其脉如蛇亡津液而無胃氣之象也

子和云呂君玉妻年三十病風搐目眩角弓反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癎治之以南星雄黃烏附用之不効戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直搖動風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木肝木茂而自病因湧風痰二三升次以寒劑下十餘行又以排鍼刺百會穴出血一杯愈

劉宗厚曰按風搐本與痓症不同而痓症屬湿土極必兼風木動搖之化風搐屬木木極必見金燥瘈斂之形要之亦可同論故取此條以證痓病不專風寒湿之外至亦有風火熱之内作者也

三因方云夫人之筋各隨經絡結束于身血氣内虚外為風寒湿熱之所中則痓以風散氣故有汗而不惡寒曰柔痓寒泣血無汗而惡寒曰剛痓原其所因多由亡血筋無所營故邪得以襲之所以傷寒汗下過多與夫病瘡人及産後致于斯疾者槩可見矣診其脉皆沉伏絃緊但陽緩陰急則久久拘攣陰緩陽急則反張強直二證各異不可不别

丹溪曰痓切不可作風治兼用風藥　大率與癎相似比癎為甚為虚宜帶補　多是氣虚有火有痰宜用人參竹瀝之類　一男子二十餘歲患痘瘡靨謝後忽患口噤不開四肢強直不能屈時或遶臍腹痛一陣則冷汗如雨痛定則汗止時作時休其脉絃緊而急如真弦狀向知此子極勤苦意其因劳倦傷血山居多風寒乘虚而感又因痘瘡其血愈虛當用辛温養血辛凉

散風遂以當歸芍藥為君川芎青皮釣藤為臣
白朮陳皮甘草為佐桂枝木香黃連為使更加
紅花少許服二十帖而安 同上

王海藏云發汗太過多因致痓身熱足寒項強惡
寒頭熱面腫目赤頭搖口噤背反張者太陽痓
也若頭低視下手足牽引肘膝相搆陽明痓
也若一目或左右邪視并一手足搐搦者少
陽痓也汗之止之和之下之各隨其經可使必
已 在表無汗宜汗之有汗宜止之陽明痓屬 八十四卷
裏宜下之少陽痓半表半裏宜和之所謂各隨 三六
其經也

劉宗厚曰謹按傷寒痓病活人以太陽中風又感
寒濕而致則專于外邪所傷然仲景亦有汗下
過多之戒則又出于壞証所成矣盖外邪所傷
者通宜解散仲景言剛柔活人分陰陽雖知論
經絡等諸方詳矣至于治壞証補虛救失之法
諸方則亡也又千金謂溫病熱入腎中亦為痓
小兒病癇熱盛亦為痓若此治法俱未見之也

況此二者之外又有血氣本虛之人如產後汗
出多而變痓者或因七情怒氣而發痓者或因
濕熱內盛痰涎壅遏經絡而作痓者治各不同
也大抵傷寒有外邪之可解宜用風藥發散風
寒又風藥亦能勝濕耳至于邪熱入腎亦非風
藥之所能療也其內證作痓本無外邪前人豈
可仍用風藥處治惟宜補血降火敦土平木清
痰去濕隨證而用不可不察也

海藏云若汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來 八十四卷
寒熱脉弦者少陽風痓宜柴胡防風湯 三七

柴胡 防風各一兩 人參 黃芩各五錢 半夏製六錢
生姜 甘草各六錢半 棗三枚 每服一兩水煎服

若發汗過多發熱頭面搖卒口噤背反張者太陽
兼陽明也宜去風養血防風當歸散主之

防風 當歸 川芎 地黃 每服一兩水煎

神朮湯 治剛痓解利無汗

蒼朮三錢 防風二錢 甘草一錢 姜葱水煎服

白朮湯 加桂心黃芪治柔痓解利有汗

白朮三兩 防風二兩 甘草一兩 每服五錢姜三片
水煎服一日二服漸〻汗止為解
仲景葛根湯 太陽無汗而小便少氣上衝胸口
噤不得語欲作剛痓者
葛根四兩 麻黄 生姜各三兩 桂枝 芍藥 甘
草各二兩 大棗十二枚 每服五錢煎服取微汗
若發熱無汗惡寒名曰剛痓宜麻黄加獨活防風
湯 麻黄 桂枝各一兩 芍藥三兩 甘草五錢 獨活
防風各一兩 每服一兩水煎温服
瓜蔞桂枝湯〈十四表〉 太陽病其証備身體強几几然脉 三八
反沉遲此為柔痓
瓜蔞根 甘草 芍藥各二兩 桂枝 生姜各三兩
大棗十二枚 水九升煎取三升分三服取微汗
汗不出啜粥發之
海藏 治發汗自汗而不惡寒者名柔痓宜桂
枝加川芎防風湯
桂枝 芍藥 生姜各一兩半 甘草 防風 川芎
各一兩 大棗六枚 每服一兩水煎服

凡剛柔二痓皆可與小續命湯 但要識加減法
若柔痓自汗者去麻黄夏間及病有熱者減桂
枝一半冬及初春去黄芩
千金續命湯 卒中半身不遂手足拘急不得屈
伸身體冷或智或痴或身強直不語或生或死
狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用食
大小便不利皆療之
人參 桂心 川歸 獨活 黄芩 甘草炙
乾姜炮各七錢半 石膏一兩半 杏仁四十枚 以水九升煮
取三升分温三服日二服〈十四表〉無汗者加麻黄 三九
若汗後不解乍静乍躁目直視口噤往来寒熱脉
弦者少陽風痓宜柴胡加防風湯
柴胡 防風各一兩 人參 黄芩各五錢 半夏六錢 生
姜 甘草各六錢半 棗三枚 每服一兩水煎
倉公當歸湯 賊風口噤角弓反張痓証
川歸 防風各七錢半 獨活一兩半 附子一枚 細辛五錢 麻
黄一兩三錢 酒五升煮取三升服一升口不開者
格口納之一服當蘇二服小汗三服大汗

活人八物白朮散　陰痓一二日面腫手足厥冷筋脉拘急汗不出恐陰氣內傷

麻黃　白朮　茯苓　五味子　羌活各五錢　桂心　附子各三分　良姜一分　每四錢姜五片水煎服

附子散　陰痓手足厥逆筋脉拘急汗出不止頭項強直頭搖口噤

桂心　川芎各三錢　附子炮　白朮各一兩　獨活五錢

每三錢棗一枚水煎服

桂心白朮湯　陰痓手足厥冷筋脉拘急汗出不止　白朮　防風　甘草　桂心　川芎　附子　每五錢姜五片棗二枚水煎溫服

〔八十四卷　四十

丹溪治虛婦因怒手足強直十指如束右手脉弦虛左手脉弦大而強稍堅此風木攻脾土宜速瀉肝氣助肺金補脾土之陰

黃連二錢　南星　白朮　人參　黃芩　天麻

川芎　木通　陳皮　青皮各五錢　甘草一分

水煎入姜汁辣服

附後方　中風體強直不得屈伸反覆刮枳樹皮細切一升以酒二升浸一宿每日溫服半升酒盡再作即枳實樹皮去風濕効

千金方　治口噤手足不隨而手体強直

伏龍肝五升以水七升攪勻取汁飲之

痓痙辯

生生子曰丹溪云痓當作痙傳寫之悞耳攷之諸書亦未有能辯之詳註之確者惟郭雍氏云痓與痙當是二病謂昔劉寅氏有言病以時發者謂之痙不以時發者謂之痓似亦未能詳悉厥後以其所歷見及治之効與不効者反覆考據二症之名二字之義其用心可謂至懃至懇者矣然終未能昭著允若故後之人疑其為二症者不亦宜乎愚按靈素仲景以下諸書云痓云痙字雖兩般治多雷同殆亦不必犁而為二也吾辯之則愈支離膚見謂痓乃病之名痙乃病之狀原其有剛柔二種以病發之時而經筋脉絡僵勁角弓反張故曰痙痙是勁急也是以其病發之狀象而名之也不然何歷代諸公或以

〔八十四卷　四一

治痓之方治痙或以治痙之方治痓諸皆能効
治既同而不殊則痓當一而不二也焉用分

勞風即痓之類

丹溪云痓比癇為虛盖因勞汗遇風內挾太陽寒濕之邪治亦與痙同法但當視其所勞則知虛在何臟如房勞則腎虛汗出腠理開風入皮腠得寒則閉風不能出與水俱行其人當目下腫如卧蚕之狀戴人云腎主水其經至于目下故也不禁房室則死明其虛在腎也所以関于太

陽何也太陽主寒其經最在外腠理得寒則閉故太陽先受邪也治宜八物白术散倉公當歸湯

黃芪湯　汗多氣虛發痓

黃芪蜜炙二錢　人参　白术　茯苓　白芍炒各一錢
甘草炙八分　桂枝五分　水煎服

當歸散　血虛及去血過多發痓

當歸酒洗二錢　川芎　熟地　防風　黃芪各一錢
芍藥一錢半　甘草四分　水煎服

理氣平肝散　七情所傷發痓

烏藥　香附各一錢半　青皮　枳殼　芍藥　川芎
柴胡　木香各一錢　甘草
姜三片水煎服木香磨水二匙加入

清痰湯　痰火攻作項強口噤角張反痓

山梔　黃芩　半夏炮　橘紅　茯苓　瓜蔞仁
枳殼　貝毋　香附童便浸各一錢　甘草五分
水煎入竹瀝姜汁各三四匙食遠服

去濕青熱散

白术二錢　蒼术二錢半　澤瀉　茯苓　天花粉　山

梔各一錢　羌活七分　甘草四分　水煎服

芎枳丸　治勞風強上冥視肺熱上壅唾稠

川芎　枳殼等分　為末蜜丸桐子大每服三五十丸食後溫水下日三服

祛風清金散　肺熱壅盛痰唾如膿

防風　栝蔞根　桔梗　枳殼　旋覆花　川芎各一錢　山梔　黃芩　貝毋　瓜蔞仁炒　茯苓
天門冬　麥門冬　橘紅各八分　五味子十五粒　甘草四分　水煎服

生生子曰按內經評熱病論篇帝曰勞風之病何如岐伯曰勞風發在肺下其為病也使人強上冥視唾出若涕惡風而振寒此為勞風之病帝曰治之奈何岐伯曰以救俛仰巨陽引精者三日中年者五日不精者七日欬出清黃涕其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死也、

引精謂目中之精明引動能辨人與物也

啟玄子註曰勞風者從勞風生故曰勞風勞謂腎勞也腎脉者從腎上貫肝膈入肺中故腎勞風生上居肺下也強上好仰也冥視謂合眼視不明也腎精不足外吸膀胱膀胱氣不能上營故使人頭項強而視不明也肺被風薄勞氣上薰故令唾出若鼻涕狀腎氣不足陽氣內攻勞熱相合故惡風而振寒肺傷則營衛散解魄不內治故死林氏謂強上者似角弓反張也冥視者目開不見物也凡痓病皆同不識人或反視斜視也治法當與痓同千金方冥視作目眩

〔八十四卷 四

不得卧

靈樞曰病而不得眠者何氣使然岐伯曰衛氣不得入于陰常留于陽留于陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入于陰則陰氣虛故目不瞑矣

大惑論

黃帝問于伯高曰夫邪氣之客人也或令人目不瞑不卧出者何氣使然伯高曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積于胸中出於喉嚨以貫心脉而行呼吸焉營氣者泌其津液注之於脉化以為血以榮四末內注五臟六腑以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慓疾而先行于四末分肉皮膚之間而不休者也晝日行于陽夜行于陰常從足少陰之分間行于五臟六腑今厥氣客于五臟六腑則衛氣獨衛其外行于陽不得入於陰行于陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻陷不得入于陰陰虛故目不瞑黃帝曰善治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑

〔八十四卷 四五

陰陽已通其卧立至黄帝曰善此所謂决瀆壅塞經絡大通陰陽和得者也願聞其方伯高曰其湯方以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清者五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭為一升半去其滓飲汁一小杯日三稍益以知為度故其病新發者覆杯則卧汗出則已矣久者三飲而已矣（此去飲之别也）

内經曰胃不和則卧不安帝曰人之不能偃卧者何也岐伯曰肺者臟之蓋也肺氣盛則肺大肺大則不能偃卧

〔八十四卷　四六

王海藏云膽虚不眠寒也（酸棗仁炒為末以竹葉湯調服）

張子和治一富家婦人因思慮過甚二年不得寐無藥可療其夫求治脉之兩手俱緩此脾受邪也脾主思故也乃與其夫議以怒激之多取其財飲酒數日不處一法而去其婦大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寤自是食其脉得平（此怒勝思法也）

水腫病令人不得卧卧則驚驚則欬甚此水（氣凌肺也）

温膽湯治大病後虚煩不得眠或則驚悸極效

丹溪治煩不得眠益元散加牛黄服之

有心血不足而不寐者用益榮湯

仲景酸棗湯　治虚煩不得眠

酸棗仁（二升）　甘草（一兩）　知母　茯苓　川芎（各一兩）

水八升煮酸棗仁得六升内諸藥煎取三升分温三服　一方加生姜二兩

本事鱉甲丸　膽虚不得眠四肢無力

酸棗仁　鱉甲　羌活　牛膝　黄芪　人参　五味子（各等分）　蜜丸梧子大每四五十丸温酒下

〔八十四卷　四七

聖惠酸棗地黄湯　骨蒸勞煩心不得眠

酸棗仁（一兩）　水一大碗半研絞取汁下米二合煮粥熟再入地黄汁一合更煮過不計時服之

六物湯治振悸不得眠　四君子加酸棗仁（生姜煎服）

許學士珍珠母丸　肝虚内受風邪卧則寬散而不收狀若驚悸

珍珠母（三錢另研末）　當歸　熟地（各一兩半）　人参　茯苓　酸棗仁　栢子仁　犀角（各一兩）　沉香　龍齒（各五

錢為末蜜丸梧子大辰砂為衣每四五十九金銀薄荷湯下日午及夜服（一方多虎睛一對射香一錢）

獨活湯　治同前相兼服

獨活　羌活　人參　前胡　細辛　半夏　酸棗仁　沙參　茯苓　甘草　五味子（各等分）

每七錢姜三片烏梅一箇不拘時煎服

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每卧則魂飛揚覺身在牀而神魂離体驚悸多魘通夕無寐更醫不効予為診視詢之曰醫作

八十四卷　四八

何病治董曰衆皆以為心病予曰以脉言之肝經受邪非心病也肝氣因虛邪氣襲之肝藏魂者也遊魂為变平人肝不受邪卧則魂歸于肝神静而得寐今肝有邪魂不得歸是以卧則魂飛揚若離体也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此未之聞雖未服藥已覺沉痾去體矣願求治之予曰公且持此說與衆医議所治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方無與病相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除

此方用眞珠母為君龍齒佐之眞珠母入肝經為第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以為鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能变化故魂遊而不定虎能專静故魄止而有守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失在夫人達之而已

八十四卷　四九

益榮湯　血不足不寐及怔忡驚悸

當歸　黃芪　遠志　酸棗仁（炒）　茯神　栢子仁　麥冬　白芍　人參　紫石英（各一錢）　木香（七分）　甘草（五分）　姜三片棗二枚水煎服

多卧

黃帝曰人之多卧者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕而分肉不解焉腸胃大則衛氣留久皮膚濕則分肉不解其行遲夫衛氣者晝常行于陽夜行于陰故陽氣盡則寐陰氣盡則寤故腸胃大則衛氣行留久皮膚濕分肉不解則

行遲留于陰也久，其氣不精則目瞑，故多卧矣。其腸胃小，皮膚滑以緩，分肉解則衛氣留于陽也久，故少瞑焉。黄帝曰：其非常經也，卒然多卧者，何氣使然？岐伯曰：邪氣留于上焦，上焦閉而不通，已食若飲湯，衛氣留久於陰而不行，故卒然多卧焉。大惑篇

海藏曰：膽實多睡，熱也。

生棗湯　治膽熱多睡

生酸棗仁為末，茶、姜汁調服。六十四卷

又方　生酸棗仁一兩　臈茶二兩　以生姜汁塗炙微焦為末，每服二錢，水七分，煎六分，溫服。五十

醒睡湯　酸棗仁　沙參各一錢半　麥冬一錢　茯神　甘草各五分　姜一片　水煎服

煩躁門

仲景云：煩屬肺，躁屬腎，火入於肺則煩，入于腎則躁。大抵煩躁皆心火為病，火旺則金爍而水虧也，惟火獨存，故肺腎合而為煩躁。又脾經絡于心中，心經起于脾中，二經相搏，濕熱生煩。夫煩者擾擾心亂，兀兀欲吐，怔忡不安。

成無已曰：煩為擾亂而煩，躁為憤怒而躁。合而言之，煩躁為熱也；析而言之，煩，陽也；躁，陰也。煩為熱之輕者，躁為熱之甚者。

陳無擇曰：內熱為煩，外熱為躁。又曰：虛煩身不覺熱，頭目昏疼，口乾咽燥，不渴，清清不寐，皆虛煩也。

婁全善曰：先賢治煩躁，俱作有屬熱者，有屬寒者。獨煩而不躁者多屬熱，惟悸而煩者為虛寒；躁不煩者多屬寒，惟火邪者為熱。蓋煩者心中煩，或六十四卷胸中煩，皆內熱也。躁者身体手足躁擾，或裸体五二不欲近衣，或欲坐井中，為外熱也。內熱者有本之熱，故多屬熱；外熱者多是無根之火，故屬寒也。

生生子曰：仲景、成無已二公所論煩躁，皆為火熱，是祖內經。夫熱病皆傷寒之類也，乃傷寒家語，言其邪自外而入至于煩躁，皆為熱候。予謂躁有陰陽，煩有虛實。陶節庵曰：先煩而悸者為實，先悸而煩者為虛。又曰：煩漸生躁，有陰陽虛實之別：心熱則煩，陽實陰虛；腎熱則躁，陰實陽虛

煩為熱輕躁為熱重此亦傷寒家語也雜症之
煩躁又各有虛實寒熱不同須當分別而治虛
煩者心中擾亂精神不能任持似脹不脹悒〻
悶〻飲食不甘美睡臥不安寧者是也治以養
心血虛火安神之劑如安神丸之類實煩者或
心火熾盛或水飲痰涎停于胸膈壅悶不安者
是也治以消痰逐飲散邪之劑如梔子豆豉湯
蠲飲湯五苓散之類陽躁者煩渴欲飲憤激躁
怒二便不利經云諸躁狂越皆屬于火者是也

治如丹溪用妙香丸之類陰躁者渴不欲飲極
其躁擾或上熱下寒此為陰盛格陽為陽氣虛
憊不能復入皇〻欲死非中者是也治以理中
湯四逆湯之類大抵煩症多屬于虛經曰夏脉
者心也其不及令人煩心又云肝腎脾虛皆令
人体重煩冤逆是知煩多由于虛也當尋傷寒
法外之治今録治方于左以備採用

內外俱虛身冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆不
得安靜者死　熱病七八日其脈微細小便不
利加暴口燥脉代舌黒焦乾者死

保命集云起臥不安睡不穩謂之煩宜梔豉湯竹
葉石膏湯

活人書云但獨熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相
似但不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發
汗頭不痛脉不緊数故知非裏實也不可下病
此者內外皆不可攻〻之必遂煩渴當與竹葉
湯若嘔者與陳皮湯一劑不愈再與之孫真人
云此法數用有効

陳皮湯　陳皮一兩半　甘草炙　竹茹各五錢　人參一錢半
每服七錢姜三片枣二枚水煎服

淡竹茹湯　心虛悶頭疼短氣內熱不解心中悶
亂及產婦心虛驚悸煩悶欲絕
麥門冬去心　小麦各兩半　甘草炙一兩　人參　茯苓各一兩半
半夏湯洗二兩　每服四錢姜七片枣二枚淡竹
茹一塊水煎服

東垣硃砂安神丸　心亂煩熱怔忡心神顛倒兀
兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊憹之狀皆膈上

血中伏熱蒸蒸不安宜用權法以鎮陰火之浮行以養上焦之元氣用甘草之甘溫補之當歸生地又為長生陰血之聖藥黃連去心煩除濕熱硃砂納浮游而安神明　方見怔忡門

仲景下痢後更煩按之心下濡者為虛煩也梔豉湯主之

丹溪治一女子年二十餘歲在室素強健六月間發煩悶困倦不食發時欲入井六脈皆沉細而弱數兩日後微渴衆以為病暑治不効四五日加嘔而人瘦手心極熱喜在陰處漸成伏脉時妄語予急製局方妙香丸如梧子大以井水下一丸半日許大便藥已出病無退減遂以射香水洗藥以針穿三竅次日以涼水送下半日許大便下稠痰數升是夜得睡困頓伏枕旬日而愈因記金匱云昔肥而今瘦者痰也遂作此藥治之

妙香丸　丹溪云疏決腸胃制伏木火藥也

辰砂飛五兩　牛黃　龍腦　膩粉　射研各一兩　巴豆一百五十粒去皮膜炒熱研　金箔九十片　右研勻煉黃蠟六兩入好蜜三分同煉令勻為丸每兩作三十丸如要此藥速行針刺一眼子冷水浸少時服効更速小兒百病丸如菉豆大

遠志湯　治心虛煩熱夜卧不寧及病後虛煩

遠志去心　黃芪　當歸　麥冬　石斛　酸棗仁各一錢二分　人參　茯神各七分　甘草五分　水煎服

煩甚者加竹葉知母

竹葉湯　傷寒大病後及霍亂吐瀉後心虛煩悶內熱不解　竹葉　麥冬　人參　茯苓　小麥　半夏各一兩　甘草五錢　每六錢姜五片水煎服

小草湯　虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草　黃芪　川歸　麥冬　石斛　酸棗仁各一兩　人參　甘草各五錢　每六錢姜五片水煎服

地仙散　傷寒後伏暑後煩熱不安及虛勞不安

地骨皮二兩　防風一兩　甘草五錢　每六錢姜五片水煎服

竹茹麥冬湯　大病後表裏俱虛內無津液煩渴

心躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不痛不可汗下者　淡竹葉　麥門冬等分　每八錢水煎

酸棗仁湯　霍亂吐下後增劇虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁一兩七錢半　人參　桂心各二錢半　知母　茯苓各三錢　石膏五錢　甘草二錢　每七錢姜棗煎服

人參竹茹湯　胃口有熱嘔吐欬逆虛煩不安

人參五錢　半夏一兩　分二帖加姜七片陳皮二錢半竹茹一錢水煎服

竹茹石膏湯　大病後餘熱煩悶

溫膽湯　大病後虛煩不得眠及驚悸

五苓散　水停心下作驚悸煩悶

清心蓮子飲　方見癃閉門

梔子豆豉湯　治邪在上焦

四逆湯

理中湯

健忘門

戴元禮曰健忘者爲事有始無終言談不知首尾此以爲病之名非比生成之愚頑也

靈樞經曰人之善忘者何氣使然岐伯曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心氣虛虛則榮衛留于下久之不以時上故善忘也

丹溪心法曰此証皆由憂思過度損其心胞以致神舍不清遇事多忘病在心脾凡思傷脾以故令人轉盼遺忘治之以歸脾湯須兼理心脾神寧意定其証自除也

歸脾湯　思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白朮　茯神　黃芪　酸棗仁各一兩　人參　木香各五錢　甘草二錢半　每六錢姜三片棗二枚圓眼肉五枚水煎服

定志丸　心氣不定恍惚多忘

遠志　石菖蒲各二兩　人參一兩　白茯苓三兩

右末煉蜜丸梧子大硃砂爲衣每服三十丸米飮下　一方加茯神

加味茯苓湯　痰迷心竅健忘失事

二陳湯加益智仁香附人參姜水煎服

讀書丸 健忘服之日記千萬言

石菖蒲 兎系子 遠志各一兩 地骨皮二兩 生地 五味子 川芎各一兩 為末薄糊丸梧子大每服七八十丸臨卧白湯下

孔子大聖枕中湯 常服令人聰明

龜甲 龍骨 遠志 菖蒲 各等分為末酒服方寸匕日三服

聖惠千金翼同 補心虛治健忘令人耳目聰明以戊子日服之開心不忘

菖蒲 遠志 各等分為末每服方寸匕常服令人耳目聰明從外見裏令人長生去三百病毒不能為害

二丹丸 安神定志和血治健忘

熟地黄 天門冬 丹參各一兩半 茯苓 甘草各一兩 遠志 人參各五錢 麦門冬一兩 右末煉蜜丸梧子大硃砂五錢為衣每服五十丸白湯下

又讀書方

菖蒲遠志桂甘草 地骨人參巴戟天

倍煮茯苓糊丸服 讀書日記萬千言

狀元丸 教子第一方

菖蒲去毛 遠志去心甘草水煮各一兩 白茯神去皮木 巴戟天水煮去心五錢 人參 地骨皮去心各三錢

右末用白茯苓去皮二兩糯米二兩共為粉用石菖蒲三錢煎濃湯去渣打糊為丸每食後午時臨睡各服三五十丸

赤水玄珠第十五卷目録

秘結門
大小便不通
閉癃遺溺不禁辨
小便不通門
癃門
遺溺門
小便不禁門
溺赤
脫肛門 附腸癖
前陰諸疾門
疝門

赤水玄珠第十五卷

新安生生子孫一奎著輯

秘結門

經曰大便者腎之所主腎主五液也腎氣充則大便潤虛則津液耗竭而燥結矣又飢飽勞役損傷胃氣及食辛熱厚味之物而助火邪伏於血中煎熬真陰皆能使大便燥結又有年老陰血不足而燥者惟當補而潤之不可用峻利之劑又大便燥結者不得發汗汗則重亡津液必秘結而死矣

有陽結有陰結有風結有實結有虛結有氣秘有血秘

仲景曰脉浮數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇脉沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇陽結者散之陰結者熱之風結者諸藥中加羌活防風之類此二味雖是風藥然味辛所以能潤燥也經曰腎惡燥急食辛以潤之

潔古曰臟腑之秘不可一槩治療有虛秘有實秘胃實而秘者能食小便赤以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛不能食而小便清利者厚朴湯主之實秘者物也虛秘者氣也

東垣曰有物有積而結者當下之食傷太陰腸滿食不化腹響響然不能大便者以苦泄之（仲景麻仁丸局方七宣丸皆以大黃爲君之類是也）治注夏大便澁滯者血少血中伏火也黃蓍人參湯加生地當歸身桃仁泥潤之如潤之大便仍久不快者少加煨大黃微利之如加大黃久不快利者非血結血秘是熱生風止當服黃蓍人參湯內用羌活防風各五錢水四盞煎至一盞空心服之其便必大（走也）

丹溪戒人用峻利但宜滋養陰血使孤陽之火不熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行津液津液入胃則腸潤而通矣須知在西北以開結爲主在東南以潤燥爲主慎勿膠柱而調（瑟也）

王海藏云桃杏仁俱治大便秘當以血氣分之年老虛人大便秘脉浮在氣杏仁陳皮主之脉沉

在血桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以其手陽明病與手太陰爲表裏也

（脉多沉伏而結 陽結脉沉實而數 陰結脉伏而遲或結 老人虛人便結脉雀啄者不治）

七宣丸

柴胡 枳實（麩炒） 訶子皮 木香（各五兩） 桃仁（去皮尖炒六兩） 甘草（炙四兩） 大黃（麪包煨十五兩） 右煉蜜丸桐子大每服二十丸米飲下漸加四五十丸以利爲度

厚朴湯 胃虛而秘者不能飲食小便清利

陳皮 半夏麴（炒） 枳實（炒各一兩） 甘草（炙） 厚朴（製各二兩） 白朮（三兩） 每三五七錢姜三片棗一枚水煎服

保命集大黃牽牛散 相火之氣遊走臟腑大便秘結 大黃（一兩） 牽牛（頭末五錢） 爲細末每三錢有厥冷合用酒調無厥冷而手足煩熱者蜜湯調下食後以微利爲度此謂不時而熱者濕熱也凡用大黃半兩至一兩而大便不通利者加射香少許調于藥中則大便必大走也

半硫丸 治年高虛秘冷秘 方見燥門

大潤腸丸　治大便秘澁通用
杏仁炒　枳殼　麻仁　陳皮各五錢　阿膠　防風各二錢半　右煉蜜丸梧子大每五十丸老人蘇子煎湯下壯者荊芥湯下

麻仁丸　實秘能飲食小便赤此丸與七宣丸主之　枳殼　川芎等分　麻仁泥減半
煉蜜丸梧子大食前溫水下

又麻仁丸　風秘脾約症小便數大便秘
大黃　枳殼　赤芍藥各一兩　厚朴五錢　麻仁杏仁各一兩二味俱另研　煉蜜丸梧子大每服三五十丸

皂角丸　治有風人大便秘澁
牙皂　枳殼　羌活　桑白皮　檳榔　杏仁麻仁　防風　白芷　陳皮等分
蜜丸梧子大每服三五十丸蜜湯下

皂角枳殼丸　大腸有風秘結老人宜服
皂角炙去皮子　枳殼炒各等分
蜜丸梧子大每七十丸空心食前米飲下

搜風順氣丸　治大腸秘澁
大黃五兩半熟半生　山茱萸　麻仁泥　郁子仁泡去皮研　兎絲子　山藥　牛膝　檳榔各二兩　防風　枳殼　獨活各一兩　車前子二兩半　煉蜜丸梧子大每二三十丸米飲下平旦臨卧各一服

二仁丸　治老人虛人風秘不可服大黃者妙
麻仁　杏仁　枳殼　訶子等分
蜜丸梧子大每三十丸溫水下未利增之

四磨湯　氣滯腹急大便秘澁
沉香　木香　檳榔　烏藥等分　各磨半鍾和勻溫服有熱者加大黃枳殼名六磨湯

橘杏丸　治氣秘老人虛弱人皆可服
橘紅　杏仁等分　煉蜜丸梧子大每七十丸空心米飲下

蘇麻粥　順氣滑大便　蘇子　麻仁　二味不拘多少研爛水濾取汁煮粥食之

蓯蓉瑣陽粥　老人陰血不足大便燥結
肉蓯蓉　瑣陽　煮粥服

小通氣散　虛人憂怒傷肺致令秘澁曾服燥藥而大便秘

陳皮　蘇葉　枳殼　木通等分　水煎服立通

金液丹　治扶冷結滯兼治傷寒陰結以杏仁麻
仁煎湯呑下　方在寒門

神功丸　治氣壅風盛秘結後重疼痛煩悶
大黃　訶子各四兩　人參　麻仁各二兩
右蜜丸梧子大每二十丸米飲下食後臨卧
服此藥虛實加減

小柴胡湯　治傷寒陽結能食而大便結

檳榔丸　治大腸實熱不通心腹脹滿

八十五卷　六

檳榔　大黃　麻仁　枳實　羌活　杏仁
牽牛　白芷　黃芩各一兩　人參五錢
蜜丸梧子大每四十丸空心溫水下

四順清涼飲　治同前　每加灯心十根枳殼十
片水煎服効

檳榔散　治腸胃有濕大便秘結
檳榔不拘多少為末每服二錢蜜湯點服

香藾散　治同上　加枳殼檳榔水煎服

五仁丸　津液枯竭大腸秘結傳道艱難
桃仁　杏仁各一兩　栢子仁　郁李仁　松子仁各二錢半　陳皮四兩為末另　右五仁另研為膏入陳皮末
研勻蜜丸梧子大空心米飲下五十丸

調氣滋補溫腸丸　治發汗利小便亡津液以致
秘結　沉香一兩為末另　肉蓯蓉二兩　為末用麻子
仁汁打糊為丸梧子大每七十丸空心米飲下

潤腸丸　治脾胃中伏火秘結及風結血結
桃仁　麻仁　當歸尾　大黃　羌活各五錢　升
麻　紅花　郁李仁　右除桃麻仁另研為泥

八十五卷　七

外餘為末煉蜜丸梧子大每三五十丸空心
白湯下
一方加防風三錢　皂角仁燒存性兩半　無升麻以下二味

威靈仙丸　治年高氣衰津液枯燥秘結
黃耆　枳殼　威靈仙等分
煉丸梧子大每五七十丸薑湯熱水任下

陳黃湯　治老人大便秘結
黃耆　陳皮各五錢為末　每服三錢用火麻仁一合
研爛以水投取汁一鍾濾去渣于銀石器中

煎候有乳花起即入白蜜一大匙再煎令滚
調藥末空心服
獨棗湯 治大便積日不通
大棗一枚劈開入輕粉五分依舊合起以麻線
縛扎慢火水煮熟嚼碎以棗汁送下
丹溪治虛熱大腸秘
白芍藥一兩半 陳皮 生地黃 當歸身各一兩 條
芩 甘草各一錢 右粥丸每七八十丸白湯下
潤麻丸 治血燥大便不通出丹溪秘方

麻仁 當歸 桃仁 生地黃 枳殼各一兩
蜜丸梧子大每五十丸空心白湯下
導滯通幽湯 治大便難幽門不通上冲吸門不
開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤
之 當歸身 桃仁泥 升麻各一錢 生地 熟
地各五分 炙甘草 紅花各三分 水煎食前調檳榔
末五錢或加麻仁泥一錢若加大黃名當歸
潤燥湯
潤燥湯

升麻 生熟地黃各二錢 當歸梢 生甘草 大
黃煨 桃仁泥 麻仁泥各三錢 紅花五分
右除二仁另研作一服水煎數沸下二仁煎
空心熱服
活血潤燥丸 治大便風秘血秘時常燥結
當歸稍一錢 防風三錢 大黃濕紙裹煨 羌活各一兩 桃仁
麻仁各二兩研如泥 皂角燒存性一兩二錢其性得濕則滑又則燥濕自解
右除二仁另研外餘為末蜜丸梧子大空心
服五十丸白湯送下三兩服後以蘇子麻仁

粥每日早晚食之大便不致燥結以磁器盛
藥紙封
脾約麻仁丸和劑方 治腸胃熱燥大便秘結
厚朴去皮姜製 芍藥 枳實麸炒各八分 杏仁去皮尖炒
麻仁另研各五錢 大黃蒸焙一兩六錢 蜜丸梧子大每二
十丸臨卧温水下以通利為止
潤腸丸 治大便秘澁連日不通
麻子仁一盞半細研用水浸濾去皮取汁 芝麻半盞微炒研用水浸取汁
桃仁泡去皮尖炒黃研如泥 荊芥穗為末各一兩

右前藥入盐少許同煎可以代茶飲之以利為度

三和散　治七情之氣結于五臟不能流通以致脾胃不和心腹痞悶大便秘澁

川芎三兩　羌活去芦　紫蘇去梗　沉香　宣木瓜　白术

木香　檳榔　陳皮　甘草各七錢半　大腹皮

每服五錢水煎服

木香三稜散　治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑丑半生半炒君　大腹子君　檳榔　木香　三稜煨

雷丸　莪术煨　錫灰醋炒　大黃已上各二兩

右為末每服三錢空心蜜水調下或砂糖水亦可須先燒肉一片口中嚼之久久吐出口中肉汁然後服藥

大小便不通

烏桕湯　治大便不通如神亦能通小便

烏桕木皮方一寸七劈破以水煎取小半盞服之立通不用多服其功神聖兼能取水或以此湯調下五苓散二錢空心服

推車散　治大小便秘經月欲死者

推車客七枚　土狗七枚　如男子病推車客用頭土狗用身　如女子病土狗用頭推車客用身　右新瓦上焙乾為末用虎目即虎杖樹皮向南者濃煎汁調只一服經驗如神

皂莢散　治大小便閉格不通經三五日

不炷皂角燒灰米湯調下三錢即通

甘遂散　治大小便不通

甘遂二兩　用赤皮者為末煉蜜二合和勻每一兩重分作四服蜜水下如未効第二服漸加之

蜜硝湯　治大小便不通

好蜜一鍾入皮硝二錢用滾水一碗空心調下主通

導引法　蜜二匙　葱汁二匙　猪膽汁二匙　青黛二分

皂角末五分　玄胡索三分　右同和一處以猪小腸一節將此藥灌入腸内一頭用竹筒一箇兩頭俱用線扎定將竹管入肛門徐徐擠藥進去肛門滑藥氣即通神効

蜜兊法　凡諸秘結不通或兼他症及老弱虛極不可用下藥者　蜜熬老入皂角末少許以葱

作骨乘熱捍作兊候冷硬用油塗肛門揷入立通

猪膽汁導法　大猪膽一枚瀉汁和醋少許入竹管灌穀道中少刻即通

霹靂煎　用塩與蜜乘熱捍如蜜兊法上頭銳用寸許納入穀道中少刻化開即通

一法　用蜜兊不通者　用塩吹入肛門亦妙

提盆散　治雜病非陰候者

草烏頭不拘多少為極細末每用葱一枝肥者削去鬚圓頭上有汁濕蘸之納穀道中

海藏用塩與蜜兊相合如用草烏頭末相合亦可蓋塩能軟堅潤燥草烏能化寒消結可隨症陰陽所宜用之

宣積丸

巴豆　乾姜　韭子　良姜　硫黄　白檳榔

甘遂各等分　為末研飯為丸圓眼大早朝先用椒湯洗手麻油塗手掌口握藥一粒移時便瀉欲止以冷水洗之

大小便不通

塩燒紅填臍內切蒜一片蓋塩上艾炷灸三五壯即通

孫尚治趙令女忽吐逆大小便不通煩亂四肢漸冷無脉凡一日半與大承氣湯一劑至夜半漸得大便通脉漸和翌日乃安此関格之病極為難治垂死而活者惟此一女耳

孫兆方　治大小便不通

皂角燒存性為末粥飲調下三錢立通

外臺秘要方　治脹滿大小便不通

獨蒜煨熟去皮綿包納入下部氣立通

止吐透格湯

藿香　砂仁　白叩仁各一錢　陳皮　半夏各二錢

茯苓　厚朴　蒼术各一錢半　水二鍾煎七分入姜汁三匙徐徐頻服如火熱者去藿香叩仁加

黄連姜汁炒　山梔竹茹鬱結氣滯者加香附貝母檳榔

通関導滯散

木香　檳榔　枳殼　當歸尾　厚朴各一錢半

大黄三錢　如小便不通加瞿麥木通滑石各一

錢半或用八正散水煎食前服

閉癃遺溺不禁辨

生生子曰閉者小便不出塞而不通也癃者罷弱而氣不充淋淋瀝瀝點滴而出或澁而疼一日数十次或百次俗名淋病者是也閉則多是急病癃則是緩病遺溺睡夢中溺出醒而方知是也不禁者日夜無遍数頻頻而溺也今各分枝門詳載治法以見新久虛實寒熱氣血各有所攸重也惟肝與督脉三焦膀胱主之

經云肝主小便淋溲肝足厥陰之脉遶陰器所生病者遺溺閉癃又云督脉者女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其男子循莖下至簒與女子等其生病癃痔遺溺故遺溺閉癃皆取厥陰腧穴及督脉腧穴也又三焦主之者經云三焦下脉在于足太陽之前少陽之後出于膕中外廉名曰委陽足太陽絡也三焦者足太陽少陽之所將太陽之別也上踝五寸別入貫腨腸出於委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癃虛則遺溺遺溺則補之閉癃則瀉之是也又膀胱主之者經云膀胱不利為癃不約為遺溺然遺溺閉癃不取膀胱腧穴者蓋膀胱但止藏溺其出溺皆三焦及肝督脉也又經云三焦者決瀆之府水液出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣由是言之膀胱藏水三焦出水治小便不利故刺灸法但取三焦穴不取膀胱穴也

小便不通門

東垣謂小便不通有在氣在血之異夫小便者足

太陽膀胱所主長生於申申者西方金也金能生水金者肺也肺中伏熱水不能生是絕小便之源也人法象天地膀胱之源自頭項下至于足故曰陽中之陰如渴而小便不通者肺不能降是也治法者用清燥金之正化氣味薄之藥茯苓猪苓澤瀉琥珀燈心通草車前子瞿麥扁蓄之類皆為淡滲之藥能瀉肺火而清肺金滋水之化源也若不渴熱在下焦是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之二者

之病一居上焦在氣分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有濕故不渴也二者之殊至易分別耳

綱目云氣鬱于下微者香以散之甚者吐以提之血鬱于下微者輕劑行之甚者峻劑破之

丹溪云小便不通有氣虛血虛有實熱有痰氣閉塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋氣乘載其水也先哲譬之如滴水之器必使上竅通而後下竅之水出焉氣虛參朮升麻先服後吐

血虛四物湯先服後吐痰氣閉塞者二陳加木通香附探吐實熱當分利之或八正散大便動則小便自通老人氣短者四物加參芪吞滋腎丸下焦血氣乾者死

統旨云氣虛而小便不通者經曰膀胱者津液藏焉氣化則能出矣氣虛則不能化故不通也血虛而小便不通者蓋血即津液之屬血虛即津液燥而溺道不利故不通也與痰氣閉結於下者虛實之情不同今丹溪皆用吐法乃急則治其標也雖然氣虛血虛以虛為本虛則必補之而後可夫以參朮四物調其真氣而吐之誠可以通其溺而其本之虛也豈參芪四物之類頃刻下咽遂能以補益之耶吾恐病根猶在不久必復作故愚意以為若果氣虛血虛必用補氣補血之藥使其氣盛而施化血生而津潤其便自可以通不必探吐果宜吐者必須先吐俟其溺通繼服補劑庶可平復非如痰氣閉結者但吐之而可已此丹溪未盡之意予故表而出之

戴元禮云汗多而小便赤澁夏月多有此症盛暑所飲既多小便反澁緣上停為飲外發于汗津道不通小腸閉澁則水不運下五苓散然有虛勞汗多而反澁者乃是五內枯燥滋腴既去不能生津當以温養潤肺十全大補湯或養榮湯不可過用利小便藥蓋汗者心液心主血養血則心得所養汗止金生不待通溺而自清矣諸失精血及患癰毒人或有小便反澁之症亦是枯竭不潤之故也

羅太無曰小便不利有三不可槩論若津液偏滲于腸胃大便泄瀉而小便澁少者一也宜利而已若熱搏下焦津液則濕熱不能行者二也必滲泄則愈若脾胃氣澁不能通調水道下輸膀胱而化者三也可順氣令施化而出

丹溪云諸淋皆屬于熱余每用黄柏滋腎丸每百丸用四物湯加甘草稍杜牛膝木通桃仁滑石木香煎湯空心吞服兼灸三陰交如鼓應桴累試累効

保命集云淋閉者凉膈散加滑石四兩茯苓一兩

治熱在氣分之劑

東垣清肺散 治渴而小便閉或黄澁邪熱在氣分

茯苓一錢 猪苓 澤瀉各三錢 琥珀 瞿麥 桂各五分 通草 燈心各二分 木通 萹蓄各七分 車前子炒一錢

每服五錢水煎熱服五苓散八正散亦宜用

仲景猪苓湯 治脉浮發熱渴而小便不利

猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉各一兩

水四升煎二升去渣内膠煎溶温服一日三服

茯苓戎鹽湯

茯苓半斤 白朮二兩 戎鹽彈丸大一枚

為末白湯調下

清肺飲 治肺燥而小便不通

黄芩一錢 山梔子三枚 鹽豉二十粒 長流水煎服

治熱在血分之劑

東垣滋腎丸 下焦陰虛脚膝軟無力陰汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉者邪熱在血分也

黄柏 知母俱酒洗焙各一兩 肉桂二錢

右滚水為丸梧子大每百丸加至二百丸煎百沸湯空心服

潔古黄連丸 治因服熱藥過小便不利諸藥莫能効者或臍下痛不可忍

黄連炒 黄柏炒 甘草各等分 水煎服

如耳不通加知母此藥助氣使氣得化則通矣

羅太無白花散 治小便不通膀胱有熱

朴硝為末每服二錢煎茴香湯調下

東垣導氣除燥湯　小便不通乃血湿致氣不通而竅澁　知母酒洗　滓瀉各三分　黄栢四錢　滑石炒　茯苓各二錢　水煎不拘時服

小便不通腹下狀如覆梳痛悶難忍者乃腸胃乾涸膻中氣不下則便不化啓玄子謂胞器若滑氣海之氣施化則溲便下氣海之氣不及則隱秘不通故不滑便利也先用木香沉香各三錢酒調下令氣通達便自通利

又方　煎陳皮茯苓湯調木香沉香末服之

上二方正綱目所謂氣欝于下微者香以散之是也

丹溪治氣欝於下甚者以吐法提之

血欝于下小便不利微者輕劑行之如蒲灰散滑石白魚散茯苓戎盐湯皆主之

仲景蒲灰散

蒲黄粉七分　滑石三分　為細末白湯調一日三服

滑石白魚散

滑石　乳髮灰　白魚各二分乃衣魚也　為末米飲服五分一日三服

羅太無髮灰散　治臍下急滿小便不通

髮灰二錢　米醋二合調服　一法與葵子等分為末米飲服二錢訖即炒黑豆葉盖其上即通

右滑石能逐汚血蒲黄髮灰能消汚血丹溪謂髮髮補陰之功甚捷

血欝于下小便不利甚者峻劑破之

本事桃仁煎治婦人積血小便不通臍腹脹疼不可忍衆醫皆作淋治如八正散之類數種皆治不効診之乃知血瘕也非瞑眩藥不可去予用此藥得愈　桃仁　大黄　朴硝各一两　虻虫半两炒黑　四味為末先以醇醋二升半銀石器內慢火煎取一升五合下大黄桃仁虻虫等不住手攪良久出丸如梧子大前一日不晚食五更初温酒吞下五丸至日午腹大痛不可忍卧少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁或如鷄肝蝦蟇衣狀其痛止此藥極峻氣虚血弱者不可輕用凡用宜少服之漸加可也

如見鮮血即止藥續以補藥調理此方出千金方

倒換散 治癃閉大小便不通小腹急痛肛門腫

痛 大黃小便不通減半 荊芥穗大便不通減半

爲末每服二錢溫水調下

朴硝牛膝湯 治小便不通或血淋

杜牛膝二兩 以雪水二碗煎至一碗調朴硝一

兩空心服立通

雜方

治小便閉 用大田螺生去殼搗細封臍上即通 入十五卷 三

治傷寒後小便不通 入十五卷

生姜八九塊杵碎水十餘碗麻布五六尺同煎

數沸用桶盛候可通手以布蘸熨小腹良久恰

用紅豆末一錢 江茶二錢 井花水調服神効小便如注

本事方 治小便難小腹脹急不速治即死

葱白一斤細切炒令熱以帕子裹分作兩處更

替熨臍下即通

聖通方 治小便難腹滿悶不急療即死

秦艽一兩去芦 以水一大碗煎七分食分二服服之虛

濟世方 治小便不通

杏仁二十一枚 研碎水調分作二服効

千金方 治婦人卒不得小便用紫菀末以井水

調服三撮便通如小便血五撮立止

灸小便淋澁法

炒鹽不拘多少熱填滿病人臍中是神闕穴也

却用筋頭大艾炷灸七壯良驗或灸三陰交穴

又法 治小水秘澁

猪膽連汁籠套玉莖少刻汁入即通 入十五卷 三

婦人用藥末貯袋子安入玉户中必通

玄珠經云陰陽關格前後不通利小水自行中有

轉胞之症諸藥不効無救則脹滿悶亂而死曾

以甘遂末水調敷臍上內以甘草節湯飲之藥

汁至臍二藥相反而胞自轉小水來如湧泉此

救急良方

一法 治小便不通諸藥無効或轉胞至死

用猪尿胞一箇底頭出箇小竅用翎筒通過放

在竅內根底細線繫定翎筒口子細杖子堵定

上用黄蠟封尿胞口頭吹滿氣七分繫定了再
用手捻定翎筒根頭放了黄蠟堵塞其翎筒放
在小便頭放開翎筒根頭手其氣透入裏自然
小便下神効

瓜蔞散　治腹脹小便不通
瓜蔞仁　不拘多少為末每服三錢温酒調下
如不能食酒米飲下以通為度

葵子散　治小便不通
黄蜀葵子　赤茯苓各二錢　水煎服

鷄蘇散　治小便不通
鷄蘇一握　生地　通草各四兩　滑石　石葦去毛各一兩
冬葵子半兩　以水六碗煎至三碗分三服空
心進一服約人行五里路又進一服
一方加榆莢黄芩車前子

治小便不通垂死者
玄明粉一兩　淡竹葉三十片　灯心五分　煎湯徐徐調下即通

治老人虚人小便不通　亦治心痛
琥珀為末人參湯調下妙

王海藏云脬轉小便不通非膀胱小腸厥陰之氣
也盖因強力房事或過忍小便以致此疾非可
利之藥所能利之法當治氣宜以沉香湯主之
沉香　木香各三錢
為細末煎陳皮茯苓湯空心食前調服

痳門

生生子曰痳羅也下元羅憊而氣餒弱不能施化
故小便淋瀝點滴而下是又稱為淋也

陳無擇曰淋古謂之痳名稱不同也痳者羅也淋
者滴也古方皆云腎氣虧致小腸膀胱不利澁

有冷淋濕淋熱淋等屬外所因既言心腎氣虧
與驚思恐憂即内所因况飲啖冷熱房失勞役
及乘急忍溺多致此病豈非不内外因也大率
有五曰冷曰熱曰膏曰血曰石五種不同皆以
氣為本

嚴氏曰五淋氣石血膏勞是也氣淋為病小便澁
常有餘瀝石淋莖中痛尿不得卒出膏淋尿似
膏出勞淋勞倦即發痛引氣衝血淋遇熱即發

甚則溺血候其鼻頭色黃者小便難也大抵此症多由心腎不交積蘊熱毒或酒後房勞服食熱燥七情鬱結所致癃閉淋閟為病皆一類也

張子和曰世人多為服金石燥熱之劑淂之常見農家有此症豈是服金石之人也大抵是膀胱蓄熱而成此疾如湯瓶久在火中煮瓶底白鹹而不能去沙石淋之症與此理同 劉宗厚曰此譬極當內經云小腹熱溲出白液亦甚似之也

東垣曰凡小便癃閉是無陰而陽氣不化也凡

利小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥陽中之陰非北方寒水陰中之陰所化者也此乃奉養太過膏粱積熱損北方之陰腎水不足膀胱腎之室久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦非膈上所生也獨為關非格病也潔古云熱在下焦填塞不便是治關格之法因治王善夫病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極腿脚腫脹破裂出黃水雙睛突出晝夜不淂眠飲食不下苦痛不可名狀求予治之因問受病之始知病不渴近苦嘔噦衆醫皆用治中滿利小便滲淡之藥急難措手乃辭歸從夜至旦耿耿不寐窮究其理記素問有云無陽則陰無以生無陰則陽無以化此病小便癃閉是無陰則陽無以化也今病者內關外格之症悉具死在旦夕但治下焦可愈隨處以北方寒水所化大苦寒之氣味俱陰者黃栢知母為君桂為引名曰滋腎丸沸湯下二百丸少頃前陰如刀刺火燒之痛溺出如瀑泉卧具皆濕床下成流顧

盼之間腫脹消散予驚喜曰大哉聖人之言豈可不遍覽而執一者也其症小便閉塞而不渴時見煩燥者是也凡諸病在下焦皆不渴也

千金方 治小便淋痛以杜牛膝以酒煮服

肘後方 以杜牛膝根莖葉酒煮服治小便不利莖中痛欲死及治婦人血結堅痛如神蓋牛膝治淋之聖藥也但虛人當用補藥監治之耳

仲景云淋家不可發汗發汗則便血

寶鑑曰痺論云胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃

以湯溢於小便上爲清滌夫膀胱爲州都之官津液藏焉氣化則能出焉令風寒濕邪客于胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其症小腹膀胱按之内痛若沃以湯澁于小便以足太陽經其直行者上交額下入絡腦氣下灌於鼻竅則爲清涕也

劉宗厚曰按此則知淋閉有寒熱之殊大抵人之所禀虚實受病不同宜叅脉理分治

方古庵云淋症其感不一或因劳房厚味醇酒忿

怒所致夫房劳者陰虚火動也忿怒者氣動生火也醇酒厚味者釀成濕熱也積熱既久熱結下焦所以小便淋澁欲去不去不去又來而痛不可忍者初則熱淋血淋久則煎熬水液稠濁如膏如沙如石也諸方中類多散熱利小便而于開欝行氣破血滋陰蓋少焉若夫散熱利小便只能治熱淋血淋而已其膏淋沙淋石淋三者必須開欝行氣破血滋陰方可也古方用欝金琥珀開欝藥也用青皮木香行氣藥也用蒲黄牛膝破血藥也用黄栢地黄滋陰藥也東垣用藥凡例小腹痛用青皮黄栢夫青皮疏肝黄栢滋腎緣小腹小便乃肝腎之部位也學者不可不知

治熱之劑

火府丹　治心經熱小便澁及治五淋臍下滿痛

生地　木通　黄芩　甘草

煉蜜杵丸梧子大每二十丸木通煎湯下

導赤散　治心蘊虚熱小便赤澁或成淋痛

生地　甘草　木通　加竹葉水煎服

車前子散　治諸淋小便痛不可忍

車前子五錢　淡竹葉　赤茯苓　灯草　荆芥穗各二錢　分二帖水煎服

地膚子湯　治諸病後体虚觸熱熱結下焦小便赤澁多起少出莖痛如刺或尿血

地膚子　猪苓　知母　黄芩　海藻　通草　瞿麥　枳實　升麻　葵子各等分　姜三片水煎服

立效散　治下焦結熱小便淋閉作痛有時尿血

甘草三兩炙　瞿麦一兩　山梔仁五錢炒　每一兩姜
三片葱白三根灯心三十根水煎服
通草湯　治諸淋
通草　葵子　茅根　蒲黄　當歸　王不留
行　梔膠　瞿麥　滑石各一兩　甘草五錢
每一兩姜五片水煎服
石葦散　治膀胱有熱淋瀝不去臍腹急痛蓄作
有時勞役即發或尿如豆汁或出沙石並治
芍藥　白朮　滑石　葵子　木通　瞿麥各二
八十五卷　卅
兩　當歸　甘草　王不留行各一兩　石葦去毛二兩
為末每服二錢空心小麦湯調下
五淋散　腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不
出或如膏如沙如石如豆汁並治之
赤芍藥　山梔仁各十兩　當歸　甘草生各五兩　條芩
三兩　赤茯苓六兩　每服七八錢水煎
八正散　治大人小兒心經蘊熱臟腑閉結小便
赤澁癃閉不通熱淋血淋膏淋沙淋石淋並皆
治之　車前子　瞿麦　扁蓄　滑石　甘草

山梔　大黄麵包煨　木通各等分　每服五七錢入灯
心十莖煎至六分食前服
又方　治諸淋
四苓散二錢　益元散　山梔子各一錢
灯心三十根水煎服
又方　益元散加車前子末一錢　或加阿膠一錢
石葦飲　治小便不利莖中痛
石葦去毛　冬葵子各二兩　瞿麦一兩　滑石五兩　車前子三兩
為末每服二錢日三服熱水下
八十五卷　三七
葵花湯　治小便淋澁
葵花根洗淨搗碎水煎服
又方　治沙淋
車前草搗汁半碗入蜜一兩懸井中五更取起
溫服若是沙淋石淋則以煅寒水石為末調服
如治白淋用砂糖
治淋閉莖中作痛神効方
石葦　滑石　瞿麦　扁蓄　木通　冬葵子
王不留行　地膚草各等分　為末每服三錢白湯調下

一方 治淋及尿血立効
旱蓮草 車前草 同取汁每服半碗
一方 治淋痛及尿血
側栢葉 藕節 車前子等分
取汁調益元散三錢神効
治石淋方
杜牛膝 搗碎水五碗煎至一碗去渣入射香
少許調服効
一方 治沙淋
石首魚腦骨五對火煅 滑石五錢 為末分二服煎木
通湯調下連服數劑看沙盡止藥
海金沙散 治膏淋
海金沙 滑石末各一兩 甘草二錢半
為末每二錢麦冬湯調服灯心湯亦可
一方 加木通瞿麦穗通草杏仁
鹿角霜丸 治同上
鹿角霜 白茯苓 秋石各等分
為末麺糊丸梧子大每五十丸米湯送下

大海金沙散 治小便淋瀝及下焦湿熱氣不施
化或五種淋疾癃閉不通
海金沙研 木通 瞿麦穗 滑石 通草各半兩
杏仁一兩去皮尖 每五錢入灯心二十根水煎服
牛膝膏 治死血作淋
牛膝四兩酒洗 桃仁一兩去皮尖炒 當歸尾二兩酒洗 赤芍
藥一兩半 生地一兩半酒洗 川芎五錢
用水以炭火慢熬至二鍾入射少許分作四
服空心服如夏月用凉水換此膏不壞
滋陰降火湯 治火燥血少氣不得降而淋
當歸 黄栢鹽水炒各一錢半 知母 牛膝 生地各一
錢 白芍一錢二分 甘草稍 木通各八分 水煎食前服
靈苑透膈散 治五種淋疾氣淋熱淋劳淋石淋
及小便不通至甚者 硝石一兩為末 每服二
錢各依湯使服 如劳倦虛損小便不出小
腹急痛葵子煎湯下通後更須服補虛丸藥
如血淋小便不出時下血疼痛並用冷水
調下 如氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木

通]煎湯下　如石淋莖内痛尿不能出内引
小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絶仔藥末
先入銚子内隔紙炒至紙焦爲度再研令細
温水調下　如小便不通小麦湯下　卒患
諸淋並以冷水調下　以上並空心先調藥
消散如水即服之更以湯使送下凡服藥未
効者服此立愈

靈苑方　治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澁疼痛
三葉酸漿草取嫩者擣汁一合酒一合攪匀空
〔六十五卷　二四
心服之立通　酸漿草即布谷飯

一方　治血石淋
湯擣蛙屑烏梅一大棗三水煎服

羅太無石燕丸　治石淋多因憂鬱氣注下焦將
所食鹹物結成砂石小便㵒痛不可忍必候砂
石出而後小便通　石燕(燒赤水中淬三次研水飛過)　滑石
石葦(去毛)　瞿麦穗(兩各一)　爲末糊丸梧子大煎灯心
瞿麥湯吞下十九一日三服

葛粉九　治男女淋病疼痛効速勿輕忽之

沙糖(本草云治心肺大腸熱)　葛粉　和九梧子大井花水
化開一二九

斗門方　治五淋
苧麻根兩莖打碎水煎頓服大妙(丹溪云苧根補陰行滞血)

治石淋方　螻蛄(一枚)　鹽(二兩)　用於新瓦上鋪盖
焙乾研末温酒調下一錢匕服下即愈

白薇散　治熱淋血淋
白薇　芍藥(等分)　爲末每服二錢温酒調下立
効或加檳榔
〔六十五卷　三五

一方　治血淋諸熱淋
山茵陳　淡竹葉　木通　山梔　滑石　甘
草　猪苓　瞿麥　每服五七錢加灯心煎服
大便秘加大黄

二神散　治諸淋急痛
海金沙(七錢半)　滑石(五錢)　爲末每服二錢木通麥
冬車前草煎湯入蜜少許調下

治淋悶便濁神方
五爪龍藤連根(一兩)　土茯苓　杜牛膝根(各八錢)

共用酒三碗煎至一碗空心服三服全愈

又治下疳如神五帖後疳愈再不發他瘡毒

腎瀝湯　治胞痺小便不利小腹急

麦冬　木通　桔梗　桑白皮　杜仲炒　犀角屑　五加皮各一錢　赤芍五分　水二鍾加羊腎一枚切碎煎至八分入竹瀝少許食前服

濟生木通散　小便不通小腹痛不可忍

木通　活石各一兩　黑丑頭末五錢

每服五錢灯心十莖葱白一莖水煎服

八十五卷　三六

治氣開鬱之劑

芍藥檳榔散　治五淋

赤芍藥一兩　檳榔一枚麪包煨

為末每服一錢匕空心白湯調下

丹溪　生氣藥

砂仁三錢　海金沙　紅曲　檀香各二錢　白荳仁　木香　丁香各一錢　分五帖研桃仁十四枚入生氣藥

治諸般沙石淋

琥珀二錢　研細末空心用葱白頭煎濃湯調下

無問諸般淋疾一二服神効本草云琥珀消瘀血極驗

通秘散　治血淋痛不可忍

陳皮　香附　赤茯苓等分　水煎服

沉香散　治氣淋疼㽲多因五內鬱結氣不舒行陰滯於陽而致壅滯小腹脹滿便溺不通

沉香　石韋　滑石　當歸　王不留行各五錢　葵子　芍藥各七錢半　甘草　陳皮　木香　青皮各二錢半

為末每服三錢煎大麥湯下

治卒淋急痛方

八十五卷　三七

益元散二錢　茴香一錢微炒黃　木香　檳榔各二分半

右為末水調服

琥珀散　治五淋砂石淋

滑石　琥珀各一兩　木通　當歸　木香　鬱金　萹蓄各五錢　為末每五錢以蘆葦葉煎湯調服

如無蘆葦葉以竹葉煎湯送下

一方　治同上

石燕子七枚搗如黍米大　新桑白皮三兩同拌勻

二味分作七帖用水煎一日三服

治肝經氣滯蘊熱小便淋痛方

甘草稍子五錢 青皮 黄栢 澤瀉各一錢

水煎服効

補氣血之劑

丹溪治朱郎小便淋痛脉大右濇此為劳傷經血勿作淋治可補血行肝經滞血自愈

生地 當歸 赤芍各一錢 川芎 條芩 甘草梢各二分 陳皮 木通各五分 黄栢炒二分 紅花一分 杜牛膝一錢 右以桃仁泥研滑石同煎待淋病退減桃仁滑石杜牛膝木通入川牛膝代木通分兩信之

氣虚者八物湯加杜牛膝黄芩煎服

老人氣虚亦餘淋参术中加木通山梔

治劳苦傷血脉沉而大下焦蘊結而淋

人参 歸尾 白芍 香附各五錢 條芩三錢 木通三錢 山梔仁炒三錢半 黄芪 甘草梢生各五分

分四帖煎杜牛膝湯煎服

茯苓琥珀湯 小便澁莖中痛不可忍相引脇下痛

川練子去核炒 甘草生一錢 人参五分 茯苓四分 琥珀 當歸梢 澤瀉 柴胡各三分 玄胡索七分

水煎服数服効

六味地黄丸 治久淋陰虚者

清心蓮子飲 治上盛下虚心火炎上口舌咽乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋並治之

黄芪蜜炙 石蓮肉 赤茯苓 人参各七錢半 甘草炙 車前子 地骨皮 麥門冬 黄芩各五分

每服七八錢水煎温服 發熱加薄荷柴胡

治氣虚脾虚消渴淋濁

人参 滑石各一錢 白术一錢半 赤茯苓 澤瀉各七分 麥門冬 甘草各五分 竹葉三十片

加灯心二十根水煎服

治寒之劑

千金茯苓丸 治胞痺小便内痛

赤茯苓 防風 細辛 白术 澤瀉各五錢 紫菀 天花粉 牛膝 黄芪 芍藥 甘草炙各三錢 山藥 山茱萸肉 獨活 半夏各一錢 附子

炮 官桂各二錢 煉蜜丸梧子大每服五六十丸
空心温酒下
腎著湯 治胞痺小便不通
赤茯苓 白朮各四兩 甘草炙三兩 乾姜炮一兩
每服五七錢水煎一日三服
巴戟丸 治胞痺臍腹痛小便不利
巴戟去心一兩半 桑螵蛸炒 遠志去心 生地黄 山藥
附子炮 肉蓯蓉酒浸 續斷各一兩 杜仲炒 鹿茸酥炙
石斛 兎絲子 五味子 山茱萸 官桂
龍骨各三錢 煉蜜丸梧子大空心温酒下三十丸
三因生附散 治淋而脉沉微小便秘澁数起不
通竅中痛 瞿麥 木通 半夏各一兩半 滑石五錢
附子五錢 每二錢生姜三片灯心二十莖蜜半
匙水煎食前服

淋閟餘論

生生子曰淋閟一證玉機微義闡述詳盡極當檢閱如劉河間之熱罷知悌之寒張潔古分在氣在血之異嚴用和之五淋陳無擇之三因朱彥修之痰積死血劉宗厚之腎虚火熾述素問靈樞脉經之要旨門分類析甚便後學惟婦人治法尚畧頗今時婦人患此頗多鮮獲奇効緣由未得其眞括也考之經曰肝主小便淋溲婦人經未絶年皆厥陰肝經用事肝主謀慮者也婦人之性多於偏鄙鬱而不決氣道因澁鬱久成火凝滯濁液漸結成粒名曰砂石淋是也今之治淋者動手輙用五苓八正之類皆淡滲利竅之劑于病未嘗遠也而底績不樹何耶殊不知淡滲皆在天之陽也但能利肺氣是氣降而水利矣非治有形之陰病也腎乃肺之子也淡滲過劑腎氣奪矣陰血日虧鬱火日熾經曰無陽則陰無以化無陰則陽無以生淡滲皆泄氣而損血者血損則竅愈澁澁則病劇治當開鬱火養陰血兼之以導氣之藥經曰壯者氣行則愈陰血旺氣道滑病自瘳矣正如河涸舟粘縱用力多未若決水之為易也學者其可忽諸

丹溪牛膝膏加鬱金以開鬱山梔以降火生地以

補陰琥珀以導氣利竅則愈矣

遺溺門

生生子曰按遺溺遺失也睡夢中遺失醒而後覺童稚多有此大人少有也夫童稚陽氣尚微不甚約束好動而魂遊故夜多遺失也古方多用煖藥乃温養陽氣之意經謂虛則遺溺又曰不約為遺溺從可知矣曾見數人二三十歲仍遺失不止後皆無子得非下元虛寒所致歟

東垣曰小便遺失者肺金虛也宜安卧養氣禁劳役以黄芪人参之類補之不愈當責有熱加黄栢生地又曰立夏前悞用白虎湯過多致遺溺者宜温藥升陽以解之

甲乙經云肺脉不足以息卒遺失無度

原病式云遺尿不禁者是熱甚客于腎部干於足厥陰之經廷孔鬱結極甚而氣不能宣通則痿痺而神無所用故液滲入膀胱而旋溺遺失不能收禁也

丹溪嘗治一男子遺溺不覺脉洪大盛以黄栢知

母杜牛膝為君青皮甘草為臣木香為佐桂些小為反佐服數帖大効此法與千金翼白薇散皆治熱甚廷孔鬱結神無所用不能收禁之意也

生生子曰按劉河間丹溪千金翼方有認為熱者必以脉症相參看治應無偏熱偏寒之弊予前論寒者以大槩而言也諸病皆有寒熱虛實多有始同終異故治法不能執一而無權也

桑螵蛸散　治遺溺

桑螵蛸酒炒為末姜湯調下二錢

鷄内金散　治溺床失禁

鷄膍胵一具即鷄肫内黄皮并腸洗淨燒存性男用雌女用雄研為末每二錢酒服妙

大人遺溺不知薔薇根細研酒下

雞腸草湯　治小便不禁或睡中遺出不覺

雞腸草一兩　牡蠣粉三錢　龍骨　麥冬　白茯苓　桑螵蛸各五錢　每服三錢棗一枚去核煎服

一方　治同上

補骨脂炒為末黄栢煎湯調下

又方　治同上

桂皮末　雄雞肝　等分搗丸如小豆大温水下

治小兒夢中遺尿

薏苡仁一合去心不去殼敲碎入塩一小撮同炒黃色水煎空心服之効

縮泉丸　治小兒遺尿脬氣不足小便頻多

烏藥　益智仁去殼塩水炮　等分為末酒煮山藥糊為丸空心塩湯下二錢

又方　治同上

烏藥　益智仁各五錢　桑螵蛸一兩

為末空心塩湯調下二錢効

治遺尿方

白茯苓　牡蠣醋煆　桑螵蛸各五錢　龍骨　桂各三錢

為末以雞腸一具燒存性為末和匀空心白湯調下一錢

禁方　治遺溺

阿膠炒　牡蠣煆　鹿茸酒炙　桑螵蛸酒炙　各等分

為末糯米為丸梧子大每五十丸空心酒下

治遺溺淋瀝

桑螵蛸焦炙　龍骨等分　為末每二錢空心塩湯下

千金翼白薇散　治尿出不知時

白薇　白芍藥等分　為末温酒下方寸匕日三服

濟世方神芎導水丸　治遺尿有實熱者每百丸空心白湯下若一服得大便利止後服

此謂濕氣遺溺渾聚在腎痺謂氣不宣通也

雞腸散　腎與膀胱虚冷不能約制故遺尿失禁或睡自出　肉桂　龍骨各一錢半　白茯苓　桑螵蛸　牡蠣粉各三錢　雞腸一具

分二帖水煎姜三片棗二枚空心温服

小便不禁

生生子曰不禁謂無禁約小便多而頻不計遍數按經云水泉不止者是膀胱不藏也有濕熱有下元虚憊數而少為熱數而多為虚老人多有此蓋陽氣衰微不能約束歷見數人卒皆不救由其不能攝養而神氣耗散故也古人有謂不通為熱不禁為寒乃心腎氣弱陽道衰冷而傳

化失度法當温補温存以養其神藥石以堅其腎神完腎固膀胱氣充自可約束然必調治及早庶或十全三五

王節齋曰小便不禁或頻數古方多以為寒而用温澁之藥殊不知屬熱者多盖膀胱火邪妄動水不得寧故不能禁而頻數来也故年老人多類此是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以收澁之劑如牡蠣山茱萸五味子之類不可用温藥也病本屬熱故〔八十五卷　四六〕宜瀉火因水不足故火動而致小便多小便既多水益虛矣故宜補血瀉火治其本也收之澁之治其標也

按此乃本之於原病式熱鬱廷孔之說也

生生子曰按節齋此論亦是以大槩言也老人下元虛憊氣弱不能秉載其水膀胱停湿浸滛皮薄不能收持故頻數不禁必如河間節齋所云然則癃閉已主於熱矣而不禁又主於熱是無虛寒之症也何古方有温補之法經有寒虛之文耶不若以小便頻而清白長者為虛寒頻而少黃赤澁者為熱及脉洪数有力無力或滑或濇参驗之始無差悞凡熱天小便少寒月小便多寒熱之理亦易見爾

大便秘結而小便頻多屬脾約症以脾約丸治之

茯苓丸　心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁

赤茯苓　白茯苓　等分為末新汲水挼洗澄去新沫控乾别取熟地黃汁與好酒同於銀石器内熬成膏為丸彈子大空心盐酒嚼下一丸〔八十五卷　四二〕

二氣丹　治内虛裏寒膀胱積冷陽氣漸微小便不禁

硫黄　肉桂各二錢半　乾姜炮　硃砂各二錢為衣　附子一枚大者炮去皮臍為末五錢

右糊丸梧子大每五十丸盐湯下

姜附赤石脂丸　小便数而不禁怔忡多忘夢魘不已

附子生　乾姜各五錢　赤石脂一兩半飛　硃砂伏火者一兩

酒糊丸菉豆大每十五丸至三十丸

大便有病米飲下　小便不禁茯苓湯下

王海藏云此方妙在硃砂伏火上　論載玉機微義甚詳

御藥院秘元丹　治內虛裏寒自汗時出小便不
禁　白龍骨三兩　訶子十枚　砂仁　靈砂各一兩
右稉米糊為丸梧子大每五十丸空心鹽湯下
兎絲子丸　治小便多或致失禁
兎絲子　肉蓯蓉酒浸各二兩　牡蠣煅　附子炮　五味
子　鹿茸酒炙各一兩　雞胜胵炙乾　桑螵蛸酒炙各五錢
右酒糊丸梧子大每七十丸空心鹽湯溫酒下
三因家韭子丸　下元虛冷小便不禁或成白濁
家韭子炒六兩　鹿茸酥炙四兩　肉蓯蓉酒浸　牛膝　熟地

黃　當歸各二兩　巴戟去心　兎絲子酒浸各一兩半　杜仲
石斛　桂心　官姜炮各一兩
酒糊丸梧子大每百丸空心鹽湯酒任下
桑螵蛸散　治小便頻數或如米泔稠濁
桑螵蛸鹽水炙　遠志　石菖蒲鹽炙　龍骨　人參
茯神　當歸　鱉甲醋炙各等分　為末每二錢臨臥
人參湯調服　一方用龜甲
五子丸　治小便頻數時有白濁
兎絲子酒蒸　家韭子炒　益智　茴香炒　蛇床子

去皮炒各等分　酒糊為丸梧子大每七十丸米飲鹽湯任下
丹溪鹿茸丸　治久虛冷小便白濁滑數不禁
鹿茸　川椒去子取頭末　桂心　附子　牡蠣　石
斛　沉香　補骨脂　肉蓯蓉　雞胜胵各一兩
桑螵蛸三分　右酒糊為丸梧子大食前酒下三十丸
又方　治污血淋瀝
鹿角屑炒黃為末溫酒下二錢妙　本草云鹿角逐陰中邪氣
惡血
水芝丸　治下焦真氣虛弱小便頻多日夜無度

蓮子去皮　先以好酒浸一二宿用猪肚一具入
蓮子在內水煮熟取出蓮子切片晒乾為末
醋糊丸如雞頭子大每五十丸溫酒送下
一方　治禀賦虛弱小便頻數不禁
五味子四兩　肉蓯蓉半斤　肉地六兩　兎絲子酒煮炒乾二兩
右酒煮山藥糊為丸梧子大每五七十丸空
心鹽湯或酒送下
萆薢丸　治小便頻數
川萆薢　不拘多少為末酒糊丸如梧子大每

五十丸空心塩湯送下

一方 治夜多小便老人虚人多有此症

白芷一兩 秫米五錢炒褐色 右秫米糊丸梧子大饅頭煎湯空心下七十丸

玄兎丹 治小便多

兎系子酒浸焙末十兩 五味子酒浸研末七兩 白茯苓三兩 蓮肉三兩 為末乾山藥末六兩将所浸酒餘者添酒煮糊為丸搗千杵丸梧子大每五七十丸空心米飲下

小兎系丸 治腎氣虚損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精 石蓮子肉二兩 兎系子酒浸研五兩 白茯苓一兩五錢 山藥二兩七錢 打糊丸梧子大每五七十丸空心温酒或塩湯送下

一方 生山藥半斤刮去片先用酒熬沸入山藥不得攪動待熟加塩葱白更添酒空腹下二三盞妙

益智散 治小便多

益智三十四枚 為末水一盞煎八分入塩五分臨卧温服

本事方衛真湯 治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯弱真陰不固三焦不和上盛下虚夜夢鬼交覺来盗汗面色精彩唇口舌燥耳内蟬鳴腰痛背倦心氣虚乏精神不寧驚悸健忘飲食無味日漸瘦瘁外腎湿痒夜多小便腫重冷痛牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久冷經候不調或過期不至或一月兩来赤白帶下漏分五色子宮感寒久不成孕並皆治之 此藥大能生氣血遇夜半子時腎水旺極之時補腎實臟男子摒血化精諸病未萌之前皆能制治使不復為梗

川歸酒浸一夜 丁香 青皮去白各一兩 熟地黄 白茯苓 木香 肉菓 山藥各三兩 生地 川牛膝各二兩童便煮各半盞浸一夜 人參一兩半 石斛五兩 為末每三大盞酒調下塩湯亦得空心食前服婦人諸病童便同酒調空心服

辰砂妙香散 方在婦人門

濁赤

諸病水液渾濁皆屬于熱小便黃者少腹中有熱也　治小便黄無如黃栢知毋効

脉經云足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯

綱目載小便黃有四

一屬肝熱經云肝熱病者小便先黃是也

二屬胃實經云胃足陽明之脉氣盛則身已前皆熱其有餘于胃則消谷善飢溺色黃者是也

三屬肺虚經云肺手太陰之脉氣虚則肩背痛寒少氣不足以息溺色變故耳

八十五卷　五三

四屬腎虚經云冬脉者腎脉也冬脉不及則令人眇清脊痛小便變是也

脫肛門 附載腸病

生生子曰脫肛之症多由腸內有積而清氣不升如痢疾裏急後重而下脫也治當從滞下門先推去積滞然後升補積滞去而清氣自升不復脫下其或因下血及痢疾之後脫而不收者為虚升補之藥看氣血孰重脫之已久當以澁劑收之腸胃有風脫而下血者以風藥舉之脫久亦有虚寒者當溫藥微洗内服大補之劑

丹溪曰有氣虚氣熱血虚血熱

氣熱者條芩六兩升麻一兩為末麪糊為丸服之　其証肛脫紅腫者是也

氣虚者参耆芎歸升麻或加白术訶子有熱加條芩　其証多於劳倦房慾而發者是也

血熱者四物湯加炒黃栢　其証多於好酒及辛辣之物而發及便血也

血虚者用四物湯加升麻荊芥　其証下血過多而色痿黃者是也

八十五卷　五三

下痢脫肛 痢門參治

截腸病　其証大腸頭出痛苦乾又落〻又出腸盡則死初出寸餘時治之以芝麻油一盞以臀坐之飲火麻子汁数升愈

脫肛之證前人以為肺氣虚寒蓋肺與大腸為表裏肺臓蘊熱則閉結虚寒則脫婦人有此疾者多由産育用力過多小兒有此疾皆因久痢大腸虚冷所為也有腸頭作痒者此係腸中有虫

黄桂峰云親見一人裏急後重肛脫紅腫百藥皆試乃有虫在肛故也

濟世方　治男女脫肛用五倍子小便濃煎洗之

聖惠方　治脫肛不收蝸牛燒灰猪脂調敷之

砂仁湯　治大腸虛脫肛挾熱紅腫者

砂仁　黄連　木賊等分　為末每服二錢米飲下

文蛤散　大腸虛寒肛門脫出不收或用力太過及小兒叫呼久痢後重者

五倍子為末水煎汁浸洗更入白礬蛇床子尤佳後用赤石脂為末少許摻在芭蕉葉上頻用托入或有脫出尺許者亦用此湯温浸頻換藥水以縮為度

倍榆散　治小兒脫肛

五倍子　地榆等分　為末每五分或一錢米飲調下

治老人脫肛

防風蘆　蒼朮　黄栢　五倍子　煎湯薰洗

内服清凉大腸之藥而愈

治脫肛下血

韭菜一大握擂碎瓦罐煎熱再用生韭菜汁冲在湯内將肛門坐在瓶口薰一二次神效

槐角丸　五種腸風下血痔漏脫肛並治

槐角三兩　地榆　黄芩　當歸　防風　枳殼麩炒各二兩　右酒糊丸梧子大每七十丸空心米飲下

凉血清腸散

生地　當歸　芍藥各一錢二分　防風　升麻　荆芥各一錢　黄芩炒　黄連　香附炒　川芎各八分　甘草五分　水煎服

三因方香荆散　大人小兒肛門脫出並治

香附　荆芥穗各等分　一方加砂仁

右為末每服三匙水一大碗煎數沸乘熱洗

秦艽湯　腸胃濕熱及有風而脫肛不止

秦艽去芦酒洗七錢水煎空心服ゝ後安卧一時渣再煎

補中益氣湯　治勞倦脫肛効

一方　五倍子為末每用三錢入白礬一塊水煎先或以五倍末用紙襯之托上

一方　木賊燒存性為末　肛上按入即收

二霊散 治久痢腸胃俱虚肛門脱下
龍骨 煅五錢 木賊 燒存性二錢半 為末掺上托之
治男女脱肛 五倍子荊芥小便濃煎洗之
本事方 腸風下血及脱肛不收
皂角 三莖搗碎水一碗揉令皂角消盡用絹
二層濾取清汁將肛浸在汁中自收並不待手
托如大腸收了即用湯盪其肛門上下令皂角
氣行則不再作盪三次全愈
集驗方 治脱肛歷年不愈
（六十五卷） 五六
生鉄三斤水一斗煮取五升以汁浸洗
一方用刀漿水洗亦効
肘後方 治腸頭脱肛出轉久不可收入
生栝蔞汁浸之猪肉汁中洗隨以手按之 令煖自收
濟世方治脱肛 荊芥 龍腦 薄荷 朴硝
右煎湯一日洗數次自入
本事方治腸風脱肛及有血
蛇床子炒為末貼肛上立收
蝟皮散 治肛門或因洞泄或因用力脱出不收

蝟皮 一枚燒存性 礞石 煅五錢 桂心 五錢 此寒而脱肛也
右為末米飲服方寸匕忌持重及房室
肘後方治女人陰脱前方加鱉頭一枚燒存性 研入
黒聖散 治瀉多時脱肛疼痛
大蜘蛛一枚瓠葉重裹線札定合子內燒存性
研入黄丹少許同研凡有上件疾即先用白
礬葱椒湯洗拭乾後掺藥以手托上
千金方 治脱肛歷年不愈
鱉頭一枚燒令烟盡為末付上手按挼之
（六十五卷） 五七
丹溪方 治脱肛 葫荽燒烟薰之立入
海上方 諸般痔脱肛
死蛇一條如指大濕者掘地坑燒之以有孔板
子蓋之坐其上以肛受烟薰之烟盡為止大効
濟世方 治肛出
皂角薰次用鯅鮋一條入瘡浸去鯅鮋將瘡調
土硃付上即入
一女子脱肛用糯米一勺濃煎飲去米洗肛温柔
先以磚一片火燒通紅用酢沃濕以青布鋪磚

上坐肛於青布上如太熱加布令厚其肛安自收入

又方 蓮房殼荊芥枳殼槐花黃柏防風獨活煎湯洗之 或以木賊灰或文蛤末付上立收

治肛門腫痛 木別子去殼取油四五枚研如泥入水盆中以滚湯泡之乘熱洗另用少許為末付上

肛門腫痒 杏仁搗膏敷上 亦治蔌道痛蝕

外臺秘要治下部虫䘌 桃葉一斛蒸之令極熱納小口器中以下部坐上受薰其虫盡死

脉經云慝蝕陰脫其脉虛小者生緊急者死

一人脫肛囊急後重百方莫能收一僧教以取猪肚一具刮下垢膩入花椒末拌勻塗肛上以青綿布袋兜之再以溫湯入埕內坐其上薰之少頃肛癢腸收象上再不許其發從此再不復發

前陰諸疾

前陰所過之脉有二一曰肝脉二曰督脉經云肝足厥陰之脉入毛中遶陰器抵小腹是肝脉所過也又云督脉者起于小腹以下骨中央女子入繫廷孔循陰器男子循莖中至篡與女子等是督脉所過也

陰縮陰縱

陰縮謂前陰受寒縮入腹內也陰縱謂前陰受熱挺長不收也經曰足厥陰之筋傷于寒則陰縮入傷熱縱挺不收治在行水清陰氣是也

丹溪治鮑兄年二十玉莖挺長腫而痿皮塌常潤磨股不能行兩脇氣上手足倦弱先以小柴胡加黃連大劑行其濕熱畧加黃柏降其逆上之氣其挺腫漸收漸減及半但莖中有堅塊未消

遂以青皮一味為君佐以散風之劑末服外以絲瓜汁調五倍子末敷而愈

平江王氏子年三十忽陰挺長腫而痛脉數而實用朴硝荊芥湯浸洗又用三乙承氣湯大下之愈

內經曰陰縮而死者皆屬肝傷又云悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正當陰縮而攣筋兩脇骨不舉毛悴色夭死于秋又云厥陰終者喜溺舌卷卵上縮是也

玉莖腫前陰腫是也其症不一有遍身水氣癩脛

俱腫者此屬水腫以治水之法治之其腎風搔搔成瘡以致腫者以治瘡毒之法治之有姤精餒瘡腫毒以乾瘡之藥治之此緣姤精蘊結毒氣未散而成腫痛也有服金石秘澁之藥梢氣壅遏不能宣揚或試緊爐之方取一時之快熱毒内蘊俱能為腫有血氣凝滯癮悶竅閉塞致使莖腫或由恐溺致氣結不行而成腫凡此諸症並以灯心湯調五苓散服之以荊芥木通煎湯淋洗 此條出豹玄

陰㿉陰汗陰冷陰臭

陰㿉皆耗散過度傷於肝筋所致經云足厥陰之經其病傷于内則不起是也

東垣陰㿉陰汗陰臭論　一富者前陰間嘗聞臊臭又因連日飲酒腹中不和求予治之予應之曰夫前陰者足厥陰之脉絡陰器出其挺末臭者心之所主散入於五方為臭入肝為臊臭此其一也當於肝中瀉行間是治其本後於心經瀉少冲以治其標如恶針當用藥除之治法當求其本連日飲酒夫酒者氣味俱能生湿熱是風湿熱合於下焦為邪故經云下焦如瀆又云在下引而竭之酒者是湿熱之水亦宜決前陰以去之是合下焦二法治之龍膽瀉肝湯是也

龍膽瀉肝湯　治陰部時復湿痒有臊臭

柴胡梢　澤瀉各一錢　車前子　木通各五分　當歸尾　龍膽草　生地黄各三分　水煎空心飢時熱服便以美膳壓之柴胡入肝為引用澤瀉車前子木通其淡滲之味利小便亦除臊臭是

名在下者引而竭之生地黄龍膽草之苦寒瀉酒湿熱更兼車前子之類以徹肝中邪氣肝主血用當歸以滋肝中血不足也

固真湯　治两丸冷前陰㿉弱陰汗如水小便後有餘瀝臊氣尻臀并前陰冷恶寒而喜熱膝亦冷　升麻　柴胡　羌活各一錢　甘草炙　澤瀉各一錢半　黄柏　知母分　龍膽草二炒各錢　水煎空心服以美膳壓之

温腎湯　面色痿黄身黄脚軟陰汗陰莖有天色

麻黃六分 防風根 蒼朮各一錢半 白朮 猪苓 白
茯苓 升麻 黃柏酒炒各一錢 泽瀉二錢 柴胡梢六分
水煎食前服之候一時辰許方食
補肝湯 前陰如氷冷并冷汗兩脚痿弱無力
黃芪七分 人參 葛根各三分 甘草炙 蒼朮各五分
升麻 猪苓各四分 知母 柴胡 羌活 當歸
身 陳皮 黃柏炒 防風 白茯苓 澤瀉
神麯 連翹各二分 水煎食前熱服忌酒麵
清震湯 治溺黃臊臭淋瀝兩丸如氷陰汗浸兩

股陰頭亦冷正值十二月天寒凛冽寒之極矣
澤瀉 升麻 蒼朮 黃芩各五分 柴胡 當歸
身 甘草炙各一分 羌活 黃柏酒炒各一錢 防風 麻
黃根 藁本 猪苓各三分 紅花一分 水煎服忌酒麵
柴胡勝濕湯 兩外腎冷兩髀樞陰汗前陰痿弱
陰囊濕痒臊氣 柴胡 甘草生各三錢 升麻 羌
活 泽瀉各一錢半 當歸 麻黃 龍膽草 漢防
巳炙一錢 黃柏酒炒二錢 五味子二十粒 紅花少許 白茯苓
戈 水煎熱服忌酒麵房事

仲景八味丸 治陰痿不振今依前方夏減桂附
一半春秋減三之一 病去全減桂附
椒粉散 治前陰兩丸濕痒秋冬尤甚
麻黃一錢 狗脊 蛇床子各五分 斑猫二枚 當歸梢
猪苓 小椒各二分 肉桂二分 輕粉 紅花各少許
為細末摻上避風寒濕冷處坐臥
又方 治腎囊濕痒 先以吳茱萸湯洗過後用
吳茱萸半兩 寒水石三錢 黃柏二錢半 樟腦 蛇
床子各五錢 輕粉一錢 白礬三錢 硫黃二錢 檳

榔三錢 白芷三錢 為末摻之
千金方云有人陰冷漸〻冷氣入陰囊腫滿恐死
日夜痛悶不得眠取生椒擇之洗淨以布帛裹
著丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取出瘥
本事云曾有人陰冷漸次冷氣入陰囊腫滿晝夜
疼悶不得眠煮大蒴汁服立瘥
陰腫陰痛陰吹
婦人陰腫腎痛枳實半斤切碎炒熱布包熨之冷即易
交接勞復陰卵痛是勞復陰陽易

仲景云胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導之其方猪膏半斤亂髮如鷄子大三枚以髮入膏中煎至髮盡分再服病自從小便中出能治諸疸症殊效

雄黃散　陰腫大如斗核痛人所不能治者

雄黃一兩　礬二兩　甘草生半兩　以水五升煎洗

荆芥散　治腎腫　荆芥穗一兩　朴硝二兩　蘿蔔葱同煎湯洗

男子陰腫大如升覈痛甚搗馬鞭草塗之

八十五卷　六十四

和劑三白散　治小兒膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利　白牽牛一兩　桑白皮　木通　白朮　橘紅各五錢　為末姜湯調二錢

癩風　俗名腎臟風

癩風之症起於下部虛熱或行路体倦及夏月久坐冷地為風濕所襲乃發為疾其症囊濕皮厚生水泡瘡疥作痒古方用蛇床子一味煎湯淋洗痒甚者以姜汁入香油数滴攪匀塗上自愈

沐浴長春散　治下元陰濕久冷陰囊夜痒抓之則害手住則痛成瘡流水為患甚苦及治婦人下部陰濕子胞久冷並効

牡蠣　蛇床子　破故紙　紫梢花　官桂　薄荷葉　各等分每用一兩半入葱白数莖水煎一小鍋先薰後洗再用津調散搽之全安

津調散　治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連　款冬花等分　麝香少許

為末先洗過或以地骨皮蛇床子煎湯洗帛拭乾津調敷忌生冷生湯洗　一方無射

八十五卷　六五

又方　治外腎及兩腿風濕瘡

全蝎　檳榔　蛇床子　硫黃各一錢

為末麻油調入手心搽熱吸三口用手抱囊一頃次搽藥兩腿上

疝氣門

内經四氣刺逆從篇曰厥陰脉滑則病狐風疝少陰脉滑則病肺風疝太陰脉滑則病脾風疝陽明脉滑則病心風疝太陽脉滑則病腎風疝少陽脉滑則病肝風疝又骨空篇曰任脉為病男

子內結七疝女子帶下瘕聚大奇論篇曰腎脉大急沉爲腎疝肝脉大急沉爲肝疝心脉搏滑急爲心疝肺脉沉搏爲肺疝三陽急爲瘕三陰急爲脾疝三陰脾脉也

脉經曰寸口脉弦而緊絃緊相搏則爲寒疝

生生子曰內經以六經脉滑爲風疝又以大急沉爲五藏疝按此六經五臟皆有疝也而以風字加之於六經之疝者何也意者然乃以風字作氣字者看耶或以巽爲風則木之氣肝之所主

也又成疝之地乃肝部也夫滑脉主痰飲食積是言各經之痰飲食積流傳于肝之部地乃成疝也因肝主風故以風字加之也又夫急者緊急之謂也緊主病爲寒沉亦爲寒爲氣大亦爲氣是亦言五臟寒氣沉於下部發爲疝也蓋寒喜傷下腎肝俱在下而肝之絡環繞陰器故以疝屬肝也據任脉起于胞門循腹裏與衝脉厥陰會故男爲七疝女爲瘕聚也其病極爲難治而諸書所言亦不一惟張戴人一主于肝寬輯甚慱且曰非靈素銅人之論法皆不取要之欲窮其原耳故其歷舉經義俞穴及七疝症固殊爲詳悉但用治諸方多是渠生平所長之三法人或病其峻抑不知有是病用是藥醫而不善用此是無術也則未免有過時失機之悔顧其症積滯根固洞藪偏僻非峻劑曷能以達第不可孟浪亂投法所當用又何畏縮在談施者消息經權務求其當可也劉守真言此症亦有熱者丹溪亦主于肝且又言有濕熱死血及痰積

因寒鬱而發間亦有虛者此亦溪鑒前人純擬于寒而一以剛燥爲劑也今以諸賢大意述列於後以便叅治

劉守真曰癩疝小腹控卵腫急絞痛也寒主拘縮故也寒極而土化制之故腫滿也經言丈夫癩疝謂陰器連小腹急痛也故言婦人少腹腫皆厥陰肝之脉也經注曰寒氣聚而爲疝也又按經言五藏皆主疝但脉急也注言脉急者寒之象也然寒則脉當短小而遲今言急者非急數

而洪也由緊脉主痛急為痛甚病寒雖急亦短
小也所以有痛而脉緊急者脉為心之所養也
凡六氣為痛則心神不寧而緊急不得舒緩故
脉亦從之而見也欲知何氣為其病者適其緊
急相兼之脉而可知也如緊急洪數則為熱痛
之類也又經言脾傳之腎病名疝瘕小腹寃熱
而痛出白蠱注言小腹痛溲出白液也一作客
熱內結銷鑠肌肉如蠱之食故名白蠱也然經
後言熱為疝瘕則亦不可止言為寒當以脉症

弘之

丹溪曰疝主肝經與腎經絶無相干疝痛之甚者
睪丸連小腹急痛也或有形或無形或有聲或
無聲自素問以下皆以為寒蓋經絡得寒收引
不行所以作痛世有得寒而無疝者又必有說
以通之可也予屢踢冰徒涉不曾病此以予素
無熱也因而思此病始于濕熱在經鬱遏至久
又感外寒濕熱收鬱而作痛若只作寒論恐為
未備或曰此症多客厥陰一經濕熱之積何由
而致予曰大勞則火起于筋醉飽則火起于胃
房勞則火起于腎大怒則火起于肝火鬱之久
濕氣便盛濁液凝聚并入血隧流于厥陰肝屬
木性速急火性暴為寒束宜其痛甚而暴也愚
見古方以烏頭梔子等分作湯用之其効亦速
後因此方隨形症加减無有不應又須分濕熱
多寡而治之但腫多為濕癩是也却有水氣而
腫又有挾虛而發者當以參朮為君而佐以䟽
導診其脉沉緊而豁大者是也若不以補劑而

行决裂之法禍不旋踵

許學士曰大抵此疾因虛得之不可以虛而驟補
經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病必實
故必先滌所畜之熱然後補是以諸方多借巴
豆氣者蓋謂此也

張戴人曰疝本肝經宜通勿塞疝有七前人論者
甚多非靈樞素問銅人之論余皆不取非余好
異也但要窮其原耳七疝者何寒水筋血氣狐
癩是也俗工不識目為膀胱又為腎冷又或為

小腸氣小兒曰偏氣立名既謬併變其實何哉
盖醫者既斷為膀胱腎冷小腸氣又曰虛寒所
致其藥之用也不鹿茸巴戟則杜仲蓯蓉不附
子烏頭則乾姜官桂不練實茴香則金鈴補骨
脂朝吞暮餌曾無殊効三二十年牢不可去間
因微病稍似開通執此微芒浸成大錯標既不
除本必歸甚處處相傳曾無覺者豈知諸疝皆
歸肝經其奈膚流歸之小腸脬囊夫膀胱水府
專司滲泄小腸水道專主通流腎為少陰總統

二水入之小溲自胃入小腸滲入膀胱膀胱者
脬囊也氣化則水出莖端此常道也及其為疝
乃是厥陰肝經盖環陰器而上入小腹者足厥
陰肝經也夫腎肝皆屬于下衝任督相附然靈
樞經言足厥陰肝經病則有遺溺癃閉狐疝主
腎與小腸膀胱三經則不言疝是受疝之處乃
肝之部分也且內經男子宗筋為束骨之會也
而肝主筋睾者囊中之丸雖主外腎非厥陰環
而引之與玉莖無由伸縮在女子則為篡户其

內外為二其一曰廷孔其二曰竅漏此足厥陰
與衝任督之所會也靈樞言足厥陰之經筋聚
于陰器其病傷于寒則陰縮入傷於熱則縱挺
不收治在行卧清陰氣故陽明與太陰厥陰之
筋皆會於陰器惟厥陰主筋故為疝者必本之
厥陰靈樞又言足厥陰之别名曰蠡溝去內踝
五寸别走少陽循脛上睾結于莖其病氣逆睾
腫卒疝實則挺長虛則暴痒取之所别矣豈非
厥陰為受病之處耶靈樞又言邪在小腸連睾

係屬于腎貫肝絡肺系心氣盛厥逆上衝腸胃
熏肝散於肓結於臍故取之肓原以散之刺太
陰以平之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之
按其所過之經以調之此其初雖言邪在小腸
至其治法必曰取厥陰以下之乃知諸疝關於
厥陰可以無疑以脉考之素問云厥陰滑為狐
風疝少陰滑為肺風疝太陰滑為脾風疝　云云
凡此六疝雖見于他脉中皆言風疝者足厥陰
肝經之氣也靈樞亦曰心脉微滑為心疝肝脉

滑甚為㿉癃腎脈滑甚為癃㿉凡此三臟脈之疝亦以滑為疝也素問又云脈大急皆為疝心脈滑傳為心疝肺脈沉傳為肺疝三陰急為疝三陽急為瘕王太僕云太陽受寒血凝為瘕太陰受寒氣聚為疝此言太陰受寒傳之肝經也可以溫藥逐之不可以溫藥補之若補之者是欲病去而強挽留之也歷考素問三陽為病發寒熱其傳為㿗疝此亦言膀胱非受病之處必傳于厥陰部分然後為疝也又言病在少腹〻

〔八上 王恭〕 七一

痛不得大小便病名曰疝得之寒言脈急者曰疝瘕少腹痛凡言少腹者豈非厥陰之部分耶又言脾氣傳胃名曰疝瘕此謂非肝木不能為風氣名曰厥疝蓋脾土虛而不能制水又為肝木所凌也又言督脈為衝疝蓋厥陰與衝任督俱會于前陰也豈不明哉至于運氣中又言歲太陽在泉寒淫所勝民病少腹控睾蓋寒客于小腸膀胱則肝木縮而不得伸行毋傳之子也陽明司天燥淫所勝丈夫㿗疝婦人小腹痛此

言肝氣不得上行為金所抑鬼賊故也又言太陰在泉土勝則寒氣逆滿食飲不下甚則為疝此亦言寒客太陰濕土〻不能勝水〻傳之肝經也又嘗遍閱銅人俞穴亦相表裏如背上十三椎俞肝經言寒疝腹部中行惟陰交一穴言寒疝任脈之所發也關元一穴言暴疝小腸之募足三陰任脈之會也曲骨一穴言㿉疝任脈足厥陰之會也其腹部第二行肓俞二穴言寒疝衝脈足少陰之會也四滿二穴言疝瘕衝任

〔八十五 王恭〕 七三

脈足少陰腎之會也其腹部第二行大巨二穴言㿗疝足陽明脈氣之所發也氣衝二穴言㿗疝莖中痛兩丸寒痛亦足陽明脈氣之所發也其腹部四行府舍二穴言疝痛足六陰厥陰〻維之交會也亦太陰部三陰陽明支別也衝門二穴言陰疝足太陰厥陰之會也其在側脇者五樞二穴言寒疝陰邪上入少腹帶脈下三寸也其在足六經者足厥陰穴十名言疝者七謂大敦行間大衝中封蠡溝中都曲泉足少陽穴

十四名言疝者一謂丘墟穴也足太陰穴十一名言疝者一謂陰陵泉也足陽明穴十五名言疝者一謂陰市穴也足少陰穴十五名言疝者五謂然谷大谿照海交信築賓也足太陽穴十八名言疝者二謂金門合陽也由是言之惟厥陰言疝獨多為疝之主也其各經穴雖亦治疝終非受疝之地但與足厥陰相連耳或在泉寒勝木氣攣縮禁于此經或司天燥勝木氣抑欝于此經或忿怒悲哀憂抑頓挫結于此經或藥

淋外固閉尾縮精壅于此經其病差別如此不知世間之藥多熱補從誰而受其方也信其方則素問靈樞銅人皆非也信素問靈樞銅人則俗方亦皆非也不知後之君子以孰為是嗚呼余立于醫四十餘歲使世俗之方人人可療余莫知敢廢也諳練日久因經識病然後不惑且夫遺溺閉癃陰痿脬痺精滑白淫皆男子之疝也不可妄歸之腎冷血涸不月月罷腰膝上熱足躄嗌乾癃閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕若年少而得之不計男子婦人皆無子故隱蔽委曲之事了不干脬腎小腸之事乃足厥陰肝經之職也奈俗方只言脬腎小腸殊不言肝木一句惑人甚矣且肝經乙木也木屬東方為心火之母也凡疝者非肝木邪則肝木自甚也不可便言虛而補之難經所謂東方實西方虛瀉南方補北方此言瀉火木自平金自清水自旺矣昔審言為蔡之參軍也因坐湿地疝

痛不可堪諸藥莫救余急以導水丸禹功散瀉三十餘行腫立消痛立減又項關一男子病卒疝暴痛不任倒於街衢人莫能動呼余救之余引經証之邪氣客於足厥陰之絡令人卒疝故病陰丸痛也余急瀉大敦二穴大痛立已夫大敦穴者乃是厥陰之二穴也殄寇鎮一夫病瘧瘡發渴痛飲蜜漿劇傷氷水醫者莫知瀉去其湿反雜進姜附湿為燥熱所壅三焦閉溢水道不行陰道不興陰囊腫墜大於升斗余先以導

水百餘丸少頃以猪腎散投之是夜瀉青赤水一斗遂失痛之所在近顂尾一夫病卒疝赤腫大痛数日不止諸藥如水投石余以導水一伯五十丸令三次咽之继以通經散三錢宝腹淡酒調下五更下臓腑壅積之物数行痛腫皆去不三日平復如舊内經曰木鬱則達之達謂吐也令條達肝之積本當吐者然觀其病之上下以順爲貴仲景所謂上宜吐下宜瀉者此也敢列七疝圖於左以示後之君子庶幾有所憑藉者焉

寒疝其狀囊冷結硬如石陰莖不擧或控睾丸而痛得於坐卧濕地或寒月涉水或冒雨雪或卧坐磚石或風冷處使内過劳宜以温劑下之久而無子

水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫而狀如水晶或囊痒而燥出黄水或少腹中按之作水声得于飲水酒醉使内過劳汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故水多令人爲卒疝宜以逐水之劑下之有漏針去水者人多不得其法

筋疝其狀陰莖腫脹或潰或膿或痛而裏急筋縮或莖中痛〻極則痒或挺縦不收或白如精隨溲而下得于房失劳傷及邪術所使宜以降心之劑下之

血疝其狀如黄瓜在少腹兩傍横骨兩端約中俗云便癰得于重感春夏大燠劳動使内氣血流溢滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和血之劑下之

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱之而脹怒止號罷則氣散者是也有一治法以針出氣而愈者然針有得失宜以散氣之藥下之或小兒亦有此疾俗曰偏氣得于父年巳老或少年多病陰痿精怯強力入房因而有子胎中病也此疝不治惟築賓一穴言之

狐疝其狀如瓦卧則入小腹行立則出小腹入囊中狐則晝出穴而溺夜則入穴而不溺此疝出入上下往来正與狐相類也亦與氣疝大同小

異今人帶鈎鈐是也宜以逐氣流經之藥下之㿗疝其狀陰囊腫縋如升如斗不痒不痛者是也得之地氣卑濕所生故江淮之間湫塘之處多感此疾宜以去濕之藥下之　女子陰户突出雖亦此類乃熱則不禁固也不可便謂虛寒而澁之燥之補之本名曰㿉宜以苦下之以苦堅之王冰云陽氣下墜陰氣上争上争則寒多下墜則筋緩故睾垂縱緩因作㿗疝也已上七疝下去其病之後可調則調可補則補各量病勢

勿拘俗法經所謂陰盛而腹脹不通者㿗癃疝也不可不下

統旨曰或問疝氣古方有以為小腸氣者有以為膀胱氣者惟戴人丹溪專主肝經其説不同何以辨之予曰小腸氣小腸之病膀胱氣膀胱之病疝氣肝經之病三者自是不一昔人以小腸膀胱氣為疝者誤也殊不知足厥陰之經環陰器抵小腹人之病此者發則睾丸脹痛而連及小腹則疝氣之係于肝經也可知矣且小腸氣俗謂之横絃竪絃繞臍走注少腹攻刺而膀胱氣則在毛際之上小腹之分作痛與疝氣之有形如瓜有声如鼃或上於腹或下於囊者不同也但小腸膀胱因經絡並於厥陰之經所以受病連及于肝則亦下控引睾丸為痛然只是二經之病不可以為疝也學者惟考張朱二公之説則庶乎其不惑矣

生生子曰按統旨此論只可以言狐疝不足以盡經義然素問六經皆有疝故後之言疝者或名

小腸氣或名膀胱氣或名腎冷氣張戴人朱丹溪乃獨屬之肝經要之各有所本而肝腎居多爾按靈樞經云邪在小腸連睾系屬腎貫肝絡肺系心氣盛厥氣上衝也大凡邪氣襲於人之經也隨各經而名之襲於腎為腎氣襲于膀胱為膀胱氣襲于小腸為小腸氣腎與膀胱相為表裏其氣通于外腎系於睾丸此三經與厥陰互相聯絡而又俱在下部與衝任督諸脉會也戴人亦曰腎之穴十而言疝者五丹溪乃言與

腎絶無相干絶之一字未細考爾實相須也凡久立過内則傷腎勞力遠行則傷筋腎傷則膀胱虚筋傷則肝氣弱一有所傷風寒濕邪乘虚而襲入於腎則腎囊腫小腹痛而足冷舌本强此腎經受病之候入於肝則先從陰器冷痛上抵胠脇居青足厥甚則舌卷囊縮此肝經受病之候也膀胱乃胞之室素問骨空論篇曰任脉起於中極之下以上毛際循腹裏上關元自胞上過帶脉貫臍而上故任脉為病男子内結七疝或揞膀胱氣者以此也又衝脉為病逆氣裏急督脉起少腹以下骨中央女子入系廷孔其孔溺孔之端也其絡繞陰器合纂間繞纂後别繞臀至少陰其男子循莖下至纂與女子等其少腹直上者貫臍中央上貫心此生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝注曰衝任督皆奇經一源而三岐都與腎肝會也由是考之各有所本匪謬也惟肝腎居多腎不得無相干肝不得獨主疝從可知矣揣戴人之意若獨屬之

肝則東方實為有餘有餘者瀉之庶可以行生平所長之技也師者誠能體認不謬則通塞一適其宜丹溪戴人不多讓矣

挾虚者當用參术為君佐以疎導之藥其脉豁大按之無力者虚也　又按之不定者亦屬虚必用桂枝山梔炒過烏頭細切炒過為末以姜汁糊為丸每服三四十丸姜湯下大能劫痛　食積與死血成痛者梔子桃仁山查枳實吴茱萸並炒以生姜汁順流水煎湯調服

一方加茴香附子

戴元禮曰木腎者心火下降則腎水不患乎不温真陽下行則腎水不患乎不和安有所謂木强者哉夫惟嗜慾内戕腎家虚憊故陰陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯脹大作痛頑痺結硬不可純用燥熱當温散温利以逐其邪邪氣内消榮衛流轉盎如寒谷春回盖有不疾而速不行而至之妙矣

橘核散　単止痛此盖濕熱因寒欝而發用梔子

仁以除溼熱用烏頭以散寒鬱况二藥皆下行
之藥而烏頭又爲梔子所引其行尤速不使胃
中停留也 橘核 桃仁 梔子 川烏炒
吴茱萸 水煎服
又方刼痛 烏頭細切炒 梔子仁炒等分 爲末或加或
減白湯丸服亦可
積疝方 山查炒一兩 茴香炒 柴胡炒各三錢 牡丹皮一錢
酒糊丸如梧子大盐湯下六十丸
又方 治疝痛

山查炒四兩 枳殼炒 茴香炒 山梔仁炒各二兩 牡丹皮
柴胡 梔仁炒 大茴炒各一兩 吴茱萸五錢
酒糊丸盐酒吞下五十丸
又方 治疝痛
蒼朮盐炒 香附盐炒 黄栢酒炒爲君 青皮 玄胡索
益智 梔仁爲臣 茴香爲佐 大附子盐炒 甘草爲使
水煎服一痛過更不再作矣
一人有疝腹内有塊每塊痛作疝痛止疝痛作塊
痛止 三稜 莪朮醋煮 神麯炒 姜黄 南星各一
兩 山查二兩 木香 沉香 香附各三錢 黄連与茱萸同
炒去茱萸用净黄連五錢 桃仁 蘿卜子 山梔仁 枳
核炒各五錢 姜汁蒸餅糊爲丸
治小腸氣及木腎偏墜
黑丑一斤用猪尿胞裝滿以線縫口好酒米醋
各一碗於砂鍋内煮乾爲度取出黑丑用青紅
娘子各十九枚於鉄鍋内炒爆去青紅娘子将
黑丑研取頭末四兩另入猪苓澤瀉細末各二
兩醋糊爲丸梧子大每服三十丸空心盐酒送

下不可多服多服令人頭眩如頭眩可服黑錫丹
元戎加味五苓散 治疝氣卒痛小便澁
本方加川練子一分
局方三白散 治膀胱蘊熱湿熱乘陰囊腫痛大
小便不利 方見前隂門
彼元通氣散
舶上茴香 川山甲 蛤粉炒各二兩 陳皮 玄胡
索 黑丑炒末 甘草炒各一兩 木香一兩半
爲末每一大錢食前熱酒調服

寶鑑控引睾丸　小腸病結上而不下痛引心臆
茴香炒　川練子炒　食茱萸　陳皮　馬閵花醋炒
各一兩　芫花醋炒五錢　醋糊爲丸梧子大每十九至
二十九空心温酒下
三因大烏頭桂枝湯　治風寒疝氣腹中刺痛手
足不仁身體拘急不得轉側或致陰縮
大烏頭五枚去皮尖蜜煎過洗切　桂心　白芍各三錢　甘草一錢
每服四錢姜棗煎服
局方奪命丹　遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍
八十五卷　合
下撮痛悶亂外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒搔
成瘡　吴茱萸一斤四兩用酒醋湯童便各浸一宿焙乾　澤瀉二兩
酒糊爲丸梧子大每五十九空心塩湯下
葫蘆巴丸　小腸氣蟠腸氣奔豚疝氣偏墜陰腫
小腹有形如卵上下来去痛不可忍或絞結繞
臍攻刺嘔吐者　葫蘆巴炒一斤　巴戟炒六兩　川練
子炒一斤二兩　川烏炮去皮六兩　茴香炒二十兩　吴茱萸湯洗七次
兩　酒糊爲丸梧子大每二十九空心酒下
戴人禹功散

黑丑頭末四兩　茴香炒一兩　爲末以生姜自然汁調
一二錢臨睡服或加白术一兩
茴香練實丸　治陰疝痛不可忍及小腸氣痛
川練子炒　茴香炒　青皮　陳皮　芫花醋炒
山茱萸　食茱萸　吴茱萸　馬閵花各等分
醋糊丸梧子大温酒下三十九
天台烏藥散　治小腸疝氣牵引臍腹疼痛
烏藥　木香　茴香炒　青皮　良姜炒各五錢　檳榔
二枚　川練子十枚　巴豆七十粒
八十五卷　合
右先以巴豆微打破同川練麸皮炒黑去巴
豆麸皮不用外餘藥同爲末每用一錢酒調
下甚者姜湯下亦可
濟生葵子湯　膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾
燥　赤茯苓　猪苓　葵子　枳實　瞿麥
車前子　木通　黄芩　滑石　甘草等分
每五錢入姜煎空心服
局方蟠葱散　治寒疝氣疝衝心疼痛
玄胡索　蒼术　甘草各半斤　茯苓　蓬术

三稜 青皮各六兩 丁皮 砂仁 檳榔各四兩 桂
乾姜各二兩 每服二錢入連鬚葱一莖水煎食前服

金櫃當歸生姜羊肉湯 寒疝腹中痛及脇痛裏
急 當歸三兩 生姜五兩 羊肉一斤
水八升煮三升温服七合日三服如寒多加
生姜嘔者加陳皮二兩白朮一兩

蜘蛛散 治陰狐疝氣偏有大小時時上下
蜘蛛十四枚熬焦 肉桂五錢一分
為末取八分米飲調服或蜜丸服亦可

〈八十五卷 八六

王海藏丸用以黑大者去頭足研加膏入藥中乃効炒黑不効

東垣丁香練實丸 男子七疝痛不可忍婦人瘕
聚帶下皆任脉所主陰經也乃腎肝受病故治
法同 當歸 附子炮 川練子 茴香炒各二兩
好酒三升同煮盡為度焙乾作細末每一兩
入丁香木香玄胡末各五錢全蝎十二枚後
四味末入在前藥末內和匀酒糊丸梧子大
每三十丸加至百丸空心温酒下

熨法 塩半斤炒極熱以舊綿包熨臍腹痛處

又方 葱白研碎一握置臍中上用熨斗熨之或
以艾於上灸之尤妙

海藻潰堅丸 治木腎如斗結硬如石
海藻 昆布 川練肉 吳茱萸湯泡各一兩 木香
青皮 小茴 荔枝核炒 玄胡索炒 肉桂各五錢
海帶 橘核炒 桃仁麩炒去皮尖各一兩 木通七錢
酒糊為丸梧子大每六十丸空心塩酒任下

癩疝大如升斗者是也惟大不痛丹溪謂非痛斷
房事厚味不可用藥惟促其壽若蒼朮神麴白
芷半夏山查枳實皆要藥人視其為淺鄙以啓

〈八十五卷 八七

慯心又不能斷慾以愛護其根者非徒無益而
又被其害者多矣且其藥宜隨時令寒温更按
君臣佐使加減大抵癩屬湿多
蒼朮 神麴 白芷散水 山查 川芎 枳實
南星 半夏 神麴糊為丸有熱加山梔一兩
堅硬加朴硝五錢秋冬加吳茱萸二錢半

又方 治癩疝
南星 山查 蒼朮各二兩 白芷 半夏 枳核

神麯各一兩 海藻 昆布各五錢 玄明粉 吴茱萸各二錢 酒糊丸

治木腎不痛方 南星 半夏 黄栢酒洗 蒼木鹽炒 枳實 山查 白芷 神麯炒 滑石炒 吴茱萸 昆布 酒糊丸空心鹽湯下一方加枸杞子

治偏墜初生

川山甲 茴香 為末酒送下乾物壓之

潔古海蛤丸 治癩疝從小便中利出惡物

海蛤醋淬三次 海金沙 膩粉 硼砂 川歸各一錢

海藻 粉霜各五分 水蛭廿一條炒 青黛 滑石 乳香各一錢 硃砂二錢 地龍二十一條鹽水洗去泥

右用鹽煮麵糊為丸小豆大硃砂為衣每十丸燈心湯空心服之小便下冷膿惡物乃効却以黄連紫河車板藍根各二錢煎湯漱口以固牙一方去板藍根加貫衆

丑 海藏地黄膏子 男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼痛陰腫控睾而痛上衝心腹不可忍者

血竭 沉香 木香 人參 廣茂炮 玄胡索 蛤粉炒 川歸 川芎 續斷 白术 川練子 全蝎 茴香炒 柴胡 没藥 吴茱萸

已上分兩随症加減用之 氣多者加青皮 血多者加肉桂 為末地黄膏子為丸梧子大空心温酒下二十丸日加一丸至三十丸

本事方念珠丸 膀胱疝氣外腎腫痛不可忍昔有人貨此藥治疝如神一日貨数千丸一國醫多與金而得之用果良驗

乳香 硇砂各二錢飛為末 黄蠟一兩 熔化分作一百单

八丸以線穿之露一宿次日用蛤粉為衣旋取用乳香湯送下

丹溪治鄭子敬酒後飲水及水菓腎偏大時作鞋声或作痛炒枳實一兩鹽炒茴香炒梔子各三錢研煎湯送下保和丸 又一人膀胱氣下墜如鞋声臭橘核炒十枚桃仁二十枚蘿卜汁下保和圓七十丸

一人年三十左腎核腫痛此飲食中濕墜下成熱以臭橘核五枚桃仁七枚細研順流水一盞煎

沸湯熱下保和丸

丹溪治木腎以水晶蒲桃葉　野紫蘇葉　蒼耳葉濃煎湯薰洗

一方治水癩偏大上下不定疼痛不止

牡蠣不拘多少塩泥固濟炭三斤煅令火盡冷取出二兩加乾姜一兩焙為細末二味和勻以冷水調塗病處小便大利而愈

又方　玄胡索（塩炒）　全蝎　為末每二錢温酒調下

雄礬散　治陰腫大如斗核痛

丁十五卷　卆

雄黃（一兩）　白礬（二兩）　甘草（五錢）　水煎先薰後洗効

治偏墜一入核腫痛甚二子不分大如升偏腎不効以此治除根松江甚神此方

牡丹皮（二兩）　蒼术（米泔浸三日塩水拌炒六錢）　荔枝核（炒一兩）

山查（一兩半）　橘核（炒七錢）　山梔仁（去皮以吳茱萸湯炒三兩）

神麯糊丸梧子大空心白湯下五十丸

解鉼丸　治小腸氣及膀胱氣橫絃堅絃木腎偏墜下部諸疝氣痛

木鱉子（二兩淨去油用木通二兩切碎同炒焦黑色去木通）　茴香（二兩用班猫二十一枚去頭翅足同炒香熟去班猫）　黑丑（二兩用蘿卜子二兩罨研碎同炒香熟去蘿卜子）　半夏（二兩用薜荔二兩向陽者剉碎同炒黃色去薜荔）　補骨脂（二兩用猪苓二兩剉碎同炒去猪苓）　酒糊丸梧子大空心服三十丸炒姜塩燈心酒下下午後臨睡各一服

五妙丸　治一切下部氣速効如神

黑丑　補骨脂　川練肉（各一兩用地龍一兩同三件炒去地龍）

半夏（一兩用猪苓一兩同炒去猪苓不用）　茴香（一兩用班猫十四枚同炒去班猫不用）

丁香（二分用土狗十枚同炒去土狗）　玄胡索（一兩炒）

酒糊丸梧子大每服十丸加至十五丸空心

八十五卷　九乙

塩酒送下

乳姜湯　治寒疝氣上衝中脘築痛

乳香末（二錢）　生姜自然汁（二錢）　水一大盞同煎三五沸通口服一服効

香木丸　寒濕成疝腎腫疼痛

蒼术（半斤米泔水浸一宿晒乾用生姜半斤葱白四兩搗炒蒼术乾去葱姜不用）

茴香（半斤用生姜汁四兩浸一二宿後用塩炒乾）　吳茱萸（湯炮炒四兩）

右末搗葱白成膏為丸梧子大每五十丸空心温酒或塩湯下

又方　治諸疝痛及心痛臨發時服

海石　香附　爲末姜汁調下

一人患疝因服熱藥多以致小便不通後用五苓散分三帖每加連鬚葱一根射香少許塩五分煎服連進三服其夜下黑汁二升臍下遂寛續用硇砂丸数日全愈

赤水玄珠第十六巻目録

霍亂門　轉筋　中惡客忤

欬逆　噫氣　下氣　漏氣

嘈雜門

眩暈門

痛門

痘證門

厥門

吐門

赤水玄珠第十六卷

新安生生子孫一奎著輯

霍亂門

霍亂者揮霍撩亂其勢急暴有似鬼祟實非邪也乃內有所傷外有所感陰陽乖隔而成此前人

格論

內經曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨搖併蓋言木乘土而為病也夫霍亂者揮霍撩亂也其症心腹卒痛嘔吐下痢發熱增寒頭痛眩運或吐而不瀉或瀉而不吐或吐瀉並作夫邪在上焦則先心痛而吐邪在中焦則先腹痛而瀉邪客上中二焦則吐瀉俱作甚則轉筋入腹則斃蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔逆治之惟宜温煖更詳別三因以調之外因諸風則惡風有汗傷寒則惡寒無汗冒温則重著傷暑則煩熱又有內因九氣所致鬱聚痰飲痞隔不通遂致滿悶隨其勝復必作吐利或諸飽食膾炙恣飧

乳酪寒漿旨酒脾胃受傷遂成吐利又有轉筋者蓋陽明胃主養宗筋今暴吐下津液頓亡宗筋失養以致攣轉甚則卵縮舌捲為不治之症又有乾霍亂者上不得吐下不得利壅悶正氣關格陰陽躁擾喘脹命在須臾若濕霍亂則所傷之物因吐瀉而出吐瀉盡則止故猶可治大抵熱勝痰鬱則悶亂濕勝飲鬱則利下其治濕霍亂宜藿香正氣散加生姜不惟可以温散風濕抑亦可以調理吐瀉其若傷暑所致者亦不可遽用香薷沉冷之劑合先用橘皮半夏生姜之類開散結滯次則以香薷五苓温服散暑解煩或挾寒而手足厥逆腹中絞痛宜以四逆理中之類温之亦不可遽用峻補兜澁之劑則邪愈滋而變症百出治乾霍亂急以鹽湯灌之令其大吐庶有可生切不可與穀食恐胃中邪物吐瀉不盡新穀一入脾不能化轉增危殆慎之慎之大槩其脉浮洪者易治若脉微遲加以氣少昏沉不語者皆難治也

丹溪曰内有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加減作吐以提其氣切莫與穀食雖米飮一呷入口即死必待吐瀉盡過二三時直至飢甚方可與稀粥其脉多伏欲絶　又曰雖已吐瀉不徹還用吐提其氣或用樟木煎湯吐之

大法生姜理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓散亦可下者　乾霍亂最難治死在須臾升降不通邪無從出當吐提其氣極是良法世多用塩湯為内有食傷外有邪遏故吐之吐中就有發散之義

轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩邊此千金妙法也　轉筋入腹者死

脉訣舉要曰滑数為嘔代者霍亂微滑者生濇数凶斷又曰滑而不勻必是吐瀉霍亂之候脉代勿訝

内經曰脉伏者霍亂脉微而濇　或代而散　或隠而伏　或大而虚　脉右關滑為霍亂吐瀉

脉結促代皆不可斷以死　脉大者生　脉洪者為熱　絃者為飮　氣口脉絃滑膈間有宿食留飮

縮脾飮　解伏熱除煩渴消暑毒止吐瀉宜沉冷頻服　草果仁四两　烏梅肉三两　甘草炙二两半

每服五錢姜十片水煎服

藿香正氣散　中濕霍亂吐瀉

蒼朮　陳皮　半夏　藿香各二錢　甘草炙一錢

姜五片枣二枚水煎服

桂苓甘露飮　中暑霍亂吐瀉發渴引飮方見中暑

不換金正氣散　霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼方見瘟疫門

五苓散　方見暑門

藿苓湯　外感風寒内傷飮食霍亂轉筋吐瀉

藿香　厚朴　白朮　茯苓各一錢二分　甘草炙五分

大腹皮　紫蘇　白芷　桔梗　半夏　陳皮各一錢　肉桂六分　猪苓　澤瀉各一錢半　姜五片水煎服

訶子散　霍亂吐利如神又治心脾冷痛

訶子　甘草　厚朴　乾姜　草果仁　陳皮

良姜　茯苓　神曲　麥芽等分　水煎入塩服

二香散　暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂
藿香　白术　厚朴　陳皮　茯苓　半夏
白扁豆　紫蘇　桔梗　白芷　香薷　黃連各一錢　大腹皮　甘草炙五分　薑五片　葱白三根　水煎服
加味四君子湯　霍亂轉筋吐瀉腹中痛體重脉沉細兩　人參　白术　茯苓各二錢　甘草炙　芍藥
良薑各一錢　薑三片棗二枚水煎服
通脉四逆湯　霍亂多寒肉冷脉絶
吳茱萸炒二兩　附子炮一兩　桂心　木通　白芍藥
細辛　甘草炙各五錢　當歸三錢　每服七錢水一鍾
酒半鍾薑七片棗一枚煎七分温服

〈十六卷〉　五

七氣湯　七氣鬱五臟之間互相刑克陰陽不和
揮霍變亂吐利交作
半夏五兩　厚朴　桂心各三兩　白芍藥　茯苓各四兩　紫蘇葉　橘皮各二兩　人參一兩　每七錢水一
盞半酒半盞薑七片棗一枚煎温服
木瓜湯　霍亂吐瀉轉筋擾悶
酸木瓜二兩　茴香微炒二錢半　甘草炙二錢　吳茱萸炒二兩　每服五六錢薑七片紫蘇十葉水煎服一方無茴香
薑附湯　霍亂轉筋手足厥冷多汗嘔逆方見寒門
加味香薷飲　伏暑吐利不止煩悶多渴
本方加檳榔黃連　每五錢水酒各半煎服
冷香湯　夏秋伏暑引飲過食生冷遂成霍亂
良薑　附子　甘草　檀香各一錢　乾薑炒一錢　草菓半錢　丁香三分　分二服水煎連瓶沉井內待冷服
人參散　霍亂體痛四肢逆冷服理中四順不效者
人參　白芍　川歸炒　良薑各一兩　附子　陳皮
桂心　白术各三錢　每五錢加紅棗三枚水煎服

〈十六卷〉　六

活命散　霍亂吐瀉不止面色青黑垂死者
防風　羌活　獨活　乾薑　細辛各一分　草豆蔻　肉豆蔻　川芎各五錢　官桂半分　吳茱萸　木瓜各一兩　每三錢濃煎木瓜湯調服
四生散　霍亂不已吐利不止但有一點胃氣存
無不効者　陳皮　藿香葉各五錢　不煎或為末
熱酒調服
秘方　霍亂吐利轉筋神効

白扁豆葉根一研取汁一碗入米醋同服立瘥

加減理中湯　霍乱嘔吐

白朮　人參　乾姜各三錢　甘草炙一錢　水煎服

若為寒氣濕氣所干者加附子一錢名附子理中湯　若霍亂吐瀉加陳皮青皮各一錢名治中湯　若乾霍亂心腹作痛先以塩湯少許頻服候吐出令透即進此藥　若嘔吐者加丁香半夏各一錢姜十片同煎　泄瀉者加橘紅茯苓各一錢名補中湯　溏瀉不已

於補中湯内加附子二錢不喜飲食及米穀不化再加砂仁一錢　霍乱吐下心腹作痛手足逆冷于本方内去白朮加熟附子名為四順湯　傷寒結胷先以桔梗枳殼等分煎服不效者及諸吐利後胷痞欲絕心膈髙起脹痛手不可近者加枳實茯苓各一錢名枳實理中湯　若渴者再于枳實理中湯内加瓜蔞根一錢　霍亂轉筋者理中湯内加火煆石膏一錢　若臍上築者乃腎間動氣也去朮加官桂一錢半腎悪燥去朮恐作奔豚也故加桂取辛以潤之　若悸者加茯苓一錢　渴欲飲水者加白朮五分　腹滿者去白朮加附子一錢　若寒者再加乾姜一錢　飲酒過多及啖炮炙熱物發為鼻衄者加川芎一錢　傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉只用本方

二因白朮散　中暑嘔吐眩運及大病後調理失宜勞復及脾胃虛損面色青黃飲食不思口吐

酸水滑泄腹鳴飲食所傷霍乱吐瀉並宜服之

白芷　甘草炙　青皮　白茯苓　桔梗　香附子　山藥各三兩　乾姜五錢　白朮　陳皮各一兩

每一兩姜三片棗一枚木瓜一片紫蘇三葉水煎服　若吐瀉加白梅煎　喘加桑白皮杏仁　傷寒勞復加薄荷　膈氣加木通入射香少許　中暑嘔逆加香薷　霍亂加藿香　産後泄瀉加荆芥　氣厥加塩煎服

調中白朮散　大病後吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱

及酒毒嘔噦 白术 茯苓 人參各五錢 藿香五錢 甘草炙一兩五錢 木香一錢 葛根 為末白湯調服二錢 煩渴加滑石二兩甚者加姜汁

經驗方人參散 止吐逆及瀉後煩渴常服調中和氣

人參 茯苓各五錢 葛根一兩 藿香 木香 甘草炙各一錢 分三帖水煎服 瀉後渴甚者加滑石一錢

止渴湯 霍亂煩渴

甘草炙 人參 麥冬 茯苓 桔梗 瓜蔞根

澤瀉 葛根各五錢 右末蜜湯調下二錢

姜鹽飲 霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一兩 生姜五錢搗碎 同炒令色變以水一碗煎熱溫服甚者加童便一盞

蓼湯 霍亂轉筋不止

蓼一大握水煎湯薰洗或以帛蘸湯熨患處

一方 每遇轉筋時即以鹽揩擦痛處三五十匝即雖皮破亦不妨可以斷根

灸法 霍亂已死腹中尚煖猶未絕氣者用鹽納臍中令滿大艾炷灸三五七壯甦

麥冬湯 霍亂已愈煩熱多渴小水不利

麥門冬 茯苓 半夏 陳皮 白术各一錢半 人參 小麥 甘草各一錢 生姜五片烏梅半箇 煎服

青金丹 霍亂吐瀉不止及轉筋諸藥不効者

硫黃一兩 水銀八錢 右二味銚子內炒柳木箆子不住手攪勻更以柳枝蘸冷醋頻洒候結如鐵色即成青金丹乃刮下再研如粉留小

半為散餘以粽子尖三箇醋約半盞研稀稠得所成膏丸如雞豆子大硃砂為衣每服一丸煎丁香湯磨化下熱服如作散服以丁香湯調下一錢傷寒陰陽乘伏用龍腦冷水磨下一日二三服

海藏云吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜和中

四君子湯平胃散建中湯 每一兩姜五片水煎服如吐瀉轉筋自汗脉浮者四君子湯加桂五錢 吐瀉轉筋脇下痛脉絃者宜建中加木

瓜柴胡湯平胃散加木瓜五錢亦可也

建中木瓜柴胡湯

桂枝一兩半 芍藥三兩 甘草一兩 膠飴糖半杯 生姜一兩半 大棗六枚 木瓜五錢 柴胡五錢 每一兩水煎臨服加飴糖兩匙 吐瀉後小便不通胸中實痛者四君子湯加大黃一兩 吐瀉腹中痛轉筋體重脉沉而細者宜四君子加高良姜白芍藥四君子四味各一兩芍藥良姜各五錢同前煎法服 吐瀉霍亂四肢拘急脉沉而遲者宜四君子湯加姜附厚朴湯四君子四味各一兩生姜附子厚朴薑製三錢各同前煎服 吐瀉轉筋四肢厥冷服微緩者宜建中加附子當歸湯

桂枝一兩 當歸二錢 芍藥二兩 粉草五錢 飴糖半杯 生姜一兩 附子炮三錢 大棗六枚 同前煎服 吐後轉筋木瓜一味煎服良

轉筋

尋常轉筋四時皆有不因霍亂而發者其發多于臑中或伸欠而作丹溪謂此多屬血熱以四物湯加蒼术紅花酒芩南星水煎服 有筋轉于足大指轉上至大腿近腰結了乃因奉養過厚飲冷感寒而作寒過其熱寒主收引勁急故筋轉而疼也前方加姜汁臨時服之 足太陽之下血氣皆少則善轉筋踵下痛 丹溪曰轉筋徧身入肚不忍者作極鹹塩湯于槽中暖浸之 蓼湯亦妙 蓼湯亦好 仲景云轉筋之為病其臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹者雞屎白散主之

雞屎白炒為末取方寸匕以水六合和温服 聖惠方 肝虛轉筋用赤蓼莖葉切作三合水一盞酒三合煎四合分二服 孫尚藥 脚轉筋疼痛攣急松節二兩剉如米粒乳香一錢以甆器内慢火炒令焦只留一分出火毒為末每一錢至二錢熱木瓜酒調下但是筋病疼痛皆妙不獨轉筋而已

外臺治轉筋取舊綿以釅醋浸甑中蒸及熱用綿

褁患脚上冷則易勿傷皮以瘥為止

秘方 脚轉筋無時甚好

雄猪陰莖一條全者薄切香油煎熟細嚼鹽酒送下空心服連進三朝奇驗

中惡客忤門

中惡客忤者無故忽然而病倒者是也多受于道途及早晚門外忽得之卒受非節之氣令人心腹絞痛脹滿叫喚氣冲心胷不急治則死磨好真烟墨一盞熱湯觧服之又有鹽湯探吐亦好

卒死鬼擊或先病因睡卧間忽然而絕皆是中惡之候若脉氣應指心頭仍暖者擣石菖蒲灌之立甦如口噤須灌從鼻入

中惡暴死 石菖蒲為末每用五分安舌底又吹入兩耳及鼻中則甦

中惡入心須死

阿魏末鹽酒調下一錢半連進二服効

中惡吐血 生桔梗取汁每服一鍾日三無生者以乾者為末仍以桔梗湯調下

中惡客忤 蘇合香丸姜湯調下妙

欬逆門

內經曰歲金太過欬逆金欝之發欬逆少陰二氣欬逆古謂之飽逆氣上逆作聲之名也經曰諸逆衝上皆屬于火是心火刑于肺金也易老曰欬逆者火熱奔急上行而肺金不納何其當哉俗以為噦者非蓋噦者出聲也噦出其氣噦声盡然後呼也出入呼吸大有不同况噦者本于胃欬逆者本于肺又豈可例論哉然是症或由

水清于肺而心痞或喜笑過多而氣噎或痰飲錯喉而氣嗆或急食乾物而氣塞皆令作欬逆之聲連續不絕俗謂吃忒是也人或以紙撚取鼻嚏而止或寃以恐賊因恐而止或鼻熱聞食香調氣而止皆抑之駭之而使氣下也又有胃氣寒而呃元禮戴氏以雜病發呃者皆屬寒惟有傷寒發呃屬熱蓋由陽明內實過經失下清濁不得升降以致氣不宣通而作或又有飲食填塞胷中而氣不得升降者或有痰閉于上火

起于下而氣不得伸越者又有吐利後胃虛膈熱而作呃者又有氣血虛作呃者不可以不辨也

傷寒陽症欬逆者盖由陰消將盡陽火暴甚直冲而上出于胃入於肺而作聲所以東垣用凉藥以瀉熱降火其陰症欬逆者盖以陰氣先消陽火將竭浮于胷中亦欲散也故反用丁香乾姜之屬以養胃中陽氣胃氣一和陽生則陰長也

丹溪云傷寒發呃亦有四症不同有中氣不足脉虛微氣不相續而發呃者宜補中益氣湯加生脉散加黃栢以降虛火或少加附子服之立愈○有陽明內實失下而發呃宜大承氣湯下之○有渴而飲水太過成水結胷而發呃者宜小陷胷湯或小青龍湯去麻黃加附子治水寒相搏發呃者妙○有傳經傷寒熱症誤用姜桂熱藥助起火邪痰火相搏而為呃者宜用黃連解毒白虎湯及竹瀝之類○大凡食呃便秘者大承氣下之便軟者瀉心湯主之○久病虛者見此症最危○心法云欬逆有痰有氣虛有陰火視其有餘不足治之其詳在格致餘論不足者人參白虎下大補丸○有餘并有痰者吐之人參蘆之類○痰碍氣而吃逆者用蜜水吐此乃燥痰不能出○痰者以陳皮半夏○氣虛人參白术○陰火黃連黃栢滑石○欬逆自痢者滑石甘草炒黃栢白芍藥人參白术陳皮加竹瀝服

戴元禮云欬逆因痰與熱及胃火者極多

橘皮竹茹湯　胃熱多渴嘔噦不進飲食

赤茯苓　陳皮　枇杷葉　麥門冬　竹茹　半夏各二錢五分　甘草炙　人參各一錢二分　分二服每服姜七片水煎一方只用人參陳皮甘草竹茹

小柴胡湯　加姜三片柿蒂三枚輕服治同上

橘皮乾姜湯　胃寒欬逆

陳皮　通草　乾姜　桂心　人參　甘草各等分　水煎

丁香柿蒂散　病後胃中虛寒欬逆至八九聲相連收氣不回者難治

人參 茯苓 陳皮 半夏 良姜（炒） 丁香

柿蒂（各一兩） 生姜（一兩半） 甘草（五錢） 水煎服調蘇合香丸服尤妙一方只用良姜丁香柿蒂甘草四味水煎服

柿蒂湯 胸滿欬逆不止

柿蒂 丁香（各三錢） 一方加人參姜五片水煎服

皂莢半夏湯 治欬逆欲死

半夏（一兩） 皂莢（八錢去皮弦酥炙） 為末煉蜜丸梧子大每三丸棗湯吞日三服夜一服

〈八十六卷〉 十七

羌活附子湯 吐痢後胃寒欬逆

羌活 附子（炮去皮臍） 茴香（炒炙半兩） 乾姜（炮） 丁香（各一兩） 每二三錢水一鍾鹽少許煎七分服

灸欬逆法 乳下一指許與乳相直骨間陷處婦人三壯男左女右只灸一處火至則瘥不瘥即不治又云其穴只當取乳下骨間動脉處是

無病偶然致餩此緣逆氣而生宜小半夏茯苓湯加枳實半夏湯或用煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散乘熱服逆氣用之佳

人參白术湯

人參 黃芩 柴胡 乾姜 甘草（炙） 梔子仁（各五錢） 白术 防風 半夏（炮） 五味子 每服五六錢加姜五片水煎服

宣明桂苓白术散 消痰止欬逆散痞塞開堅結痛悶進飲食和臟腑

乾生姜 官桂（各二錢半） 茯苓 半夏（各一兩） 白术 橘紅 澤瀉（各五錢） 右末麵糊丸小豆大姜湯下三十丸日三服一方加黃連半兩黃栢二兩水丸効尤速

〈八十六卷〉 十八

噫門（俗作噯氣）

靈樞曰寒氣客于胃厥逆從下上散復出于胃故為噫又曰心為噫胃為噦釋之者曰神不守心故噫胃精內竭故噦傷寒書上焦不至其部故為噫中焦不至其部故為噦什之曰上焦竭善噫以上焦受中焦氣中焦不和不能消穀故令噫又曰緩者胃氣有餘噫而吞酸此言有餘者謂胃中有穀物未消故使噫而吞酸由此觀之

一由于胃寒一由于胃有宿食然亦有胃火衝逆而致者也有陰虛火因上炎而致者難以槩論也治法寒者溫之熱者凉之中焦未和者則消導以通之至于病久虛憊而噫則為神不守心而為死症矣

噫與欬逆不同噫乃出氣欬逆則為入氣然治法胃寒亦宜橘皮乾姜湯胃熱宜橘皮竹茹湯中焦未和而熱壅鬱或以調胃承氣下之或以加減平胃散以消之陰虛宜以四物湯或芎歸湯

加知母甘草以滋之

靈樞註云噫象火烟隨焰出心不受邪故噫出之宜甘草瀉心湯以生姜易乾姜若有微熱時噫者小柴胡湯

二陽一陰發病主驚駭背痛善噫欠也

仲景旋覆代赭湯　治痞而噫

本事方枳殼散　心下蓄積痞悶或作痛多噫敗卵氣

枳殼　白朮各五錢　香附一兩　檳榔二錢

為末每二錢米飲調下日三服

丹溪云噫氣胃中有痰有火

又云曾治宣州一人氣上築心膈噫氣脉之右關短弱左關尺洪長而大數此肝有熱宜瀉肝補脾

青皮一錢　白朮二錢五分　木通　甘草二分

水煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒

清胃中痰火　鬱熱噯氣

南星製　半夏各一兩半　軟石膏　香附各一兩　山梔子七錢

每八錢水煎服

下氣門

下氣屬心虛經云夏脉者心也心脉不及下為氣泄者是也

河間云腸胃鬱結穀氣內發而不能宣通于腸胃之外故善噫而或下氣也

診論云顛癇癆瘵若氣下泄不止者必死此真氣竭絕腸胃腠理閉塞穀氣不能宣通于腸胃之外故從腸胃中泄出也

漏氣走哺門

病者身背皆熱肘臂攣痛其氣不續膈間厭悶食

入則先吐而後下名曰漏氣此由上焦傷風開其腠理經氣失道邪氣内著麥冬湯主之

麥門冬　生蘆根　竹茹　白术　人參　甘草　茯苓　陳皮　萎蕤

走哺病者下焦實熱大小便不通氣逆不續嘔逆不禁名走哺人參湯主之

人參湯即前方加知母石膏黄芩

嘈雜門

生生子曰内經云胃爲水穀之海無物不受若夫濕麵魚腥水果生冷以及烹飪粘滑難化等物恣食無節脾氣受傷失其健運之常清痰稠飲由此而生嘈雜由此而作也夫嘈雜之爲症似飢不飢似痛不痛而有懊憹不自寧之態是也或兼噯氣痞滿惡心漸至胃脘作痛數者多挾痰火故丹溪云嘈雜是痰因火動治法宜以南星半夏橘紅之類以消其痰芩連知母石膏梔子之類以降其火蒼术白术芍藥之類以健脾行濕又食欝者梔子姜炒黄連山查之類又有濕熱欝滯不喜食者宜三補丸加蒼术倍香附

蔣氏云心嘈索食白术黄連陳皮作丸白湯下七八十丸數服而愈要在臨症加减

脉法

右寸脉緊而滑兩寸弦滑胸中有留飲　寸脉横者膈上有横積也　右関弦急甚者爲木乘土位欲作胃反難治

嘈雜亦有中氣不足者以六君子湯加竹茹黄連

三補丸

黄芩　黄連　黄柏等分　蒸餅糊丸服

二聖丸

白术四兩　黄連四錢　陳皮一兩　神麯糊丸姜湯下

右関脉沉嘈雜　二陳湯加藿香　若吐而有物有声者加砂仁　有声無物加姜炒黄連

眩暈門

丹溪曰眩言其黑暈言其轉

林氏曰眩者玄也謂忽然眼見黑花昏亂少頃方定暈者運也謂頭目若坐舟車而旋轉運也甚

有至于卒倒而不知者
丹溪又曰此症屬痰者多蓋無痰不能作眩雖因
于風亦必有痰痰在上火在下火炎上而動其
痰則作眩也治宜二陳湯加黃芩蒼朮羌活挾
氣虛者亦治痰為主兼補氣降火如東垣白朮
半夏天麻湯之類傷濕者降濕湯加川芎左脉
數熱多脉澁有死血右脉實有痰積脉大久病
眩運不可當者以大黃酒炒為末茶湯調下其
効○戴云有因虛致暈雖暈然醒時面常欲得

熱手按之蓋頭者乃諸陽之會陽氣不足故耳
有頭眩而耳中常鳴頭上如鳥雀啾啾之聲切
不可全謂耳鳴為虛此頭腦挾風所為也○原
病式曰諸風掉眩皆屬肝木風主動故也所謂
風氣甚而頭目眩暈者由金虛不能制木而復
生火風火皆屬陽陽主動兩動相摶則為之旋
轉也成無己曰傷寒頭暈與眩冒者皆發汗吐
下後所致由陽虛也○嚴用和曰眩暈之症經
雖云皆屬于肝風上攻然體虛之人外感六淫

內傷七情皆能眩暈當以脉証別之風則脉浮
有汗項強不仁寒則脉緊無汗筋攣掣痛暑則
脉虛煩悶濕則脉沉重則吐逆及其七情所感
遂使臟氣不平鬱而生涎結而為飲隨氣上逆
令人眩暈眉稜骨痛眼不可開寸脉多沉此為
異耳若疲勞過度下虛上實金瘡吐衄便利及
婦人崩傷產後去血過多皆令人眩暈當隨其
因治之○張子和曰頭風眩暈手足麻痺胃脘
發痛皆風寒暑濕之氣雜至合而為痺也在上

為之停飲可用獨聖散吐之吐後服清上辛涼
之藥○劉宗厚曰眩暈一証人皆稱為上盛下
虛所致而不明言其所以然之故所謂虛者血
與氣也所謂實者痰涎風火也原病之由有氣
虛者乃清氣不能上升或多汗亡陽當升陽補
氣有血虛者乃因亡血過多陽無所附當益陰
補血此皆不足之症也有因痰涎鬱遏者宜導
痰開鬱重則吐下有因風火所動者宜清上降
火又有外感而得者嚴氏雖分四氣之異皆當

散邪為主此皆有餘之症也世所謂氣不歸元而用丹藥鎮墜沉香降氣之法蓋香竄散氣丹藥助火其不歸之氣豈能因此而復耶内經所謂治病必求其本氣之不歸求其本而用藥則善矣○林氏曰淫慾過度腎家不能納氣歸元使清氣逆奔而上此眩暈出于氣虛也吐衂崩漏肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈生于血虛也氣虛者宜益氣補腎湯血虛者宜補肝養榮湯若專用溫熱鎮墜丹藥多致飛越之元其害有不可勝言者矣

生生子曰按劉林二公慎丹劑戒燥熱俱為保金水二臟真陰而言也木之有餘則挾火勢而侮肺金金受火侮津液枯涸降令不行生化之源絕矣况斷喪枯燥之腎曷能為其母復仇耶由是假藥餌以相濟也既知其腎虛不能納氣歸元矣寧復更以燥熱傷其母可乎都緣滯于溫補下元之說不體認夫真陰真陽之虛實以故相循習俗而為流弊也凡物各有偶也肺出氣腎納氣今氣不歸元是腎之真陰不足當益腎陰以全其職可也腎雖屬陰臟而用藥亦自有氣血之分焉氣虛則用補骨脂杜仲兎絲子之類如安腎丸之謂也若血虛則以山藥山茱萸熟地黃之類如六味地黃丸之謂也氣是無形者至清所以能走空竅而施精明非有形之丹石所能鎮墜二公辨之允矣或曰經云形不足者溫之以氣精不足者補之以味吾子以溫補為謬可乎予曰前人已註之矣溫是溫存之溫

非專指溫暖之藥而言也味是味之厚者乃陰中之至陰本乎天造非偏厚出于人為之味也是皆不以溫熱為補明矣前証若果屬腎虛木旺火亢金衰則當從東方實西方虛瀉南方補北方之治則其氣自平而無偏倚之患也矣

眩暈一証前賢著述病因方藥可謂周且備矣原其著述各有所發明也劉河間之肝木兼于風火之化成無已之傷寒引汗吐下後之虛嚴用和之四氣七情張子和之停飲吐法朱丹溪之

痰火濕熱氣虛血虛死血久病戴氏之陽虛劉宗厚林億公之陰虛戒溫熱香竄之丹劑各剖其衷製方立論誠後學之寶鑑一展視之毫髮畢覩原其設意盖以人之司命為重故不以研心為勞也庸是窮究精微不為成說所縛補前人所未盡開來學之蒙蔽得非仁人之心其心歟今之醫者每每撿方治疾至于經旨病機全不攷究甚至有得一僥倖之方就以是為世世傳家至寶不妄泄人噫何其鄙哉方前諸君子

吐心露膽者為何如人耶聖人未嘗以聖自期也盖以其有公天下之心立德不衰而後人稱之也賢人未嘗以賢自待也盖以其有同天下之志繼聖不怠而後人誦之也後之視今亦猶今之視古也學者能不以聖賢之心為心焉

鈎藤散　肝厥頭暈清目

鈎藤　陳皮　半夏　麥冬　茯苓　石膏

人參　甘菊　防風各五錢　甘草一錢半

每服四錢姜七片水煎溫服

肝厥狀如癇疾不醒嘔吐醒後頭虛暈發熱

麻黄　鈎藤取皮　石膏　乾姜　半夏曲

柴胡　甘草　枳殻　甘菊

每四錢姜三片棗一枚水煎溫服

婦人患頭風眩者十居其半每發必掉眩如在車上盖因血虛肝有風熱故耳余嘗取此方以授人比他藥捷而効速名曰芎藭散

川芎一兩　川歸三兩　羌活　旋復花　蔓荊子

細辛　石膏　藁本　荊芥穗　半夏曲炒

防風　熟地　甘草各半兩

每五錢姜三片水煎溫服

天麻半夏湯　風痰内作胸膈不利頭旋眼黑兀兀欲吐上熱下寒不得安卧

天麻　半夏各一錢　橘紅　柴胡各七分　酒芩

前胡　甘草炙　白茯苓各五分　黃連三分

姜三片水煎食後溫服忌生冷酒麵

益氣補腎湯　淫慾過度腎家不能納氣歸元使諸氣逆奔而上此眩暈出于氣虛也

人參 黃芪蜜炙各一錢二分 白朮二錢 山藥 山茱
萸各一錢半 白茯苓一錢 甘草炙五分 棗二枚水煎服
補肝養榮湯 吐衂崩漏肝家不能收攝榮氣使
諸血失道妄行此眩暈生于血虛也
當歸 川芎各二錢 芍藥 熟地 陳皮各一錢半
甘菊一錢 甘草五分 水煎食前服 若腎虛氣不
降者去菊花入前補腎湯
清眩化痰湯 痰火上攻作眩及氣不降胸滿者
川芎 酒芩各一錢半 天麻一錢 半夏湯泡二錢 白茯苓

橘紅各一錢一分 桔梗 枳殼各一錢 甘草四分
痰結眩暈甚者加南星旋覆花各一錢
六合湯 風虛頭暈及血虛或去血過多
當歸 川芎各二錢 白芍藥 熟地各一錢半 秦艽一錢
羌活七分 水煎食遠服
川芎散 勞倦後身體發熱眩暈神魂不安
山茱萸一兩 山藥 甘菊花 人參 茯神
小川芎各半兩 右末每服二錢酒調下
安腎丸 腎虛頭眩牙齒疼痛腰痛

破故紙炒 胡芦巴炒 茴香炒 川練炒 續斷炒各三兩
桃仁炒 杏仁炒各一兩 山茱萸 茯苓各一兩半
右末蜜丸梧子大空心鹽湯下五十丸
六味地黃丸 見虛損門
加味參夏湯 七情相干眩暈欲倒者
人參 半夏各一兩半 肉桂一兩 甘草炙五錢 乳香三錢
每五錢姜五片水煎服 又治七情之氣鬱
於心腹痛不可忍脉沉遲一服立効
枯礬散 治痰暈
枯礬為末姜湯調下一錢吐之立愈

清上丸 安神治痰火眩暈
石菖蒲 酸棗仁 膽星 茯苓 黃連半
夏 神曲 橘紅各一兩 姜蚕 青代 木香各五
錢 柴胡七錢半 竹瀝打糊為丸食後茶下一
錢五分
瘖門
瘖者邪入陰部也經云邪搏陰則為瘖然有二症
一曰舌瘖乃中風舌不轉運之類是也一曰喉

瘖乃勞欬失音之類是也蓋舌瘖但舌本不能轉運言語而咽喉音声則如故也喉瘖但喉中聲嘶而舌本則能轉運言語也

痰涎乘虛閉塞舌本之脉道令人瘖

丹溪謂一人年三十五連日勞倦發嗽發瘧醫與瘧藥三發後変為發熱舌短言語不辯喉間痰吼有聲脉洪数似滑遂以獨參湯加竹瀝兩甜殼許兩服後吐膠痰三塊舌本正而言可辯餘症未退遂煎人參黃芪湯服半月而諸症皆退粥食調補兩月方能起

〈十六卷　三十五

一中年舌短言語不辯始傷寒身熱師與傷寒藥五帖後变神昏而瘖遂作體虛有痰治以人參五錢黃芪當歸白朮陳皮各一錢煎湯入竹瀝姜汁飲之十二日其舌始能語得一字又服之半月舌漸能轉運言語熱除而痊

足少陰脉挾舌本足太陰之脉連舌本手少陰別繫舌本若此三脉虛則痰涎乘虛而閉塞其脉道故舌不能轉運言語也若此三脉亡血則舌無血營養而瘖

經云刺舌下中脉太過血出不止為瘖治當補氣血

一男子年五十餘嗜酒吐血桶許後不食舌不能語但渴飲水脉畧数與四物各一兩參朮各二兩陳皮一兩半甘草二錢入竹瀝童便姜汁至二十餘帖乃能言凡此三脉風熱中之則其脉弛縱故舌亦弛縱不能轉運而瘖風寒客之則其脉縮急故舌強舌卷而瘖治在中風半身不收求之也

〈十六卷　三十六

脉要精微篇岐伯謂心脉搏堅而長當病舌轉不能言

丹溪治俞繼道遺精誤服參芪及升浮劑遂氣壅于上焦而音聲不出用童便浸香附為末調服而踈通上焦以治瘖又用蛤粉青黛為君黃柏知母香附佐之為丸而填補下焦以治遺十餘日良愈　本草云童便主久嗽失音故治瘖多用之由其能降火故也

出音声方

訶子炮去核木通各一两甘草半两用水三升煎一升半入生姜地黄汁一合再煎数沸放温分六服食後日三服（訶子治逆氣破結氣木通利九竅治肺癰甚當）

訶子湯 治失音不能言語

訶子（四两半生半煨） 桔梗（一两半生半炒） 甘草（二寸半炙半生）

右末每服二錢童便一盞水一盞煎至七沸温服甚者不過三服愈（桔梗通利肺氣訶子泄肺導氣童便降火甚速）

又方 桔梗（二两） 大訶子（四個） 甘草（二两炙） 每服三四錢水煎入砂糖一小塊不入童便時時細呷一日服盡其効甚速

發声散 治咽喉語声不出

栝蔞皮 白姜蚕（去頭） 甘草 俱炒黄等分為末每温酒調下三錢或生姜自然汁調下用五分綿褁噙化咽津亦可日二三次不拘時

肘後方 咽喉卒失音不出

陳皮（五两） 水三升煮取一升頓服

玉粉丸 冬月寒痰結在咽喉語声不出

半夏（炮五次） 草烏（炒二分半） 桂（去二分） 為末生姜汁浸飯餅糊為丸雞豆大每夜噙化一丸多年不愈皆効 黄帝針經中説寒氣客于會厭卒然而瘂此藥主之

蛤蚧丸治肺間邪氣胸中積血作痛失音并治久欬失音 蛤蚧（一對去觜足温水浸去膜刮了血脉用好醋炙） 訶子（煨）

阿膠（炒） 生地 麥門冬 北細辛 甘草（炙各五錢）

為末蜜丸棗子大每食後噙化一丸

千金方 暴失音語声不出

杏仁泥 姜汁 砂糖 白蜜（各一升） 五味子 紫苑（各三两） 通草 貝母（各四两） 桑白皮（五两）

右水九升煮五味紫苑通草貝母桑皮取三升去渣納杏仁泥姜汁蜜糖微火攪煎取四升初服三合日再服一合後稍加

通声膏 五味子 款冬花 通草（各三两） 人參 石菖蒲 細辛 桂心 竹茹（各二两） 杏仁（一升） 白蜜（二斤） 東膏 姜汁（一升） 酥（五升）

水五升微火煎三上三下去渣納姜汁棗膏
酥蜜煎令調和酒服如棗大二丸
丹溪治欬嗽声嘶者此血虛受熱也用青代蛤粉
蜜調服之
濟世方　治失音及咯血
槐花瓦上炒香出火毒三更後床上仰卧隨意
呑之
又方　治卒啞
杏仁三分去皮尖　桂一分　研如泥和取杏核大綿裹
含細細咽之日五夜三

丹溪治失音以桂末着舌下嚥津妙 丁金門食忌堅斗乃同
内侍曹都使新造一宅落成入居半月飲酒大醉
卧起失音不能語召孫至診曰因新宅故得此
疾耳半月當愈但服補心氣薯蕷丸治濕用川
芎細辛又十日其病漸減二十日全愈曹既安見
上問誰治曰孫兆郎中上乃召問曰曹何疾也
對曰凡新宅壁上皆濕地亦陰多人乍來陰氣
未散曹心氣素虛飲酒至醉毛竅皆開陰濕之
氣乘虛而客心經所以不能語臣先用薯蕷丸
使心氣壯熱然後以川芎細辛去其濕所以能語也
靈樞經黃帝問于少師曰人之卒然憂恚而言無
音者何道之塞何氣出行使音不彰願聞其方
少師曰咽喉者水穀之道路也喉嚨者氣之所
以上下者也會厭者声音之戶也口唇者音声
之扇也舌者音声之机也懸雍垂者音声之関
也頏顙者分氣之所泄也橫骨者神氣所使主
發舌者也故人之鼻洞涕出不收者頏顙不開

分氣失也是故厭小而疾薄則發氣疾其開闔
利其出氣易其厭大而厚則開闔難其氣出遲
故重言也人卒然無音者寒氣客于厭不能發
發不能下至其開闔不至故無音黃帝曰刺之
柰何岐伯曰足之少陰上繫于舌絡于橫骨終
于會厭兩瀉其血脉濁氣乃辟會厭之脉上絡
任脉取之天突其厭乃發也
胎前產後瘖
素問黃帝曰人有重身九月而瘖此為何也岐伯

曰胞之絡脉絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫于腎少陰之脉貫腎係舌本故不能言帝曰治之柰何岐伯曰無治也當十月復

郭氏論產後不語者何荅曰人身有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉于心竅神志不能明了心氣通于舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語但服七珍散

七珍散 產後敗血閉塞心竅令人不語

人參 石菖蒲 生地 川芎各一兩 細辛 防風 辰砂各另研半兩 為末每服一錢薄荷湯調下

胡氏孤鳳丹 產後閉目不語

白礬研末每一錢熱水調服

疸門

夫疸者謂濕與熱欝蒸于脾面目肢體為之發黃是也疸之名有五一曰黃汗者身體俱腫汗出不渴其汗能染衣黃如蘗汁此由脾胃有熱汗出為風所閉熱結于中其汗黃也二曰黃疸食已即飢遍身俱黃但欲卧小便澁黃增寒壯熱此酒麵煉炙蘊熱瘀滯而得也三曰穀疸食畢即頭眩心中怫欝不安遍身發黃此脾胃有熱因大飢過食有傷胃氣所致也四曰酒疸身目俱黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤班此由飢中飲酒大醉當風入水所致也五曰女勞疸大勞渴慾大熱交接袵席未幾遽就浴室以致發熱惡寒小腹滿急而身目俱黃也五者之証雖不同而其為黃則一也原其所自未有不由濕熱而致者也濕也熱也而豈無輕重之别乎

濕氣勝則如薰黃而晦熱氣勝則如橘黃而明盖脾主肌肉土色本黃濕熱內蒸或重或輕自然見于外矣自其濕熱瘀而傷血此又為血症發黃何以明之疸症之黃小便不利血症之黃小便自利夫脾受濕熱欝而不行亦多有腹脹之疾治法大要錬導濕熱于大小便之中如茵陳五苓黃連三黃之劑皆要藥也然又單湯無陰病熱已極疸而不渴猶為可療疸而復渴加之腹膨則為難治矣甚者寸口無脉鼻出冷氣

與夫形如烟薰搖頭直視為心絕環口黧黑柔汗發黃為脾絕雖遇盧扁亦將不救孰謂黑疸其可療乎

加減五苓散 飲食伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便不利

茵陳 猪苓 白朮 赤茯苓 澤瀉各二錢

水煎食前服 一方有桂心七分

葛根荳豉湯 治酒疸

葛根一錢 山梔仁 枳實麩炒 荳豉各二錢

炙甘草一錢 水煎服

秦艽飲子 五疸口乾發熱微寒

秦艽 當歸 芍藥 白朮 官桂 熟地黃

茯苓 陳皮 小草 川芎 半夏 甘草炙各一錢 加姜五片水煎服

山茵陳湯 疸症發熱大小便秘澁

山茵陳 梔子 赤茯苓 枳實各一錢半 葶藶

甘草各一錢 姜二片水煎服

加味四君子湯 治色疸

人參 白朮 茯苓 白芍藥 黃芪炙 白扁豆炒各二錢 甘草炙一錢 姜五片棗二枚水煎服

茵陳湯 時行瘀熱在裏鬱蒸不散通身發黃

茵陳一兩 梔子仁一錢半 大黃三錢 水煎服

當歸白朮湯 酒疸發黃心胸堅滿不進飲食小便黃赤脈弦濇

當歸 黃芩 茵陳 甘草炙各一錢 白朮二錢 半夏 杏仁麩炒去皮尖 枳實麩炒

前胡各一錢半 茯苓二錢 姜三片水煎服

白朮湯 酒疸因下後變為黑疸目青面黑心下如啖蒜虀狀大便黑皮膚不仁脈微而數

白朮 桂心各二錢 枳實 荳豉 葛根 杏仁去皮尖炒 甘草炙各一錢 水煎服

桂枝加黃芪湯 黃汗身腫汗出已輒輕久久必身瞤胸中痛腰以下無汗其腰弛痛如有物在皮中劇者不能飲食煩躁小便不利

桂枝二錢 芍藥三錢 甘草炙一錢 黃芪二錢 姜五片棗三枚水煎服忌生冷

茵陳散 黃疸食已即飢身體面目爪甲牙齒及小便悉黃寒熱或身體多赤多青皆由酒食過

度為風湿所搏熱氣鬱蒸而成
茵陳 木通 大黄炒 梔子各一兩 石膏二兩 瓜蔞一箇 甘草炙半兩 每五錢姜五片葱白一莖煎至八分服大小便秘加枳實赤茯苓葶藶
又有傷寒瘀血不解鬱于表發為黄疸其脉浮緊當以汗解獨煎麻黄湯飲之
黄芪湯 黄汗身体腫發熱不渴汗出染衣黄色
黄芪蜜炙 赤芍 茵陳各二兩 石膏四兩 麥門冬 淡豆豉各一兩 甘草炙半兩 竹葉十四片 姜三片水煎服

滑石散 治女劳疸
枯礬五錢 滑石半兩 為細末每二錢用大麥粥湯調服以小便出黄水為度
嗃藥瓜蒂散 黄疸遍身如金色累効
瓜蒂二錢 母丁香四錢 黍米四十九粒 赤小豆五分 為末每夜以少許吹兩鼻内嗃入便睡明日取下黄水次服黄連散
黄連散 黄疸大小便秘臟腑壅熱
黄連 大黄醋炒各一兩 黄芩 甘草炙各一兩 每服二錢白湯下日三
犀角散 發黄心膈煩躁目赤痛
犀角屑 黄芩 梔子仁 升麻各一兩 茵陳 朴硝各二兩 每五錢竹葉七片水煎服
紫金丸 脾胃食積結塊令人四肢怠惰身面俱黄肚腹膨脹俗名黄胖病此藥能理脾胃消積聚退黄去脹進飲食
針砂炒紅醋內研 紫金皮酒浸 香附炒 京三稜煨 蒼术米泔浸炒 陳皮 厚朴 砂仁各一兩

麪糊丸梧子大每三十九白湯下或酒或川椒湯亦可忌牛肉沙魚等物
大温中丸 食積黄腫病
蒼术 厚朴 陳皮 三稜 蓬术 青皮各五兩 香附一斤 甘草二兩 針砂二兩醋炒紅 醋糊丸梧子大每五十丸空心姜湯下午後塩湯下臨卧酒下
金黄丸 食積酒積諸積面黄積塊堅硬疸症
京三稜 黑丑各二錢 巴豆四十九粒去油為末 黍米粉

香附各半兩 澤瀉半一錢 為末梔子煎湯和丸菜
豆大每三五丸食遠白湯下
穀疸丸 專治穀疸
苦參三兩 龍膽草一兩 牛膽一個
為末以膽汁入少煉蜜丸梧子大每五十丸
空心滾水或生姜甘草煎湯下
治黃疸効方
生蘿蔔子焙為末白湯調下日三服每用二錢
厥證門

脉沉微而不数謂之寒厥沉伏而数謂之熱厥
內經曰厥之寒熱者何也陽氣衰于下則為寒厥
陰氣衰于下則為熱厥熱厥之為熱必起于足
者陽氣起于足五指之表陰脉集于足下而聚
于足心故陽氣勝則足下熱也寒厥之為寒必
從五指而上于膝者陰氣起于足五指之裏集
于膝下而聚于膝上故陰氣勝則從五指至膝
上寒也寒厥何如而然前陰者宗筋之所聚太
陰陽明之所合也春夏則陽氣多而陰氣少秋

冬則陰氣盛而陽氣衰此人質壯秋冬多慾而
奪其精則陽氣日衰不能滲榮其經絡陰氣獨
在邪氣因從之而上故手足為之寒也熱厥何
如而然酒氣盛而慓悍酒入于胃則絡脉滿而
経脉虛脾主為胃行其津液者也陰氣虛則陽
氣入而胃不和胃不和則精氣竭而不榮其四
肢此人数醉若飽以入房氣聚于脾中不得散
酒氣與穀氣相薄熱盛于中故腎氣日衰陽氣
獨勝熱遍于身內熱而溺赤手足為之熱也此

內経論寒厥為手足寒熱厥為手足熱不專以
厥為手足冷矣故以六経厥狀言之太陽之厥
腫首頭重足不能行發為眴仆陽明之厥癲疾走
呼腹滿不得卧面赤而熱安見安言少陽之厥
頰腫而熱暴聾腸痛胻不可以運太陰之厥腹
滿䐜脹後不利不欲食食則嘔不得卧少陰之
厥口乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥少腹腫痛腹
脹溲不利好卧屈膝陰囊腫胻內熱此分六経
之厥亦不出寒熱二證劉宗厚謂陽證至為眴

什為癲疾為妄見陰證至為膜脹大小便不利或嘔或心痛之類皆素多痰氣因虛所乘之為病陳無擇謂攷其所因多以不勝乘其所勝氣不得行遂致厥逆如腎移寒于脾則水乘于土水既不行乃成寒厥如心移熱于腎則火乘于水火既不行乃成熱厥六經皆然可次第論也再考張仲景傷寒論陰陽二厥之證則皆指手足逆冷而言不以陽厥為手足熱也原病式謂陰厥者原病脈候皆為陰證身凉不渴脈遲而

微陽脈者原病脈候皆為陽證煩渴譫語身熱脈數若陽厥極深或失下變為身冷脈微欲絶反見陰證者正為熱極而然若悞作陰證而用熱藥治之必死王安道云熱極而成厥逆者陽極似陰也寒極而成厥逆者獨陰無陽也陽極似陰用寒藥獨陰無陽用熱藥今詳內經所論寒熱二厥由腎之精氣內竭而成乃常病虛損之證寒厥當補陽熱厥當補陰王冰所謂益火之原以消陰翳壯水之主以鎮陽光是也若仲景河間安道所論厥證乃傷寒傳變手足厥冷者病情不同治法亦異診察之間生死反掌医者當詳究焉

按傷寒陽厥者先自三陽氣分感寒起于頭痛熱惡寒後傳入三陰血分變出四肢厥冷大便燥實讝語煩渴揚手擲足不惡寒反怕熱脈沉有力等証此因大實失下使血氣壅閉不通故手足厥冷其手冷上不過肘足冷上不過膝或有時而乍温是外雖厥冷內實熱邪耳如火煉

金熱極則金反化水所謂亢則害其物承乃制其極也厥微者熱微四逆散厥深者熱深大承氣湯若悞作寒証而投熱藥是抱薪救火矣傷寒陰厥者是因三陰血分自受寒邪初病無身熱頭痛就便惡寒四肢冷過肘膝引衣踡卧或腹痛吐利小便清白或戰慄面如刀刮口吐涎沫脈沉遲無力此陰証也又有病自三陽傳入三陰久而變寒者亦陰厥也輕者理中湯甚者四逆湯且夫人之手足乃胃土之末凡脾胃有

熱手足必熱有寒手足必寒此理之常至于亢極反成兼化此又病形之變也故凡厥無脉可診未辯其為陰陽者且與理中丸加甘草一倍試之若陽厥便當見出熱証陰厥則無熱証矣此法記之

汪子良內外厥論曰素問云盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之靈樞引此以言人迎寸口經刺之法難經引此以言子母本經補瀉之方而王氏真邪相持之註尤別夫聖人之言所該自廣固可推而無不通然此段屬之六經厥狀病能之下而意實兼承上文寒熱之厥而著其所以治之之法故盛則瀉之言熱厥也虛則補之言寒厥也皆主內傷不盛不虛以經取之言六經厥狀此主外感按經有言熱為有餘寒為不足寒熱盛衰之別久矣而人之一身臟腑咽喉之類屬內經脉四肢皮膚頭項之類屬外故內傷之治在臟腑外感之治在經絡不可紊也觀上文云熱厥之故因酒入內氣薄于脾胃酒氣慓

悍腎氣獨衰陽氣獨盛故手足為之熱矣陽挾酒毒欝而為熱非盛而何故其治當瀉陽氣之有餘也又觀上文云寒厥之故因秋冬勞傷脾胃陽虛不能滲營其經絡陽氣獨損陰氣獨存故手足為之寒也陽為陰搏痞而為寒非虛而何故其治當補陽氣之不足也此二治者皆主內傷也非因內傷則臟腑之內無盛虛之分由外感邪氣客于經脉之間須審兼其經之証則取其經隨病盛衰而施補瀉也如腫首頭重足不能行發為眴仆者取之太陽如胻急攣心痛引腹者取之太陰之類是知此則聖言各有所指而意亦可以觸類而通矣

有人冒犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚粟起頭面青黑精神不守牙緊口噤昏不知人頭旋暈倒者此尸厥也凡弔死問喪入廟登塚飛尸鬼擊多有此病急以蘇合香丸灌之候稍甦省以調氣散合平胃散治之名調氣和胃散一法急用姜汁半盞酒半盞煎沸灌之灸百會四十九

壯氣海卅田二三百壯㷉体暖即止後以陰毒法治之此臟氣虛寒之証也世俗不識多作中風而治鮮不斃矣靈樞云邪客于手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會于耳中上絡左角若臟氣相刑或外邪相忤則氣遏不行五絡俱絶諸脉伏匿令人身脉皆動而形無所知其狀若尸故名尸厥昔扁鵲治虢太子之尸厥針三陽五會而愈正此謂也

有人七情内傷卒然氣逆身冷僵仆牙関緊急痰涎潮壅昏不知人者此氣厥也凡忿怒太甚多有此病勿悞作中風而用踈風散之藥急以蘇合香丸灌之候省以八味順氣散或木香調氣散調降其氣自然平復有痰者以四七湯加南星木香治之然暴厥不知人有不治自愈者昔宋仁宗最寵貴妃一日食次忽仆倒遍身卒冷急召孫尚杜任至奏曰不妨此氣厥耳少頃吐即復甦御坐良久果而甦上問因何而得二人並奏曰貴妃方食因憂怒氣上與食相併故如此吐即氣通故復甦也素問云厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者陰氣盛于上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛于上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知人也又云血之與氣并走于上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死者是也

厥因氣虛而得者其脉細小宜四君子湯加黃芪附子○因血虛而得者脉洪大宜四物湯加酒炒黃栢知母○因氣血兩虛而得者宜十全大

補氣血加附子○有吐衂不知人而厥者此血厥也治之無論其脉急用芎歸養榮湯十全大補湯或獨参湯以救之○厥因飲酒而得者宜二陳湯加黃連梔子乾葛青皮或葛根解酲湯加減治之

有人醉飽之後或感風寒或着惱怒忽然厥逆昏迷口不能言肢不能舉者此食厥也蓋食滯胸中陰陽痞隔升降不通故生此症若悞作中風而用祛風散氣之劑則胃氣重傷死可立待宜

煎姜塩湯探吐其食後以平胃散加茯苓白朮麥芽半夏之類調理若有風寒尚在者以藿香正氣散解之氣滯不行者以八味順氣散調之有小兒手足搐搦而發厥者此風厥也宜加減續命湯

五色篇雷公曰人不病而卒死何以知之黃帝曰火氣入于臟腑者不病而卒死矣雷公曰病小愈而卒死者何以知之黃帝曰赤色出兩顴大如拇指者病雖小愈必卒死黑色出于天庭大如拇指必不病而卒死

姜附湯

乾姜炮　附子　水煎涼服

星香散

南星四錢　木香五分臨熟磨　姜三片水煎服

順元散

木香磨五分　川烏炮錢　南星二錢　附子炮一錢　姜三片

水煎服

導痰湯

南星　半夏　枳實　橘紅　赤茯苓　甘草炙　姜三片水煎服

調氣和胃散

白豆蔻　木香　丁香　檀香　藿香葉

砂仁　甘草　蒼朮　厚朴　陳皮　水煎服

八味順氣散

白朮　茯苓　青皮　陳皮　人參　白芷

烏藥　甘草　水煎服

木香調氣散

木香　藿香　丁香　檀香　白荳蔻　砂仁

甘草　為末沸湯入塩少許點服二錢

芎歸養榮湯

當歸　川芎　白芍藥　熟地黃　黃栢

知母　人參　枸杞子　麥門冬　甘草

水煎服

加減續命湯

防風　防巳　人參　黃芩　白芍藥　川芎

甘草炙　麻黃　杏仁　桂枝　附子炮　生姜

水煎服 右方太陽無汗去桂枝附子有汗去麻黃杏仁陽明無汗加石膏知母有汗加葛根黃芩

傷寒病有胃中虛寒蛔虫攻胃而手足厥冷口吐清水或吐蚘者此蛔厥也宜理中湯加炒川椒檳榔煎吞烏梅丸如不止用烏梅川椒黃栢煎服蓋蛔見酸則安見辛則伏見苦則不敢動也

烏梅丸

烏梅二十五枚 細辛 附子炮 人參 黃栢 桂枝五錢 乾姜八錢 黃連一兩三錢 當歸 川椒二錢

（八十六葉）（五三）

右末以醋浸烏梅取肉蒸爛杵膏加煉蜜和丸每十五丸食前服

四逆散

甘草炙 柴胡 芍藥 枳實等分

為末白湯調服方寸匕日三服

蘇合香丸 治厥 方見氣門

論吐法

王海藏曰病有當吐而不可吐者如尺中脉按之有力則當吐之若尺中按之無力不可吐也有力則陽氣下陷于陰中為陰中所遏故吐之使陽氣得上升而復其平也

綱目論病不可吐者有六病勢劇甚老弱氣衰者不可吐吐不止則亡陽血虛者不可吐諸吐血嘔血喀血衄血嗽血血崩失血者皆不可吐病人無正性妄言妄從者不可吐主病者不辨邪正之說不可吐性行剛暴好怒喜淫之人不可吐

張子和曰凡涌後有頓快者有徐快者有反悶者病未盡也有反熱者不可不下也大抵三日後無不快者凡下不止者以氷水解之凡藥熱即行寒即止

（八十六葉）（五十四）

生生子曰經云上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死王海藏謂尺脉按之無力不可吐非與經背也經云下部無脉者謂病人當其正吐之時氣脉皆上逆而下虛是言病勢脉勢也若其人不吐而脉不至乎尺乃腎經之原氣絕矣故云下部無脉者死也海藏謂尺脉按之無力不可吐者是言治法也 凡尺脉有力則腎間有

原氣當吐去其邪則安矣若尺脉無力是腎陰
已虛吐則復傷其陽陰陽俱虛必致顛蹶故曰
尺脉無力者不可吐也經言其病王言其治也

茶調散一名二仙散

瓜蔕不以多少好茶中停　右細末每二錢虀
汁調下空心服

獨聖散

瓜蔕不以多少為細末每一二錢虀汁調下服
之脇痛加全蝎　頭痛加蔚金

（十六卷　辛五）

碧雲散　治小兒驚風有涎

膽礬半兩　銅青一分　粉霜一錢　輕粉一分
右細末每一字薄荷湯下　中風以漿水調

赤水玄珠第十七卷目録

素問熱病論　問桂枝湯發汗治法
三陽三陰辯証　仲景傷寒例
太陽禁忌不可犯　四時表証治法
陶節菴辯仲景傷寒論　太陽當汗不當汗
問兩感邪從何入　傷寒傳变不一
當汗而不汗生黄　傷寒雜症悞下变
傷寒至捷法　發汗過多成痓
辯内外傷　十勸歌
（十七卷）
不當汗而汗成蓄血　狂言譫語鄭声辯
看証法則　知可解不可解
陽明禁忌不可犯　辯表裏中三証
九味羗活湯解利法　汗多亡陽下多亡陰
辯陰陽二証　當汗而下之成協熱利
五臓受病相尅訣　太陽經六傳
太陽証治　太陽一下有八变
太陽頭痛　裏傳表

赤水玄珠第十七卷

新安生生子孫一奎著輯

熱論

黄帝問曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也不知其解願聞其故岐伯曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故為諸陽主氣也人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感于寒而病者必不免于死帝曰願聞其狀岐伯曰傷

寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脉侠鼻絡于目故身熱目疼而鼻乾不得卧也三日少陽受之少陽主膽其脉循脇絡于耳故胷脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於臓者故可汗而已四日太陰受之太陰脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脉貫腎絡于肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脉循陰器而絡于肝故煩滿而囊縮三陰三陽五臓六腑皆受病榮衛不行五臓不通則死矣其不兩感于寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱小腹微下大氣皆去病日已矣帝曰治之柰何岐伯曰治之各通其臓脉病日衰已矣其未滿三日可汗而已其滿三日可泄而已帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食

之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺柰何岐伯曰視其虚實調其逆從可使必已帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也帝曰其病兩感于寒者其脉應與其病形何如岐伯曰兩感于寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食讝言三日則少陰與厥陰俱病則耳聾囊縮

而厥水漿不入不知人三日死帝曰五臟已傷六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也其血氣盛故不知人三日其氣乃盡故死矣凡病傷寒而成瘟者先夏至為病温後夏至日為病暑暑當與汗皆出勿止

仲景傷寒例

陰陽大論云春氣温和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此則四時正氣之序也

冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷于寒觸冒之者乃名傷寒耳

其傷於四時之氣者皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也

中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏于肌膚至春变為温病至夏变為暑病暑病者熱極重於温也是以辛苦之人春夏多温熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而復大寒夏時應大熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大温此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此其時行之氣也

夫欲候知四時正氣為病及時行疫氣之法皆當按斗曆占之

九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月雨水節

後宜解也所以謂之雨水者以冰雪解而為雨水故也至驚蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便涼

從霜降以後至春分以前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也

其冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重為治不同証如後章

從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而有人壯熱為病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病

成云此為溫病也內經曰冬傷於寒春必病溫

從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳

中云此時天令漸熱一時不正之寒感之也時令熱氣在內故發為疫病非冬傷寒之謂也故成云此疫氣也

十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名為二十四氣

成云節氣十二中氣十二共二十四內經曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲

中云節氣者如立春正月節之類也中氣者如雨水正月中之類也

然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而不去者或有至而太過者皆成病氣也

金櫃要畧曰冬至之後甲子夜半少陽起少陰之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此為未至而至也以得甲子而天未溫和此為至而不至也以得甲子天大寒不解此為至而不去也以得甲子而天溫如盛夏五六月時此為至而太過也內經曰至而和則平至而甚則病至而反者病至而不至者病未至而至者病

中云非特冬為然餘三時亦當以此法觀之
　但冬甲子尤一歳氣運所関耳
但天地動静陰陽鼓撃者各正一氣耳
　成云天地之氣鼓撃而生春夏秋冬寒熱温
　涼各正一氣也
是以彼春之暖為夏之暑彼秋之忿為冬之怒
　成云春暖為夏暑從生而至長也秋忿為冬
　怒從肅而至殺也
是故冬至之後一陽爻升一陰爻降也夏至之後

一陽氣下一陰氣上也斯則冬夏二至陰陽合
也春秋二分陰陽離也陰陽交易人変病焉
此君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也小
人觸冒必嬰暴疹須知毒烈之氣畱在何經而
發何病詳而取之
是以春傷於風夏必飱泄夏傷於暑秋必病瘧秋
傷於湿冬必咳嗽冬傷于寒春必病温此必然
之道可不審明之
　成云當春之時風氣大行春傷于風ゝ氣通
　於肝ゝ以春適王風雖入之不能即發至夏
　肝衰然後始動風淫末疾則當發於四肢夏
　以陽氣外盛風不能外發故攻内而為飱泄
　飱泄者下利米穀不化而色黄當秋之時湿
　氣大行秋傷於湿ゝ則干於肺ゝ以秋適王
　湿雖入之不能即發至冬肺衰然後湿始動
　也雨淫腹疾則當發為下利冬以陽氣固湿
　氣不能下行故上逆而為咳嗽當夏之時暑
　氣大行夏傷于暑夏以陰主内暑雖入之勢

　未能動及秋陰出而陽為内主然後暑動傳
　陰而為痎瘧痎者二日一發瘧者一日一發
　當冬之時寒氣大行冬傷於寒冬以陽為主
　内寒雖入之勢未能動及春陽出而陰為内
　主然後寒動傳陽而為温病是感冒四時正
　氣為病必然之道

陶節庵辯仲景傷寒論

客有過予而問之曰甚矣傷寒之蘊與桂枝麻黄
二湯之難用也服之而愈者纔一二不愈而変

重者當八九仲景立法之大賢也何其方之難憑有如此哉令人畏而不用以參蘇飲和解散等平和之劑代之然亦未見其妙也予盍與我言之荅曰吁難言也請以經語證之經曰冬氣嚴寒萬類潜藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也中而即病名曰傷寒不即病者其寒毒藏于肌膚至春變為温病至夏變為暑病暑病者熱極重於温也以此

言之傷寒者乃冬時感寒即病之名桂枝麻黄二湯為當時之傷寒設與過時之温暑有何預焉夫變病之源則同亦可均謂之傷寒所發之時既異治之則不可混也請晷陳之夫春温夏熱秋凉冬寒者四時之正氣也以成生長收藏之用風亦曰四時之氣成温凉寒熱也若氣候嚴寒風亦凜冽天道和煦風亦温煖冬時坎水用事天令閉藏水氷地凍風與寒相同而成殺厲之氣人觸冒之腠理鬱塞乃有惡風惡寒之

證其餘月時則無此證也仲景固知傷寒乃冬時殺厲之氣所成非比他病可緩故其言特詳於此書而畧于雜病也倘能因名以求其實則思過半矣不幸此書傳世久遠遺帙頗多晉太醫令王叔和得散亡之餘詮次流傳其功博矣惜乎以已論混經未免穿鑿附會成無已氏因之順文註釋並無闕疑正誤之言以致將冬時傷寒之方通解温暑遺禍至今而未已也温暑必別有方今皆失而無徵也我朝宋景濂學士

嘗嘆傷寒非全書得其旨哉葢傷寒之初中人必先入表〻者何即足太陽寒水之經此經行身之後自頭貫脊乃有頭疼脊強惡寒之證在他經則無此證矣况此經乃一身之綱維為諸陽之主氣猶四通八達之衢治之一差其變不可勝言者矣故宜此二湯發散表中寒邪經曰辛甘發散為陽者是也若以此湯通治春温夏熱之病則誤之甚矣曰傷寒發于冬時已聞命矣邪之在表為太陽經也一經而有二藥之分

又何耶曰在經雖一然則有榮衛之別焉寒則傷榮証乃悪寒發熱無汗脉浮緊為傷寒有寒則見無寒則不見也當用麻黄湯輕揚之劑發而去之寒邪退汗出表和而愈矣曰緊脉固為寒矣脉之緩者亦用桂枝湯又何耶曰風則傷衛〻傷則自汗緣太陽受風不能衛護腠理疎而汗泄所以脉見浮緩也脉雖浮緩其受寒則一故亦宜桂枝辛温之藥解散寒邪腠理閉而汗止表和而愈又有榮衛俱傷者二湯又難用

也故復設大青龍湯然此藥雖用非庸俗淂而識也曰温暑既無方法治之則将柰何脉証與傷寒有何分別曰温暑雖亦冬時感受風寒而不即散在人身中伏藏歴過二三時之久天道大変寒化為熱人在氣交之中亦随天地之氣而化視仲景以即病之傷寒與傷暑時令為病之名豈無異哉治之之方亦必随時以辛凉苦矣安淂槩用冬時治寒之方乎今無其方者盖散亡之也經既称変為温変為熱則已改易冬〻時之寒為温熱矣方亦不容不随時改更也夫温病欲出值天時和煖自内達表脉反見于右閉不浮緊而微数曰悪寒否乎曰傷寒自冬月風寒而成外則有悪風悪寒之證既名為温則無此症矣曰然則子之言有所拠乎曰拠乎經耳經曰太陽病發熱不悪寒而渇者温病也不悪寒則病非自外来渇則明其自内達表曰春夏之病亦有頭疼悪寒脉浮緊者何也曰此非冬時所受之寒乃冒非時暴寒之氣耳或温暑

将發又受暴寒雖有脉浮之証未若冬時之甚也宜辛凉之藥通其内熱而解之斷不可用桂枝等劑矣曰温熱與傷寒治之不同也已聞命矣敢問傷寒之在三陽則為邪熱既傳三陰則為陰証矣以熱治固其宜也三陰篇以四逆散凉藥以治四逆大承氣湯以治少陰其故又何耶嗚呼此盖叔和以残闕之經作全書銓次將傳經陰証混同立論所以遺禍至今而未已也姑畧陳之盖風寒之初中人無常或入于陰或

入於陽皆無定體非但始太陽終厥陰或自太陽始日傳一經六日至厥陰邪氣衰不傳而愈者亦有不罷再傳者或有間經而傳者或有傳至二三經而止者或有始終只在一經者或有越經而傳者或有初入太陽不作鬱熱便入少陰而成真陰証者或有直中陰經而成寒証者緣經無明文後人有妄治之失若夫自三陽傳次三陰之陰証外雖有厥逆內則熱邪耳若不發熱四肢便厥冷而惡寒者此則直中陰經之

寒証也自前人立說之差使後人蒙害者多矣太陽受邪行盡三陽氣分傳次三陰之血分則熱入深矣熱入既深表雖厥冷真熱邪也經曰亢則害承乃制熱極反兼寒化也若先熱後厥逆者傳經之陰証也經云厥深熱亦深厥微熱亦微是也故宜四逆散承氣湯看微甚而治之如其初病便厥但寒無熱此則直中陰之寒証也急宜四逆輩以溫之經曰發熱惡寒發于陽也無熱惡寒發于陰也尚何疑哉又有曰傳二

經為兩感者傳經未終而斃矣病有標本治有逆從豈可槩論之乎曰陰証之不同已聞命矣嘗讀劉守真書云傷寒無陰証人傷於寒則為熱病熱病乃汗病也造化汗液皆陽氣也徧考內經靈樞諸篇並無寒証陰証乃雜病也叔和誤入之耳守真高明之士亦私淑仲景者而議論之異者何耶曰雖守真之明達蓋亦曰傷寒論以桂枝麻黃通治溫暑之誤而有是說故可寧云天道溫熱之時用桂枝湯必加冷藥於其

中免致黃生斑出之患若知此湯自與冬時即病之傷寒設不與過時之溫暑設則無此論矣觀其晚年悟道著病機氣宜保命集其中羌活湯辛涼之藥以治非時傷寒其妙如神足可補仲景之遺旨何其高哉夫內經言傷寒即為熱病而無寒者語其常也仲景之論有寒有熱者語其變也合常與變而無遺者也所謂道並行而不相悖而反相為用也此其所以為醫家萬世之準繩標的也歟

王執中曰傷寒雖是一病然所感不同而證亦懸絶有冬傷于風寒即時便發名曰正傷寒者有至春變為温病至夏變為熱病名曰伏熱病傷寒者有雖伏病在身至春夏亦未發偶因暴感風寒或色慾不謹或飲食不節觸動而發者亦曰伏熱病傷寒有冬月飲食不節誤傷冷物而發者亦名冬月正傷寒此其所感之不同也若夫春夏秋本無伏病在身而偶感風寒謂之四時傷寒即雜病也非仲景節菴之所謂傷寒也

故用參蘇飲藿香正氣散等藥與仲景節菴傷寒門藥大異至於所見之證則又不同有頭痛項強腰脊痛惡寒發熱者有滿身骨節痛有不頭疼不項強無腰脊痛寒熱骨節痛俱無者有頭不疼而即腰脊痛惡寒發熱骨節疼者有只頭疼而諸症俱無者有只腰脊痛而諸症俱無者有只惡寒發熱而諸症俱無者有只骨節痛而諸症俱無者有寒熱交争狀似瘧疾者有惱熱利下利清水狀似痢疾者有白瀉腹痛狀似水瀉者有既吐且利揮霍撩乱名曰霍乱者有傷在一經以次傳徧者有始終只在一經者有越一經而傳者有越兩經三經而傳者有傳一二經而止者有傳變六經而再傳者有從陽經傳入陽明腑中者有從陰經傳入陽明腑中有不從六經傳来直中陽腑者此其症之不同也至於用藥一差則壊症百出莫測端倪不可言紀曰衂血曰吐血曰便血曰發斑曰發黄曰發狂曰如狂曰腹痛曰譫語曰鄭声曰噦曰嘔曰

吐曰瀉曰利曰小水不利曰大便自利曰除中曰不寐曰自汗曰盗汗曰手足汗曰頭汗曰陰結曰陽結曰能食曰不能食曰狐惑曰脾約曰吐蛔曰陰陽易曰勞復曰食復曰尋衣摸牀曰撮空曰動氣曰奔豚曰肉苛曰舌卷囊縮不能枚舉此其壊之不同也然非愚之聽説仲景先師分為太陽等篇每條開示某經某症某脉了了明白東垣先師撮其大綱究其玄旨陶節菴先師又著家秘瑣言别門分類使覽初學令其

在十二卷中醫家撿之洞然自悉何至妄投藥劑乃有殺人之慘也

傷寒至捷法

發熱惡寒身體痛脉浮無汗怎生醫十神湯與香蘇散有汗傷風用桂枝

四五日來口舌乾發熱身疼卧不安先服人參敗毒散小柴胡湯在後看

七八日来熱在内口渴心煩腹脹暈小便赤少大便難大柴胡湯好通利

（八十七卷）

發熱口乾大便瀉小便赤少煩燥結小柴胡湯無五苓加上黄連真一絶

（十七）

汗下之後病不解依然熱渴如見怪解毒湯無小柴胡諸般熱病皆無碍

十勸歌　　彭用光

一傷寒頭痛及身熱便是陽證不可服熱藥傷寒傳三陰三陽共六經内太陰病頭不痛身不熱少陰病有反熱而無頭疼厥陰病有頭疼而無發熱故知頭疼身熱即是陽證若妄投熱藥决致死亡

二傷寒必須直攻毒氣不可補益邪氣在經絡中若隨証早攻之只三四日痊安若妄謂先須正氣却行補益使毒氣流熾多致殺人

三傷寒不思飲食不可服温脾胃藥且傷寒不思飲食自是常事終無餓死之理如理中丸之類不可輕服若陽病服之致熱氣增重或至不救丁香巴豆之類尤不可服

四傷寒腹疼亦有熱證不可輕服温煖藥難經云

（八十七卷）（十八）

疼為實故仲景論腹滿時痛之証有口疼甚者加大黄疼甚而加大黄意可見也惟身冷厥逆而腹疼者方是陰証須消息之每見腹疼便投熱藥多致殺人

五傷寒自利當看陰阳証不可例服補藥止瀉藥自利惟身不熱手足温者屬太陰身冷四逆者属少阴厥阴其餘身熱下利皆屬阳當隨證依仲景法治之每見下利使投煖藥及止瀉藥者致多死亡

六傷寒胸脇疼及腹脹滿不可妄用艾灸常見村落間有此證無藥便用艾灸多致毒氣隨火而盛膨脹發喘以不知胸脇疼自屬少陽腹脹雖屬太陰仲景以為當下之病此外惟陰証脉微弱可灸

七傷寒手足厥冷當看陰阳不可例作陰證有陰厥有陽厥醫者少能分辨阳厥而投熱藥殺人速於用刃蓋陽病不至極熱不能發厥仲景所謂熱深厥亦深熱深更與熱藥寧復得生而身

熱至三四日後熱氣已深大便秘小便赤或譫言昏憒及別熱證而發厥必是阳厥宜急用承氣湯以下之若初得病身不熱大便不秘自引衣盖身或下利或小便數不見熱證而厥者即是陰厥方可用四逆湯之類二厥所以使人疑者緣為其脉皆沉然阳厥脉沉而滑數陰厥脉沉而弱又陽厥時復指爪却温或有時發熱陰厥則常冷此為可別

八傷寒病已在裏即不可用藥發汗然傷寒証須看表裏如發熱惡寒則是在表正宜發汗如不惡寒反惡熱即是裏證若一例發汗則真氣已涸死者必矣又別有半在表半在裏之證不惟皆不可下亦皆不可汗但隨證治之

九傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度病人大渴當與之水以消熱故仲景以飲水為欲愈人見此說遂令病者縱飲因而為嘔為喘為咳逆為下利為腫為悸為痞為結胷小便不利者多矣且如病人欲飲一碗只可與半碗常令不

足為善

十傷寒病初安不可過飽及勞動或食羊肉行房及食諸肉骨汁并飲酒如病方愈不須再服藥兼脾胃尚弱食飽不能消化病即再来謂之食復病方好氣血尚虚勞動太早病即再来謂之勞復又食羊肉行房並死食諸肉骨汁并飲酒再病必重右傷寒十勸誠可為病家醫家之便益治法也

治傷寒看證法則

陶節庵

凡看傷寒先观两目或赤或黄阳毒六脉洪大有力燥渴者輕則三黄石膏湯重則大承氣黄為疸證如小水不利或赤熏小腹脹滿不痛渴而大便實脉来沉實有力者為濕熱發黄輕則茵陳五苓散重則茵陳湯分利小水清白為愈黄自退矣刼法開在殺車槌方前

次看口舌有無胎狀如見滑白色者邪未入腑屬半表半裏證宜小柴和解舌上黄胎者胃腑有邪熱也宜下之調胃承氣湯大燥實脉沉有

力而大渴者方可下便不實脉不沉微渴者未可下尤宜小柴胡湯舌上黒胎生芒刺者是腎水尅于心火十有九死急用大承氣下之無疑矣此邪熱已極也刼法開在殺車槌方前

已後以手按其心胷至小腹有無痛處若按之當心下鞕痛手不可近燥渴譫語大便實脉来沉實有力為結胸證急用大陷胷湯加枳桔下之量元氣虚實宜從緩治若按心胸雖滿悶不痛尚為在表未入乎腑乃邪氣填乎胷中只消小柴胡枳桔以治其悶如未効本方對小陷胷一服如神若按之當心下脹滿而不痛者宜瀉心湯加枳梗是痞滿也以手按之小腹若痛而小水自来利大便黒熏或身黄譫妄燥渴脉沉實者為畜血桃仁承氣下尽黒物則愈若按之小腹脹滿不鞕痛小水不利即溺澁也五苓散加木通山梔利之不可大利恐耗竭津液也若按其小腹遶臍鞕痛渴而小水短赤大便實者有燥屎也大承氣下之刼法備開殺車槌方前

再後問其大小便通利若何有何痛處及服過何藥方知端的務使一一明白證脉相對庶得下藥不差凡看傷寒若見吐蛔者雖有大熱忌下凉藥犯之必死蓋胃中有寒則蛔上膈大凶之兆人皆未知急用炮乾姜理中湯一服加烏梅二箇花椒十粒服後待蛔定却以小柴胡退熱蓋蛔聞酸則静見苦則安矣凡治傷寒若煩渴欲飲水者因内水消竭欲得外水自救大渴欲飲一升止可與一杯常令不足不可太過若

恣飲過量使水停心下則爲水結胷寺證射于肺爲喘爲咳留於胃爲噎爲噦溢於皮膚爲腫畜于下焦爲癃滲於腸間則爲利下皆飲水多之過也又不可不與又不可強與經云若還不飲非其治強飲須敎別病生正此謂也

凡治傷寒若經十餘日已上尚有表證宜汗者與羌活沖和湯微汗之十餘日若有裏證宜下者可與大柴胡湯下之蓋傷寒過經正氣多虛恐麻黃承氣太峻悞用麻黃令人亡陽悞用承氣令人不禁故有此戒若表証尚未除而裏證又急不得不下者只得以大柴胡通表裏而緩治之又老弱及血氣兩虛之人有下證者亦用大柴胡下之不傷元氣如其年壯力盛者不在禁例從病制宜

凡治傷寒尺脉弱而無力者切忌汗下寸脉弱而無力者切忌湧吐俱宜小柴胡和之

凡治傷寒若汗下後不可便用參耆大補宜用小柴胡加減和之若大補使邪氣得補而熱愈盛

復變生他證矣所謂治傷寒無補法也如曾經汗下後果是虛弱之甚脉見無力者方可用甘温之劑補之此爲良法其勞力感寒之證不在禁補之例看消息用之凡治傷暑與傷寒俱有熱若悞治之害矣傷寒則外惡寒而脉浮緊傷暑則不惡寒而脉虛此爲不同治經云脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑治宜小柴胡湯加石膏知母或人參白虎湯天久淫雨濕令併行蒼朮白虎湯若元氣素弱而傷重者用清暑益氣湯治之

中云治暑不宜輕用小柴胡夾暴感風寒者或可用一二劑蓋傷暑非傷寒至夏變熱病之暑病也

辯表裏中三証　王好古

假令少陽証頭痛往来寒熱脉浮弦此三症但有一者是爲表也口失滋味腹中不和大小便或閉而不通或泄而不調但有一者是爲裏也如無上下表裏餘症者皆虛熱也是在其中矣

辯陰陽二証　王好古

陰証身靜重語無声氣难布息目睛不了〻鼻中呼不出吸不入往来口與鼻中氣冷水漿不入大小便不禁面上悪寒有如刀刮身表凉知在陰經也名曰陰証

陽証身動輕語有声目睛了〻鼻中呼吸出入能往而能来口與鼻中氣皆然身表熱知在陽經也名曰陽証

太陽六傳　王好古

八十七卷　廿五

太陽者乃巨陽也為諸陽之首膀胱經病若渴者自入于本也名曰傳本

太陽傳陽明胃土者名曰巡經傳為發汗不徹利小便餘邪不尽透入于裏也

太陽傳少陽膽木者名曰越經傳為原受病脉浮無汗當用麻黄而不用之故也

太陽傳少陰腎水者名曰表傳裏為得病急當發汗而反下汗不發所以傳也

太陽傳太陰脾土者名誤下傳為原受病脉緩有汗當用桂枝而反下之所致也當時腹痛四肢沉重

太陽傳厥陰肝木者為三陰不至于首惟厥陰與督脉上行與太陽相接名曰巡經得度傳

太陽證

太陽証頭痛發熱自汗悪風脉當緩而反緊傷風得傷寒脉也

太陽證頭痛發熱無汗悪寒脉當緊而反緩傷寒得傷風脉也

八十七卷　廿六

王執中云冬月此二証用九味羗活湯不應仍用桂枝麻黄各半湯蓋穩於大青龍也

二証脉不同本經大青龍湯主之易老初用桂枝麻黄各半湯後用大青龍湯以其有厥逆筋惕肉瞤及亡陽之失也易老後又改為九味羗活湯而不用桂枝麻黄也

太陽証發熱悪寒自汗脉緩

太陽証發熱悪風無汗脉緩　此二証易老原將麻黄一桂枝二為治後復改用羗活湯

太陽頭痛

太陽膀胱脉浮緊直至寸口所以頭痛者頭與寸口俱高之分也兼厥陰與督脉會於巔逆太陽之經上而不能淂下故壅滯為頭痛於上也左手浮弦胸中痛也沉弦背俞痛右手浮弦者亦然頭痛者木也最高之分惟風可到風則溫也治以辛涼秋尅春之意故頭痛皆以風藥治之者總其體之常也然各有三陰三陽之異焉故太陽則宜川芎陽明則宜白芷少陽則宜柴胡

太陰則宜蒼朮少陰則宜細辛厥陰則宜吳茱萸也

王執中曰此即論風而不及寒者風亦寒氣所化初從下起後從上來風與寒本相因但感之不同耳故治傷寒者初分有汗無汗到傳經後則不分矣由此觀之風藥亦能散寒其理同也

治太陽則不可越經　王好古

假令治太陽〻明不可遺太陽而只用陽明藥餘倣此用三陽經解藥後身番覆重者若煩則是有陽明也若不煩而番覆輕者知不傳三陽也不傳三陽則為解也大抵三陽之體靜重與濕相同傷寒五日後無汗謂穀消水去形亡故下之三日前謂內有水穀故汗之

問桂枝湯發汗

發汗或云當得汗解或云當發汗更發汗并發汗宜桂枝湯者數方是用桂枝發汗也復云無汗不得服桂枝又曰汗家不得重發汗又曰發汗

過多者却用桂枝甘草湯是閉汗也一藥二用如何說得仲景發汗與本草之義合而為一荅曰本草云桂枝味辛甘熱無毒能為百藥長通血脉止煩出汗者是調血而汗自出也仲景云臟無他病發熱自汗者此衛氣不和也又云自汗者為榮氣和榮氣和則外不諧衛氣不與榮氣相諧和也榮氣和則愈故皆桂枝湯調和榮衛榮衛既和則汗自出矣風邪由此而解非桂枝能閉腠理發出汗也以其固閉榮血衛氣自

和邪無容地而出矣其實則閉汗孔也昧者不
觧閉汗之意凡見病者便用桂枝湯發汗若與
中風自汗者合其効桴皷曰見其取効而病愈
則曰此桂枝發出汗也遂不問傷寒無汗者亦
與桂枝湯悞之甚矣故仲景云無汗不得服桂
枝是閉汗孔也又云發汗多又手心悸欲得按
者用桂枝甘草湯是亦閉汗孔也又曰汗家不
得重發汗若桂枝發汗是重發汗也凡桂枝條
下言發字當認作出字是汗自然出也非若麻

黄能開腠理而發出汗也本草出汗二字上文
有通血脉一句是非三焦衛氣皮毛中藥是為
榮血中藥也如是則出汗二字當認作榮衛和
自然汗出非桂開腠理而發出汗也故後人用
桂治虚汗讀者當逆察其意則可矣噫神農之
作於其前仲景之述於其後前聖後聖其揆一
也

太陽禁忌不可犯

小便不利不可使利之利之是謂犯本以是知五
苓散不可妄用大便不可易動〻之是謂動血
此為犯禁表在不可下〻之尤犯禁也

太陽證亦有當汗不當汗者

咽乾淋渴鼻衂小便不利已經發汗不得重發如
無已上忌證雖經發汗倘邪氣未盡亦當重發
之

當汗而不汗生黄

其證為風寒所傷陽氣下陷入於內而排寒水上
行於經絡之間本當發汗曰以徹其邪醫失汗

之故生黄也脾主肌肉四肢寒濕與內熱相合
而生黄也

當汗而發汗過多成痓

其證曰發汗太過腠理開泄汗漏不止故四肢急
難以屈伸

不當汗而汗成蓄血

蓄血其證燥火也當益津液為上而反汗以亡其
津液其毒擾陽之極則慢陰也故燥血而蓄於
胷中也

血証見血自愈

太陽病入膀胱小便利而赤蓄血証也血自下者愈也

知可解

戰而汗解者太陽也不戰有汗而解者陽明也不戰無汗而解者少陽也若先差經必不爾矣

太陽傳陽明其中或有下証陽明証反退而熱兼不渴却退頭少陽証是知可解也

太陽知可解者頭不痛項不強肢節不痛則知表邪退也

陽明知可解者為無發熱惡寒知裏易解也

少陽病知可解者寒熱日不移時而作邪未退也若用柴胡而移其時早移之於晏晏移之于早氣移之於血血移之于氣是邪無可容之地知可解也

知不可解

服解藥而去沉困只頭痛目悶是知濕去而風不去則欲解也若風去而濕不去則不解何以然風則高濕則下而入裏也

脉知可解不可解

可解之脉浮而虛不可解之脉浮而實浮而虛者只是在表浮而實者知已在裏也汗多不解者轉屬陽明也傷寒不頭痛知邪不在經若頭痛者知邪在經也

易老九味羌活湯解利法

羌活　治太陽肢節痛君主之藥也乃撥亂反正之主故大無不通小無不入關節非此不治也

防風　治一身盡痛乃軍卒中卑下之職一聽君令而行隨所使引之而至者也

蒼朮　別有雄壯上行之氣能除濕下安太陰使邪氣不傳于足太陰脾

細辛　治少陰腎經頭痛

川芎　治厥陰頭痛在腦

白芷　治陽明頭痛在額

生地黄治少陰心熱在内

黄芩　治太陰肺熱有神

甘草　能緩裏急調和諸藥

已上九味雖為一方然亦不可執〻中無權猶執一也當視其經絡前後左右之不同𨒪其多少大小之不一增損用之如神

右水煎服

若欲急汗當熱服以羮粥投之若緩汗溫服之而不用湯投之也

脉浮而不解者先急而後緩　脉沉而不解者先緩而後急

本湯不獨解利傷寒治雜病亦有神　中風行經者加附子　中風秘澁者加大黃　中風幷三氣合而成痺等症各隨十二經上下内外寒熱溫凉四時六氣加減補瀉用之煉蜜作丸尤妙

當汗而下之成協熱利

當各隨三陽本証表藥發之表解下利自愈若不愈者方可以利藥治之

太陰一下有八變

太陰病下之其脉促不結胸者此為欲解也

脉浮者必結胸　脉緊者必咽痛　脉弦者必兩脇拘急　脉細數者頭痛不止　脉緊數者必欲嘔　脉沉緩者協熱利　脉浮滑者必下血

裏傳表

太陽反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之至於大實痛者胃也桂枝加大黃湯主之已傳戊婦告夫也所以為裏傳表即名誤下傳也

三陰三陽辨証用藥治法　彭用光

太陰無汗麻黃為最太陰有汗桂枝可先小柴胡為少陰之要領大柴胡行陽明之秘堅至三陰則難拘定法或可溫而或可下宜數變以曲全生意或可方而或可圓

傷寒表証分別治法以便四時取用

傷寒表証是如何（左手脉浮緊）無汗惡寒身熱多頭項俱疼脉浮取（輕手按之脉浮大而緊）施方施劑汗之和

冬麻黃湯十神湯
春夏羌活冲和湯

傷寒裏證治法宜次第

傷寒裏証心腹疼邪傳入裡脉重取数洪不悪寒而悪熱蒸
其脉数沉兼自汗二便秘少下之生軽則大柴胡湯重則
三承氣湯選用
陽証 陽証身熱及頭疼躰重咽乾難卧動或有譫
語及循衣脉息弦洪宜審用
脉洪大有力十神湯葛根湯九味羌活湯大柴胡湯解肌湯三承氣湯
次第選用
陰証 陰証身涼二便清病初自汗也頭痛也無
煩躁也無渇脉息沉微自可明

〈十七巻　廿五

脉沉微無力五積散理中湯四逆湯三建湯
陰毒 手足甲青至節 三建湯 此症極危
灸關元 氣海 丹田 臍中
陽証似陰 陽証身涼冷四肢小便赤少大便稀
心煩口燥脉沉数白虎湯兼竹葉寄
脉沉数有力竹葉石膏湯柴胡五苓三黄解毒湯
陰証似陽 陰証如陜面赤經小便清利大便通
渾身微熱沉遅脉真武湯佳兼理中
脉沉遅弱五積散羌附湯附子理中湯

灸服藥而脉不回宜灸 氣海 神闕 丹田
陽厥 陽厥時々指㡳温心煩便秘口乾論脉来
沉細中還疾承氣柴胡最可呑
陰厥 陰厥身涼熱不回二便通滑不煩時脉来
沉伏知端的三建湯兼四逆宜
脉沉微昏憒先以星烏乾薑湯随用三建湯
灸 此証倉卒無藥只灸關元氣海丹田妙
血發黄 發黄恰似烟薫色小便自利大便黒唇
焦漱水血家黄桃仁承氣湯堪擇

〈十七巻　廿六

蓄血黄此由脾胃熱甚失于汗下以致之宜抵當湯桃仁承氣選用
湿証黄疸 發黄渾似橘皮明小便不利大便行
湿熱相蒸名曰疸茵陳湯共五苓平
蓄熱陰黄頭汗出四肢沉重如痺俱用茵陳湯加五苓兼小柴加梔子湯
發斑 發狂
陜毒發斑是如何梔子大黄黒奴科 此症甚
危紅赤白易治如黒斑則胃爛難治如陽毒五
日内可治六日七日難治人参石膏化斑湯玄参升麻石膏湯
大青四物湯

溫毒 葛根橘皮湯 黃連橘皮湯 調胃承氣湯 猪胆鷄子湯

黑奴丸方 治陽毒發斑煩躁大渴倍常時行熱病六七日未得汗脉洪大或数面赤目脹身痛大熱煩躁狂言欲走渴甚又五六日以上不解熱在胸中口噤不能言為壞傷寒醫所不治棄為死人精魂巳竭心下纔煖撥開其口灌下即活人丸灌藥下咽便能即時甦醒

黃芩 芒硝 麻黃 釜底煤

小麥奴 灶突墨 梁上塵各一兩 大黃一兩錢

十七卷 廿七

右為末煉蜜為丸彈子大井水化下即當發寒〻巳汗出乃差若時頃不汗再服一丸須見微利若不大渴不可與此藥

問兩感邪從何道而入 王好古

荅曰經云兩感者死不治一日太陽與少陰俱病頭痛發熱惡寒口乾煩滿而渴太陽者腑也自背俞而入之人之所共知之少陰者臟也自鼻息而入〻所不知也鼻氣通於天故寒邪無形之氣從鼻而入腎為水也水流溼故腎受之經曰傷于溼者下先受之同氣相求耳又云天之邪氣感則害人五臟以是知內外兩感臟腑俱病欲表之則有裏欲下之則有表〻裏既不能一治故死矣故云兩感者不治然所禀有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治〻之而不救者有矣夫未有不治而獲生者也予嘗用此間有生者十得二三故立此方以待好生君子用之

大羌活湯

十七卷 卅八

防風 羌活 獨活 防巳 黃芩

黃連 白术 蒼术 炙甘草 細辛各三錢 知母 川芎 地黃各一兩

右每服五錢水煎熱服不解再服三四次必解病愈則止若有餘証並依仲景隨經法治之

傷寒悞下变有輕重

或問曰傷寒雜証一躰若悞下之甚者变大荅曰非一躰也傷寒悞下变無定躰雜病誤下变有

定脉何以然傷寒自外而入陰也陰主動雜病
自內而出陽也陽主靜動者犯之其变無窮靜
者犯之其变止痞腹脇痛而已故变無窮者為
重痞與腹脇痛者為輕也

辯为外傷

傷風鼻中氣出粗合口不開肺氣通于天也傷食
口無味涎不納鼻息氣勻脾氣通于地也
外傷一身尽熱先太陽也從外而之內者先無形
也
內傷手足不和兩脇俱熱先少陽也從內而之外
者先有形也
內外俱傷人迎氣口俱盛或舉按皆實大表發熱
而惡寒腹不和而口液此內外兩傷也
凡診則必捫手心手背手心熱則內傷手背熱則
外傷次以脉别之
冬傷于寒者春必溫病夏為熱病長夏為大熱病
蓋因房失劳傷與辛苦之人水虧無以奉春生
之令故春陽氣長而為溫病也夏為熱病者是
火先動于火未動之時水預虧于巳旺之日故
邪但藏而不為病也夏令炎蒸其火既旺與前
所動者客邪與主氣二火相接所以為熱病也
長夏為大熱病者火之方與秋之分皆手經居
之水之方與春之分皆足經居之所傷者皆經
不足故夏火旺客氣助于手經則不足者愈不
足矣故所用之藥皆泄有餘而非足經藥何以
然泄有餘則不足者補矣此傷寒本足經只言
足經而不言手經也大意如此至于傳手經者
亦有之當作別論與夫奇經之病亦在其中矣

狂言譫語鄭声辯

狂言者大開目與人語〻所未嘗見之事即為狂
言也譫語者合目自言〻所日用常見常行之
事即為譫語也鄭声者声戰無力不相接續造
字出于喉中即鄭声也

陽明症不可犯禁忌

不當發汗不當利小便若發汗利小便竭其津液
則生蓄血症也惟當益津液為上以其火就燥

也盖津液者蓮鬚葱白湯是也 汗多亡陽下多亡陰小便重利之走氣三者雖異為言少津液則一也

汗多亡陽

汗者本所以助陽也若陽受陰邪寒結無形須當發去陰邪以復陽氣所謂益陽而除風寒客氣也陰邪已去而復汗之反傷陽經曰重陽必陰故陽氣自亡汗多亡陽此之謂也

下多傷陰

下者本所以助陰也若陰受陽邪熱結有形須當除去已敗壞者以致新陰此所謂益陰而除火熱邪氣也陽邪已去而復下之反亡陰也經曰重陰必陽故陰氣自亡下多亡陰此之謂也

傷寒五臟受病脉証相尅訣

心臟　心病舌強笑面赤燥煩掌熱口乾諓臍上動氣洪緊數反得沉微命不全

肝臟　肝家面青目痛閉筋急怒容臍左氣脉當弦急或兼長浮濇短兮名不治

脾臟　脾家不食面皮黃躰重肢痛喜卧床動氣當臍脉緩大弦長而緊是凶殃

肺臟　肺家面白帶憂愁吐血寒溫喘嗽求臍右氣兮沉細濇大而牢者死根由

腎臟　腎家面黑爪甲青耳閉足寒泄腹疼臍下氣兮脉沉滑緩而大者死之形

已上皆受尅之脉為賊邪故凶也

赤水玄珠第十八卷目録

痰證
傷食
虛煩
脚氣
傷寒用藥法則
六經用藥法
傷寒看證大畧
一提金脉要
截江綱論脉
傷寒撮要論脉
六經圖正治法
煎藥法
劫病法
製藥法

赤水玄珠第十八卷

新安生生子孫一奎著輯

痰證

外證增寒壯熱惡風自汗胸滿氣上衝咽不得息頭不疼項不強若涎多者亦隱隱頭疼脉有寸浮者亦有寸伏者以意參之柴胡半夏湯金沸草散大半夏湯氣上衝瓜蒂散吐之此亦風痰證也如食積痰虛損痰不用此藥

傷食

亦頭疼惡寒身熱但左手脉平和右手脉緊盛知為食大橘皮二陳湯心腹滿脹大柴胡湯下之胸滿嘔吐者瓜蒂散吐之亦夾食傷寒也全傷食者恐不可用柴胡

虛煩

諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒頭不疼身不痛為異耳表既虛不可汗裏不實不可下叔和云虛煩有熱不可攻

脚氣

傷寒傳足不傳手所以寒濕之氣蒸于足發則類

傷寒其証頭疼身熱肢節痛大便閉或嘔但初病時起于脚膝屈弱不能移動為異耳感於寒所患必冷越婢小續命湯入生姜汁㝡妙感于暑所患是熱小續命去附子减桂一半脚腫木瓜散梹榔散大便秘脾約丸

論傷寒用藥法則

標本逆從之既明五劑之藥須用識且如表汗用麻黃無葱白不發吐痰用瓜蒂無豉不湧去實熱大黃無枳實不通溫經用附子無乾姜不

熱甚則以泥清水加葱白煎之竹瀝無姜汁不能行經絡蜜導無皂角不能通秘結非半夏姜汁不能止嘔吐非人參竹葉不能止虛煩非小柴胡不能和解表裡非五苓散不能通利小便非天花粉乾葛不能消渴解肌非人參麦門冬五味不能生脉補元非犀角地黃不能止上焦之吐衄非桃仁承氣不能破下焦之瘀血非黃蓍桂枝不能實表閉虛汗非茯苓白术不能去湿助脾非茵陳不能去黃疸非承氣不能制定

發狂非枳桔不能除痞滿非陷胸不能開結胸非羌活不能治四時之感冒身疼非人參敗毒不能治春溫非四逆不能治陰厥非人參白虎不能化斑非理中烏梅不能治蚘厥非桂枝麻黃不能除冬月之惡寒熱隨汗解非姜附湯不能止陰寒之泄利非大柴胡不能去實熱之妄言陰陽咳嗽上氣喘息用加减小青龍分表裡而可汗下此傷寒用藥之大法也

陰經用藥格法

太陰脾土性惡寒濕非乾姜白术不能燥濕也

少陰腎水性惡寒燥非附子不能溫潤

厥陰肝木藏血榮筋非芍藥甘草不能滋養此經常之道

治傷寒看證大畧

凡證有頭疼惡寒皆是傷寒無則皆否也何則蓋傷寒則惡寒傷食則惡食理固然也但風從上來陽先受之寒從下來陰先受之風與寒常相因而感冒之時則又不同及其証之外見者則

一也
一提金脉要
人之阴阳即為先天人之氣血即為後天脉者非血非氣乃血氣之先即营行之道路又問曰既知先後天之脉理須明持脉之要曰舉曰按曰尋三字若此不明即阴阳表裡虚實何以别之持脉者軽手循之曰舉重手取之曰按不軽不重委曲求之曰尋

截江網論脉

辨病以絃為阳傷寒以絃為阴雜病以緩為弱傷寒以緩為和兩手無脉曰双伏一手無脉曰单伏必有正汗也寸口阳脉中或見沉細者但無力者為阳中伏阴尺部阴脉中或見沉數者為阴中伏阳寸口數大有力為重阳尺部沉細無力為重阴寸脉浮而有力主寒邪表實宜汗浮而無力主風邪表虚宜實尺脉沉而有力主阳邪在裡為實宜下無力主阴邪在裡為虚宜温寸脉弱而無力切忌發吐尺脉弱而無力切忌汗下初按来疾去遲名曰内虚外實去疾来遲名曰内實外虚尺寸俱同名曰緩緩者和而生也汗下後脉静者生躁乱身熱者死乃邪氣勝也温之後脉来歇至者正氣脱而不復生也純絃之脉名曰負負者死按之解索名曰阴阳離離者死阴病見阳脉者生阳病見阴脉者死

傷寒撮要論脉

左右手脉俱急緊盛是夾食傷寒右手脉来空虚左手脉来緊盛是劳力傷寒左手脉来緊右手洪滑或寸脉沉伏身熱悪寒隱隱頭痛喘咳煩悶胸脇躰痛是夾痰傷寒左手脉来緊濇右手脉沉數心胸脇下小腹有痛處是血鬱内傷外感六經圖及傷寒撮要一提金六經正治捷法

足太陽經委中穴在膕中央約紋動脉陷中膕中央即膝後相對腿湾中也日内眥在面前眼内边神庭在中間額上額額角也

此圖玉枕至阴二穴膀胱經穴也風府穴督脉穴也膀胱與督脉會于頂顛連於風府太阳症項強故併及之

足太阳膀胱經圖頭為諸阳之首故多傳变受病為先也其脉起于目内眥從頭下至項連風府行身之背終于足也其証頭項痛項強腰疼骨節痛經曰太阳頭痛脉浮項背強而悪寒嘔逆身疼或已發熱或未發熱者俱宜發表不可攻

厂之表邪乘虚内陷傳变不可勝数又不可利

小便利之則引熱入裡其害不淺若本病煩熱小便不利者乃利之則不禁如小便自利如常則不可利也凡有汗不得再發汗々多不得利小便

足太阳起于目内眥上額過神庭嵓至玉枕過項夾背脊由後廉而下至小趾外側至阴穴止

太阳經見證法

假如先起悪寒者本病巳後發熱者標病若有一毫頭痛悪寒身熱不拘日数多少便宜發散自

然熱退身凉有何变証

此處寒熱標本指病之先後言上文本病煩熱之本字指六經標本言不可混看

辯証法

表裏自汗者為風傷衛氣宜實表々實無汗者為寒傷营血宜發表

診脉法

診脉大凡皮膚之上輕手按之便得曰浮脉浮緊有力為傷寒脉浮緩無力為傷風

用藥法

冬月正傷寒用升阳發表湯即加減麻黄湯冬月傷風用踈邪實表湯即加減桂枝湯春秋無汗用羌活冲和湯發表有汗用加減冲和湯實表腹痛小建中湯痛甚桂枝加大黄湯夏月無汗用神朮湯有汗用前加減冲和湯

足阳明經

此圖神庭穴督脉穴也阳明經神庭過故載之

足阳明胃經圖乃两阳合明于前也一曰府者居中土也萬物所歸也其脉起于鼻頞上頭額絡于目循于面行身之前終于足也經曰傷寒二日阳明脉大又曰尺寸俱長者阳明受病也

足阳明起于鼻两傍上頭維從乳中近外傍而下前廉梁丘穴至大趾次趾之端厲兑穴止

阳明經見証法

頭額痛目痛鼻乾不眠微悪寒是足阳明胃經受

病假如先起目痛悪寒身熱者阳明經本病已後潮熱自汗譫語發渴大便實者正阳明胃府標病夫本宜解肌標宜急下看消息用之

辯證法

目痛鼻乾微悪寒身熱病在經潮熱自汗譫語發渴便實不悪寒病在府

診脉法

按至皮膚之下肌肉之間畧重按之乃得之脉見微洪為經病按至筋骨之間重按之乃得脉見

沉數為腑病

用藥法

微惡寒自然目脹痛鼻乾不眠者用柴葛解肌湯即加减葛根解肌湯渴而有汗不解者如神白虎湯即加減白虎湯潮熱譫語發渴揭去衣被揚手擲足斑黄狂乱不惡寒反怕熱大便實者輕則大柴胡湯重則三承氣湯選用俱在秘方六一順氣湯加减治之

足少陽經

足少陽膽經其脉起于目鋭眥上頭角絡耳中循胷脇行身之側終于足也前有阳明後有太阳居二阳之中所以居半表裡經曰尺寸俱弦者足少阳受病其證頭痛目眩口苦脇滿耳聾脇痛或心煩喜嘔或胸中煩悶而不嘔或心下病鞕或寒熱往来或發熱寅申時尤盛或身微熱者皆少阳也凡頭角痛耳中痛耳中烘〻而鳴耳之上前後腫痛皆少阳所主部分其火為之也若口苦者少阳之膽熱脇下鞕者少阳之結也

足少阳起于目鋭眥上頭角絡耳中過乳外傍從兩脇由外廉而下至小指次指之端竅陰穴止

少阳經見證法

假如先起惡寒身熱耳聾脇痛者本病已後嘔而舌乾口苦者標病緣胆無出入病在半表半裡之間止宜小柴胡湯加减和解表裡治之再無别湯本方有加减法此經有三禁不可汗下利也若治之㝵法有何壞証當須識此毋致忽焉

辯證法

耳聾脇痛寒熱嘔而口苦舌乾便屬半表半裡証

不從標本從乎中治

診脉法

按至皮膚之下肌肉之間畧重按之乃得脉見弦

數本經

用藥法

耳聾脇痛寒熱嘔而口苦舌乾者用柴胡双解飲

即加減小柴胡湯若阳明少阳合病則脉弦而

十八卷 十二

長此湯加葛根芍藥

足太陰經

此圖膻中穴任脉穴也太陰脉過此故載之

足太陰脾經圖脾為中榮宮之坤土也其脉始于

足太指上行至腹絡于嗌連舌本行身之前也

若寒邪卒中直入本經者一時便發腹痛或吐

或利宜温之如四日而發腹滿嗌乾者此傳經

之邪也宜和之若太阳病下之早因爾腹痛者

此淏下之而傳也凡治太阴症自利不渴脉沉

細手足冷急温之若脉浮者可發汗宜桂枝湯

主之若發熱脉數者少阳之邪未解小柴胡湯

十八卷 十三

主之如自利不渴者臓有寒也宜理中湯甚者

加附子重則回阳救急湯即加减四逆湯腹滿

嘔吐食不下者宜治中湯手足冷脉沉細者宜

四逆湯若傳經邪熱內陷腹痛者宜桂枝芍藥

湯主之

足太阴從足大趾隱白穴由内廉而上環小腹上

乳内傍膻中其別從乳外近厥阴而上至喉下

人迎止

又云凡阳經傳来之邪終是阳明腑証皆不當和

亦不可用桂枝只三承氣選用其用桂枝者中
在陰經未入陰府也

太陰經見證法

腹滿自利津不到咽手足溫者是足太陰脾經受証假如先起腹滿咽乾者本病已後身目黃標病內有寒熱所分不可混治臨病之際用在得宜

辯証法

腹滿咽乾發黃者屬腑熱自利不渴或嘔吐者屬臟寒

診脈法

重手按至肌肉之下筋骨之間方得脈沉而有力宜當下脈見沉而無力宜當溫

用藥法

腹滿咽乾手足溫腹痛者桂枝大黃湯即加減桂枝湯身目黃者茵陳大黃湯即加減茵陳湯自利不渴或嘔吐者加味理中飲重則回陽急救湯即加減四逆湯

足少陰經

足少陰腎經圖為人身之根蒂也其脈始于足心上行貫脊循喉絡舌本散舌下注心中行身之前也若因慾事腎虛者寒直中之也其証一二日便發故發熱脈沉足冷或惡寒倦臥宜溫經散寒若五六日而發躁舌乾者此傳經之熱邪宜急下之恐腎水乾也如其脈沉細足冷者又不可下急溫之脈沉疾有力者乃可下之凡少陰欲水而小便色白者下虛有寒引水自救非熱宜溫之蓋少陰傷寒多因勞傷腎經之所致

有緊有慢其害甚速宜溫之不可以寒涼之藥
妄投之也但脉沉足冷雖發熱者急宜溫腎以
扶元氣

足少陰起于足心湧泉穴由内廉而上在太陰經
之後行入乳内傍近膻中至喉下人迎止

少陰經見證

假如先起舌乾口燥者本病已後譫語大便實者
標病至陰經則难拘定法或可溫而或可下因
分直中者寒証傳経者熱症是其發前人之所
未發也

十六

診脉法

重手按至肌肉之下筋骨之間方得脉見沉實有
力宜當下脉見沉遲無力宜當溫

用藥法

口燥咽乾渴而譫語大便實或遶臍鞕痛或下利
純清水心下鞕痛者俱是邪熱燥屎使然急用
六一順氣湯分輕重下之即承氣湯有加减法
無熱惡寒厥冷踡卧不渴或腹痛嘔吐瀉利沉
重或陰毒手指甲唇青嘔逆絞痛身如被杖面
如刀刮戰慄者俱是寒邪中裡使然急用回陽
救急湯溫之即四逆湯有加减法

足厥陰經

十七

此圖一經從缺盆下乳上入裏會於頂巔

足厥陰肝經圖厥者尽也六經之尾也其脉起於足大指上環陰器抵小腹循脇肋上口唇與督脉會于巔頂行身之前側也若本經不足寒邪直中之也一日便發吐利小腹痛寒甚者唇青厥冷囊縮急宜温之并着艾灸丹田氣海以温之若六七日發煩滿囊拳者此傳經熱邪厥深熱亦深也若脉沉疾有力者宜急下之若脉微細者不可下也凡傷寒傳至厥陰經則病勢極矣然死生在於須臾可不謹察之也大抵熱深厥亦深則舌卷囊縮陰寒冷極亦舌卷囊縮也當要仔細而辯其冷熱之治其法微矣

足厥陰起足大趾大敦穴由内廉而上在太陰經之前行入小腹過脇下從乳外傍穹入乳内傍至中脘而止其入裏行者會于巔頂也圖內不載

厥陰經見證法

假如先起消渴煩滿者本病已後舌卷囊縮者標病亦有寒熱兩端不可槩作熱治

辯證法

煩滿囊拳消渴者屬熱口涎沫不渴厥冷者屬寒

似瘧不嘔清便必自愈

用藥法

消渴煩滿舌卷囊縮大便實手足乍冷乍温者急用六乙順氣湯下之即承氣湯有加減法口吐涎沫或四肢厥冷不溫過乎肘膝不渴小腹絞痛嘔逆者急用茱萸四逆湯即回陽救急湯有加減法

煎藥法

一發汗藥先煎麻黄一二沸後入餘藥同煎

一止汗藥先煎桂枝

一和觧藥先煎柴胡

一下藥先煎滚水入枳實

一溫藥先煎乾姜

一行血藥先煎桃仁

一利水藥先煎猪苓

一止瀉藥先煎炒白朮
一消渴藥先煎天花粉
一止痛藥先煎白芍藥
發黃藥先煎茵陳
發斑藥先煎青黛
一發狂藥先煎石羔
一止嘔藥先煎半夏
勞力感寒先煎黃芪
一溼証藥先煎蒼朮

一感冒傷寒先煎羌活
暑症藥先煎香薷
一痓病藥先煎防風
一腹如雷鳴藥先煎煨生姜
已上俱以主病者先煎餘藥俱後入同煎

劫病法

一傷寒發狂奔走人難制伏先於病人處生火一盆用醋一碗傾於火上其烟沖入鼻內即安方可察其阳狂阴躁觀切用藥無差若初起頭疼發熱惡寒方除已後登高而歌棄衣而走踰墻上屋罵詈叫喊大渴欲死脉来有力乃因邪熱傳裏阳盛發狂當用寒藥下之此為阳狂凡見舌卷囊縮者不治若病起無頭疼身微熱面赤戴阳煩躁脉来沉微無力欲坐卧於埿水中乃因寒極而發躁手指甲面色青黑冷汗不止心腹結鞕如石躁渴欲死即陰証似阳當用熱藥温之此為阴躁凡見厥冷下利譫語者不治須詳脉来有力無力此為良法

一傷寒腹中痛甚將涼水一盞與病人飲之其痛稍可者屬熱當用涼藥清之清之不已而或遶臍鞕痛大便結實煩渴屬燥屎急用寒藥下之若食痛同治法若小腹鞕痛小水自利大便黑身目黃者屬蓄血亦用寒劑加行血藥下尽黑物則愈此三者皆痛隨利減之法也若飲水愈加作痛屬寒當用温藥和之和之不已而或四肢厥冷腹痛嘔吐瀉利急用熱藥救之須詳脉来有力無力此為良法

一傷寒直中陰經真寒証甚重而無脉或吐瀉脫元而無脉用好酒姜汁各半盞與病人服之其脉来者可治當察其脉用藥不拘脉浮沉大小但指下出見者生如用此法脉不至者必死又當問病人何處有痛証要知痛甚者脉必伏宜隨病制宜方為吉兆如無痛証用此法而脉不至者不為吉兆尤當問病人若平素原無正取脉須用覆手取之脉必見也此屬反關脉診法與正取法同若平素正取有脉後因病診之無

脉者亦當覆手取之而脉出者陰陽錯乱也宜和合陰阳如覆取正取俱無脉者必死此為良法

一傷寒舌上生胎不拘滑白黃黑俱用井水浸青布片於舌上洗净後用生姜片子時時蘸水刮之其胎自退凡見舌生黑胎芒刺者必死此熱毒入深十有九死是腎水尅心火也若發黃者用生姜粗時時遍身擦之其黃自退若心胸脇下有邪氣結實滿悶鞕痛用生姜一斤搗粗去汁炒微燥帶潤用絹包於患處款款熨之稍可又将粗和匀前汁炒乾再熨許久豁然寬快俱為良法

一傷寒鼻衂成流久不止者将山梔炒黑為細末吹入鼻中外将水紙搭於鼻冲其血自止若點滴其血不成流者其邪在經未解照後秘方用藥不在此法

一傷寒熱邪在裏服轉藥後塩炒麩皮一升將絹包於病人腹上款款熨之使藥氣得熱則行大

便易通矣

一傷寒吐血不止用韮汁磨京墨呷下其血見黑必止如無韮汁用鷄子清亦可正謂赤屬火而黑屬水也

一傷寒直中陰經真寒証或阴毒証身如被杖腹中絞痛嘔逆沉重不知人事四体堅冷如石氷指甲唇青藥不得入口六脉沉細或無脉欲絶者将葱縛一握切去根葉取白三寸許如餅先用麝香半分填於臍中後放葱餅於臍上以火

熨之連換二三餅稍醒灌入生姜汁煎服回阳救急湯如不醒再灸関元氣海二三十壯使熱氣通其内逼邪出于外以復阳氣如用此法手足温和汗出即醒者為有生也如用此法手足不温汗不出不省人事必死

一傷寒熱病熱邪傳裏亢極無解用黄連煎水一盞放井中頓冷浸青布搭于胸中徐徐換之待熱勢稍退即除不可久漬夏月用此法冬月不宜用

一傷寒服藥轉吐出不納者隨用竹管重捺内関後將生姜自然汁半盞熱飲其吐即止大凡服寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑温和服之如要取汗雖辛甘之劑亦宜熱服如要止汗雖辛甘温之劑亦宜温服此為良法

内関中掌後腕二寸厥阴心包相火之經

一中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絶者先用皂莢末撚紙燒烟冲入鼻有嚏可治随用吐痰法用皂莢末五分半夏白礬各三分為細末姜汁調服探吐後服導痰湯加減治之無嚏不可治此為良法

一治乾霍乱不得吐者用滚湯一碗入皂莢末三分塩一撮調服探吐切莫與米湯與之即死是穀氣反助邪氣也

一中寒卒倒昏迷不醒者先用熱酒姜汁各半盞灌入稍醒後服加味理中湯為効如不飲酒人止用姜汁灌之依此法調治冬月有之餘月不多見

製藥法

一用附子去皮臍先用塩水姜汁各半盞用砂鍋煮七沸後入黄連甘草各半两再加童便半盞再煮七沸住火良久撈起入磁器盛貯伏地氣一晝夜取出晒乾以備後用庶無毒害頂圓臍正一两一枚者佳

一用川大黄須錦紋者佳剉成飲片用酒拌均燥乾後用不傷陰血如年壯實熱者生用不須製

一用麻黄去節先滚醋湯畧浸片時撈起以備後

用庶免大發如冬月嚴寒腠理至密當生用不
須製
一用吳茱萸將鹽水拌均炒燥庶無小毒
一用附子後身目紅者乃附子之過用蘿蔔搗水
濾汁二大盞入黄連甘草各半兩犀角三錢煎
至八分服之以解附子毒其紅即除如解遲必
血從耳口鼻出者必死無蘿蔔用蘿蔔子搗水
取汁亦可如無蘿蔔子用澄清泥漿水亦可也
一用大黄後瀉利不止者用烏梅二枚炒粳米一

一二八卷　廿六

撮乾姜二錢人參炒白术各半兩生附子皮一
錢半甘草一錢升麻少許灯心一握水二大鍾
煎之去渣後入炒陳壁土一匙調服即愈取土
氣以助胃氣也
一用麻黄後汗出不止者将病人髮披水盆中足
露出外用炒糯米半升龍骨牡蠣藁本防風各
一兩為細末周身撲之随後秘方用藥免致亡
阳而死此為良法
羌活冲和湯　治太阳傷風有汗脉浮緩

羌活　白芷　黄芩　甘草各半　防風　白术
生地各一錢半　川芎五分　右如前煎法若一服汗仍
未止加黄蓍一錢半芍藥一錢仍未止以小柴
胡加桂枝芍藥各一錢
葛根湯　治太阳阳明項背強急無汗悪風脉帶
弦浮而發熱又治太阳與阳明合病必自利此
湯並主之　葛根一錢　甘草　麻黄湯泡二次各二錢去節
水二鍾姜四片棗二枚煎服微覆取汗
獨活散　治傷寒温熱等症

入十八卷　廿七

羌活　獨羌　防風　枳殼　黄芩　麻黄泡次
人參　細辛　茯苓　炙甘草　蔓荆子
甘菊花　石膏　水二鍾姜三片薄荷五葉
煎
敗毒散　治傷寒温疫風温頭目昏眩四肢疼痛
増寒壯熱項強目晴疼尋常風眩拘急
羌活　獨活　前胡　柴胡　川芎　枳殼
桔梗　茯苓　人參　甘草各等分
水二鍾如常煎服

六神通解散

麻黃 黃芩 滑石各二兩 石膏一兩 甘草一兩半

蒼朮四兩 治時行三日前加葱白香豉煎服而汗之立効中病即止不可尽劑

升麻湯 治傷寒中風頭疼增寒壯熱肢躰疼痛發熱悪寒鼻中乾不得卧兼治寒瞖不時人多疾疫及暴熱之頃忽然変寒身躰疼痛頭重如石

升麻 甘草 芍藥 葛根各等分

每服七八錢煎如常法若老人去芍藥加柴胡茯苓人参各一錢

五積散 治陰經傷冷脾胃不和感冒寒邪

蒼朮二十四兩 桔梗十二兩 陳皮八兩 白芷 茯苓各四兩

甘草炒各五兩 枳殼 肉桂 人参 川芎各二兩

厚朴 半夏 芍藥 當歸 麻黃 乾姜各三兩

右十六味除枳殼肉桂陳皮其餘共一處生擣為粗末用酒拌匀晒干分作六分大鍋内文武火炒令黃色不浔焦擲冷入殼桂陳皮和匀每服五錢水二鍾姜三片煎一鍾服

婦人血風証因崩漏大脱血或前後血因而涸燥其熱未除尋衣摸床撮空明目不省人事揚手擲足搖動不安錯語失神脉弦浮而虛内有燥熱之極氣粗鼻乾而不潤上下通燥此為难治宜服生地黃黃連湯

治男子去血多亦有此症其妙不可容言

生地黃黃連湯

川芎 生地 當歸各七分 赤芍藥 梔子

黃芩 黃連各三分 防風

每服五錢水煎清飲徐々呷之如脉實可加大黃下之大承氣湯氣藥也自外而之内者用之生地黃々連湯血藥也自内而之外者用之氣血合病循衣撮空治同

自氣而之血々而復之氣者大承氣湯下之自血而之氣々而復之血者生地黃々連湯主之二者俱不大便此是承氣湯對子又與三黃石膏湯表裏皆是三焦胞絡相火之用也病既危急只浔以此湯降血中火耳不拘婦人男子去血過

多而有此症者皆宜服之無不効者
秘用三十七方就註三十七槌法

升麻發表湯　即麻黄湯附加減法

治冬月正傷寒頭疼發熱惡寒脊強脈浮緊無汗為表症此足太阳膀胱經受邪當發汗以頭如斧劈身如火熾者宜此湯有汗者勿用

麻黄　桂枝　甘草　杏仁　升麻　川芎
防風　白芷　羌活

本經發熱惡寒頭痛無汗而喘者本方加干葛去升麻

本經發熱惡寒身躰痛者本方加蒼木芍藥去杏仁

本經惡寒發熱身痒面赤者以其不得小便出故也本方去白芷升麻杏仁加柴胡芍藥

本經頭痛發熱惡寒胸中飽悶者本方加枳壳桔梗

本經感寒深重服湯不作汗者再宜服至二三劑而汗不出者死

本經汗後不解者宜再服量症輕重用麻黄升麻分多寡為當

水二鍾姜三片葱白二茎槌法加江西豆豉一撮煎之熱服取汗有神宜厚被覆首凡中病即止不得多服多則反加别病

疎邪實表湯　即桂枝湯附加減法

治冬月正傷風頭痛發熱惡寒脊強脈浮緩自汗為表症此足太阳膀胱經受邪當實表散邪無汗者不可服

桂枝　芍藥　甘草　防風　川芎　羌活
白术　如汗不止加黄芪　喘加杏仁柴胡
胸中飽悶加枳壳桔梗

水二鍾姜三片枣二枚槌法加膠飴二匙温服

羌活冲和湯　以代桂枝麻黄青龍各半等湯此太阳經之神藥也

治春夏秋非時感冒暴寒頭痛發熱惡寒脊強無汗脈浮緊此足太阳膀胱經受邪是表症宜發散不與冬時正傷寒同治此湯非独治三時

暑寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜症亦有神也冬寒亦可用惟黄芩須輕投耳

羌活　蒼朮各一錢半　防風　黄芩　川芎　白芷

甘草　生地黄各一錢　細辛五分不可多

水二鍾煎八分熱服溫被蓋覆取微汗濕土司天加蒼朮一錢五分天久淫雨亦加如渴加石膏三錢知母一錢不渴不加冬月禁之

如胸中飽悶加桔梗枳殼去生地

夏月加石膏知母名神朮湯如服此湯後不作汗本方加蘇葉喘而惡寒身熱本方加杏仁生地汗後不解宜服要汗下兼行加大黄乃釜底抽薪之法

其春夏秋感冒非時傷寒亦有頭疼惡寒身熱脉浮緩自汗宜實表本方去蒼朮加白朮汗不止加黄芪即加減冲和湯再不止以小柴胡加桂枝芍藥一錢有神

槌法姜三片棗二枚煎至一鍾加葱白搗汁五匙再煎一二沸如發汗熱服止汗溫服

柴葛解肌湯　即葛根湯附加減法

治足阳明胃經受邪目痛鼻乾不眠微頭疼眼眶痛脉来微洪宜解肌屬阳明經病其正阳明腑病別有治法

柴胡　葛根　甘草　黄芩

芍藥　羌活　白芷　桔梗

本經無汗惡寒甚者去黄芩加麻黄冬月宜加春宜少夏秋去之加蘇葉

本經有汗而渴者治法在如神白虎湯下即白虎湯

水二鍾姜三片棗二枚槌法加石膏末一撮煎之熱服

柴胡雙解散　即小柴胡湯附加減法

足少陽膽經受證耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脉来弦數屬半表半裏宜和解此經無出入有三禁不可汗下利也止有小柴胡一湯隨病加減再無別湯

柴胡　黄芩　半夏　甘草　人參　陳皮

芍藥　若只小柴胡湯無芍藥
本經症小便不利加茯苓　脇痛加青皮
本經嘔者入姜汁竹茹　痰多加瓜蔞貝母
寒熱似瘧加桂　渴加天花粉知母
齒燥無津液加石膏　嗽者加五味金沸草
壞症加鱉甲
本經痞心下飽悶未經下者非結胸乃表邪傳至胸中未入于腑證雖滿悶尚為在表只消小柴胡加枳梗未効就以本方對小陷胸加枳桔

一服虛煩類傷寒証本方加竹葉炒粳米
本經與陽明合病本方加葛根芍藥
婦人熱入血室加當歸紅花
男人熱入血室加生地黃
老婦人傷寒無表証其熱勝者本方加大黃甚者加芒硝
水二鍾姜一片棗二枚槌法加生艾汁三匙煎之溫服

小柴胡湯證註釋

治太陽病十日已去脉細而嗜卧外雖已解設胸滿脇痛與服之若脉浮者麻黃湯傷寒五六日來往寒熱胸脇苦滿默默不欲食心煩喜嘔或煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心悸小便不利或不渴身有微熱者此湯主之血氣弱腠理開邪氣因與正氣相搏結于脇下邪正分爭往來寒熱休作有時默默不欲食臟腑相連其痛必下邪高痛下致使嘔也此湯主之服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之傷寒五六日身

熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者此湯主之傷寒陽脉濇陰脉弦腹中急痛先與小建中湯不差者此湯主之太陽病過經十餘日發汗吐下後四五日柴胡湯証仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結致如瘧狀此湯主之傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大便硬脉細者為陽微

結必有表復有裏脉沉亦裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外症悉入在裏此為半在表半在裏也脉雖沉緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗也今頭汗出故知非少陰可與此湯設不了了得屎而解傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴胡症在者復與小柴胡湯心下痞為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而腹痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞氣柴胡

一八十八卷　卅六

不中與之宜半夏瀉心湯已上屬太陰經末後五六日嘔而發熱至太陽經一段俱太陰證節菴併及者見太陰証柴胡亦有當與不當與者

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇不利者與此湯陽明病脇下鞕滿不大便而嘔舌上白胎皆可與之上焦得通津液得下胃氣因和濈然汗出而解陽明中風脉弦浮大而短氣腹部滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦身前後腫刺之少差外不解病過十日脉續浮者此湯主之已上屬陽明經太陽病不解轉入少陽脇下滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者此湯主之若已吐下後發汗溫鍼譫語小柴胡湯証罷此為壞証知犯何逆以法治之已上屬少陽經嘔而發熱宜服此湯傷寒已後更發熱此湯主之若脉浮者以汗解之屬陽易差後勞復脉證

一八十八卷　卅七

彭用光加減法

如胸中煩而不嘔去半夏人參加瓜蔞仁煩者熱也嘔者逆氣也今煩而不嘔則熱聚而氣不逆邪氣欲漸成實也參甘恐補去之無助熱夏味辛散去之以無逆氣也瓜蔞仁苦寒用之以通鬱熱于胸中

若渴者去半夏恐燥津液加人參之甘潤瓜蔞根之苦潤相合則津液生而渴已也

若腹中痛去黃芩加芍藥寒邪入裏裏氣不足

寒邪壅則腹中痛苓苦寒性堅而寒中去之則
中氣易和芍藥味酸而和中加之則裏氣得通
而腹痛自愈
如脇下痞鞕去大棗之甘溫恐令滿加牡蠣之
酸鹹則痞消而鞕輭矣
若心下悸小便不利者去黃芩之苦寒恐蓄水
浸行加茯苓之甘淡能滲利則津液通矣
若不渴外有微熱去人參微熱恐有表邪加桂
枝取汗發散表邪也

若欬者去人參大棗生姜加五味子乾姜肺氣
逆則欬參棗姜甘溫中則肺氣愈逆故去之用
五味子之酸收歛肺氣乾姜之辛熱以散內之
寒氣則欬自止若加葛根芍藥治少阳〻明合
病頭疼痛發熱耳聾脇痛或往来寒熱如瘧和
解散治之和解散即小柴胡湯加減如嘔逆加
姜九片陳皮一錢如頭痛惡寒加羌活防風各
一錢寒熱間作加桂枝一錢夏月中暑發熱頭
痛加黃連一錢春天温病時行加生地黃川升

麻一錢瘧疾或先寒後熱加川常山尖檳榔半
錢各要未發時煎服傷寒惡寒頭項強發熱前
方沖和湯内去細辛蒼术加白术二錢
桂枝大黃湯　即桂枝湯加大黃附加減法
治足太阴脾經受症腹滿而痛咽乾而渴手足
温脉来沉而有力此因邪熱從阳經傳入阴經
桂枝　芍藥　甘草　大黃　枳實　柴胡
本經腹滿不惡寒而喘者加大腹皮去甘草
水二鍾姜一片棗二枚槌法臨服入檳榔磨水

三匙熱服
中云看此証不如三承氣湯選用或一日初傳太
陰乃可覌仲景書或者邪中阴經而留于府者
也不然必外証未全除可也不然此方亦當用
在壞証例非本經藥也直説阳症傳来者誤也
加味理中飲　即理中湯附加減法
治太阴脾經受証自利不渴手足温身無熱脉
来沉而無力此屬臟寒
乾姜　白术　人參　甘草　肉桂

陳皮　茯苓

厥阴消渴氣上衝心飢不欲食；即吐蚘腹痛

大便實者本方加大黄蜜少許利之

本經腹濡滿時减者本方去甘草

本經嘔者入半夏姜汁

本經勸卧沉重利不止少加附子

利後身躰痛者急温之加附子

自利腹痛者入木香磨姜汁調服和之

水二鍾姜一片棗二枚槌法臨服入炒陳壁土

八十八卷　四十

一匙調服取土氣以助胃氣

茵陳將軍湯　即茵陳湯附加减法

治足太阴脾經腹滿身目發黄小水不利大便

實發渴或頭汗劑頸而還脉来沉重者宜用

大黄　茵陳　山梔　甘草

厚朴　黄芩　枳實

大便自調者去大黄厚朴加大腹皮利小便清

為効

水二鍾姜一片槌法加灯草一握熱服

導赤飲　即五苓散附加减法

治小水不利小腹滿或下焦蓄熱或引飲過多

或小水短赤而渴脉沉數者以利小便為先惟

汗後亡津液與阳明汗多者則以利小便為戒

茯苓　猪苓　澤瀉　桂枝　白术

甘草　滑石　山梔

中湿身目黄者加茵陳

水結胸證加木通灯心如小水不利而見頭汗

出者乃阳脱也此死證

八十八卷　四十一

自得病起無熱但狂言煩躁不安精釆不與人

相當此湯治之

此因熱結膀胱太阳經之裡症也一名太阳本

病

水二鍾姜一片灯心二十莖槌法入塩二字

六一順氣湯　以代大承氣小承氣調胃承氣大

柴胡三乙承氣湯大陷胸等湯之神藥也舉世

無人知此奇妙耳秘之莫與俗人言附加减法

治傷寒熱邪傳裡大便結實口燥咽乾怕熱譫

語揭衣狂妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自汗胸
腹滿硬遶臍疼痛等症悉皆治之
大黃　枳實　厚朴　甘草
黄芩　柴胡　芒硝　芍藥
潮熱自汗譫語發渴揚手擲足揭去衣被狂妄
斑黃大便實者俱屬正阳明胃腑病依本方
口燥咽乾大便實屬少阴依本方
下利純清心下鞕痛而渴者屬少阴依本方
怕熱發渴譫妄手足乍冷乍温大便實者阳厥
証屬厥阴依本方舌卷囊縮者难治須急下之

熱病目不明謂腎水已竭不能照物病已篤矣
惟宜急下依本方目中不了了即目不明也
轉屎氣者謂下泄也有燥屎焉當下依本方如
更衣者止後服不必尽劑不更衣宜再少與大
便通者愈若結胸証心下鞕痛手不可近燥渴
譫語大便實者依本方去甘草加甘遂桔梗凡
傷寒過經及老弱併血氣両虚之人或婦人產
後有下症或有下後不解或有表症未除而裏

症又急不得不下者用此湯去芒硝下之即吉
蓋恐轉藥硝性燥急故有此戒大凡傷寒邪熱
傳裏結實須看熱氣淺深用藥令之庸俗不分
當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃
芒硝乱投湯劑下之因玆枉死者多矣余謂傷
寒之邪傳來非一治之則殊耳病有三焦俱傷
者則痞滿燥實堅全俱宜大承氣湯厚朴苦温
以去痞枳實苦寒以泄滿芒硝鹹寒以潤燥軟
堅大黃苦寒以泄實去熱病斯愈矣邪在中焦

則有燥實堅三証故用調胃承氣湯以甘草和
中芒硝潤燥大黃泄實不用枳朴恐傷上焦虛
無氤氲之元氣調胃之名自此立矣上焦受傷
則痞而實用小承氣湯枳實厚朴之能除痞大
黃之泄實去芒硝不傷下焦血分之真阴謂不
伐其根本也若夫大柴胡湯則有表症尚未除
而裏症又急不得不下者只得以此湯通表裏
而緩治之猶有老弱及血氣両虛之人亦宜用
此故經云轉藥孰緊有芒硝者緊也大承氣最

緊小承氣次之調胃承氣又次之大柴胡又次之其大柴胡加大黃小柴胡加芒硝方為轉藥蓋為病輕者設也仲景又云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

右先將水二鍾滚三沸後入藥煎至八分槌法臨服時入鐵銹水三匙調服立効取鐵性沉重之義最能墜熱開結有神此千金不傳之秘

如神白虎湯　即白虎湯附加减法

治身熱渴而有汗不觧或經汗過渴不觧脉來微洪

石膏　知母　人參　甘草　山梔

麦冬　五味

心煩者加竹茹一團如大渴心煩背悪寒者依本方去山梔加天花粉無渴不可服此藥為大忌

水二鍾姜一片枣一枚槌法加淡竹葉十片

三黃石膏湯

此湯治傷寒後五心煩熱舌燥表裏皆實怫欝陽毒發斑黃身如塗朱眼珠如火狂叫欲走十指皮脫六脉洪大滑數燥渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不觧已成壊症表裏皆熱欲發其汗病熱不退又復下之大便遂頻小便不利亦有錯治温症而成此症者又八九日已經汗下後脉洪數身壯熱拘急沉重欲治其内由表未觧欲發其表則裡症又急趑趄不能措手待斃而已殊不知熱在三焦閉塞経絡津液營衛不通遂成此症又治汗下後三焦生熱脉洪數譫語不休晝夜喘息鼻時加衂身目俱黃狂叫欲走者通用此湯治之有神

石膏一兩半　黃芩　黃連　黃栢各七錢

山梔　麻黃　香豉一合

每服一兩水二鍾姜三片枣二枚槌法入細茶一撮煎之熱服　未中病再服

三黃巨勝湯

此湯治陽毒發斑狂乱妄言大渴叫喊目赤脉數大便燥實不通上氣喘急舌卷囊縮难治者

權以此湯却之三黃石膏湯內去麻黃香豉加
大黃芒硝是也
水二鍾姜一片棗二枚槌法臨服入泥漿清水
二匙調服即安
冲和靈寶飲　治兩感傷寒起于頭痛惡寒發熱
口燥舌乾以阳先受病多者先以此湯探之中
病即愈
羌活　防風　川芎　生地　細辛　黃芩
柴胡　甘草　乾葛　白芷　石膏

水二鍾煨生姜三片棗二枚槌法入黑豆一撮
煎之溫服取微汗為愈如不愈表症多而甚急
者方可用麻黃葛根為解表如裏多而甚急者
先以調胃承氣為攻裏是也
如以阴經自中病發熱下利身疼痛脉沉細無
力不渴倦卧昏重者又當先救裏温之回陽救
急湯是分表裏寒熱而治此其權變大法
古云兩感雖為死証復有可救之理乃用藥先
後寒熱之剂及發表攻裡之序不用故枉死者

多矣此方良可
桃仁承氣對子　即桃仁承氣湯附加減法
治熱邪傳裏熱畜膀胱其人如狂小水自利大
便黑小腹滿痛身目黃譫語燥渴為畜血証脉
沉有力宜此湯下尽黑物即愈未服前而血自
下者為欲愈不宜服
桃仁　桂枝　芒硝　大黃　芍藥　柴胡
青皮　當歸　甘草　枳實
水二鍾姜三片槌法臨服入蘇木煎汁三匙服

消毒清黛飲　治熱邪傳裡〻實表虚血熱不散
熱氣乘于皮膚而為斑也輕則如疹子重則如
錦紋重甚則斑爛皮膚或本屬阳悞投熱藥或
當下不下或下後未解皆能致此不可發汗重
令開泄更加斑爛也然而斑之方萌與蚊迹相
類發斑多見於胸腹蚊迹只在於手足阳脉洪
大病人昏憒先紅後赤者斑也脉不洪大病人
自静先紅後黃者蚊也其或大便自利短氣怫
鬱氣短燥糞不通又如菓實靨者盧醫復生不

能施其巧矣凡汗下不觧足冷耳聾煩悶咳便
是發斑之候
黄連 甘草 石膏 知母 柴胡 玄參
生地 山梔 犀角 青黛 人參
水二鍾姜一片枣二枚槌法臨服入苦酒一匙
大便實者去人參加大黄
生地黄連湯 治鼻衄成流久不止者或热毒入
深吐血不止
黄芩 山梔 桔梗 甘草 生地 黄連

柴胡 川芎 芍藥 犀角如無升麻代之
水二鍾枣二枚煎八分槌法臨服入茅根搗汁
磨京墨調服如無茅根以藕搗汁亦可
外用劫法水紙搭于鼻冲
加味犀角地黄湯 治煩躁漱水不下咽者屬上
焦有瘀血
犀角 生地 芍藥 甘草 桔梗 牡丹皮
陳皮 紅花 當歸
水二鍾姜三片槌法臨服入生藕節搗汁三匙

温服
回陽救急湯 即四逆湯附加减法
治寒邪直中陰経真寒証初病起無身熱無頭
疼止則悪寒四肢厥冷戰慄腹疼吐瀉不渴引
衣自蓋踡卧沉重或手指甲唇青或口吐涎沫
或至無脉或脉来沉遲無力
熟附子 乾姜 人參 甘草 白术 肉桂
陳皮 五味 茯苓 半夏
嘔吐涎沫或小腹痛加塩炒呉茱萸

無脉者加猪胆汁一匙 嘔吐不止加姜汁
泄瀉不止加升麻黄芪
水二鍾姜三片煎之臨服加麝香三厘調服中
病以手足温和即止不得多服多則反加別病
矣如未止可用前理中飲加减治之無妨
回陽反本湯 治陰盛格陽陰極發躁微渴面赤
欲坐卧於泥水井中脉来無力或脉全無欲絶
者 附子 乾姜 甘草 人參 麦門冬
五味 臘茶 陳皮

面戴阳者下虚也加葱七茎黄連少許用澄清
泥漿水二鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取
汗為効

柴胡百合湯　治瘥後昏沉發熱渴而錯語失神
及百合劳復等證

柴胡　人参　黄芩　甘草
知母　百合　生地　陳皮

渴加天花粉　胸中煩熱加山梔　頭微疼加
羌活川芎　嘔吐加姜汁炒半夏　胸中飽悶
加枳殼桔梗　食復者加枳實黄連甚重大便
實者加大黄　胸中虛煩加竹茹竹葉　瘥後
乾嘔錯語失神呻吟睡不安者加黄連犀角
咳喘加杏仁百合甚加麻黄　心中驚惕為血
少加當歸茯神遠志　虛汗加黄芪　脾倦加
白术　腹中雷鳴加煨生姜　劳復時熱不除
加葶藶烏梅生艾汁

水二鍾棗一枚姜三片槌法加醋炙鱉甲煎之
温服

如聖散　治剛柔二痓頭揺口噤身反張手足攣
搐頭面赤項強急與瘈瘲同此法

防風　川芎　白芷　柴胡　芍藥　甘草　羌活
當歸　烏藥　半夏　黄芩　有汗是柔痓加
白术桂枝　無汗是剛痓加麻黄蒼术　口噤
咬牙者如大便實者入大黄利之

水二鍾姜三片煎之臨服入姜汁竹瀝温服

温經益元湯　治因汗後大虛頭眩振振欲擗
地并肉瞤筋惕及因發汗太多衛虛亡陽汗不
止或下後利不止身疼痛者併皆治之

熟地　人参　白术　黄芪　甘草　芍藥
當歸　生地　茯苓　陳皮　肉桂　大附子

如飽悶加枳殼去地黄　如瘦人去芍藥有熱
去附子　利不止加炒白术升麻陳壁土去當
歸地黄　嘔者加姜汁製半夏　渴者加天花
粉　汗後惡風寒屬表虛去附子肉桂生地加
桂枝膠飴　水二鍾姜三片棗一枚加糯米一
撮槌法煎之温服

逍遥湯　治有汗傷寒瘥後血氣未平勞動助熱復還於經絡有因與婦人交接淫慾而復發不易有病者謂之勞復内交接淫慾而無病人反淂病者謂之阴阳易余曾見舌出數寸而死者多矣此証最难治必宜此湯

人参　知母　竹青　卵縮腹痛倍加黄連

甘草　滑石　生地　韮根　柴胡　犀角

水二鍾姜三片枣二枚煎之臨服入燒裩襠末一錢半調服有粘汗出為効不粘汗出再服以

小水利阴頭腫則愈

升陽散火湯　治有患人叉手冒胸尋衣摸床譫語昏沉不醒人事不可呼為風証而用風藥悮死者多矣蓋汗熱乘于肺金元氣虚不能自主持名曰撮空証小便利者可治小便不利者不可治　人参　當歸　柴胡　芍藥　黄芩

甘草　白术　麦冬　陳皮　茯神

有痰加姜製半夏　大便燥實譫語發渴加大黄　泄瀉者加升麻炒白术

水二鍾姜三片枣一枚槌法入金首飾煎之熱服

再造飲　治有患頭疼發熱項脊強悪寒無汗用發汗藥二三剤汗不出者苟不識此不論時令遂以麻黄重藥及火刼取汗悮人死者多矣殊不知陽虚不作汗故有此証名曰無阳証

黄芪　人参　桂枝　甘草　細辛　熟附子

羌活　防風　川芎　煨生姜

夏月加黄芩石膏冬月不加

水二鍾枣二枚煎至一鍾槌法加炒芍藥一撮煎三沸温服

黄龍湯　治有患心下鞕痛下利純清水譫語發渴身熱殊不識此証但見下利便呼為漏底傷寒而便用熱藥止之就如抱薪救火悮人死者多矣殊不知此因熱邪傳裡胃中燥屎結實此利非内寒而利乃逐日自飲湯藥而利也宜急下之名曰結熱利証身有熱者宜用此湯身無熱者用前六一順氣湯

大黄　芒硝　枳實　厚朴　甘草
人參　當歸
年老氣血虛者去芒硝
水二鍾姜三片棗二枚煎之後再加桔梗煎一
沸熱服

調營養氣湯　即加减補中益氣湯
治有患頭疼身熱悪寒微渴濈然汗出身痛脚
腿酸疼沉勤脉空浮而無力不可因見頭疼悪
寒發熱便呼為正傷寒而大發其汗所以輕变

重而害人者多矣此劳力内傷氣血外感寒邪
宜少辛甘温之剤則愈名曰劳力感寒証故経
云劳者温之損者温之温能除大熱正此謂也
有下証者大柴胡湯下之則緩
人參　黄芪　當歸　生地　川芎　柴胡
陳皮　甘草　細辛　羌活　防風　白术
元氣不足者加升麻少許須知元氣不足者至
陰之下求其升　口渴加天花粉知母　喘嗽
加杏仁去升麻　汗不止加芍藥去升麻細辛
胸中煩熱加山梔竹茹　乾嘔加姜汁炒半夏
胸中飽悶加桔梗枳壳去生地甘草黄芪白术
少許痰盛者加瓜蔞仁貝母去防風細辛　腹
痛去芪术加芍藥乾姜和之　有因血欝内傷
腹有痛處或大便黑加桃仁紅花去芎辛羌防
黄芪白术甚者加大黄下尽瘀血則愈後去大
黄調理
水二鍾姜三片棗二枚槌法入葱白二茎煎之
温服

導赤各半湯　治患傷寒後心下不鞕腹中不滿
大小便如常身無寒熱漸变神昏不語或睡中
独語一二句目赤脣焦舌乾不飲水稀粥與之
則嚥不與即不思形如醉人俗不識此而悞人
者多矣殊不知熱傳手少阴心也心火上而逼
肺所以神昏名越經証
黄連　山梔　黄芩　滑石　甘草
知母　犀角　茯神　麦冬　人參
水二鍾姜棗煎之加灯心一握煎沸熱服

益元湯　治有患身熱頭疼全無不煩便作躁悶面赤飲水不得入口不識者呼為熱証而用凉藥遂至悞人殊不知元氣虛弱是無根虛火泛上名曰戴陽証

熟附子　甘草　乾姜　人參　五味
麥冬　黄連　知母　葱　艾

水二鍾姜一片枣二枚槌法臨服入童便三匙頓冷服

桂苓飲　治有患初得病無熱狂言煩躁不安精采不與人相當切勿呼為狂發悞用下藥死者多矣此因熱結膀胱名如狂証

猪苓　澤瀉　桂枝　甘草　白朮
知母　黄栢　山梔　蘇葉

水二鍾姜三片煎一鍾槌法再加滑石末一錢煎三沸温服取微汗為効

當歸活血湯　有患無頭疼無悪寒止則身熱渴小水利大便黑口出無倫語設如不識呼為熱証而用凉剂則悞矣殊不知內傳心脾二經使人昏迷沉重故名挾血如見祟

當歸　赤芍　甘草　紅花　桂心　乾姜
枳殼　生地　人參　柴胡　桃仁

服三帖後去桃仁紅花干姜桂心加白朮茯苓

水二鍾姜一片煎之槌法入酒三匙調服

加味導痰湯　有患憎寒壯熱頭疼昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫庸醫皆作傷寒治之多悞殊不知此因內傷七情以致痰迷心竅神不守舍神出舍空々則痰生也名曰挾痰如見祟痰症類傷寒與此同治法

茯苓　半夏　南星　枳實　黄芩　瓜蔞仁
白朮　陳皮　甘草　桔梗　人參　黄連

年力壯盛先用吐痰法後服此湯

水二鍾姜三片枣二枚槌法臨服入竹瀝姜汁温服

加減調中飲　治食積類傷寒頭疼發熱悪寒氣口脉緊盛但身不痛此為異耳經云飲食自倍腸胃乃傷輕則消化重即吐下此良法也

蒼朮　厚朴　陳皮　甘艸　白朮　山查
神麯　枳實　草菓　黄連　乾姜
腹中疼加葹仁　痛甚大便實熱加大黄下之
去山查草菓神曲干姜
心中兀兀欲吐者與乾霍乱同吐法用滚水一
碗入塩一撮皂角末五分探吐
水二鍾姜一片臨服入木香磨汁調服即効
加减續命湯　治脚氣類傷寒頭疼身熱悪寒支
節痛便秘嘔逆脚軟屈弱不能轉動但起於脚

膝耳禁用補劑及淋洗
防風　芍藥　白术　川芎　防已
桂枝　甘草　麻黄　蒼术　羌活
暑中三阳所患必熱脉来数去附子桂枝麻黄
加黄栢黄芩柴胡　寒中三陰所患必冷脉来
遅加附子　起于湿者脉来弱加牛膝木瓜
起於風者脉来浮加独活　元氣虚加人参少
許　大便實者加大黄
水二鍾姜一片棗二枚灯心二十莖槌法臨服
入姜汁調服
芩連消毒飲　時天行大頭病發熱悪寒頭項腫
痛脉洪取作痰症治之其喉痺者亦照此方治
柴胡　甘草　桔梗　黄芩　川芎
荊芥　黄連　防風　羌活　枳壳
連翹　射干　白芷
先加大黄利去一二次　後依本方去大黄加
人参當歸
水二鍾姜三片煎一鍾加鼠粘子一撮再煎一

沸槌法入竹瀝姜汁調服
初起不可用大黄末後不减方可量加
加味六神通解散　治時行三月後謂之晚發頭
痛身熱悪寒脉洪數先用冲和湯不愈後服此
湯
麻黄　甘草　石膏　黄芩　滑石
蒼术　川芎　羌活　細辛
水二鍾姜三片槌法入豆豉一撮葱白二莖煎
之熱服取汁中病即止

赤水玄珠第十九卷目錄

藥誤傷人　病人應死証　望色
聞聲　聞音　切脉　發汗止發汗
傷寒可吐　傷寒不可吐　傷寒吐不出
探法　傷寒吐不住止法　傷寒不可下
小便不通燻法　胸膈不寬熨法
姙娠護胎法　傷寒不染病法　用藥寒
温合宜論　姙娠傷寒禁忌藥　蒸臍法
熨臍法　中寒　傷寒合病　陰毒傷
寒　夾陰傷寒　寒疫　大頭傷寒
食積　中濕類傷寒　痰證類傷寒
蓄血類傷寒　嗽水不欲嚥　晝夜偏劇
心下滿　遺尿　大便自利　驚惕
呃逆　譫語　鄭聲　瘖瘂不言
陰症似陽　冷結　蚘厥　欝冒不仁
肉瞤筋惕　肉苛　百合　瘈瘲
循衣摸床　舌捲囊縮　瘥後發癰
瘥後遺毒　瘥後發碗頭瘡　瘥後勞復

女勞復　瘥後陰陽易　瘥後虚弱
瘥後昏沉　瘥後飲酒復劇　姙娠傷寒
産後傷寒　不可水　再三汗下熱不退
四肢冷　附四肢沉重四肢不收　結陽
結陰　寒在皮膚熱在骨髓熱在皮膚寒在
骨髓　太陽傳經用藥　內傷似外感始為
熱中病　內傷似外感末傳寒中病　內傷
似外感陽明中熱病　內傷似外感温熱病
內傷似傷寒　房室傷風　房室傷寒
瘧痢發熱類傷寒　赤膈傷寒　黃耳傷
寒　觧㑊類傷寒　砂病類傷寒
搖頭　身痒　未交接而作易病治
人迎氣口脉　衝陽脉　太谿脉
結脉　促脉　代脉

目錄終

赤水玄珠第十九卷

新安生生子孫一奎著輯

藥誤傷人

凡應用小柴胡湯和解誤用承氣湯致身發黃者死中暑作熱病誤用燥劑者死腎虛受寒內逼浮陽之火泛上面赤煩躁身有微熱渴欲飲水不能下咽大便閉或自利小水淡黃或嘔逆或氣短或鄭聲或咽痛狀似陽證醫見面赤煩渴便閉認作陽證誤投寒涼立死陰證身熱面赤

足冷煩躁揭去衣被脉来數大無力不急用加減五積散冷服誤用凉藥者死傷寒汗多用利小便藥者死陽明病潮熱汗多小便因少若利之加喘渴者死濕病若發其汗使人耳聾不知痛處者死病人煩躁自覺甚熱他人以手按其肌膚殊無大熱此為無根失守之火用凉藥者死

病人應死證

頭重視身此天柱骨倒元氣已敗死大便溺氣極臭者死目精正圓者死卵縮入腹脈見離經者死瘥後小便澁有血名曰內外瘡皆黑靨不出膿者死少陰下利止頭眩時時自冒者死熱盛躁急不得汗出是陽脉極死舌上黑胎生芒刺刮不去易生者死夏月可治鼻衄自汗者死胃寒發呃丁香柿蒂良姜湯調服脈不出加膽汁合生脉散其脉又不出或暴出者皆死

望色

昔肥令瘦主痰大肉脫去主不治平人消瘦主脾

熱眼眶黑主內有痰鼻色青主腹中痛苦冷者死鼻色微黑者有水氣鼻色黄主小便難鼻色白者為氣虛鼻色赤者屬肺熱鼻色鮮明者有留飲鼻孔乾燥者必衄血鼻色燥如烟煤者是陽毒熱極鼻孔冷滑色黑者是陰毒冷極鼻流濁涕者屬風熱鼻流清涕者是肺寒鼻孔癖脹者屬肺熱有風唇口焦紅者吉唇口焦黑者凶唇口俱腫赤者是熱極唇口俱青黑者是寒熱唇口舌胎斷紋者难治唇口燥裂者是脾熱唇青舌捲者死唇吻色青

者死環口黧黑者死口張氣直出者死齒燥無津液者是阳明熱極前板齒燥兼脉虛者是中暑齒如熱者难治耳色黑枯燥者是腎憊目赤唇焦舌黑者屬阳毒目重黃色暗者屬湿毒目黃兼小便利大便黑小腹满痛者屬蓄血目瞑者將欲衄血目之白睛黃氣冷無熱不渴脉沉細者屬阴黃两皆黃者病欲愈凡開目見人者屬阳閉目不欲見人者屬阴睛昏不識人目反上視睛小瞪目直視目邪視目睛正圓戴眼反折眼胞陷下此八者皆死證目睛微定暫時稍轉動者屬痰目中不了了睛不和不明白者此因邪熱結實在内不了了者謂見一半目不見一半目是也舌腫者难治舌出者死面顴頰赤在午後此虛火上升不可作傷寒治面赤脉数無力此伏阴病其證煩躁引飲虛阳上升面赤脉沉細此少阴病外熱内寒阴盛格阳宜温誤用寒凉者死面赤脉弦数此少阳病宜小柴胡和解緣面赤々乃阳氣怫鬱在表汗不徹之故宜發汗面部通赤色此阳明表證未解不可攻

裏宜解肌面唇青是阴寒極面青兼舌捲囊縮亦是阴寒面青兼小腹絞痛是夾阴傷寒面目身黃兼小水短澁是湿熱面目身黃兼小腹满硬痛小便利是蓄血傷寒面白為無神或汗多或脫血所致面白人不宜大汗黑氣在魚尾相牵入太阳者死黑氣自人中入口者死黑氣自入耳目鼻舌者死面黑人在傷寒内涉虛不宜叅术大補

聞聲

聲清聲濁　病邪在表其聲清而響喨病邪入裏其聲濁而不喨

聲輕聲重　病在陽分其聲前輕後重病在阴分其聲前重後輕

聲斷聲續　病邪表浅併有餘陽證其聲續病邪入深併内傷不足其聲斷

言壯言怯　外感阳病有餘出言壯厲則寒熱交作内傷阴證不足出言懶怯則寒熱間作

嘆　嘆是心変動之聲

欠　腎主欠陰氣積下陽氣未尽阳引而上阴引而下陰陽相引故數欠也

噫　噫是心変動之聲是胸中氣不交通寒氣客于胃厥逆從上下復出于胃故為噫

嚔　嚔是腎変動之聲有病發嚔是傷風或傷熱無病發嚔是阳氣和満於心

吞　吞口入脾変動之聲

呃　其發皆從胃中至胸嗌間而為呃有胃中實熱失下者有胃中痰飲者有服寒涼藥過多者有胃中虚冷者

〈十九卷　五

咳　咳是肺変動之聲俗呼為嗽肺為邪干氣逆不下也有肺寒咳者有停食咳者有邪在半表半裏咳者

唏　陰氣實阳氣虚阴氣速阳氣遅阴氣盛阳氣絶故為唏

怒　怒是肝変動之聲

歌　歌是脾変動之聲

哭　哭是肺変動之聲

笑　笑是心変動之聲

太息　憂思則心系急〻則氣約〻則不利故太息以伸出之

錯語　意錯言乱自知言錯邪氣尚輕自不知竟此熱甚正氣衰

呢喃　病邪入輕則睡中發此聲也

聲嘶　肺有風熱

聲啞　聲啞唇口見生瘡是狐惑病有風熱傷心肺而聲啞者少陰病咽中生瘡者有痓病口禁者有熱病三四日不得汗出者死

〈十九卷　六

口禁　口禁难言見手足牽搐是風痓口噤不言难治陽明病渴欲飲水口噤舌乾白虎加人参湯咽乾不可汗

舌哽舌短舌強　病邪入深主难治

口噤咬牙　是風痓

喉中有聲　喉中嚨〻有聲者是痰也

卒然無音　寒氣客於厭會則厭不能發〻不能下至其開闔不便故無音

聲如臭鼾　聲如臭鼾者难治
久病耳聾　屬氣虛
咽喉不得息　寸脉微浮或沉伏胷中痞鞕氣上衝此胷中有寒宜吐之
鼻息如鼾睡　屬風温
耳聾兼脇痛　宜和觧寒熱咽而口苦屬少陽
耳聾兼耳腫耳痛　是少陽風熱

問因

口苦口甜　口苦是膽熱口甜是肝熱

舌乾口燥　是胃家熱極
心下滿　因下早致滿為痞氣手按拍之有聲又與此停水手按則散此虛氣手按鞕痛此宿食
喜明喜暗　喜明屬陽元氣實喜暗屬陰元氣虛
睡向壁向外　向壁屬陰元氣虛向外屬阳元氣實
病起覺不舒快少情緒否有此證是夾氣傷寒
病起覺勸卧骨腿酸疼脇痛否有此證是勞力傷寒要知病在肝經問婦人乳頭縮不縮
耳聾　耳聾邪氣入深难治或兼虛證有少阳證不可不知

切生死形狀六經六絶脉

雀啄連来三五啄屋漏半日一點落彈石鞕来尋即散搭指散乱真觧索魚翔似有亦似無鰕遊静中跳一躍寄語醫家仔細看六脉一見休下藥
一動一止两日死两動一止四日亡三動一止六日亡四動一止八日事五動一止只十日十動一

止一年去春草生時即死期二十一動二年住清明節後始傾亡三十動一止三年次立秋節後病則危四十動一止四年住小麥一熟是死期五十一動一止五年試草枯水寒時死矣此為太素脉玄秘
左右手脉俱急緊盛是夾食傷寒
右手脉来空虛左手脉来緊盛是勞力傷寒
左手脉来緊盛右手洪滑或寸脉沉身熱悪寒隐隠頭痛喘咳煩悶胸脇作痛是夾痰傷寒

左手脉来紧濇右手脉沉数心胸脇下小腹有痛處是血鬱内傷外感

鬼脉　得病之初便譫語或發狂六部無脉大指之下寸口之上有脉動者是

反關脉　如病人六部無脉便不可言其無要在掌後切看脉来動者是

傷寒不可發汗

口燥舌乾者口苦咽乾者咽喉痛者吐血下血者淋血者小便淋瀝者大便渴利者内傷勞勸者尺脉微弱者房勞陰虛者夢遺泄精者風溫者溫溫者中暑者瘡漏者

傷寒發汗不出燻法

用發表藥汗不出將蘇葉燒湯以器盛之至於被内兩膝下燻之又法用薑柤綿裹周身擦之其汗自出此良法也

傷寒汗出不住止法

將病人髮披在水盆中足冷于外用炒麩皮糯米粉龍骨牡蠣煆為末和匀周身撲之其汗自止此良法也

傷寒可吐

胸中懊憹者喉中有痰聲者胸滿鬱鬱微煩者中風寒痰涎擁塞者乾霍亂心腹刺痛欲死者傷寒三四日邪在胷中者脉大胷滿多痰者下利日數行寸口脉滑者寸口脉沉伏或浮滑有痰者

傷寒不可吐

病人元氣虛羸者房勞陰虛者勞倦内傷者胎産崩漏者寸脉虛細弱無力者經水適斷適來者少陽胆病者

傷寒吐不出探法

用梔子豉湯大瓜蒂散不得吐隨用三山丸合解毒散煎服再不吐將鵝羽在喉中探吐

傷寒吐不住止法

用炒糯米一撮生薑自然汁少許水煎服凡嘔吐止者亦用此二味入各藥中同煎服嘔吐自止如胃實嘔吐不可用

傷寒不可下

六脉虚細者嘔吐者腹中時滿時減者不轉屎氣
者少阳膽病者腹如雷鳴者阳明面冷赤色者咽
中閉塞者血氣两虚者内傷勞勸者阴虚勞勸者
經水適斷適来者胎前崩漏者小便清白者夾阴
面赤者心下鞕者脉雖大無力者

傷寒小便不通熏法

一切小便不利先将麝香半夏填患人脐中上用
葱白田螺各搗爛成餅封於脐上用布帯縛住良
久下用皂夾焼烟熏入阴中其水實自通婦人亦

用皂夾煎湯洗玉户立通

傷寒胸膈不寬熨法

一切寒結熱結水結食結痞結血結痰結支結大
小結胃痞氣結者俱用生姜搗爛如泥去汁取柤
炒熱絹包漸〻揉熨心胸脇下其滿痛豁然自愈
如姜查冷再入姜汁再炒再熨揉之以愈為効惟
熱結用冷姜查揉之不可炒熱醫當慎之又有傷
寒衄血将解未尽或熱極及吐血不尽醫不知其
證遂用凉藥之剤止住其衄血留結於心胸之分

故滿痛而成血結胸也用加味犀角地黄湯

妊娠傷寒護胎法

用井底泥青黛伏龍肝各為末調匀塗於孕婦脐
中二寸許如乾再塗上以保胎孕也

到傷寒家不染病法

凡入病家須避其邪氣不使染着為上以雄黄末
塗鼻孔行動從容位而入男子病穢氣出於口女
子病穢氣出于阴門其相對坐立之間必須識其
向背

用藥寒温合宜論

如麻黄得桂枝則能發汗芍藥得桂枝則能止汗
黄芪得白术則止虚汗防風得羗活則治諸風蒼
术得羗活則止身痛柴胡得黄芩則寒附子得乾
姜則熱羗活得川芎則止頭疼川芎得天麻則止
頭眩乾姜得天花粉則止消渴石膏得知母則止
渴香薷得扁荳則消暑黄芩得連翹則消毒桑皮
得蘇子則止喘杏仁得五味則止嗽丁香得柿蒂
乾姜則止呃乾姜得半夏則止嘔半夏得姜汁則

回痰貝毋得瓜蔞則開結痰桔梗得升麻開提血
氣枳實得黃連則消心下痞枳壳得桔梗能使胷
中寬知毋黃栢得山梔則降火豆豉得山梔治懊
憹辰砂得酸棗則安神白朮得黃芩則安胎陳皮
得白朮則補脾人参得五味麥門則生腎水蒼朮
得香附開鬱結厚朴得腹皮開膨脹草果得山查
消肉積神曲得麥牙能消食烏梅得乾葛則消酒
砂仁得枳壳則寛中木香得姜汁則散氣烏梅得
香附則順氣芍藥得甘草治腹痛呉茱萸得良姜

亦止腹痛乳香得沒藥大止諸痛芥子得青皮治
脇痛黃芪得大附子則補陽知毋黃栢得當歸則
補陰當歸得生地則生血姜汁磨京墨則止血紅
花得當歸則活血歸尾得桃仁則破血大黃得芒
硝則潤下皂夾得麝香則通竅訶子得肉果則止
瀉木香得梹榔治後重澤瀉得猪苓則能利水泄
瀉得白朮則能收濕此用藥相得之大端也

妊娠傷寒禁忌藥

蚖斑水蛭及蝱蟲　烏頭附子配天雄
野葛水銀并巴荳　牛膝薏苡與蜈蚣
三稜代赭芫花麝　大戟蛇蜕黃雌雄
礞石芒硝牡丹桂　槐花牽牛皂角同
半夏南星與通草　瞿麥乾姜桃仁通
硇砂乾漆蟹甲爪　地膽茅根都不中

蒸臍法

用麝香半夏皂莢末一字填患者臍中後用生
姜薄片貼于臍上放大艾火于姜片上蒸二七
壯灸關元氣海二十壯熱氣通于內逼於外陰

自退而陽自復矣

熨臍法

用葱頭縛一把切去葉留白根切餅二寸許連
縛四五餅先將麝香硫黃二字填於臍中放葱
餅于臍上以熨斗盛火于餅上熨之餅爛再換
餅再熨熱氣入腹以通陽氣如大小便不利以
利則止

中寒

中寒之邪卒時直中所經即病如中太陰脾經用

藿香正氣散合理中湯寒甚加附子如寒中少陰腎經用五積散加茱萸寒熱足冷加附子四逆湯寒熱手足甲唇皆青舌卷囊縮脉伏絶者用蒸臍法及大劑姜附温之不然則死矣

傷寒合病

三陽若與三陰合病即是兩感所以三陰無併合例也大抵傷寒二陽經合病必用二陽經藥合治三陽經合病必用三陽經藥合治

陰毒傷寒

咽喉不利致毒氣攻心如傷寒時氣得病一二日便結成陰毒或服藥後三四日或十餘日变成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心〻下脹滿硬如石短氣不息嘔逆唇青面黑四体如氷臭如被杖其脉沉細而疾或伏絶用陰毒甘草湯先進一服如人行十里再進一服取汗出乃愈蓋陰毒之氣隨汗而出也五六日可治七日不可治如湯藥不受面唇指甲皆青黑色或時鄭聲舌卷囊縮煩躁冷汗不止腰背眼痛此皆陰寒毒氣入深急用蒸臍法如手足温煖即止知人事者生灌入生姜汁煎用藥不可與凉劑悞服必死

夾陰傷寒

陰極發躁用四逆湯合生脉散入辰砂細茶白蜜冷服陰利用四逆湯加人参茯苓肉桂肉果砂仁木通灯心升麻少許服之虛阳伏阴用加減五積散冷服藥服下嗌冷体既消熱性乃發熱因寒用也

寒疫

寒疫四時皆有之若初起病頭疼發熱增寒拘急或吐逆惡心中脘痞滿或飲食停留不化或腹中作痛未發熱者宜藿香正氣散加減治之若已發熱者十味芎蘇散汗之若身体痛骨節疼發熱者羌活冲和湯加蘇葱主之若有汗不得再發汗宜加減冲和湯主之若邪熱不解傳入裏变證者宜從正傷寒條内治之

大頭傷寒

若先發於鼻額紅腫以至兩目盛腫而不開并額

上面部皆赤而腫者此屬阳明也或壯熱氣喘口乾舌燥咽喉腫痛不利脉来數大者用普濟消毒飲主之内實熱盛者用通聖消毒飲若發於耳之上下前後并頭角紅腫此屬少阳也或肌熱日晡熱潮熱往来寒熱口苦咽乾目疼脇下滿宜小柴胡加天花粉羌活荊芥連翹芩連主之若發於頭上并腦後項下及目後赤腫者此屬太阳也宜荊芥敗毒散主之若三阳俱受邪併於頭面耳目鼻者以普濟消毒散外用清凉救苦散敷之治法當

先緩後急則邪伏也先緩者宜退熱消毒虚人兼扶元氣胃虚食少者宜助胃氣候其大便内熱甚以大黃下之拔其毒根此緩之法盖此毒先腫於鼻額次腫於目又次腫於耳從耳至頭上絡後腦結塊則止不散必膿也普濟消毒飲如無板藍根用大青或青黛虚人脉弱加人参引至毒處加皂角刺胃弱食少加白术橘紅如大便不通加酒浸大黃服後就卧使藥氣上行内熱用荊芥則毒散加酒炒黃芩熱盛加酒炒黃連口渴加天花粉凡

頭面腫盛目不開鼻塞悶口乾舌燥内外有熱或咽喉腫痛不利或内實大便秘結脉洪數煩渴宜用通聖消毒散不消加牛蒡子玄参或生犀角水姜汁服凡時毒頭面赤腫咽嗌堵塞水藥不受者臟腑素有積熱發為腫毒疙瘩一切悪瘡紅腫並宜漏蘆湯大便實加大黃芒硝凡雷頭風頭面疙瘩腫痛增寒壯熱四肢拘急状似傷寒用清震湯治咽喉腫病用緑雲散以細竹管吹入喉中病處

食積

身不痛悪食噯氣作嘔欲吐不出悪心短氣痞滿腹脹胃口痛按亦痛

中濕類傷寒

太陽病關節疼痛脉沉細者此名濕痺其人小便不利大便反快但當利小便凡濕病頭汗出背強欲得被覆向火胸滿小便不利舌上白胎者此丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不飲則口燥煩也若悞下則噦為难治若下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死也

痰證類傷寒

如病人目睛微定暫時轉動目如炭煤昔肥今瘦喘嗽轉側半难臂痛皆痰證也痰在上部寸口脉浮滑痰在中部右関脉滑大痰在下部尺脉洪滑或痰飲發寒熱胸滿氣粗語出無倫此夾痰如見祟用二陳湯加蘇子枳實芩連瓜蔞貝母桔梗山梔前胡姜汁調辰砂温服

内傷瘀血證發熱狀類傷寒

或被踢打相撲閃朒一時不覺過至半日或一二三日而發者有至十數日半月一月而發者胸脇小腹滿痛手不可近者而發寒熱此有瘀血也或一時傷重就發寒熱瘀血上冲則昏迷不省如死之狀良久復甦輕則當歸導滞湯重則桃仁承氣湯加蘇木紅花牛膝桔梗姜汁量其元氣下其瘀血自愈

漱水不欲嚥

漱水不欲嚥者此属陽明胃熱也欲飲不欲嚥是邪熱循經裏無熱也陽明氣血俱多熱迫血妄行作衂但欲嗽水不欲嚥口燥者用犀角地黄湯外無寒熱喜忘如狂小便自利大便黒色口燥舌乾但嗽水不欲嚥者此有瘀血結於下焦宜桃仁承氣湯下尽黒物則愈少陰證脉沉細手足冷或時煩燥渴嗽水不欲嚥者宜四逆湯下利厥逆無脉乾嘔煩渴嗽水不欲嚥下宜白通湯加猪胆汁入人尿煮之厥陰蚘厥煩躁吐蚘口燥舌乾但欲凉水浸舌并口唇時不可離不欲嚥下宜理中湯加烏梅花椒主之大抵陰證發躁煩渴不能飲水或欲勉強飲下良久誠復吐出或飲水而嘔噦者皆内寒也宜四逆湯温之盖無根失守之火遊於咽嗌之間假作燥渴則不能飲水也

晝夜偏劇

凡病晝静夜劇者熱在血分宜四物湯加黄柏知母芩連山梔丹皮夜柴胡主之若夜静晝劇此熱在氣分宜小柴加山梔連母地骨主之

心下滿

傷寒心下滿者當心下高起滿硬者是也不經下

後而滿者則有吐下之分若下後心滿者有結胸痞氣之別若發熱者以小柴胡加枳實姜炒黃連去黃芩治之若按之拍〻有聲而軟者此停水五苓散主之若按之硬痛者有宿食也輕則消導重則用承氣下之寒在胃中心下滿而煩飢不能食宜瓜蒂散吐之陽明病心下滿硬者不可下〻之則利不止者死脉浮大有力心下硬有燥渴譫語大便實者此屬臟病宜攻之此言屬臟者宿屎在臟也故下之若食在胃口未入於胃未可下也大抵腹中滿心下滿胃中滿俱不可用甘草糖棗甘甘之物蓋甘能補氣填實故也外用姜擦法甚良

遺尿

遺尿者小便自出而不知也大抵熱盛神昏遺尿者可治若陰證下寒逆冷遺尿脉沉者多難治宜四逆湯加益智仁主之厥陰囊縮逆冷脉沉遺尿者宜四物加茱萸湯陽不回者死傷寒汗下之後熱不解陰虛火動而遺尿者用人參三白湯加黃栢知母麥冬五味歸地主之

大便自利

下利微熱渴脉弱自愈下利脉數微熱汗出自愈

驚惕

傷寒八九日胸滿煩驚小便不利譫語一身盡痛用柴胡龍骨牡蠣湯主之大抵傷寒汗吐下之後虛極之人或因事驚恐遂生驚惕宜養心血安神之劑

呃逆

橘皮半夏生姜湯加茯苓枳實陳皮桔梗凡其氣自臍下直衝於胸嗌間呃忒者此陰證呃忒也其病不在胃因下虛內有伏陰或誤服寒藥遂至冷極於下迫火上衝發為呃忒而欲盡也又病人煩躁自覺甚熱他人以手按其肌膚則冷此為無根失守之火散乱為熱非實熱也乃水極似火陰證似陽若不識此誤用涼藥下咽則死當用羌活附子湯加官桂人参木香陳皮半夏砂仁急溫其下真陽回陰火降呃忒止也陰證及因胃寒呃忒不止者外用乳香硫黃散嗅法內用丁香柿蒂散

之則止再灸期門中脘氣海關元此良法也但手足温煖脉重者為有生矣灸期門穴法以婦人之乳頭向下尽處骨間動脉是穴男女乳小者以手一指為率陥中動脉是穴男左女右灸三五壯

譫語

諸譫語脉浮大者生沉小四逆者死也太陽本病邪結膀胱其人如狂與五苓散利之加辰砂末虚甚錯語柴胡三白湯加黄連麥冬五味主之

鄭聲

八十九卷　廿三

鄭聲者喉中鄭重而不接續如氣息不促手足頗温其脉沉細者急以白虎湯加人参五味麥冬助其元氣或濃煎獨参湯徐〻呷之其脉微細大小便自利手足冷用白通湯

瘖瘂不言

瘖瘂不言者若少陰病咽中生瘡不能言語者以鷄子苦酒湯若狐惑上脣青瘡声嗄者在本條瘂病口噤不能言治在本條熱病瘖瘂不言三四日不得汗出者死熱甚大腸肺金不能言者宜清肺降火則愈風熱擁盛咳嗽聲瘂者以消風熱降痰火則愈又有失於發散風邪伏於肺中者當以發散為主也

陰證似陽

又云面赤目赤引飲脉来七八至按之則散者此無根之脉用人参四逆湯治之又夾陰中寒面色青脉沉厥冷囊縮舌巻下利清穀裏寒外熱者身痛脉沉厥冷脉微欲絶者並用四逆湯瀉多加肉果訶子粟殻炒陳壁土熟艾木通燈心二十莖取

八十九卷　卌

土氣嘔吐不止加姜汁半夏陳皮胃氣寒嘔不止加丁香咽喉痛不利加桔梗大腹痛加肉桂乾姜小腹絞痛加茱萸青皮藿香腹痛甚不止加木香乳香没藥砂仁熟艾玄胡口食寒物身受寒氣加砂仁草果藿葉悪寒戰慄加麻黄桂枝骨體疼痛甚加桂枝羌活蒼朮胃寒發呃加丁香柿蒂茴香良姜為末姜湯調服或入前湯調服立止口吐涎沫加塩炒茱萸名茱萸四逆有寒痰加半夏姜陳皮候服寒涼藥過多胸腹脹悶閉格不通嘔逆不

止湯藥不受欲死者加丁沉木香蘇子檳榔枳實
陳皮姜汁傳送去甘草凡尼姑女冠寡婦室女與
其有夫妻妾不同患陰寒證者倍加附子不必疑
乃陰多陽少故也

冷結

凡人手足厥冷脉沉細無結胸但小腹脹滿按之
痛者此冷結膀胱須灸關元穴也宜服茱萸當歸
四逆湯磨木香溫服外用揉熨法

蚘厥

舌乾口燥常欲冷水不欲嚥蚘上煩躁昏亂欲死
兩手脉沉遲足冷至膝甚者連蚘并屎俱出大便
不行此證雖出多端可救治也加味理中安蚘湯
主之又有胃中空虛蟲無所安反食其真臟之血
病人心胸脇下有痛陣必攢眉呻吟或時下血如
豚肝色或如溼毒膿狀或鮮血下利急迫或昏沉
不省人事者一切吐蚘雖身大熱不可與凉劑服
之必死俱用理中安蚘湯加减治之待蚘定却以
小柴胡退熱又有厥陰病消渴氣上冲心飢不能

食食即吐蚘既曰胃寒復有消渴之證蓋熱在上
焦而中下焦但寒而無熱若大便實用理中湯加
大黄主之吐蚘未止加黄連苦楝樹皮細辛治蚘
不可用甘草

鬱冒不仁

四逆湯加人參歸桂枝藭著天麻主之凡頭目眩
暈非鬱冒也蓋眩暈為輕鬱冒為重

肉瞤筋惕

太陽病發汗出不解仍發汗頭身瞤動振振欲擗

地用真武湯合人參養榮湯倍用歸著若不因汗
過多其人筋脉跳動者此人禀素血少邪熱傳于
六脉之中火動惕也用加味人參養榮湯汗後虛
煩不得眠筋惕肉瞤內有熱以加味溫膽湯

肉苛

肉苛者雖著衣絮猶尚苛也傷寒發汗過多亡其
血者乃変此證蓋榮虛而衛實則血氣不得和通
肉失所養故頑痺不仁痛痒不知也用羌活冲和
湯加桂枝當歸木香主之治肉苛肌肉不仁路龍

吉升麻湯治榮虛衛實肌肉不仁痲身痛痒用肉苛羌活散

百合

若惡寒嘔者病在上焦二十三日愈若腹滿微喘大便堅三四日一行微溏者病在中焦六十三日愈若小便淋瀝难者病在下焦三十三日愈並宜百合湯主治百合病也已經發汗後更發者用百合知母湯已經下後更發者用百合代赭湯已經吐後更發者用百合鷄子湯

一八 十九卷 廿七

痓痙

不因汗所生者當平肝木降心火佐以和血之劑用羌防荊連柴芍歸地川芎天麻參類若兼痰者必加南星半夏竹瀝姜汁如風邪急搐須兼全蝎姜蚕若曾經汗下之後多日傳变得此證者為病勢虛極生風用小續命湯加減凡傷寒汗出露風則汗不流通遂变筋脉攣急手足搐搦用牛蒡根散主之若用小續命湯有汗去麻黄無汗去黄芩須要通变治之

循衣摸牀

凡循衣摸牀直視譫語脉弦者生脉濇者死小便利者可治不利者不可治謂津液枯竭也大抵陰阳二氣俱絶則妄言撮空也若大便秘結撮空譫語燥渴者此為實熱宜承氣湯下之

舌卷囊縮

有陽證有陰證其陽證囊縮者因熱極而縮急用大承氣湯下之陰證囊縮者因寒極而縮急用四逆易加呉茱萸湯温之婦人無囊覌其乳頭縮者即是也凡治此症先灸関元氣海丹田及蒸熨法甚効

八 十九卷 廿八

瘥後發腫

傷寒方愈後浮腫者此水氣也用牡蠣澤瀉散主之胃虛食少五苓散加蒼术陳皮木香砂仁胃不虛者以商陸一味煮粥食之亦妙傷寒大病瘥後足腫者不妨但節飲食戒酒色胃氣強腫自消

瘥後遺毒

傷寒汗下不徹餘邪結在耳後一寸二三分或両

耳下俱硬腫者名曰遺毒宜速消散緩之必成膿以連翹敗毒散治之項腫痛加威靈仙大便實加大黃川山甲發腫有膿不消或已破未破者但用內托消毒散加皂莢升麻金銀花甘草

痘後發碗頭瘡

碗頭瘡者亦因汗下後餘毒不盡痘後故發碗頭瘡也只以黃連甘草歸尾紅花防風苦參荆芥連翹羌活白芷煎服外用芒硝赤小荳青黛爲末以鷄子清和猪膽汁調敷瘡上最効勿動待其脫落

傷寒痘後小便澁有血者名曰內外瘡皆有膿不出膿者死亦是餘熱毒也用黃連解毒湯加生地歸翹木通滑石牛膝萹蓄琥珀甘草梢

痘後勞復

氣虛煩嘔竹葉石膏湯燥渴去半夏知母倍天花粉虛熱不止者千金麥冬湯

痘後女勞復

其候頭重不擧目中生花腰背痛小腹裏急絞痛或增寒發熱或時陰火上衝頭面烘熱心胸煩悶者竹皮燒裩散猳鼠屎有熱加柴胡調赤衣散人虛弱者用參胡三白湯調赤衣散小腹急痛脉沉足冷用當歸四逆湯加熟附茱萸送下赤衣散若見卵縮入腹脉見離經者死

痘後陰陽易

若傷腎經虛損真陽有寒無熱脉虛足冷者以人參四逆湯調下燒裩散若傷肝經以當歸四逆湯加茱萸熟附下燒裩散用分寒熱而治陰易熱氣上衝胸中煩悶手足拳攣搐搦如風狀用瓜蔞竹茹湯婦人病未平復有犯房事小腹急痛連腰胯痛四肢不仁無熱者當歸白朮散陰陽易不瘥大便不通心神昏亂驚惕不安用妙香丸

痘後虛弱

痘後虛熱盜汗不止屬陰虛用當歸六黃湯陽虛自汗無熱惡寒無力下虛用加味黃芪建中湯痘後心神恍惚不寧夜卧煩躁不安或亂夢虛驚不眠因汗下過多心血虧少用硃砂安神丸加遠志酸棗仁茯神有痰加橘紅

瘥後昏沉

若用知毋麻黄取汗者但慮病後血氣兩虛豈可再大汗之若人元氣壯實脉來有力者乃可行之脉虛人弱者只用十味温膽湯有寒熱潮熱日晡發熱者參胡温膽湯加苓連主之

瘥後飲酒復劇

緣傷寒病熱未解而飲酒者則病增劇轉加熱感脉弦數者用小柴胡合解毒湯加烏梅乾葛砂仁脉洪者用人參白虎湯合黄連解毒湯加乾葛烏

梅砂仁主之

妊娠傷寒

若有表證宜汗者用羌活冲和湯加紫胡當帰芎藥蘇葉蒴白即四物冲和湯汗之有氣喘喘急加香附砂仁去生地外用護胎法若裏實熱證大便不通燥渴者當用大黄轉藥不必疑矣須酒制用有病則病當之設患真寒脉伏厥冷用姜桂附子不必慮也附姜桂雖熱炒制無害必加黄連甘草制之沉香墜之

産後傷寒

産後傷寒不可輕易汗下恐産時傷力其發熱有去血過多有悪露不盡有三日蒸乳發熱或早起勞動或飲食停滞俱有發熱悪寒状類傷寒不可便用發表攻裏之劑産後悪露不盡亦有發熱悪寒必脇肋脹満連大小腹有塊作痛産後飲食停滞發熱頭痛必有噫氣作酸悪聞食臭胸膈飽悶右関脉緊用治中湯加山柤神曲砂仁炒黄連川芎當帰佐之若産後蒸乳發熱悪寒者必乳間脹

硬疼痛令産婦揉乳汁通其熱自除不藥而愈矣若果産後不謹慮中入風者當以四物湯加防風荊芥白芷人參香附烏梅姜蚕乾姜産後不謹感冒傷寒發熱悪寒頭疼骨疼脉浮緊表證宜汗者用四物湯加羌活蒼朮白朮乾姜蘇葉梔子少佐用蒴白頭水煎取微汗自汗去蒼朮蘇葉加白朮熱甚加軟柴胡乾姜必許黄芩佐之熱用熱邪傳裏口燥渴大便不通脉沉實或熱甚譫語宜下之輕則蜜導法重則用四物加柴胡炒黄芩枳殻熱

大黃微下就用四物湯加乾姜少許參朮大用以温補其血氣若熱邪傳至半表半裏證寒熱嘔口苦脉洪數者四物湯合小柴胡主之

不可水

水停心下微〻喘　汗吐下而脾胃寒
腹滿結胸煮不食　縱貪切勿與之餐

傷寒大吐下後外氣怫鬱胃中寒也發汗後亢不可水與之則噦嘔喘咳發熱悪寒濡弱相搏臟氣裏微胸中苦煩非結也不可水漬青布冷貼胸中誤下後寒氣相搏腸鳴得水令汗大出即成餲陽明病潮熱誤下腹滿不能食或胃中虗冷不能食皆不可水下利脉浮大不可水當温之傷寒結胸無熱證者宜平和藥若與水益令熱不得出當汗而不汗則煩假令汗出後腹中痛亦服和氣之藥

再三汗下熱不退

汗下再三熱弗休　長沙公見應心憂
人參白虎加蒼朮　解毒湯和涼膈傳

經云三下而熱不退者即死後人有四五次下加至十數次行而生者此乃偶誤中耳活者未一二死者已千百观是之言後之學者切不可以爲法但當解毒合涼膈多服調之使陽熱徐退陰脉漸生庶不失事是知權变者矣傷寒下後自汗虗熱不已白虎湯加人參蒼朮一服如神汗出身涼此通仙之妙法也汗下之後熱不退不問有汗無汗皆宜白虎加蒼朮湯解之又加人參亦妙仍服涼膈合解毒調之發汗之後熱不解脉尚浮者白虎加蒼朮湯傷寒表解傳裏熱而不退或有汗而未愈調和陰陽湯病在半表半裏熱不退小柴胡湯半表半裏大便微實小柴胡湯加大黃半表半裏大便不通者除膈熱湯裏熱微者宜除胃熱湯熱勢未退宜六一順氣湯而除表裏之熱病至六七日裏熱已甚表熱漸微脉雖浮數先用大柴胡湯不退宜解裏熱湯病在半裏半表熱不退脉尚浮洪者當微表小柴胡合白虎湯和之病在半表半裏

脉沉實當微利除膈熱湯輕下之汗吐下三法
之後别無異證但些微熱或無熱並小柴胡和
之口舌乾燥合解毒湯凉之汗吐下之後别無
異證大便硬結不通凉膈散病熱已去微熱者
以益元散和之無令再病熱不退發黄班凉膈
散加當歸下後熱不退或證未全退双解散双
和表裏大汗前後逆氣熱勢不退双解散瘥後
遺熱不退双解散再解之次用小柴胡和之他
人病氣汗毒傳染或食猪羊牛馬酒毒再復發

一八十九卷　廿五

熱不退双解散除膈熱湯風寒暑湿飢飽勞逸
憂愁思慮恚怒悲恐四時中外諸邪所傷意氣
身熱頭項拘勸強痛發熱惡寒惡風汗下後熱
不退並宜服双解散有汗去麻黄無汗加葛根
身微熱不退表虚汗出不已或過發汗以致表
虚脉不實海藏黄耆湯畜〻惡寒發熱不退其
人大渴飲水者其腹必滿小便不利而自汗出
其病欲解此為肝乘肺名曰縱當刺期門發熱
不退腹滿譫語寸口脉浮緊此為肝乘脾名曰

横當刺期門男女下血發熱不退譫語者此為
熱入血室但頭上汗出者當刺期門婦人經水
適来適断者為熱入血室

四肢冷　附四肢沉重四肢不收

下利肢疼屬厥陰　欲眠嘿〻風温尋
身如被杖旋真武　厥利脉沉四逆珍

四肢疼下利厥逆惡寒脉沉弱四逆湯回陽急
救湯少陰證四肢沉重疼痛欬咯小便不利或
自下利而咳真武湯温經益元湯四肢沉重唇

八十九卷　廿六

黒有瘡或如傷寒四肢沉重忽〻喜眠見多眠
條羗活蒼术湯風温証四肢不收嘿〻欲眠頭
疼身熱自汗体重而喘萎蕤湯羗活蒼术湯

結陽

四肢腫滿結陽名　陽脉住停氣不行
八正五苓兼理胃　消風退腫萬全靈

結陽者肢腫也諸陽脉不行陰府留結成熱為
四肢腫滿也萬全木通散五苓散八正散並加
蘿蔔枯酒曇根妙

結陰

血氣無宗滲入腸　致成便血可驚惶

三黃補血誠為妙　四物阿膠桂附湯

結陰者便血也陰氣內結不得通行血氣無宗滲入腸則下血也四物阿膠湯三黃補血湯桂附六合湯

寒在皮膚熱在骨髓熱在皮膚寒在骨髓

病身大熱反欲衣　寒在骨間熱在皮

寒在皮膚熱骨髓　身寒反不用其衣

八十九卷　卅七

身熱惡寒而反欲得近衣者先服麻黃湯汗之次用柴胡桂枝湯和之身寒惡熱而反不欲近衣者先用防風通聖散人參羌活散表之次用白虎加人參湯和之蘊要云身熱欲衣桂麻各半湯身寒不欲衣白虎加桂枝湯劉全備云身熱而常貪納被內虛寒而邪熱淺浮藥辛溫而取効宜不換金正氣散八解散並加川芎白芷頭疼加細辛羌活葱白藿香正氣散人參養胃湯五積散臨証擇用加減得宜最為良法体寒而欲掀衣素壯熱而感寒鬱閉飲辛凉而必痊宜人參敗毒散防風通聖散升麻葛根湯柴葛解肌湯參蘇飲芎並加黃芩主之

太陽傳經用藥

傷寒傳病太陽始　依次傳經陽明起

若越陰經不順傳　各經引藥加減矣

太陽傳陽明而太陽證已罷陽明證已至曰傳經餘倣此

八十九卷　卅八

太陽傳陽明名巡經傳葛根湯入於裏承氣凉膈下之

太陽傳少陽名越經傳小柴胡加川芎

太陽傳少陰名表傳裏小承氣凉膈合小柴胡或更合解毒天水

太陽傳太陰名誤下傳桂枝加芍藥湯桂枝加大黃湯

太陽傳厥陰名巡經得度傳大承氣湯加川芎柴胡六一順氣湯

太陽自入於本名傳本未入本為表麻黃湯自

入本為棗五苓散

内傷似外感始為熱中病

始為熱中氣难言　頭痛四肢痓悶煎
鼻息不調聞食悪　補中益氣正當先

頭痛大作四肢痓悶氣高而喘身熱而煩上氣鼻息不調四肢困倦不收無氣以動無氣以言或煩躁悶乱心煩不安或渴不止病久者邪氣在血脉中有湿故不渴如病渴是心火炎上剋肺金故渴或表虚不任風寒目不欲開口不知

八十九卷　廿九

味右手氣口脉大〻於左手人迎三倍其氣口脉急大而數時一代而澁是脉之本脉代者是無氣不相接乃脾胃不足之脉是洪大而數乃心脉刑肺急是弦急乃肝脉挾心火剋肺金也其右關脾脉比五脉獨大而數〻中顯緩時一代此不甚劳役是飲食不節寒温失所則右關胃脉損弱隱而不見惟内顯脾脉如此也治用補中益氣湯

内傷似外感末傳寒中病

末傳寒中胃心疼　足弱肢寒嗌不通
脉大濇而腰脊痛　神聖湯施豆蔻同

腹脹胃脘當心痛四肢兩脇膈咽不通或涎唾或清涕或多溺足下痛不能任身履地骨乏無力喜唾兩睾丸冷陰作痛或妄見鬼状夢亡人腰背脾眼腰脊皆痛不渴不瀉脉盛大以濇名曰寒中病用神聖復氣湯白术附子湯草豆蔻丸

内傷似外感陽明中熱病

内傷中熱類陽明　脾胃久虚因熱秉

八十九卷　四十

清暑益氣加减用　誤施白虎恐难禁

有天氣大熱時劳役得病或路途劳役或田野中劳役或身体怯弱食少劳役或長齋久素胃氣久虚劳役其病肌体壮熱躁熱悶乱大悪熱渴飲水漿與陽明傷寒熱白虎湯證相似鼻口中氣短促上喘此乃脾胃久虚元氣不足之證身亦疼痛至日西作必譫語熱渴悶不止脉洪大空虚或微弱白虎湯證其脉洪大有力與此内傷中熱不同治用清暑益氣湯

內傷似外感溫熱病

溫熱病生長夏間　精神困倦汗垂潸
氣高而喘熱煩悶　清暑湯施益氣還

長夏五六月溫熱之時人困勸四肢不收精神短少胸滿短氣肢節疼氣高而喘身熱而煩或大便泄利或黃或白泔色或渴或不渴或不飲食或小便頻數而黃治用清暑益氣湯

內傷似傷寒

內傷煩躁類傷寒　伏熱蒸蒸總一般

昏倦不眠脉細數　補中益氣倍參安

凡似傷寒煩躁不絕聲汗後復熱脉細數五七日不睡補中益氣倍人參用竹葉同煎甚者加麥門冬五味知母

似傷寒三戰後勞乏煩躁昏倦四君子加當歸黃蓍知母麥門冬五味子

似傷寒至五七日汗後煩躁喫水者補中益氣加附子

有舌黑燥大便滑泄食在大腸煩躁夜不安宜防風當歸飲子

內傷病退後燥渴不解者有餘熱在肺參苓甘草少加姜汁冷服虛者用人參湯

房室傷風

房室傷風脉緊浮　頭疼發熱汗如油
解肌羌活湯尤穩　參术芎歸白术投

躰氣虛弱犯房室而冒傷風頭疼發熱自汗惡風脉浮緩宜羌活湯大白术湯並加當歸人參黃蓍湯血虛汗不止加桂枝白芍當歸參术芎

歸湯

凡房室傷風挾內傷者補中益氣湯隨六經加減

頭疼惡寒羌活散身熱石膏湯腹痛合芍藥散寒熱合柴胡散自汗加白术茯苓無汗蒼术防風氣虛合四君子血虛合四物湯

房室傷寒

房勞因感冒寒憂　無汗頭疼脉緊浮
羌活湯兼大白术　人參敗毒總宜投

夫人體氣虛弱犯房室而感傷寒頭疼發熱無汗惡寒脉浮緊宜羌活湯大白术當歸人參川芎湯加當歸蒼术防風參术芎歸湯

頭疼發熱自汗惡風脉浮緊無汗惡寒脉浮緩黃蓍湯合川芎湯汗止外證不解九味羌活湯加人參當歸

頭疼身体痛發熱惡寒或惡風或胸痛或咳嗽或寒熱人參敗毒散無汗加蒼术防風當歸自汗加白术黃蓍當歸參术芎歸湯加減

八十九卷

四三

血虛人四物湯頭疼惡風合羌活散腹痛合芍藥散寒熱而嘔合柴胡散上證全俱合服体氣虛甚加人參

頭疼惡風身熱自汗羌活散合石膏湯血虛者更合四物湯

身熱自汗腹痛石膏湯合芍藥散血虛者更合四物寒熱腹痛柴胡散合芍藥散血虛者更合四物湯

頭疼惡風身熱自汗腹中痛寒熱而嘔羌活散石膏湯芍藥散柴胡散四藥合和血虛者更合四物湯

大抵羌活散治頭痛惡風石膏湯治身熱自汗芍藥散治腹中痛柴胡散治寒熱而嘔四物湯治血虛四君子治氣虛無汗加蒼术川芎防風自汗加白术黃蓍茯苓有是諸證臨時選用合服不可執一而無權也

瘡瘍發熱類傷寒

瘡瘍發熱要詳看　初發防荊敗毒安

八十九卷

四四

已潰還須托裏散　忌投汗劑與涼寒

經曰諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處飲食如常畜積有膿也又曰數脉不時則生惡瘡也所以惡瘡初生必寒熱交作不可便以傷寒治之須視病人頭面脊背有無瘡頭若有小紅白膿頭瘡須當仔細辨之凡發背初作只起一小瘡也不過二三日則大發也若疔瘡初作全與傷寒相似要當識之也若一例而發汗或妄投寒涼之劑則誤之矣若識其瘡毒須尋瘡

科治之庶不誤也若毒氣走散則难救矣
初生在表瘡毒正發而未潰發熱惡寒宜防荆
敗毒散行凉敗毒散隨證加减服之若有凉血
止痛草藥可增入數味在內和服亦可取効速
如小薊五爪龍紫金皮金銀花之類皆可用
如瘡毒已潰宜托裏解毒湯隨證加减或有草
藥乾臙散血之剂亦可增入數味可也如小薊
川山蜈蚣紫金皮之類是也
初生未成者速塗令消散宜拔毒散已潰爛者
一八十九卷 四十五
用鐵箍散

赤膈傷寒

赤膈傷寒胸膈上　疼痛赤腫號為名
防風敗毒宜加减　裏實防風通聖螢
夫受傷於寒变故萬狀未易黙悟也然胸膈赤
腫疼痛頭疼發熱惡寒身躰痛此非正傷寒乃
類傷寒也名之赤膈傷寒宜防荆敗毒散加瓜
蔞子黃連黃芩紫金皮玄參赤芍升麻白芷
有表復有裏胸膈赤腫疼痛防風通聖散加瓜
蔞子黃連紫金皮
表證已退大便燥實胸膈腫痛凉膈解毒加瓜
蔞子枳壳桔梗紫金皮赤芍藥又宜稜鍼刺腫
處出血
半表半裏胸膈腫痛柴胡枳桔湯加瓜蔞子紫
金皮赤芍藥

黃耳傷寒

黃耳傷寒耳痛詳　要知風入腎經戕
不治卒变成危證　續命防荆敗毒良
一八十九卷 四十六
九耳中策策痛者皆是風入於腎經也不治流
入腎則卒然变惡寒發熱脊強背直如痓之狀
曰黃耳傷寒也此不可作正傷寒治乃類傷寒
法也
治宜小續命去附子加白附子姜蚕天麻羌活
獨活蔓荆子細辛
次用防荆敗毒散加細辛蔓荆子白芷蟬蜕黃
芩赤芍紫金皮
又法用苦參磨冷水滴入耳中熱則去之再易

又虎耳草取汁滴入中
又猴姜根取汁滴入耳中
又苦薄荷土木香擂汁滴入耳中

解㑊類傷寒

解㑊傷寒出内經　四肢骨節若伶仃
寒如不寒熱不熱　治法通舒血氣宰

解者肌肉解散㑊者筋不束骨解㑊之證似寒非寒似熱非熱四躰骨節解散懈惰倦怠煩疼飲食不美食不知味俗呼為砂病内經名為解

六十九卷　四七

㑊原其因或傷酒或中濕或感冒風寒或房事過多或婦人經水不調血氣不和皆能為解㑊證與砂病相似實非真砂病也治宜先用熱水蘸搭臂膊而以苧麻刮之甚者更以鍼刺十宣及委中出血或以香油燈照視身背有紅點處皆烙之皆能使腠理開通血氣舒暢而愈又宜服蘇合香丸

砂病類傷寒

嶺南砂病類傷寒　壯熱憎寒肢痛酸
鸂鶒鸀鳿毛糞煆　酒調灰服勝金冊

夫沙病者嶺南閩廣之地多有之矣乃溪毒砂虱水弩射工蜮短狐鰕鬚之類俱能含砂射人被其毒者則憎寒壯熱百躰分解似傷寒初發之狀彼土人治法以手捫摸痛處用角筒入肉以口吸出其砂外用大蒜煨搗膏封貼瘡口即愈諸蟲惟鰕鬚最毒若不早治十死八九其毒深入於骨若鰕鬚之狀其瘡類乎疔腫彼地有鸂鶒鸀鳿等鳥專食已上諸蟲以此鳥毛糞燒

六十九卷　四八

灰服之及籠此鳥於被毒病者身畔吸之其砂闕氣自出而病愈也

摇頭

摇頭直視似煙熏　真病心家已絶根
痓證反張并口噤　頭中痛者戰而言

頭者諸陽之會陽脉有乖則頭為之摇動然有心絶而摇頭者有風盛而摇頭者形證皆不類焉陰根於陽〻根於陰〻陽互根氣血所以周流而無間若心絶則神去而陰竭陽獨無根不

能自主是以頭搖經所謂陽毒留形体如煙熏
直視搖頭者此也至於太陽發痓則風盛於上
風主乎動是以頭搖經所謂獨搖頭卒口噤而
背反張者此也言搖頭中有痛也言則甚痛又
云裏痛言者為虛不言為實均是搖頭析而分
之曰實邪曰虛邪曰真邪當明其臧否可灸百
會上星風府其搖即定

身痒

陰陽虛弱渾身痒　　未解桂枝各半靈

風盛防風通聖散　　血虛四物入浮萍

陽明反無汗皮中如蟲行以久虛也朮附湯黃
蓍建中湯

風熱盛身痒發熱無汗口燥舌乾大小便秘澁
防風通聖散加羌活

風證身痒小續命去附子加白附子

血虛身痒四物湯加浮萍蒺藜防風

未交接而作易病治

新瘥後未交接　　曾與言談起慾心

思慾切心因病復　　女勞易病共條尋

夫男子病新瘥未與婦人交接而男子感動其
情思其慾事心切而得病者治與女勞復同

人迎氣口脉

左手關前一分為人迎之位凡脉緊盛迺傷寒也
右手關前一分為氣口之位凡脉緊盛迺傷食也
若人迎氣口俱緊盛此為夾食傷寒又曰內傷夾
外感也

衝陽脉

衝陽脉在足面去指縫陷谷三寸動脉中此陽明
胃經之脉動於此夫胃為水穀之本人之所主若
胃氣已憊水穀不進穀神以去其脉不動而死也
故傷寒胗衝陽者以察胃氣之有無也仲景又謂
之趺陽脉

太谿脉

太谿脉在足內踝後陷中動脉是也此少陰腎經
脉動於此蓋腎者乃人身之命蒂真氣之所主然
其脉動而不息者真氣在也若真氣以憊腎氣以

絕其脉不動而死雖衝陽有脉而少能進食者亦主死也

結脉

結者間至而動緩而一止復来者曰結此陰盛之脉凡傷寒脉結代心動悸者炙甘草湯若脉結足冷腹中痛陽氣以微者大建中湯若雜病之脉結者主有老痰食積死血在内為之可治若内無宿積其脉結者此為不相應病發多难治也

促脉

促者間至而動數而一止復来曰促此陽盛之脉凡熱極發班發喘等証皆脉促也雜病則多因怒氣傷肝與夫畜血在於上焦者皆脉促也大抵促脉漸退則生漸加則死矣

代脉

代者止也動而歇至不能自還曰代乃真氣以僃不可治若結而代者可治非結而獨代者為不可治也

或問近世多用藿香正氣散傷寒可用否然此方宋時所制治内傷脾胃外感寒邪增寒拘急頭痛嘔逆胸中滿悶與夫傷食傷冷傷湿中暑霍亂山嵐瘴氣不伏水土寒熱作瘧並宜增損用之乃良方也非正傷寒之藥若病在太陽經頭疼發熱骨節疼痛者此方全無相干如妄用之先虗正氣逆其經絡雖出汗亦不觧此乃無益而反有害徃〻誤用之遂至変逆危殆而不救良可悲夫凡傷寒發熱脉沉與元氣虗人并夾阴傷寒發熱者皆不可用切宜戒之

或問局方十神湯傷寒發散可用否然此湯用升麻葛根能觧利陽明經瘟疫時氣發散之藥也蓋非正傷寒之藥若太陽經傷寒發熱用之則引邪入陽明經傳变發班不可勝言也易老云太陽病服葛根是引賊破家也要當辨而用之

或問小柴胡湯近世治傷寒發熱不分阴阳而用之何也然柴胡之苦平乃足少陽經傷寒發熱之藥觧半表半裏之熱除徃来寒熱小有日晡潮熱也佐以黄芩之苦寒以退熱半夏生姜之

辛以散寒人参大棗之甘温以助正氣解渴生津液則陰阳和而邪熱解矣但太阳經之表熱阳明經之標熱皆不能解之也如誤用不無害乎若夾阴傷寒面赤發熱脉沉足冷者服之立至危殆可不慎歟及内虚有寒大便不實脉息小弱及婦人新産發熱皆不可用之也

或問大青龍湯仲景治傷寒發熱悪寒煩躁者服之可用否夫傷寒邪熱在表不得汗出其人則躁亂不安身心無如柰何如脉浮緊或浮数者急用此湯發汗則愈乃仲景之妙法也譬若亢熱已極一雨而涼其理可見也若不曉此理見其躁熱投以寒涼之藥為害豈勝言哉若脉不浮緊数無悪風悪寒身疼者亦不可用之也如誤用其害亦不淺也所以脉證之不明者多不敢用

八十九卷　五十三

或問阴證傷寒用附子湯冷服何也蓋陰極於下陽浮在上之治法也余曾治一人傷寒十餘日脉息沉細手温而足冷大便不通面赤嘔煩渴藥不能下惟喜涼水二三口或西瓜一二塊食下良久而復吐出此陰寒於内逼其浮陽失守之火聚於胸中上冲咽嗌故為面赤嘔煩也遂用附子一箇以生姜自然汁和白麵包裹煨熟去麵取附子去皮臍切作八片又以人参三錢乾姜炮二錢水二中煎取一鍾浸於冷水中待藥冷與之即愈此良法也

或問三陽知可解者何以辯之曰太陽知可解者頭不痛項不強肢節不痛知表已解也陽明知可解者無發熱無悪寒無口渴不便难知裏已解也少阳知可解者寒熱移其時早移於晚氣移於血晚移於早血移於氣是邪無可容之地知可解也如寒熱日作不移其時是邪未退也

八十九卷　五十四

或問太阳禁忌不可犯者何也曰小便不利ゝ之是犯本犯本則邪熱入裏不能解此犯之輕也大便不利不可利ゝ之是動血動血是犯禁此犯之重也

或問治病必求標本治何標本耶曰假令太陽證

傷寒自外入標本有二說以主言之膀胱為本經絡為標以客邪言之先得者為本後得者為標此標先受之即是本也後入于膀胱本卻為標也此乃客邪之標本治當從客之標本如麻黃桂枝治其標羌活藁本治其本也

或問陽明證禁忌不可犯者何也曰不當發汗不當利小便犯之竭其津液則生蓄血證唯當益津液為上以其火就燥也益津液者連鬚葱白足也

八十九卷　五十五

或問半表半裏有幾曰邪在榮衛之間謂之半表半裏太陽々明之間少陽居身之半表裏五苓散分陰陽膀胱經之半表裏理中湯治吐瀉上下之半表裏

或問傷寒惡寒傷風惡風理之昭然不可易也緣麻黃湯下止言惡風桂枝湯下反言惡寒者何也曰仲景言傷寒惡寒傷風惡風言之常也桂枝治傷風麻黃治傷寒一定理也今桂枝湯下反言惡寒麻黃湯下止言惡風言之变也然惡寒者必惡風惡風者未必不惡寒也

或問傷風汗自出桂枝湯以散其邪傷寒無汗麻黃湯以發其汗又言表證未解者用桂枝湯理似相反耶曰傷風汗出腠理自開傷寒已汗後腠理既開故並用桂枝湯以解肌可謂宜矣

或問病有身重不能轉側者有身疼不能轉側者何也曰身重不能轉側者下後血虛津液不榮於外也身疼不能轉側者風濕相搏於經而裏無邪也經曰傷寒八九日風濕相搏身体煩疼

八十九卷　五十六

不能轉側不嘔不渴脉浮虛而澁者桂枝附子湯主之又曰傷寒八九日下之後胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之二者頗類皆係不能轉側但有差殊耳

或問發熱惡寒發於陽無熱惡寒發於陰且如傷寒或發熱或未發熱必惡寒体痛二說皆曰惡寒如何辯之曰傷寒或發熱或未發熱必惡寒体痛嘔逆頭痛項強脉浮緊此在陽可發汗若

陰證則無頭疼無項強但惡寒而踡脉沉細此在陰可溫裏也

或問傷風自汗與中暍自汗皆相似傷寒無汗與冬溫無汗皆相類敢問如何不同曰傷風不渴中暍即渴傷寒脉浮緊冬溫脉不浮也

或問經言用藥有言可與某湯或言不可與又有言宜某湯及某湯主之凡此數節旨意不同敢問曰傷寒論中一字不苟覌是書片言隻字之間當求古人之用意處輕重是非得其至理而

後始可言醫矣所問有言可與某湯或言不可與者此設法禦病也又言宜某湯者此臨證審決也言某湯主之者乃對病施藥也此三者即方法之條目也

或問時人言下不厭遲汗不厭早斯言若何曰凡汗證固宜早仲景謂不避晨夜者此也夫下證須從宜定奪當急則急當緩則緩安可一槩而論假如陽明病已有可下之理但合面赤其在後之熱尤未斂又如嘔多雖有陽明證謂熱在上焦未全入府皆言不可攻凡此之類固宜遲也

或問傷寒論中有証同而藥異有藥同而證異皆非愚陋之可知也且如小青龍與小柴胡證皆治嘔而發熱表裏之病大槩彷彿何故二方用藥之不同誠為可疑也曰治病之要當究病源夫傷寒表不解裡熱未甚而渴欲飲水飲不能多不當與之以腹中熱尚少而不解消水飲停蓄故作諸證然水寒作病非溫熱不能解故用

小青龍湯發汗散水其水氣內漬則所搏不一故有或為之病因隨證增損以解化之原其理初無裏證自水寒以然也其小柴胡證係傷寒發熱之邪傳裏在乎半裏間熱氣內鬱故生或為諸證緣二證雖曰表裏俱病其中寒熱不同故用藥有姜桂柴苓之異苟能循理以推之其事之異同自然明矣更復何疑

或問煩躁不得眠與虛不得眠皆汗下後之餘證夫煩躁以理言則為熱也虛煩者既言虛字非

實熱也何故煩躁反與姜附湯虛煩仍用梔子豉湯二藥天壤之隔其理何如曰煩躁本為熱分晝夜則知陽虛〻煩不得眠無間斷故為裏熱經曰下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱乾姜附子湯退陰復陽其虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯以吐胸中之邪雖曰二證俱煩而不得眠卻有寒熱之異故不同然

八 十九卷 三十九

或問經言脉浮而緊法當身痛宜用汗解之又曰發汗後身疼痛脉沉遲新加湯主之夫身疼痛皆係表邪不盡固宜汗解何故復加人參生姜芍藥以益血也曰表邪盛則身疼血虛則身亦痛其脉浮緊者邪盛也其脉沉遲者血虛也盛者宜損之則安虛者宜益之則愈

或問經言服桂枝湯或下之仍頭項強翕〻發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之夫頭項強痛為邪氣仍在表也雖經汗下而未解猶宜解之何故去桂加茯苓白朮是無意於解表也曰此非桂枝證乃屬飲家也夫頭項強痛既經汗下而不解心下滿而微痛小便不利此為水飲內畜邪不在表故云去桂枝加茯苓白朮若得小便利水消腹滿減而熱自除則頭項強痛悉愈矣

或問經言結胸証其脉浮大者不可下〻之則死既不可下復作何術以治之曰夫陽沉浮關沉乃結胸不可下之脉浮大心下雖結其表邪尚

八 十九卷 卆

多未全結也若輒下之重虛其裏外邪復聚而必死矣仲景言此為箴戒使無踵其弊也其脉既不可攻當以俟其變而待其實假如小結胸證其脉浮滑按之則痛故知邪非深結亦不敢下無過解除心下之熱耳

或問病方入胃何為不傳曰經言陽明居中土萬物所歸無所復傳註曰胃為水穀之海主養四旁四旁有病皆能傳之於胃入胃則更不復傳如太陽傳之入胃則更不傳陽明陽明傳之入

胃則更不傳少陽少陽傳之入胃則更不傳三陰已上所言入胃不傳之理乃聖賢之至論也

或問經言病人無表裡證發熱七八日雖脉浮數者可下之緣攻下之法須外無表邪裏有下證庶几可攻今言無表裏証况脉更浮數何故言可下之然此證此理非僕所知敢問曰此非外感乃内傷也若外不惡寒裏無譫語七八日消爍津液乃陽盛陰虛之時苟不攻之其熱不已而变生焉故云脉雖浮數可下之言不待脉浮

而數浮則傷胃數則動脾此非本病特醫之所為也仲景之意不外是矣凡傷寒當下之證皆從太陽〻明可下之邪而入於府也故下之令不言陽明病而止云病人無表裏證此非自表之裏而病也但為可下故編于陽明篇中此章之理非初學所能備悉其意也

或問六經傷寒惟少陰與厥陰有不治之證以二經較之少陰死證尤多未審其理何如曰少陰者腎也位居子正而一陽生於其中是為復卦乃天地之根宰輔之職周旋運用承上使下一動一靜莫非腎之功也病至其經已至危殆陰陽兩全雖危弗咎盖無陽而陰獨居故言其死然子中之陽氣微弱凡病則易為消鑠其言死多於厥陰也